

## Residência Multiprofissional em Atenção Integral à Saúde - RMG ENFERMEIROS

# 1

Este é o número da  
sua prova. Marque-o  
no cartão de resposta.

### Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

✓ Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova, que contém **80 questões**;
- um cartão de respostas.

✓ Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

✓ Duração da prova: **4 horas**

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Sair da sala: **60 minutos** após o início da prova.
- Levar caderno: **30 minutos para o fim do tempo total da prova, contados a partir do seu efetivo início.**
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

✓ Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

✓ Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.

- ✓ A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.
- ✓ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.
- ✓ **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.
- ✓ Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.
- ✓ Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.
- ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.
- ✓ Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

---

**CONHECIMENTOS BÁSICOS | 30 QUESTÕES**

---

**1)** Diversas doenças contam com vacinas disponíveis à população, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, para algumas enfermidades, ainda não existem vacinas desenvolvidas, não sendo possível preveni-las por meio de imunização específica. Qual das doenças abaixo NÃO possui esse tipo de prevenção?

- a) Hepatite C.
  - b) HPV.
  - c) Hepatite B.
  - d) Difteria.
- 

**2)** A Constituição Federal de 1988 implantou no país o Sistema Único de Saúde (SUS). No título VIII, Da Ordem Social, seção II, referente à Saúde, o art. 196 define que a saúde é:

- a) Uma responsabilidade alheia ao dever do Estado.
  - b) Um direito de todos e dever do Estado.
  - c) Uma obrigação exclusiva da União.
  - d) Um benefício ofertado apenas por seguro social.
- 

**3)** O texto constitucional evidencia que a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se na construção de um modelo de atenção voltado às necessidades da população, reafirmando o compromisso do Estado com o bem-estar social, especialmente no âmbito da saúde coletiva. Dessa forma, foram estabelecidos como princípios doutrinários do SUS os seguintes, EXCETO:

- a) Universalidade.
  - b) Integralidade.
  - c) Equidade.
  - d) Desospitalização.
- 

**4)** A expressão “natimorto” é utilizada em referência ao óbito:

- a) Fetal.
  - b) Ocorrido em nascidos vivos até o 27º dia de vida.
  - c) Ocorrido em nascidos vivos até o 1º ano incompleto de vida.
  - d) Ocorrido até os 12 anos incompletos.
- 

**5)** A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de determinadas doenças, agravos ou eventos de saúde pública. A notificação deve ser realizada por meio do sistema:

- a) PCDT.
  - b) SNC.
  - c) Sinan.
  - d) Sisvan.
- 

**6)** São doenças ou agravos de notificação compulsória, EXCETO:

- a) Botulismo.
  - b) Coqueluche.
  - c) Hanseníase.
  - d) Esquizofrenia.
- 

**7)** Estão entre os objetivos principais da Estratégia Saúde da Família (ESF), EXCETO:

- a) Promover a saúde e prevenir doenças.
  - b) Proporcionar atenção integral à saúde das pessoas.
  - c) Reduzir o vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade.
  - d) Reduzir as desigualdades em saúde.
- 

**8)** Qual dos seguintes profissionais NÃO integra a composição mínima exigida para a implementação de uma Equipe de Saúde da Família?

- a) Farmacêutico.
  - b) Enfermeiro.
  - c) Auxiliar ou técnico de enfermagem.
  - d) Agente comunitário de saúde.
- 

**9)** Segundo as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde por meio de escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores da saúde traduz o conceito de:

- a) Acolhimento.
- b) Parcialidade.
- c) Negligência.
- d) Omissão.

**10)** Ao organizar o Sistema Único de Saúde (SUS), o legislador estabeleceu diretrizes que garantem que os serviços não sejam distribuídos de forma aleatória, mas sim estruturados para atender a população de maneira eficiente. O Art. 8º da Lei nº 8.080/1990 estabelece que as ações e os serviços do SUS devem ser organizados segundo os seguintes princípios organizativos:

- a) Burocratização e centralização.
- b) Regionalização e hierarquização.
- c) Setorização e concentração.
- d) Subordinação e redundância.

**11)** Quanto à organização, direção e gestão do SUS, cada esfera de governo tem suas corresponsabilidades. No âmbito da União, o gestor nacional do SUS é:

- a) O Conselho Nacional de Secretarias da Saúde.
- b) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- c) A Fundação Nacional de Saúde.
- d) O Ministério da Saúde.

**12)** Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

*As conferências de saúde são espaços de participação popular que contribuem para a construção das políticas públicas do SUS e reafirmam a saúde como direito fundamental. Realizadas a cada \_\_\_\_\_, em etapas municipais, estaduais e nacional, elas permitem avaliar a situação de saúde do país e elaborar propostas que atendam às necessidades da população de acordo com os princípios do SUS.*

- a) seis meses
- b) quatro anos
- c) seis anos
- d) oito anos

**13)** A Lei nº 8.080/1990, ao tratar da telessaúde, estabelece entre seus princípios e regras:

- a) Obrigatoriedade de primeira consulta exclusivamente presencial.
- b) Validade dos atos do profissional de saúde restrita ao Estado onde o paciente se encontra.
- c) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- d) Obrigatoriedade de registro secundário em todos os conselhos regionais.

**14)** O Decreto nº 7.508/2011, que estabelece as regras de organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), define os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS como:

- a) Redes integradas.
- b) Portas de entrada.
- c) Portais da saúde.
- d) Centros de reabilitação.

**15)** A relação nacional de medicamentos essenciais é um importante instrumento orientador sobre o uso de medicamentos e insumos no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualizada a cada dois anos, apresenta os medicamentos disponíveis no SUS em todos os níveis de atenção. Essa relação é conhecida como:

- a) Renapsi.
- b) Farmácia Popular.
- c) Medicamento de Referência.
- d) Rename.

**16)** A respeito da Atenção Domiciliar (AD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) Um dos objetivos do Serviço de Atenção Domiciliar é a redução da demanda por atendimento hospitalar.
- ( ) A AD deve estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à saúde.
- ( ) Será elegível para a AD o usuário que apresentar necessidade de monitorização contínua.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**17)** No âmbito da segurança do paciente, um incidente que resulta em dano ao paciente é a definição dada a:

- a) Ocorrência natural.
- b) Circunstância equivocada.
- c) Evento adverso.
- d) Conduta associada.

**18)** Certificar-se de que a via de administração atende às especificidades do usuário e do medicamento em questão faz parte dos procedimentos de segurança do paciente. Nesse sentido, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Via oral.
- (2) Via subcutânea.
- (3) Via intravenosa.

- ( ) Administrado pela boca.
- ( ) Administrado por injeção sob a pele.
- ( ) Administrado por injeção em uma veia.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

**19)** A ação de vacinação seletiva (de acordo com a situação vacinal e as regras do calendário de vacinação) dos indivíduos que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado para doença exantemática, como sarampo ou rubéola, é definida como:

- a) Matriz vacinal.
- b) Bloqueio vacinal.
- c) Operação limpeza.
- d) Quarentena vacinal.

**20)** O diagnóstico de anomalias congênitas detectáveis ao nascimento é feito por meio do exame físico completo do indivíduo, podendo ocorrer também por meio dos testes de triagem neonatal disponíveis na rede de atendimento à saúde, a depender das especificidades de cada local. O teste realizado nos primeiros dias de vida para o diagnóstico de seis doenças – fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita – é o:

- a) Teste do Laço.
- b) Teste de Apgar.
- c) Teste da Mãozinha.
- d) Teste do Pezinho.

**21)** A vigilância ativa da coqueluche contribui para o diagnóstico precoce, a implementação rápida de medidas de controle e a prevenção de complicações. A coqueluche é transmissível e causada por bactéria, sendo uma:

- a) Infecção dermatológica.
- b) Infecção respiratória.
- c) Doença gastrointestinal.
- d) Doença neurológica.

**22)** Em relação às equipes de saúde multiprofissionais, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) As equipes multiprofissionais são formadas por profissionais de diferentes áreas e trabalham juntas para um cuidado integrado.
- ( ) Em equipes multiprofissionais, cada profissional deve atuar isoladamente, sem necessidade de comunicação com os demais.
- ( ) O objetivo das equipes multiprofissionais é dividir tarefas para reduzir o tempo de atendimento, não para integrar saberes.

- a) E - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) C - E - C.

**23)** Considerando-se as principais medidas de frequência de doenças que servem para avaliar o cenário epidemiológico de uma população, a equação abaixo calcula:

$$\frac{\text{Nº de casos novos no local A e período B}}{\text{Nº de pessoas expostas ao risco no local A e período B}} \times 10^n$$

- a) Incidência.
- b) Prevalência.
- c) Representatividade.
- d) Confiabilidade.

**24)** No âmbito da Atenção Básica, assinalar a alternativa que NÃO corresponde a uma diretriz do SUS e das Redes de Atenção à Saúde, conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

- a) Territorialização.
- b) Cuidado centrado na doença.
- c) Longitudinalidade do cuidado.
- d) Resolutividade.

**25)** Considerando-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

*A PNAB tem \_\_\_\_\_, um modelo inovador que coloca a saúde no centro das necessidades da pessoa, da família e do território, como sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica/Primária.*

- a) na Atenção Hospitalar
- b) no Sanitarismo Campanhista
- c) na Saúde Cooperativista
- d) na Saúde da Família

**26)** Considerando-se o Calendário Nacional de Vacinação, qual vacina deve ser administrada ao nascer, que tem como objetivo prevenir as formas graves e disseminadas da tuberculose e que também possui efeito protetor contra a hanseníase?

- a) BCG.
- b) DTP.
- c) Tríplice viral SCR
- d) Tetraviral SCR.V.

**27)** A área geográfica de abrangência para a cobertura de uma determinada RAS, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é conhecida como:

- a) Comunidade adscrita.
- b) Região de saúde.
- c) Aglomerado focal.
- d) Consórcio de saúde.

**28)** Dentre as seguintes, a alternativa que mais se relaciona com a principal finalidade do território adscrito na Estratégia Saúde da Família é:

- a) Fragmentar o cuidado e os serviços para maior autonomia das unidades de saúde.
- b) Organizar o processo de trabalho da equipe e orientar ações de cuidado contínuo à população.
- c) Facilitar o controle de recursos financeiros do município.
- d) Limitar o acesso dos usuários às unidades de saúde.

**29)** Considerando-se a bioética na prática da saúde, o princípio da autonomia está diretamente relacionado a:

- a) Realizar intervenções sem que se tenha que informar o paciente.
- b) Minimizar o diálogo entre equipe e usuário.
- c) Priorizar decisões exclusivamente técnicas do profissional.
- d) Respeitar as decisões e escolhas do paciente sobre seu próprio tratamento.

**30)** Na Estratégia Saúde da Família, as visitas domiciliares têm como função principal:

- a) Ampliar o vínculo e acompanhar condições de saúde no contexto familiar.
- b) Realizar todos os procedimentos especializados no domicílio.
- c) Intervir em temas relativos à intimidade e à vida particular das famílias, formulando juízos de valor acerca de suas condutas.
- d) Avaliar exclusivamente condições estruturais da residência.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 50 QUESTÕES**

---

**31)** Uma enfermeira da atenção primária avalia um caso suspeito de dengue em um bairro com aumento recente de notificações. Durante a investigação, ela identifica febre súbita, mialgias intensas e residência em área com circulação viral confirmada. Considerando a responsabilidade legal e epidemiológica, em relação à conduta adequada segundo o sistema de vigilância nacional, dentre as seguintes, a prática mais adequada é:

- a) Registrar prontamente informações clínicas, aplicando ferramentas locais sem envio estadual.
- b) Orientar hidratação domiciliar, mantendo observação comunitária sem elaboração imediata.
- c) Realizar notificação obrigatória imediata, utilizando sistema oficial padronizado nacional.
- d) Reprogramar avaliação ambulatorial, sugerindo retorno clínico posteriormente conforme evolução.

---

**32)** Durante um atendimento, um trabalhador rural relata ter sido mordido por um cão desconhecido que fugiu após o episódio. A equipe de enfermagem avalia a lesão, classifica a exposição e decide iniciar o protocolo preventivo indicado pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva. Considerando as recomendações mais recentes, assinalar a alternativa que apresenta a conduta adequada.

- a) Aplicar apenas limpeza vigorosa utilizando água corrente, sem novos procedimentos.
- b) Avaliar necessidade vacinal posteriormente, aguardando observação animal não localizada.
- c) Protocolar antibióticos sistêmicos considerando risco infeccioso específico sem vacinação.
- d) Iniciar vacinação recomendada imediatamente, seguindo diretrizes atualizadas oficialmente vigentes.

---

**33)** Em uma sala de emergência, um paciente chega inconsciente após mal súbito, sem pulso palpável. A equipe inicia avaliação imediata, organiza o ambiente, aciona o suporte avançado e prepara o desfibrilador. Considerando protocolos internacionais atualizados de atendimento, assinalar a alternativa que indica a ação inicial prioritária da enfermagem.

- a) Iniciar compressões torácicas contínuas imediatamente, garantindo profundidade adequada ritmicamente.
- b) Buscar informações familiares rapidamente, procurando antecedentes clínicos relevantes para decisão.
- c) Realizar punção venosa periférica, aplicando soluções isotônicas previamente estabelecidas rotineiramente.
- d) Transportar rapidamente o paciente, monitorizando sinais sem realizar compressões inicialmente.

**34)** Uma idosa acamada apresenta úlcera de pressão estágio II na região sacral. A equipe identifica perda parcial de pele, leito rosado úmido e ausência de necrose. Considerando práticas atualizadas de curativos e manutenção do microambiente ideal, assinalar a alternativa que apresenta a intervenção prioritária.

- a) Aplicar cobertura seca convencional, mantendo a área rígida dificultando a cicatrização adequada.
- b) Utilizar curativo hidrocoloide, promovendo um ambiente úmido e favorecendo uma regeneração celular eficiente.
- c) Realizar desbridamento agressivo imediato, removendo tecidos íntegros sem fundamentação clínica.
- d) Suspender reposicionamentos frequentes e manter decúbito contínuo, prolongando a pressão localizada.

---

**35)** Em uma unidade hospitalar, a enfermeira líder observa atrasos contínuos na administração de medicamentos devido à distribuição inadequada das tarefas. Após mapear o fluxo assistencial, decide reorganizar a equipe seguindo os princípios de gestão participativa. Nesse contexto, assinalar, dentre as seguintes, a ação mais apropriada.

- a) Delegar todas as atividades complexas, alternando funções aleatoriamente e sem consulta coletiva.
- b) Suspender registros rotineiros, priorizando intervenções imediatas e reduzindo o acompanhamento efetivo.
- c) Centralizar decisões estratégicas, restringindo comunicação direta entre membros diariamente.
- d) Redefinir responsabilidades colaborativas, garantindo distribuição equilibrada e melhorando resultados assistenciais.

---

**36)** Em um setor clínico, a enfermeira responsável precisa implementar a sistematização da assistência de enfermagem com registro completo e etapas claramente definidas, garantindo continuidade assistencial segura. Após coleta de dados detalhados, ela deve prosseguir conforme metodologia científica estabelecida nacionalmente. Em relação ao passo sequencial adequado, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Formular diagnósticos clínicos fundamentados, organizando informações coletadas sistematicamente de forma adequada.
- b) Selecionar intervenções assistenciais aplicando exclusivamente prescrições médicas, sem levantamento próprio.
- c) Registrar evoluções subjetivas pessoais, ignorando diariamente os parâmetros clínicos objetivos essenciais.
- d) Estabelecer prognósticos imediatos, sem análise criteriosa baseada em avaliações organizadas e prévias.

**37)** Em uma sala de vacinação, uma mãe relata dúvidas sobre o intervalo entre doses de diferentes imunizantes do calendário pediátrico. A enfermeira consulta as normas atualizadas, orienta sobre prazos recomendados e reforça a importância do esquema completo para proteção coletiva. Considerando isso, assinalar a alternativa que apresenta uma conduta adequada.

- a) Aguardar sempre dois anos completos entre doses vacinais, independentemente do calendário oficial.
- b) Evitar aplicação simultânea de vacinas distintas, contrariando as práticas recomendadas em sala de vacinação.
- c) Repetir integralmente esquema infantil inteiro perante qualquer atraso curto ocasional identificado.
- d) Seguir intervalos padronizados oficialmente, garantindo proteção adequada conforme recomendações vigentes.

**38)** Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) registra aumento significativo de infecções relacionadas a dispositivos invasivos. A investigação aponta falhas no manuseio de cateteres, higienização irregular e ausência de auditoria interna estruturada. Considerando os protocolos de prevenção nacionais e internacionais, assinalar a alternativa que apresenta a medida prioritária para reduzir a incidência.

- a) Priorizar troca frequente de cateteres, sem observar recomendações técnicas científicas padronizadas.
- b) Reforçar uso de antibióticos preventivos sistemicamente, aumentando resistência bacteriana institucional perigosa.
- c) Implementar *bundles* assistenciais estruturados, garantindo adesão profissional monitorada continuamente de forma efetiva.
- d) Restringir amplamente as visitas familiares, mantendo isolamento prolongado sem fundamento epidemiológico consistente.

**39)** Durante consulta de puericultura, uma criança apresenta ganho ponderal adequado, vacinação atualizada e desenvolvimento compatível com a idade. A enfermeira reforça orientações familiares, avalia marcos motores e atualiza registros. Considerando as diretrizes de acompanhamento infantil, assinalar a alternativa que apresenta a conduta prioritária.

- a) Monitorar crescimento continuamente, registrando parâmetros regularmente e acompanhando evolução integral.
- b) Solicitar exames laboratoriais extensos obrigatoriamente, sem qualquer indicação clínica específica.
- c) Suspender visitas programadas, mantendo acompanhamento eventual somente mediante intercorrências.
- d) Restringir estímulos familiares, adotando rotina reduzida e limitando interações cognitivas essenciais.

**40)** Durante a avaliação de um paciente com dispneia súbita em unidade de emergência, a equipe de enfermagem inicia exame físico sistematizado para rápida identificação de sinais de gravidade. Considerando princípios atualizados de semiologia respiratória, assinalar a alternativa que indica a conduta técnica que demonstra maior precisão para diferenciar comprometimento ventilatório grave durante a abordagem inicial.

- a) Avaliar expansibilidade torácica anterior, verificando movimentos respiratórios simétricos.
- b) Inspeccionar retrações costais inferiores, observando alterações respiratórias visíveis.
- c) Palpar frêmito tóraco-vocal comparativamente, identificando vibrações pulmonares reduzidas.
- d) Verificar frequência respiratória isoladamente, registrando valores numéricos mensurados.

**41)** A respeito da anamnese e exame físico dos ouvidos, analisar os itens.

- I. O tímpano é visualizado como uma membrana oblíqua puxada para dentro pelo ossículo martelo.
- II. O ouvido externo compreende a caixa do tímpano.
- III. O exame do conduto auditivo interno é realizado com o auxílio de um espéculo ou otoscópio. Observa-se a quantidade de cerume presente no canal auditivo.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

**42)** Dentre as alternativas abaixo, assinalar aquela que NÃO corresponde a uma das fases de cicatrização de feridas.

- a) Degeneração.
- b) Inflamação.
- c) Proliferação.
- d) Maturação.

**43)** A oxigenação é o processo de fornecer oxigênio ao corpo e aos tecidos para seu metabolismo. Sendo assim, as indicações para a monitorização contínua da oximetria de pulso incluem:

- I. Pacientes com uma via aérea crítica ou instável.
- II. Pacientes que requerem oxigenioterapia.
- III. Pacientes em hemodiálise.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

**44)** De acordo com a escala *Cincinnati Prehospital Stroke Scale*, avaliam-se os seguintes parâmetros em urgência/emergência:

- a) Queda facial/fraqueza, fraqueza motora (queda parcial do braço) e afasia (fala).
- b) Fraqueza motora (queda parcial do braço), afasia (fala) e perda auditiva.
- c) Queda facial/fraqueza, afasia (fala) e amaurose (cegueira).
- d) Fraqueza motora (queda parcial do braço), afasia (fala) e amaurose (cegueira).

**45)** Sobre angina de peito, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Em geral, a angina de peito resulta de doença cardíaca por malformação arteriovenosa-obstrução arterial, que causa ruptura de vaso sanguíneo subclávio.
- b) O desconforto é mal localizado e pode irradiar-se para o pescoço, a mandíbula, os ombros e a face interna dos braços.
- c) A angina instável nunca ocorre em repouso.
- d) Os objetivos do manejo clínico inicial da angina consistem em aumentar a demanda de oxigênio para estimular o miocárdio, sem aporte de oxigênio em primeiro momento.

**46)** Quando ocorre a ruptura de um aneurisma, frequentemente há cefaleia súbita e inusitadamente intensa, perda da consciência por um período variável de tempo, dor e rigidez na nuca e na coluna vertebral. Também pode ocorrer tinido, tontura e hemiparesia. Sobre o aneurisma, são considerados sinais meníngeos:

- a) Rigidez na nuca e tontura.
- b) Hemiparesia e dor.
- c) Rigidez na nuca e na coluna vertebral.
- d) Cefaleia súbita, tontura e hemiparesia.

**47)** Os líquidos corporais estão distribuídos nos seguintes compartimentos funcionais principais:

- a) Lipídios, sais minerais e proteínas.
- b) Intracraniano, meníngeos e intravenoso.
- c) Intravenoso e arterial.
- d) Intracelular e extracelular.

**48)** Os indivíduos idosos correm maior risco de lesão por queimaduras em razão da coordenação reduzida e do declínio da capacidade cognitiva, força, sensibilidade e visão. Sobre queimaduras, analisar os itens.

- I. A pele do indivíduo idoso é mais fina e menos elástica, o que afeta a profundidade da lesão e sua capacidade de cicatrização.
- II. A queimadura de terceiro grau está caracterizada por formigamentos, hiperestesia, dor, áreas eritematosas que empalidecem com a pressão, edema mínimo e possíveis bolhas.
- III. Em grandes queimaduras, pode acontecer desvio subsequente de proteínas e sódio do espaço intravascular para o espaço intersticial, levando ao choque hipovolêmico.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

**49)** Considerando as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

A \_\_\_\_\_ é uma IST causada pelo espiroqueta *Treponema pallidum*.

- a) gonorreia
- b) clamídia
- c) sífilis
- d) tricomoníase

**50)** Os fatores predisponentes para a deiscência de ferida incluem:

- I. Obesidade, quimioterapia ou radioterapia e insuficiência renal ou hepática.
- II. Nutrição deficiente e diabetes.
- III. Infecção ativa e uso de corticosteroide.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

**51)** A respeito da febre maculosa, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) O laboratório clínico detecta leucocitose e trombocitopenia.
- ( ) A apresentação mais comum consiste em febre e mialgia.
- ( ) A infecção de eritoblastos e de outras células da medula óssea pelo vírus da febre causada pelo carrapato do Colorado resulta no aparecimento e na persistência de eritrócitos contaminados.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

---

**52)** A doença de Chagas, ou tripanossomíase, é uma zoonose causada pelo parasito protozoário *T. cruzi*. Sobre a doença de Chagas, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A doença de Chagas aguda é geralmente uma doença afebril, porém exantemática, que resulta da infecção inicial pelo microrganismo *T. cruzi*.
- b) A doença de Chagas crônica é diagnosticada pela detecção de anticorpos IgM específicos.
- c) A doença não é transmitida por transfusão sanguínea.
- d) O *T. cruzi* é transmitido entre os hospedeiros por meio de insetos triatomíneos hematófagos, frequentemente chamados de barbeiros.

---

**53)** A distensão da veia jugular permite observar a turgência da veia. Quando o paciente se encontra na posição deitado/sentado a 45°, esse sinal indica:

- a) Congestão sistêmica.
- b) Congestão alveolar.
- c) Hipertensão arterial sistêmica.
- d) Hipertensão intracraniana.

---

**54)** Sangramento uterino anormal que ocorre fora do período menstrual, de forma acíclica e com intervalos regulares. Em geral é escasso, mas pode variar desde manchas de sangue até uma hemorragia profusa. Esse sangramento é denominado:

- a) Metrorragia.
- b) Amenorreia.
- c) Dismenorreia.
- d) Menorragia.

**55)** Na análise da eficiência respiratória, fundamental na avaliação clínica de pacientes, três processos são avaliados de forma integrada (frequência, profundidade e ritmo). Considerando isso, analisar a seguinte situação:

*Durante relato, o profissional de saúde obtém informações sobre a Sra. Ana, uma paciente de 88 anos de idade com câncer terminal e internada para cuidados paliativos. Sua respiração é descrita como trabalhosa, apresentando frequência e profundidade irregulares, com períodos de apneia alternados com hiperventilação.*

Assinalar a alternativa que apresenta o ritmo respiratório apresentado pela Sra. Ana.

- a) Respiração de Biot.
- b) Respiração de Kussmaul.
- c) Respiração de Cheyne-Stokes.
- d) Respiração apnêustica.

---

**56)** A vacinação é imprescindível para a segurança e proteção do trabalhador em saúde. Um enfermeiro precisou realizar a atualização do seu calendário vacinal e recebeu, na Unidade Básica de Saúde do seu bairro, as seguintes informações para a Vacina Hepatite B, Tétano e Difteria (dT/dTpa) em profissionais da saúde, relacionada ao Programa Nacional de Imunização:

- I. Se o profissional apresenta esquema de vacinação básico completo de dTpa (tríplice bacteriana acelular tipo adulto), administra-se uma dose da dT (dupla bacteriana adulto) como reforço a cada 10 anos.
- II. Se o profissional apresenta esquema de vacinação básico para tétano incompleto, com menos de três doses, administra-se uma ou duas doses de dTpa, de forma a totalizar três doses contendo o componente tetânico, com intervalo recomendado de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.
- III. O reforço com a vacina dTpa deverá ser realizado a cada 10 anos.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens I e III.

**57)** Uma das principais competências da enfermagem no centro cirúrgico consiste em gerenciar a assistência perioperatória em inter-relação com diferentes profissionais e setores da instituição, incluindo ações que promovam a gestão dos recursos disponíveis de forma a aprimorar a qualidade e segurança assistencial. Sobre as fases perioperatórias, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Período trans e intraoperatório.  
(2) Período pós-operatório.

- ( ) Verificar as atribuições da enfermagem e se estas precisam ser aprimoradas ou modificadas.  
( ) Auxiliar nas trocas de macas, manter o paciente aquecido e, se necessário, colocar meias elásticas em membros inferiores.  
( ) Conferir a pulseira de identificação e o prontuário no recebimento do paciente no Centro Cirúrgico (CC) e fazer o checklist seguro.  
( ) Analisar as condições de infecção de sítio cirúrgico, mediante sinais flogísticos ou de exames.

- a) 1 - 2 - 1 - 2.  
b) 2 - 2 - 1 - 1.  
c) 1 - 2 - 2 - 1.  
d) 2 - 1 - 1 - 2.

**58)** Considerando que é importante que a equipe de enfermagem avalie as condições clínicas que possam afetar a absorção de medicamento, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Condições clínicas como insuficiência circulatória e respiratória podem prejudicar a absorção de medicamentos pela via parenteral devido à vasoconstrição, devendo o enfermeiro evitar administrar medicamentos em locais com prejuízo da circulação.  
b) Para garantir a solubilidade e absorção, os medicamentos administrados por via oral devem, obrigatoriamente, ser acompanhados de 240mL de líquido, mesmo em pacientes com restrição hídrica.  
c) Na injeção intramuscular, o aquecimento e/ou o resfriamento do local são processos que aceleram a absorção do medicamento.  
d) A via subcutânea possui, em regra, uma absorção mais rápida que a via intramuscular, devido ao maior fluxo sanguíneo.

**59)** Paciente esquizofrênica internada em hospital rotineiramente se recusa a tomar a medicação prescrita pelo médico. Sobre farmacologia aplicada à enfermagem em situações clínicas e cirúrgicas, analisar o caso e assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA conduta do enfermeiro diante da situação apresentada.

- a) O enfermeiro não precisa permanecer com a paciente para certificar-se de que o medicamento foi deglutido, pois isso pode desencadear alguma ação agressiva da paciente.  
b) Deve-se utilizar comprimidos de desintegração oral, visto que se dissolvem em segundos quando em contato com a saliva, impedindo a paciente de cuspir ou retirar da boca.  
c) O enfermeiro pode deixar o medicamento ao lado do leito da paciente para ser administrado “mais tarde”, junto de alguma refeição para que a paciente não perceba.  
d) O enfermeiro deve triturar o medicamento, diluir na forma líquida e introduzi-lo com uma seringa.

**60)** De acordo com o Programa Nacional de Imunização para gestantes, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) É recomendada para cada gestação uma dose da vacina dTpa – tríplice bacteriana acelular.  
b) Não deve ser administrada em gestantes a vacina hepatite B – recombinante.  
c) A vacina poliomielite inativada VIP é obrigatória para gestantes.  
d) É recomendada a cada gestação uma dose da vacina HPV4.

**61)** Carlos, paciente internado com pneumonia, apresenta os seguintes sinais vitais: pressão arterial 112/64mmHg, frequência cardíaca 102bpm, frequência respiratória 26bpm e temperatura timpânica 37,9°C (100,2°F). Assinalar a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o sinal vital que requer atenção imediata.

- a) Frequência cardíaca.  
b) Frequência respiratória.  
c) Pressão arterial.  
d) Temperatura.

**62)** Um enfermeiro deve saber selecionar o curativo mais adequado para otimizar o processo de cicatrização. Assinalar a alternativa que indica CORRETAMENTE o curativo descrito abaixo.

*Cria um ambiente úmido e é seguro para feridas profundas, pois é de fácil remoção, com pouco risco de retenção no fundo da cavidade da ferida. Ainda, possui uma quantidade de drenagem de moderada a alta.*

- a) Curativo de hidrogel.  
b) Curativo de hidrocoloide.  
c) Curativo de espuma de poliuretano.  
d) Curativo de alginato de cálcio e sódio.

**63)** O uso de desfibriladores para reverter ritmos cardíacos fatais é primordial. Sobre o desfibrilador externo automático (DEA), assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A desfibrilação é a aplicação de corrente elétrica para acelerar o ritmo cardíaco, sendo o DEA usado apenas no Suporte Avançado de Vida (SAV).
- b) O DEA analisa o ritmo cardíaco, reconhece o ritmo chocável e orienta o usuário, sendo indicado para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
- c) O DEA tem como função principal administrar medicamentos, e a desfibrilação atua causando uma assistolia momentânea para estabilizar o ritmo.
- d) O DEA deve ser operado apenas por profissionais médicos, e a desfibrilação é indicada para taquicardia ventricular com pulso e bradicardia sintomática.

---

**64)** Sobre a leptospirose, analisar os itens.

- I. A transmissão ocorre principalmente por ratos, mas também pode ocorrer por cães, gatos e outros animais.
- II. A doença começa abruptamente com uma fase aguda ou septicêmica de 5 a 14 dias, seguida pela fase imune, na qual anticorpos são produzidos e leptospiras são excretadas na urina.
- III. Não é uma doença de notificação compulsória.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

---

**65)** A função renal deve ser monitorada atentamente em todos os pacientes em condição crítica. Os enfermeiros têm papel central na prevenção e na detecção precoce de insuficiência renal aguda (IRA). Em relação aos princípios de monitoramento da função renal, analisar os itens.

- I. A análise do volume e das propriedades físicas, químicas e microbiológicas da urina revela muito sobre a condição do organismo.
- II. Urina turva e com resíduos pode indicar infecção.
- III. Em pacientes diabéticos, com cetoacidose, ou em pacientes anoréxicos ou que não comem, é excretada acetona na urina, o que deixa um odor caracteristicamente adocicado.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

**66)** Na parada cardíaca, o coração é incapaz de bombear e circular o sangue pelos órgãos e tecidos do corpo. Pode ser causada por arritmia, como fibrilação ventricular, bradicardia progressiva ou assistolia. Sobre as manifestações clínicas, os riscos e o manejo em pacientes com parada cardíaca, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Na parada cardíaca, não ocorre perda imediata da consciência, do pulso e da pressão arterial.
- b) A reanimação cardiopulmonar (RCP) é iniciada imediatamente. O protocolo de atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) da instituição deve ser implementado.
- c) Nunca devem ser administrados medicamentos para reverter a parada cardiopulmonar, de acordo com as diretrizes do suporte cardíaco avançado de vida para intervenções de suporte avançadas, mas exclusivamente massagens cardíacas.
- d) Na parada cardíaca, não há risco de lesão orgânica ou lesão encefálica irreversível.

---

**67)** No Brasil, a intensa participação dos enfermeiros nas atividades de cunho gerencial e o quadro da gestão do trabalho evidenciam a necessidade de mudança do modelo de gestão tradicional centralizado e vertical para o modelo de gestão compartilhada e participativa. Sobre o gerenciamento em enfermagem, analisar os itens.

- I. O modelo de gestão compartilhada ou colegiada se apoia na descentralização da organização por meio da implantação de unidades funcionais autônomas, com menos hierarquia, mais tomada de decisão compartilhada e trabalho em equipe.
- II. A prática com base em evidências e a enfermagem de prática avançada ampliam a prática clínica do enfermeiro não apenas para a organização da assistência, mas também para o efetivo gerenciamento do cuidado.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em nenhum dos itens.
- d) Em ambos os itens.

**68)** O Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) compreende ações sistemáticas voltadas para a redução máxima possível tanto da incidência como da gravidade das infecções hospitalares. Em relação às ferramentas que possibilitam a avaliação da eficácia e da eficiência de sistemas de controle de infecção hospitalar, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Indicadores de estrutura.
- (2) Indicadores de resultado.
- (3) Avaliação dos processos.

- ( ) Tem sua análise focada no diagnóstico e no tratamento de doenças, bem como nas práticas adotadas, podendo envolver o tempo e a precisão do diagnóstico, além de avaliação da escolha da terapêutica e das etapas do cuidado.
- ( ) Realizam a análise dos desfechos, como análise de sobrevida após determinada terapêutica e efeitos indesejáveis ou positivos dela decorrentes.
- ( ) Têm relação com os recursos disponíveis quanto ao capital intelectual e humano, organizações, sistemas de atendimento, estrutura física, localização geográfica e acessibilidade dos serviços.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

**69)** O enfermeiro, por deparar-se com a dor da criança em numerosas situações, precisa saber intervir não apenas na identificação dessa, mas também na sua avaliação e no seu manejo. Sobre as manifestações e respostas causadas pela dor na criança, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) As reações fisiológicas relacionadas à dor aguda da criança são: rubor cutâneo, palidez, sudorese, midríase, entre outros.
- ( ) As reações comportamentais relacionadas à dor crônica da criança são: agitar-se, chorar, franzir a testa, cerrar os olhos, abrir a boca, apresentar irritabilidade e hostilidade.
- ( ) As reações infantis ante a dor aguda são tristeza, inapetência, desânimo, agressividade e depressão.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**70)** Na consulta de enfermagem para a avaliação da mulher que vem para coleta de citopatológico, algumas informações e processos de trabalho são de fundamental importância para a realização correta do processo pelo enfermeiro. Sobre a conduta do enfermeiro na consulta de enfermagem e coleta do citopatológico, analisar os itens.

- I. Investigar sobre data da última menstruação (DUM), regularidade dos ciclos, duração da menstruação e intensidade do fluxo, sintomas perimenstruais, alterações no padrão menstrual e atrasos.
- II. O exame pélvico é realizado com a paciente em posição supina, com as pernas em litotomia dorsal e a cabeça elevada em 30 graus.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em nenhum dos itens.
- d) Em ambos os itens.

**71)** Sobre as manifestações clínicas e o manejo da hiperplasia prostática benigna (HPB), assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Os fatores de risco para a HPB consistem em tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, redução do nível de atividade, hipertensão arterial, cardiopatia, diabetes melito e dieta ocidental rica em gordura, proteínas animais e carboidratos refinados e pobre em fibras.
- b) Hesitação no início da micção, polaciúria, nictúria, urgência e força abdominal para urinar não são manifestações clínicas da HPB.
- c) A HPB não causa diminuição no volume e na força do jato urinário, tampouco interrupção do jato urinário e gotejamento.
- d) Mesmo com a HPB, o paciente esvazia totalmente a bexiga a cada micção e não refere nenhum episódio de retenção urinária.

**72)** Sabe-se que a pressão arterial diastólica aumenta aproximadamente até os 50 anos, estabilizando-se dos 50 aos 60 anos. Está relacionada à rigidez vascular arterial, que aumenta naturalmente com a idade. Além disso, para os idosos, a escolha dos medicamentos para o tratamento e a forma de uso devem ser avaliados com cautela pelas condições clínicas e de saúde mental do idoso. Em relação à gestão do cuidado pelos enfermeiros na Atenção Primária à Saúde (APS), analisar os itens.

- I. Na avaliação dos enfermeiros durante a consulta de enfermagem, o controle de fatores de risco cardiovascular se faz necessário para o manejo clínico do hipertenso, como verificação da ingestão excessiva de sal, do acúmulo de gordura, principalmente na circunferência abdominal, do abuso de álcool e tabaco e do sedentarismo.
- II. As atividades em grupo, como forma de educação em saúde, não devem ser realizadas com os idosos no entendimento do seu diagnóstico e no apoio para a mudança do estilo de vida, pois não trazem resultados positivos nessa faixa etária.
- III. No acompanhamento na APS ao hipertenso, a equipe multiprofissional deve estar alinhada para o manejo clínico a fim de que haja um planejamento de ações de promoção, prevenção e educação em saúde de forma oportuna.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

**73)** Sobre o *delirium* e a demência, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A síndrome demencial corresponde a um comprometimento do nível de consciência, em geral fluante e reversível à medida que se corrige sua causa.
- b) O *delirium* compromete o conteúdo da consciência, em geral de natureza crônica ou progressiva, sem comprometimento do nível de consciência. Além disso, é irreversível.
- c) As causas mais frequentes de *delirium* são: uso de substâncias, infecções, distúrbios hidroeletrólítico e acidobásico, endocrinopatias, lesões e/ou doenças do sistema nervoso central (SNC), doenças clínicas sistêmicas graves, câncer e pós-operatório de cirurgia de grande porte (principalmente cirurgias cardíacas), transplantes, traumas e grande queimados.
- d) Os sintomas psicóticos da demência são: alucinações (principalmente visuais) e ilusões, delírios de cunho paranoide ou pobremente construídos e alterações do pensamento, como tangencialidade, circunstancialidade e perda de associações.

**74)** Sobre as manifestações clínicas da embolia ou trombose arterial, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) Em geral, os sintomas são: dor, palidez, ausência de pulso, parestesia, poiquilotermy e paralisia.
  - ( ) A parte do membro distal à oclusão apresenta-se acentuadamente mais fria e mais pálida do que a parte proximal em consequência da isquemia.
  - ( ) A trombose arterial consiste em um coágulo de desenvolvimento lento em um vaso sanguíneo lesionado, o que pode ocluir uma artéria.
- a) C - C - C.
  - b) E - E - C.
  - c) C - E - E.
  - d) E - C - C.

**75)** De acordo com o conhecimento da farmacocinética sobre as vias de administração dos medicamentos, analisar os itens.

- I. Cada via de administração de um medicamento apresenta diferente velocidade de absorção.
- II. Quando os medicamentos são aplicados na pele, a absorção é muito rápida, em razão da composição física da pele.
- III. A injeção intravenosa produz a absorção mais rápida porque os medicamentos já ficam disponíveis imediatamente quando adentram a circulação sistêmica.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

**76)** O enfermeiro que admite o paciente na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) revê as informações essenciais com o anesthesiologista e com qualquer outro membro da equipe do centro cirúrgico. Em relação aos cuidados imediatos e alertas importantes, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Não há necessidade de avaliações frequentes de saturação de oxigênio do paciente, volume e regularidade do pulso e profundidade e natureza das respirações.
- b) Deve-se promover a estabilidade cardiovascular com prevenção, reconhecimento imediato e tratamento de hemorragia, hipertensão arterial, arritmias, hipotensão arterial e choque.
- c) Não se administra oxigênio, nem se coloca equipamento de monitoramento.
- d) Deve-se monitorar os sinais vitais e avaliar o estado físico geral do paciente somente a cada 45 minutos.

**77)** Os estabelecimentos de assistência à saúde devem implantar a gerência de risco, atendendo à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a vigilância dos produtos para a saúde. Sobre a gerência de risco, analisar os itens.

- I. A gerência de risco deve ser composta por profissionais que tenham visão abrangente da assistência prestada e do uso de produtos para a saúde envolvidos.
- II. O gerente de risco deve ter especialização em vigilância sanitária, epidemiologia, saúde pública ou administração hospitalar.
- III. Além de ter formação acadêmica de nível superior, o gerente de risco deve ter aptidão para gerenciar informações e ser ético e agente da qualidade.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

**78)** Em relação a diferenças entre febre e hipertermia, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Na febre, ocorre um aumento da sudorese, e na hipertermia há ausência de sudorese.
- b) Na febre, ocorre um aumento descontrolado da temperatura corporal.
- c) Na hipertermia, ocorre um aumento regulado da temperatura corporal.
- d) A febre é responsiva a antitérmicos, enquanto a hipertermia não é responsiva a antitérmicos.

**79)** A hepatite A é uma infecção viral frequente em regiões com saneamento precário. Considerando suas características clínicas e a conduta adequada, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A via parenteral é a principal forma de transmissão e exige testagem sorológica de rotina em todos os contatos.
- b) A transmissão é fecal-oral, com curso geralmente benigno, sendo o tratamento baseado em medidas de suporte e higiene.
- c) A colestase prolongada indica cronificação e necessidade de antivirais por tempo indeterminado.
- d) A evolução fulminante é regra, exigindo transplante hepático em todos os casos graves.

**80)** A cobertura da lesão constitui um aspecto fundamental no tratamento de feridas, porque favorece um microambiente adequado para a restauração dos tecidos. Em relação às características funcionais das coberturas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) Os filmes transparentes e hidrocoloides são coberturas conhecidas por sua adesividade prolongada, porém a frequência de trocas e o método de retirada devem ser observados com atenção para evitar lesões.
- ( ) As coberturas com baixa espessura, flexíveis e elásticas, como hidrocoloides, espumas e filmes, adaptam-se muito bem às áreas difíceis, como pés, cotovelos e dedos.
- ( ) A capacidade de absorção do exsudado da ferida nunca influencia na frequência das trocas.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.