

MÉDICO PNEUMOLOGIA

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
- Um **caderno de questões** contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
- **É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.**
- Ao ser autorizado o início da prova verifique, no **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **responsável pelo local**.
- **O tempo** que você dispõe para fazer a Prova Objetiva e a marcação do **cartão de respostas** é de 3 (três) horas.
- No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *a.*)
- Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **caderno de questões** e seu **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *c.*)
- Ao candidato somente será permitido levar seu **caderno de questões** da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem *d.*)
- **NÃO** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *e.*)
- Após o término da sua prova entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



Atenção:

- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do **cartão de respostas** pela leitora ótica.
- A leitora ótica também **NÃO** registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE !!!

CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	20/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	21 e 22/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO

Dráuzio Varella – *Reflexões para o futuro*

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos inacreditável não haveremos percebido em tempo, por exemplo, que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da boate, o menino esperto, a menininha ingênua, o senhor enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis, hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas. Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim, consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão inóspito. Nessas condições é provável que se organize para acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais, poderão democratizar o atendimento público. Eficientes programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos brasileiros.

1 - Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas previsões se apóia fundamentalmente:

- (A) no emprego do futuro do presente;
- (B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
- (C) na antevisão de um futuro sombrio;
- (D) na condenação do atraso social e cultural;
- (E) na utilização de expressões de dúvida.

2 - “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa *nós* nesse segmento inicial do texto globala:

- (A) o autor e o leitor, apenas;
- (B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
- (C) os leitores em geral e o autor;
- (D) os brasileiros em geral;
- (E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”; a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

- (A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
- (B) se pagarmos caro pela ignorância;
- (C) quando pagarmos caro pela ignorância;
- (D) e pagaremos caro pela ignorância;
- (E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não haveremos percebido em tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais inadequado é:

- (A) achamos / percebermos;
- (B) achamos / termos percebido;
- (C) achávamos / haveremos percebido;
- (D) acharíamos / termos percebido;
- (E) acharemos / tivermos percebido.

5 - O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade passadas como motivo de males futuros. O item que se refere mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

- (A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela...”;
- (B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e sem higiene”;
- (C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis do bacilo da tuberculose...”;
- (D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos”;
- (E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”; o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

- (A) multiplicidade de parceiros;
- (B) liberdade ampla de relações sexuais;
- (C) evitarem-se relações de risco;
- (D) abstinência sexual completa;
- (E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem, respectivamente:

- (A) vírgula / conjunção;
- (B) vírgula / vírgula;
- (C) conjunção / preposição;
- (D) conjunção / conjunção;
- (E) preposição / preposição.

8 - “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo *imergirão* não pode ser confundido com seu parônimo *emergirão*, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir em que houve troca entre parônimos é:

- (A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
- (B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
- (C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
- (D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
- (E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.

9 - “Estará claro, **então**, que o perigo será muito mais imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

- (A) explicação;
- (B) conclusão;
- (C) tempo;
- (D) condição;
- (E) comparação.

10 - O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que define *endemia* é:

- (A) doença causada pela fragilidade do organismo;
- (B) mal provocado por vírus desconhecido;
- (C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
- (D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
- (E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 - “...usada pelo adolescente da periferia **para** viajar ao paraíso **por** alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico presente nesse segmento destacado do texto é:

- (A) “se espalha **para** a multidão de gente pobre”;
- (B) “o bacilo da tuberculose, que, **por** via aérea...”;
- (C) “irá parar nos pulmões dos que passarem **por** perto”;
- (D) “é provável que se organize **para** acabar com as causas”;
- (E) “dirigidos **por** fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor semântico de meio é:

- (A) “para acabar **com** as causas dessas epidemias”;
- (B) “aplicados em parceria **com** instituições internacionais”;
- (C) “passíveis de controle **com** inseticidas”;
- (D) “mantidos **com** o esforço e a vigilância das comunidades locais”;
- (E) “Haverá milhões de pessoas **com** Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo em que a substituição da forma do verbo *haver* está gramaticalmente INCORRETA é:

- (A) deverá haver;
- (B) poderá haver;
- (C) poderá existir;
- (D) existirão;
- (E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é acompanhado por um vocábulo ou locução de valor adjetivo é:

- (A) mocinhas da favela;
- (B) travestis na cadeia;
- (C) garotas da boate;
- (D) menino esperto;
- (E) menininha ingênu.

CONHECIMENTOS COMUNS DE MEDICINA

15 - A notícia abaixo foi publicada em periódico de grande circulação local:

“Chegaram nesta segunda-feira (13/02), na Secretaria Estadual da Saúde do Piauí (Sesapi), os 380 mil preservativos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Os preservativos serão distribuídos em todo o Estado para o período do carnaval. Segundo o coordenador de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, Antônio Ferreira, além de preservativos, equipes da secretaria estarão nos municípios onde o carnaval é mais forte e farão um trabalho de educação entre os foliões, orientando sobre os cuidados a serem tomados para a prática do sexo seguro.”

Considerando o perfil atual da epidemia de Aids no Brasil podemos afirmar que há aumento:

- (A) de casos novos na faixa etária entre 40 e 59 anos;
- (B) da relação de casos homens/mulheres;
- (C) da taxa de mortalidade;
- (D) da incidência em homossexuais;
- (E) do número de casos transfusionais.

16 - Dos princípios a seguir, estabelecidos pela Lei 8080/90, aquele que NÃO orienta as ações das unidades de saúde vinculadas ao SUS é:

- (A) participação da comunidade;
- (B) universalidade de acesso;
- (C) integralidade do cuidado;
- (D) equidade na assistência;
- (E) centralização político administrativa.

17 - No Rio de Janeiro ocorreram duas grandes epidemias de dengue. A primeira, em 1986-87, foi causada pelo tipo 1. A segunda, em 1990/91, foi provocada pelos tipos 1 e 2. A circulação de um novo vírus (o tipo 3) no Rio de Janeiro significa que:

- (A) o *Aedes aegypti* não transmite esse tipo de vírus;
- (B) aqueles que tiveram a doença em 1986 – 87 estão imunes ao tipo 3;
- (C) toda a população está sob risco de adquirir esta infecção;
- (D) somente aqueles que tiveram dengue do tipo 2 tem risco de desenvolver a forma grave;
- (E) todos que se reinfectarem por outro sorotipo desenvolverão a forma grave

18 - Dos agravos de Notificação Compulsória abaixo relacionados, aquele que deve ser *notificado imediatamente*, ainda que como *caso suspeito* é:

- (A) síndrome de imunodeficiência adquirida;
- (B) síndrome respiratória aguda grave;
- (C) tuberculose;
- (D) malária;
- (E) sarampo.

19 – Leia a notícia abaixo:

“A Central de Transplantes do Piauí, órgão da Secretaria de Saúde (Sesapi), que funciona no Hospital Getúlio Vargas (HGV), tem 1.238 pacientes na Lista Única de Espera de doador para transplantes, sendo dois de coração, 766 de córnea, 467 de rins. Para receber o transplante, o paciente precisa se submeter à Lista Única de Espera devendo seu nome ser indicado pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, que estabelece as prioridades, por ser o órgão responsável pelo gerenciamento e pela fiscalização das atividades de captação e distribuição de órgãos ou tecidos obtidos de um doador.”

Considerando a legislação e a complexidade do Sistema Nacional de Transplantes, é correto afirmar que:

- (A) as ações de saúde relacionadas ao transplante são da atenção terciária;
- (B) a maioria dos transplantes no Brasil é realizado pela atenção privada;
- (C) a captação e distribuição de órgãos são uma estratégia da atenção primária;
- (D) o diagnóstico de morte cerebral não exige a realização de exame complementar;
- (E) a autorização da família é dispensável quando o doador documenta sua opção em vida.

20 - O programa de saúde materno infantil prevê as estratégias do *alojamento conjunto e mãe canguru* que tem como objetivo reduzir a taxa de:

- (A) tétano neonatal;
- (B) mortalidade materna;
- (C) abandono de tratamento;
- (D) mortalidade infantil;
- (E) adesão ao aleitamento materno.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Para pacientes com derrame pleural tuberculoso que apresentem hepatopatia crônica com níveis de enzimas hepáticas acima de três vezes o valor normal recomenda-se tratamento com:

- (A) rifampicina, isoniazida e pirazinamida;
- (B) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol;
- (C) estreptomicina, isoniazida e ofloxacina;
- (D) estreptomicina, etambutol, isoniazida e pirazinamida;
- (E) estreptomicina, etambutol e ofloxacina.

22 - Na tomografia computadorizada de tórax das doenças intersticiais, a presença de predomínio de lesões com distribuição cranial é observada nas seguintes patologias, EXCETO:

- (A) silicose;
- (B) sarcoidose;
- (C) fibrose pulmonar idiopática;
- (D) histiocitose;
- (E) pneumonia eosinofílica.

23 - Nas bronquiectasias observa-se um aumento do calibre dos brônquios que, habitualmente, apresentam espessamento de suas paredes. Observe as afirmativas a seguir:

- I – na bronquiectasia cilíndrica a redução progressiva do calibre do brônquio está ausente.
- II – na bronquiectasia cística observa-se com frequência a presença do sinal “anel de sinete”.
- III – as bronquiectasias de tração são dilatações brônquicas em associação a alterações do parênquima circunjacente.

- (A) todas as afirmativas estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (C) apenas a afirmativa I está correta;
- (D) apenas a afirmativa II está correta;
- (E) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

24 - Na radiografia de tórax de pacientes com edema pulmonar cardiogênico observam-se com frequência as seguintes alterações, EXCETO:

- (A) pneumotórax;
- (B) cardiomegalia;
- (C) sinais de congestão pulmonar;
- (D) derrame pleural;
- (E) linhas B de Kerley.

25 - No câncer de pulmão, o estadiamento TNM define o tratamento a ser realizado. Assinale a opção que indica o estadiamento correto:

- (A) T₂ – tumor menor que 3 cm;
- (B) T₁ – carcinoma in situ;
- (C) N₃ – metástase para linfonodo mediastinal contralateral;
- (D) N₁ – metástase para linfonodo mediastinal;
- (E) M₁ – ausência de metástase.

26 - O patógeno mais comumente encontrado nas pneumonias comunitárias é:

- (A) Streptococcus pneumoniae;
- (B) Mycoplasma pneumoniae;
- (C) Chlamydia pneumoniae;
- (D) vírus respiratórios;
- (E) haemophilus influenzae.

27 - Pneumonia causada pelo Pneumocystis carinii permanece sendo a infecção oportunista mais comumente relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida. Em relação ao tema, observe as afirmativas a seguir:

- I – ocorre com frequência em pacientes que ainda não receberam cuidados médicos e naqueles com CD₄ < 200 cel/ml.
- II – a radiografia de tórax é normal em 1/3 dos casos.
- III – os pacientes geralmente apresentam história de febre, tosse seca e dispnéia de evolução arrastada.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

28 - São sinais radiológicos de atelectasia pulmonar, EXCETO:

- (A) deslocamento das cissuras interlobulares;
- (B) aumento de densidade;
- (C) presença de broncograma aéreo;
- (D) hiperinsuflação compensatória;
- (E) elevação da hemicúpula diafragmática.

29 - A presença de carcinoma metastático endobrônquico ocorre em aproximadamente 2% das autópsias de pacientes com neoplasia extrapulmonar. As neoplasias primárias mais freqüentes são, EXCETO:

- (A) tumor de mama;
- (B) tumor de rim;
- (C) tumor de cólon;
- (D) melanoma;
- (E) tumor de testículo.

30 - As doenças pulmonares intersticiais ocorrem por diversas causas. Observe as afirmativas a seguir:

- I – poeiras inorgânicas: sílica, asbestos, metais pesados;
- II – poeiras orgânicas/químicas: fungos termofílicos, bactérias, fungos, proteína animal, inalantes químicos;
- III – fármacos: antibióticos, antiarrítmicos, quimioterápicos.

- (A) todas as afirmativas estão corretas;
- (B) apenas a afirmativa I está correta;
- (C) apenas a afirmativa II está correta;
- (D) apenas a afirmativa III está correta;
- (E) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

31 - O edema pulmonar não cardiogênico é observado nas seguintes doenças, EXCETO:

- (A) embolia gordurosa;
- (B) drogas;
- (C) broncoaspiração;
- (D) asma;
- (E) trauma grave.

32 - Infecções respiratórias de repetição, sinusite e bronquiectasias estão presentes em pacientes com:

- (A) fibrose cística;
- (B) deficiência de α_1 antitripsina;
- (C) síndrome de goodpasture;
- (D) silicose;
- (E) fibrose pulmonar idiopática.

33 - No câncer de pulmão:

- (A) a presença de calcificação exclui a natureza maligna da lesão;
- (B) a presença de calcificação central sugere malignidade;
- (C) a presença de calcificação periférica sugere benignidade;
- (D) a ausência de calcificação sugere benignidade;
- (E) a presença de calcificação central, difusa ou laminar sugere benignidade.

34 - Paciente portador de fibrose pulmonar idiopática apresenta normalmente as seguintes características, EXCETO:

- (A) dispnéia progressiva e/ou tosse seca;
- (B) padrão ventilatório restritivo na espirometria;
- (C) diminuição da capacidade de difusão ao monóxido de carbono;
- (D) maior incidência acima dos 50 anos;
- (E) evolução aguda (dias ou semanas).

35 - O derrame pleural pode ser dividido em transudato e exsudato. Em relação ao tema, NÃO é correto afirmar que:

- (A) na maioria dos casos os transudatos regredem espontaneamente com o tratamento e controle da doença;
- (B) o líquido pleural de aspecto hemorrágico com hematócrito acima de 20% é sugestivo de tumores e embolia pulmonar;
- (C) na tuberculose pleural a presença de proteínas acima de 4,5g% e linfocitose no líquido pleural são freqüentes;
- (D) são sugestivos de derrame neoplásico a presença de baixa taxa de proteínas e de células mesoteliais no líquido pleural;
- (E) a pleuroscopia deve ser indicada nos exsudatos de etiologia indeterminada.

36 - Rinossinusite e asma estão estreitamente associadas em qualquer população estudada. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

- I – a presença de infiltrado inflamatório eosinofílico é observado no epitélio brônquico.
- II – a presença de infiltrado inflamatório eosinofílico ocorre tanto no epitélio nasal quanto no epitélio brônquico.
- III – a presença de infiltrado inflamatório agudo com polimorfonucleares ocorre nos pacientes com asma aguda.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

37 - O agente etiológico mais freqüentemente associado às exacerbações agudas da doença pulmonar obstrutiva crônica grave é (são):

- (A) pseudomonas aeruginosa;
- (B) streptococcus pneumoniae;
- (C) haemophilus influenzae;
- (D) stafilococcus aureus;
- (E) bactérias atípicas.

38 - São causas de abscesso pulmonar piogênico, EXCETO:

- (A) alcoolismo;
- (B) micoses;
- (C) acidente vascular encefálico;
- (D) processo inflamatório infradiafragmático;
- (E) fístula esôfago-traqueal.

39 - Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade em adultos imunocompetentes, observe as afirmativas a seguir:

- I – pneumonia adquirida na comunidade é aquela que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge nas primeiras 48 horas da admissão;
- II – saturação periférica de oxigênio menor que 90% nas ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica indica gravidade;
- III – leucopenia denota mau prognóstico, independente do agente etiológico.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

40 - O tumor do mediastino mais encontrado no compartimento posterior é:

- (A) ganglioneuroma;
- (B) linfoma;
- (C) adenomegalia;
- (D) tumor germinativo;
- (E) teratoma.

