

Domingo de manhã

**UNIMED – SANTA MARIA/RS  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025  
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

**09 – GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
  - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
  - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
  - OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H 30MIN.**
4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_12/01/2026 16:55:26

Eco  
Friendly

A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001



**LEGISLAÇÃO**

**QUESTÃO 01** – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e psicológica está subordinada à fiscalização da Comissão Tripartite de Operadoras de Saúde.
- II. Esta Lei institui o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos realizados no Brasil ou no exterior, desde que devidamente justificados conforme a CID-10.
- III. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 02** – Conforme a Lei nº 9.656/1998, responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, \_\_\_\_\_ e prestadores de serviço, \_\_\_\_\_ débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, \_\_\_\_\_ da sua natureza jurídica.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) acionistas – salvo os – dependendo
- B) fornecedores – salvo os – independentemente
- C) acionistas – além dos – independentemente
- D) fornecedores – além dos – independentemente
- E) acionistas – além dos – dependendo

**QUESTÃO 03** – Conforme a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, analise a sentença abaixo.

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar assistência aos associados e somente mediante autorização da ANS a assistência poderá ser extensiva aos empregados da cooperativa (**1ª parte**). As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito (**2ª parte**). A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

**QUESTÃO 04** – A respeito das Assembleias Gerais, consoante à Lei nº 5.764/1971, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O associado poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal.
- ( ) Nas cooperativas singulares, cada associado presente poderá ter direito a mais de 1 voto, dependendo do número de suas quotas-partes consolidadas.
- ( ) Nas cooperativas singulares, é permitida a representação por meio de mandatário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 05** – De acordo com o art. 46 da Lei nº 5.764/1971, é da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar, entre outros assuntos, sobre a reforma do estatuto e, para tornar válidas as deliberações, são necessários os votos de \_\_\_\_\_ dos associados presentes.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) um terço
- B) dois terços
- C) três quartos
- D) cinquenta por cento
- E) cinquenta e um por cento

**QUESTÃO 06** – De acordo com a Resolução Normativa (RN) nº 395/2016 da ANS, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser emitida por profissional de saúde devidamente habilitado.
- B) A apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial à operadora poderá ser feita pelo prestador em nome do beneficiário.
- C) É diretriz que deve orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários a transparência, clareza e segurança das informações.
- D) É garantido ao beneficiário o tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor.
- E) As operadoras exclusivamente odontológicas, as filantrópicas e as autogestões deverão disponibilizar unidade de atendimento integral, no mínimo nas capitais dos Estados ou regiões de maior atuação dos seus produtos.

**QUESTÃO 07** – Conforme o Regimento Interno da Unimed Santa Maria e a respeito da admissão na Cooperativa, os critérios de avaliação para estabelecer ingresso de novos cooperados deverão observar parâmetros específicos da Unimed Santa Maria. São parâmetros que devem ser observados os listados a seguir, EXCETO:

- A) Usuários por cooperado ativo na Cooperativa.
- B) Usuários por cooperado ativo da especialidade proposta, na Cooperativa.
- C) Rendimento médio semestral dos cooperados ativos.
- D) Reclamações de usuários sobre a regularidade e qualidade no atendimento da especialidade.
- E) Rendimento médio mensal dos cooperados ativos da especialidade, na Cooperativa.

**QUESTÃO 08** – Sobre o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários é permitida quando o paciente livremente optar por acomodações hospitalares superiores às contratadas.
- B) No que tange à sistemática sócio-operacional, a complementação de honorários se aplica nos casos de indicação técnica de isolamento.
- C) Acerca das relações Cooperado-Unimed, o médico cooperado deverá garantir, por todos os meios, a confidencialidade dos dados clínicos e cadastrais dos beneficiários, mesmo após seu desligamento da cooperativa.
- D) Os honorários médicos correspondentes aos serviços prestados aos usuários serão calculados após balanço anual, por rateio proporcional à produção de cada cooperado.
- E) Acerca da admissão na cooperativa, o número mínimo de cooperados será de 20 pessoas físicas e o número máximo variável.

**QUESTÃO 09** – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, nos casos de urgência e/ou emergência, o usuário poderá ser internado sem a solicitação e/ou autorização prévia, devendo o médico cooperado solicitá-la, dentro das próximas:

- A) 4 horas úteis.
- B) 8 horas úteis.
- C) 12 horas úteis.
- D) 24 horas úteis.
- E) 48 horas úteis.

**QUESTÃO 10** – A respeito do Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, analise as seguintes assertivas:

- I. Constitui infração disciplinar fraudulenta, entre outras, autogerar exames sem a devida indicação clínica.
- II. Após a leitura das peças processuais, o representado ou denunciado, ou seu procurador constituído, produzirá a sua defesa oral, todavia, a ausência do representado ou denunciado importará na transferência do julgamento.
- III. Em processo técnico disciplinar, concluído o julgamento, a decisão da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária é recorrível administrativamente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 11** – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, a respeito de recurso da decisão proferida em Processo Técnico Disciplinar pelo Conselho de Administração, caberá, como última e definitiva instância na área administrativa, no prazo de \_\_\_\_\_ dias, recurso à primeira Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária a ser realizada, sob pena da decisão tornar-se definitiva. A punição será aplicada pelo Conselho de Administração a contar do \_\_\_\_\_ dia após anexado o comprovante do recebimento da notificação pelo apenado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) quinze – trigésimo primeiro
- B) vinte – quadragésimo
- C) quinze – quadragésimo
- D) trinta – quadragésimo
- E) vinte – trigésimo primeiro

**QUESTÃO 12** – De acordo com a RN nº 488/2022 da ANS, que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que trata a Lei nº 9.656/1998, analise as seguintes assertivas:

- I. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho.
- II. Considera-se mesmas condições de cobertura assistencial a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
- III. O direito de manutenção de que trata esta Resolução exclui vantagens obtidas pelos empregados em negociações coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 13** – De acordo com a RN nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, analise as seguintes assertivas, relacionadas às disposições gerais sobre atos e prazos, e assinale V, se verdadeiras, ou F se falsas.

- ( ) Os atos e termos processuais previstos nesta Resolução conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaços em branco, entrelinhas, rasuras e emendas não ressalvadas.
- ( ) Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial, iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente e incluindo-se o do vencimento.
- ( ) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia não útil.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

**QUESTÃO 14** – De acordo com a RN nº 483/2022, compete à ANS, de ofício ou mediante provocação, cientificada do suposto cometimento de infração a dispositivos legais ou infralegais disciplinadores do mercado de saúde suplementar, instaurar o Procedimento de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), que é constituído pela fase I, intermediação preliminar, a fase II, \_\_\_\_\_, e a fase III, \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho cima.

- A) classificação residual da demanda – auditoria tempestiva
- B) auditoria da demanda – imposição da multa
- C) eleição dos níveis decrescentes de penalidades – imposição da multa
- D) classificação da demanda – classificação residual de demandas pelos fiscais
- E) estabelecimento da demanda judicial tempestiva – aferição da quitação da multa

**QUESTÃO 15** – Sobre o Estatuto Social da Unimed Santa Maria, no que concerne à Sociedade e Objetivos, analise as assertivas abaixo:

- I. A Cooperativa, como operadora de planos de saúde, poderá exigir do cooperado que preste serviço exclusivamente à Cooperativa.
- II. A Cooperativa efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro sobre o trabalho de seus cooperados, podendo criar serviços próprios para a realização de seus objetivos sociais.
- III. Não serão admitidas pessoas jurídicas como associadas, exceto outra Cooperativa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 16** – De acordo com a RN nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, a região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. As regiões de saúde serão objeto de Instrução Normativa da

- A) Comissão Gestora Integrativa Regional (CGIR).
- B) Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO).
- C) Comissão Normativa Regional (CNR).
- D) Diretoria de Normas e Cobertura Regional (DNCR).
- E) Comissão Organizativa Assistencial (COA).

**QUESTÃO 17** – A respeito da RN nº 557/2022 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) No plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, porém não se aplica às hipóteses de rescisão unilateral do contrato por fraude ou não pagamento da mensalidade, previsto na Lei nº 9.656/1998.
- ( ) O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente, os agentes políticos.
- ( ) O plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas, de caráter profissional, classista ou setorial, entre elas, os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

**QUESTÃO 18** – A RN nº 520/2022 da ANS estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde e disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS. Sobre essa Resolução, assinale a alternativa correta.

- A) Pode exercer o cargo de administrador eleito, nomeado ou designado, o impedido por lei especial, ainda que em condição temporária de impedimento, uma vez preenchido tempestivamente o termo de responsabilidade.
- B) Ressalvadas as exigências e restrições legais, estatutárias ou contratuais, a operadora de planos privados de assistência à saúde poderá designar pessoa estranha ao seu quadro social para exercer o cargo de administrador, o qual deverá preencher as condições e os requisitos previstos nesta Resolução.
- C) O cadastramento do administrador exime a responsabilidade pela fidedignidade das informações prestadas do próprio administrador e da operadora de planos privados de assistência à saúde.
- D) O termo de responsabilidade é o instrumento particular por meio do qual o administrador eleito, nomeado ou designado declara que se encontra impedido para o exercício pleno do cargo em pelo menos duas das quatro restrições previstas nesta Resolução.
- E) Na instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 60 dias, a contar do registro do termo de responsabilidade.

**QUESTÃO 19** – Sobre a RN nº 489/2022 da ANS, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A sanção de advertência verbal será aplicada nos casos previstos, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução, salvo a condição de não ter acarretado qualquer dano aos beneficiários.
  - II. A ANS aplicará as penalidades descritas nesta Resolução, de forma isolada ou cumulativamente, considerando a gravidade, as consequências do caso e o porte econômico das operadoras.
  - III. Ser o infrator reincidente é uma das circunstâncias que sempre agravam a sanção, quando não se constituem na própria infração.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
  - B) Todas as assertivas estão incorretas.
  - C) Apenas a assertiva I está correta.
  - D) Apenas a assertiva III está correta.
  - E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 20** – De acordo com a RN nº 424/2017 da ANS, que dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A junta poderá ser realizada nas modalidades presencial ou à distância, definida a critério do desempatedor.
- B) Considera-se profissional assistente o médico ou cirurgião-dentista que solicitou o procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora, ou que será o responsável pela execução do procedimento.
- C) Considera-se profissional da operadora o médico ou cirurgião-dentista designado pela operadora.
- D) A junta presencial deverá contar, ao menos, com a presença do desempatedor e do beneficiário.
- E) O beneficiário poderá ser obrigado a arcar com as despesas do desempatedor.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – O adiamento da gestação tem levado ao aumento da procura por investigação de infertilidade conjugal. Na avaliação do casal infértil, após a exclusão do fator masculino por meio do espermograma, deve-se investigar os fatores femininos, que incluem o fator ovulatório, o fator tubo-peritoneal e o fator uterino. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o exame de maior acurácia para a avaliação do fator ovulatório, o padrão-ouro para a avaliação da permeabilidade tubo-peritoneal e o padrão-ouro para a avaliação das alterações da cavidade uterina.

- A) Dosagem sérica do hormônio antimulleriano – videolaparoscopia – ultrassonografia transvaginal.
- B) Dosagem sérica de progesterona na fase lútea – videolaparoscopia – ultrassonografia transvaginal.
- C) Ultrassonografia transvaginal seriada – videolaparoscopia – histeroscopia.
- D) Ultrassonografia transvaginal seriada – histerossalpingografia – histeroscopia.
- E) Dosagem da progesterona no 21º dia do ciclo – videolaparoscopia – histerossonografia.

**QUESTÃO 22** – Paciente de 60 anos, G3P3, na menopausa há 8 anos, procura atendimento com queixa de perda involuntária de urina aos esforços, como ao tossir e durante a prática de atividade física. Nega urgência miccional e polaciúria. Ao exame físico, o teste do cotonete evidencia variação de 35º. Exame urodinâmico apresentado pela paciente demonstra pressão de perda aos esforços de 100 cmH<sub>2</sub>O. Considerando o quadro clínico e os achados complementares, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a causa mais provável da incontinência urinária e o tratamento inicial recomendado.

- A) Hiperatividade do músculo detrusor – modificação do estilo de vida e fisioterapia do assoalho pélvico.
- B) Insuficiência esfinteriana intrínseca – modificação do estilo de vida e fisioterapia do assoalho pélvico.
- C) Insuficiência esfinteriana intrínseca – cirurgia de *sling* de uretra média.
- D) Fraqueza do assoalho pélvico – modificação do estilo de vida e fisioterapia do assoalho pélvico.
- E) Fraqueza do assoalho pélvico – cirurgia de *sling* de uretra média.

**QUESTÃO 23** – Sobre as causas de amenorreia primária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, as pacientes apresentam eixo hipotálamo-hipófise-ovariano funcionando, agenesia uterina e das trompas, além de agenesia dos dois terços superiores da vagina, com desenvolvimento normal de caracteres sexuais secundários.
- B) A síndrome de Morris decorre de defeito nos receptores de androgênio, ocorrendo em indivíduos 46,XY com testículos funcionantes e ausência de resposta periférica aos androgênios.
- C) A síndrome de Turner é a principal causa de hipogonadismo hipergonadotrófico na adolescência, sendo o cariótipo fundamental para a confirmação diagnóstica.
- D) A síndrome de Swyer e a síndrome de Morris apresentam cariótipo 46,XY e há ausência de útero em ambas, diferindo apenas quanto à presença de testículos funcionantes.
- E) Em pacientes com amenorreia primária associada à dor pélvica cíclica, devem ser investigadas causas obstrutivas do trato genital, como o hímen imperfurado.

**QUESTÃO 24** – Na Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), há resistência insulínica e consequente hiperinsulinemia. O aumento dos níveis de insulina no plasma, por sua vez, promove \_\_\_\_\_ dos níveis de LH, \_\_\_\_\_ dos níveis de FSH e \_\_\_\_\_ da SHBG, aumentando a quantidade de androgênios livres circulantes.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) aumento – aumento – aumento
- B) aumento – queda – aumento
- C) aumento – queda – queda
- D) queda – queda – queda
- E) queda – aumento – queda

**QUESTÃO 25** – A respeito do ciclo hormonal feminino, analise as assertivas abaixo:

- I. O GnRH é um hormônio produzido no hipotálamo e secretado de forma pulsátil, sendo essencial para a liberação de LH e FSH pela adeno-hipófise.
- II. No modelo das duas células e duas gonadotrofinas, o LH atua predominantemente nas células da teca estimulando a produção de andrógenos a partir do colesterol, enquanto o FSH atua nas células da granulosa promovendo a aromatização desses andrógenos em estrogênios.
- III. Na fase folicular do ciclo menstrual, o endométrio encontra-se em fase proliferativa, enquanto o muco cervical torna-se espesso e escasso, dificultando a ascensão dos espermatozoides.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

---

**QUESTÃO 26** – Sobre o câncer do colo do útero, assinale a alternativa correta.

- A) É o câncer mais prevalente entre as mulheres no Brasil.
- B) Trata-se de neoplasia geralmente sintomática em fases iniciais, o que justifica a elevada taxa de diagnóstico precoce.
- C) O estadiamento do câncer do colo do útero é cirúrgico, sendo os exames de imagem utilizados exclusivamente para planejamento terapêutico.
- D) A vacinação contra o HPV constitui a principal estratégia de prevenção secundária do câncer de colo do útero no SUS.
- E) O tratamento do câncer do colo do útero depende do estadiamento da doença, sendo a quimiorradioterapia concomitante ao tratamento padrão para tumores localmente avançados, incluindo aqueles com diâmetro tumoral superior a 4 cm.

---

**QUESTÃO 27** – Sobre a investigação da amenorreia secundária, analise as assertivas abaixo:

- I. O primeiro passo na investigação é a dosagem sérica de FSH, TSH e prolactina.
- II. Em pacientes com dosagens hormonais iniciais normais, o teste da progesterona permite avaliar a presença de estrogênio endógeno e a integridade do trato de saída.
- III. Um teste de estrogênio + progesterona negativo sugere causa estrutural, sendo a síndrome de Asherman a etiologia mais frequente.
- IV. Na presença de níveis baixos ou normais de FSH, devem ser investigadas causas hipotalâmicas ou hipofisárias, sendo a ressonância magnética de sela túrcica o exame de escolha.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 28** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os subtipos moleculares do câncer de mama às suas respectivas características.

**Coluna 1**

1. Luminal A.
2. Luminal B.
3. HER2.
4. Triplo negativo.

**Coluna 2**

- ( ) Tumores geralmente negativos para receptores hormonais, com maior frequência de mutações em BRCA1 e maior incidência em mulheres jovens.
- ( ) Caracterizado por expressão de receptores hormonais, baixo índice proliferativo e melhor prognóstico entre os carcinomas invasivos.
- ( ) Caracterizado por superexpressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano, associado a maior agressividade na ausência de terapia-alvo.
- ( ) Tumores RE positivos, Ki-67 elevado, podendo apresentar benefício adicional com quimioterapia associada à hormonioterapia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 1 – 3 – 2.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.
- E) 2 – 4 – 1 – 3.

**QUESTÃO 29** – De acordo com os Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS, são consideradas condições de categoria 4 para o uso de anticoncepcionais orais combinados, EXCETO:

- A) Mulher tabagista com 35 anos ou mais que fuma um maço de cigarros por dia.
- B) Hipertensão arterial sistêmica com pressão arterial sistólica  $\geq 160$  mmHg.
- C) Histórico pessoal de tromboembolismo venoso.
- D) Enxaqueca com aura, independentemente da idade.
- E) Cirrose hepática compensada.

**QUESTÃO 30** – Paciente de 28 anos, previamente hígida, apresenta prurido vulvar intenso há 3 dias e corrimento branco, espesso, em placas aderentes à mucosa vaginal. Nega febre ou disúria. O exame físico confirma a presença de placas esbranquiçadas aderentes à parede vaginal e vulva. O pH vaginal é normal. Com base nesse quadro, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro clínico é compatível com candidíase vulvovaginal, e o diagnóstico de candidíase recorrente é definido por quatro ou mais episódios documentados em um ano.
- B) Trata-se provavelmente de vaginose bacteriana, devendo ser associado tratamento com creme de corticoide para alívio do prurido intenso.
- C) O tratamento pode ser tópico ou sistêmico, dependendo exclusivamente da preferência da paciente.
- D) O tratamento do parceiro sexual nunca é necessário, independentemente da recorrência.
- E) Apenas pacientes com tricomoníase devem ser rastreadas para outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

**QUESTÃO 31** – Sobre a gestação gemelar, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Nas gestações gemelares, todas as gestantes devem receber AAS em baixa dose para prevenção de pré-eclâmpsia, a partir das 12 semanas de gestação.
- ( ) O uso de sulfato de magnésio deve ser feito por todas as gestantes que entrarem em trabalho de parto antes das 34 semanas.
- ( ) Nas gestações gemelares, a dose de sulfato ferroso deve ser aumentada a partir do segundo trimestre, uma vez que há risco aumentado de anemia.
- ( ) A indicação do uso de corticosteroide antenatal é a mesma das gestações de feto único, não devendo ser administrado de rotina em todas as gestações gemelares.
- ( ) Em gestações monoamnióticas, o parto pode ser realizado por via vaginal apenas se ambos os fetos estiverem em apresentação cefálica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V – V.
- B) F – V – F – F – F.
- C) F – F – F – F – F.
- D) V – F – V – V – F.
- E) V – F – V – V – V.

**QUESTÃO 32** – Em gestantes Rh negativo com parceiro Rh positivo, está indicada a profilaxia da Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) com imunoglobulina anti-D. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O principal fator determinante da sensibilização materna é o volume de hemácias fetais que alcança a circulação materna.
- B) Após o contato materno inicial com o antígeno D, o sistema imune produz predominantemente anticorpos do tipo IgM, capazes de atravessar a placenta e causar hemólise fetal.
- C) Os anticorpos anti-D produzidos pela mãe podem ligar-se às hemácias fetais Rh positivas, levando à anemia hemolítica progressiva no feto.
- D) A dopplervelocimetria da artéria cerebral média fetal é o método não invasivo mais utilizado para estimar indiretamente o grau de anemia fetal.
- E) A cordocentese é o único método que permite avaliar diretamente a anemia fetal, por meio da dosagem de hemoglobina e hematócrito fetais.

**QUESTÃO 33** – Na insuficiência placentária, o feto desenvolve adaptações neuroendócrinas e hemodinâmicas em resposta à hipóxia e à deficiência nutricional. Sobre a fisiopatologia dessas alterações, assinale a alternativa correta.

- A) O aumento da resistência vascular periférica e a vasodilatação arterial em órgãos nobres podem ser demonstrados, respectivamente, pelo Doppler da artéria umbilical e pelo Doppler da artéria cerebral média, caracterizando a centralização fetal.
- B) A primeira alteração hemodinâmica observada é a vasodilatação cerebral, detectada pelo Doppler da artéria cerebral média com índice de pulsatilidade abaixo do percentil 5.
- C) O último exame Doppler a se alterar é o do ducto venoso, sendo o índice de pulsatilidade abaixo do percentil 5 o principal marcador de sofrimento fetal grave.
- D) A presença de diástole reversa no Doppler do ducto venoso é um sinal de hipóxia fetal grave.
- E) O aumento da resistência no ducto venoso fetal ocorre exclusivamente em decorrência do aumento da pré-carga e da pressão sistólica.

**QUESTÃO 34** – Sobre a ruptura prematura de membranas ovulares (RUPREME), analise as assertivas abaixo:

- I. O diagnóstico de RUPREME é estabelecido quando ocorre a ruptura das membranas ovulares antes das 37 semanas de gestação.
- II. Pacientes com diagnóstico de RUPREME após as 34 semanas de gestação devem receber antibioticoterapia de latência e ter a gestação interrompida imediatamente.
- III. Todas as gestantes que se apresentam com RUPREME entre 24 e 34 semanas de gestação devem receber corticoterapia antenatal por via intramuscular, na ausência de contraindicações.
- IV. Gestantes com RUPREME que têm gestação interrompida por corioamnionite e que recebem antibioticoterapia com ampicilina associada à gentamicina não necessitam de penicilina adicional para profilaxia do estreptococo do grupo B.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 35** – Puérpera de 29 anos, G2P2, submetida a parto vaginal há 30 minutos, evolui com sangramento vaginal abundante, estimado em aproximadamente 800 mL. Ao exame físico, apresenta útero amolecido e aumentado, com dificuldade de contração à palpação. Sinais vitais: PA 160 x 100 mmHg, FC 112 bpm. História prévia de hipertensão arterial crônica em uso irregular de metildopa durante a gestação. Foram iniciadas massagem uterina e infusão de ocitocina endovenosa, sem resposta satisfatória. Considerando o quadro clínico, assinale a alternativa que indica a conduta farmacológica mais apropriada nesse momento.

- A) Administração de metilergometrina endovenosa, por ser o uterotônico mais potente no tratamento da atonia uterina.
- B) Administração de metilergometrina intramuscular associada ao ácido tranexâmico, reduzindo o risco de complicações hipertensivas.
- C) Administração de ácido tranexâmico isoladamente, uma vez que o sangramento ainda é inferior a 1.000 mL.
- D) Administração de misoprostol por via retal ou sublingual, podendo ser associado ao ácido tranexâmico.
- E) Aguardar resposta tardia à ocitocina antes de introduzir outro uterotônico, mantendo apenas medidas não farmacológicas.

**QUESTÃO 36** – Sobre a transmissão vertical do HIV durante a gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A carga viral materna está diretamente relacionada ao risco de transmissão vertical do HIV, sendo fundamental mantê-la indetectável durante a gestação.
- B) Gestantes vivendo com HIV não devem amamentar e, por esse motivo, devem receber medicação para supressão da lactação antes da alta hospitalar.
- C) A terapia antirretroviral (TARV) está indicada para todas as gestantes vivendo com HIV, independentemente da carga viral ou da contagem de linfócitos CD4.
- D) A principal variável que define a via de parto em gestantes vivendo com HIV é a carga viral materna no final da gestação.
- E) Toda gestante com carga viral detectável, mesmo abaixo de 1.000 cópias/mL, tem a via de parto vaginal formalmente contraindicada.

**QUESTÃO 37** – Paciente de 24 anos, G1P0, realiza sorologia para toxoplasmose com 17 semanas de gestação, apresentando IgG e IgM positivos. Qual deve ser a consulta inicial mais adequada?

- A) Iniciar espiramicina imediatamente e solicitar teste de avidéz do IgG.
- B) Iniciar espiramicina imediatamente e repetir sorologia em duas semanas.
- C) Iniciar esquema tríplice imediatamente e solicitar ultrassonografia fetal mensal para seguimento.
- D) Iniciar esquema tríplice imediatamente e solicitar teste de avidéz do IgG.
- E) Iniciar esquema tríplice e realizar amniocentese imediatamente.

**QUESTÃO 38** – Gestante de 28 anos, G2P1, com 33 semanas de gestação, procura o pronto atendimento por sangramento vaginal de início súbito há cerca de 1 hora. Refere sangramento em moderada quantidade, de coloração vermelho-escura. Nega relação sexual recente ou trauma. Ao exame físico, encontra-se pálida, sudoreica, com PA de 150 × 95 mmHg e FC de 110 bpm. Ao exame abdominal, apresenta útero hipertônico, doloroso à palpação, com aumento da frequência de contrações uterinas. Ausculta fetal revela BCF de 90 bpm. O toque vaginal não foi realizado. Com base no quadro clínico apresentado, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Descolamento prematuro de placenta.
- B) Placenta prévia total.
- C) Placenta prévia marginal.
- D) Rotura uterina.
- E) Vasa prévia.

**QUESTÃO 39** – Em relação ao diagnóstico clínico da gravidez, relacione à Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de sinais às suas respectivas manifestações.

**Coluna 1**

- 1. Sinal de presunção.
- 2. Sinal de probabilidade.
- 3. Sinal de certeza.

**Coluna 2**

- ( ) Tubérculos de Montgomery.
- ( ) Amolecimento do istmo uterino ao toque vaginal (sinal de Hegar).
- ( ) Aparecimento da linha *nigra*.
- ( ) Visualização de embrião com batimentos cardíacos na ultrassonografia.
- ( ) Sinal de Chadwick.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 2 – 3 – 1.
- B) 1 – 2 – 1 – 3 – 2.
- C) 1 – 1 – 2 – 2 – 3.
- D) 2 – 2 – 3 – 1 – 1.
- E) 1 – 2 – 2 – 3 – 1.

**QUESTÃO 40** – Paciente de 28 anos, G1P0, com 10 semanas de gestação, sem antecedentes pessoais de diabetes, realiza exames laboratoriais de rotina do primeiro trimestre, apresentando uma glicemia de jejum de 94 mg/dL. Considerando os critérios atuais para diagnóstico e manejo do diabetes melito na gestação, assinale a alternativa correta.

- A) A paciente não apresenta diabetes melito gestacional, devendo realizar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG 75 g) entre 24 e 28 semanas.
- B) O diagnóstico é de diabetes melito gestacional, não sendo necessário realizar TOTG para confirmação diagnóstica.
- C) O valor da glicemia de jejum é limítrofe, insuficiente para diagnóstico, sendo obrigatória a repetição do exame em jejum.
- D) O diagnóstico é de diabetes melito pré-gestacional, devendo ser iniciado tratamento farmacológico imediato.
- E) A glicemia de jejum isolada não tem valor diagnóstico na gestação, sendo o TOTG o único exame válido.

**QUESTÃO 41** – A endometriose é uma doença ginecológica crônica que acomete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Em relação a sua etiopatogênese, manifestações clínicas e abordagem terapêutica, analise as assertivas abaixo:

- I. A metaplasia celômica é considerada uma das teorias aceitas para a etiopatogênese da endometriose.
- II. Sintomas gastrointestinais, como fadiga, diarreia e constipação intestinal, podem estar presentes.
- III. A mudança do estilo de vida, incluindo atividade física e medidas dietéticas, faz parte do manejo terapêutico da doença.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 42** – Paciente de 41 anos refere última menstruação há 2 meses. Relata que, nos últimos 5 meses, vinha apresentando encurtamento dos ciclos menstruais. Há cerca de 30 dias, iniciou sintomas como fadiga, sono fragmentado e alterações do humor. Nega vida sexual ativa há mais de 1 ano. Com base no quadro clínico apresentado, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Falência ovariana.
- B) Climatério.
- C) Adenomiose.
- D) Primeiro trimestre de gestação.
- E) Menopausa.

**QUESTÃO 43** – A terapia hormonal do climatério vem sofrendo importantes atualizações quanto a suas indicações e contraindicações. Nesse sentido, ainda são consideradas contraindicações absolutas à terapia hormonal as seguintes patologias:

- I. Câncer de colo uterino.
- II. Meningioma.
- III. Adenoma hepático.
- IV. HAS controlada com medicação.
- V. Embolia pulmonar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e V.
- D) Apenas III, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

**QUESTÃO 44** – Paciente de 22 anos, nuligesta, portadora de lúpus eritematoso sistêmico em uso contínuo de hidroxiquina e metotrexato, realiza teste de DNA-HPV como rastreamento do câncer do colo do útero, com resultado negativo (não detectado). Considerando as recomendações atuais do Ministério da Saúde, qual é a melhor conduta?

- A) Repetir o teste de DNA-HPV em 5 anos.
- B) Repetir o teste de DNA-HPV em 3 anos.
- C) Repetir o teste de DNA-HPV em 1 ano.
- D) Realizar coleta de citologia oncológica do colo do útero.
- E) Encaminhar para colposcopia.

**QUESTÃO 45** – A respeito do câncer de endométrio, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Trata-se de uma neoplasia mais frequente em mulheres na pós-menopausa.
- B) A síndrome dos ovários policísticos constitui fator de risco para seu desenvolvimento.
- C) O diagnóstico costuma ser precoce, uma vez que geralmente cursa com sangramento uterino anormal.
- D) O método padrão-ouro para confirmação diagnóstica é a histeroscopia com biópsia endometrial.
- E) O estadiamento do câncer de endométrio é realizado com base em exames de imagem.

**QUESTÃO 46** – Mulher de 62 anos, menopausa aos 48 anos, sem uso prévio de terapia hormonal, procura atendimento após fratura de rádio distal decorrente de queda da própria altura. A densitometria óssea evidencia T-score de  $-1,8$  em coluna lombar e  $-1,9$  em colo femoral. Nesse caso, a conduta mais adequada é:

- A) Apenas orientar suplementação de cálcio e vitamina D, pois não há critérios densitométricos para osteoporose.
- B) Repetir densitometria óssea em 2 anos e reavaliar necessidade de tratamento farmacológico.
- C) Solicitar FRAX antes de definir qualquer conduta terapêutica.
- D) Iniciar tratamento farmacológico para osteoporose, independentemente do T-score.
- E) Iniciar terapia hormonal, por se tratar de osteoporose pós-menopausa precoce.

**QUESTÃO 47** – Mulher de 47 anos, G2P2, com história de endometriose profunda tratada clinicamente por vários anos, procura atendimento por aumento progressivo do volume abdominal, saciedade precoce e dor pélvica de início insidioso. Ao exame físico, apresenta massa anexial fixa e ascite moderada. A ultrassonografia transvaginal evidencia massa ovariana sólida-cística irregular, com projeções papilíferas e vascularização ao Doppler. O CA-125 encontra-se elevado. A paciente é submetida à laparotomia com estadiamento cirúrgico, cujo exame anatomopatológico revela carcinoma epitelial de ovário. Considerando o contexto clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) O subtipo histológico mais provável é o carcinoma seroso de alto grau, frequentemente associado a mutações germinativas em BRCA1/2.
- B) O subtipo histológico mais compatível é o carcinoma mucinoso, geralmente relacionado a tumores gastrointestinais primários.
- C) O carcinoma de células claras é uma possibilidade relevante, frequentemente associado à endometriose, com comportamento mais agressivo e menor resposta à quimioterapia.
- D) O carcinoma endometriode de ovário é o mais agressivo dos carcinomas epiteliais e apresenta pior prognóstico.
- E) A presença de ascite e elevação do CA-125 praticamente excluem subtipos não serosos de câncer de ovário.

**QUESTÃO 48** – Sobre o puerpério patológico, assinale a alternativa correta.

- A) A febre puerperal é definida por temperatura  $\geq 38$  °C em qualquer momento após o parto.
- B) A endometrite puerperal está mais frequentemente associada a parto vaginal sem intercorrências.
- C) A trombose venosa profunda no puerpério ocorre, predominantemente, por deficiência de proteína C.
- D) A mastite puerperal ocorre exclusivamente nas primeiras 72 horas pós-parto.
- E) A presença de lóquios fétidos associada à subinvolução uterina sugere infecção puerperal, mesmo na ausência de febre.

**QUESTÃO 49** – Considerando aspectos epidemiológicos, diagnósticos e terapêuticos das ISTs, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A presença de sífilis primária ativa caracteriza período de elevada transmissibilidade, sendo o risco de transmissão vertical maior na sífilis recente, independentemente do título do VDRL materno.
- ( ) Em mulheres assintomáticas, a infecção pelo *Chlamydia trachomatis* deve ser preferencialmente diagnosticada por teste molecular, sendo a sorologia reservada apenas para investigação de complicações tardias.
- ( ) A transmissão do vírus herpes simples tipo 2 ocorre predominantemente durante episódios sintomáticos, sendo excepcional na ausência de lesões genitais visíveis.
- ( ) A tricomoníase, embora frequentemente assintomática, está associada ao aumento do risco de transmissão do HIV e requer tratamento simultâneo do parceiro, independentemente da presença de sintomas.
- ( ) A regressão clínica das verrugas genitais não implica erradicação do HPV, podendo haver persistência viral subclínica com potencial oncogênico, especialmente nos subtipos de alto risco.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V – V.
- B) F – V – F – F – V.
- C) V – F – V – V – F.
- D) V – V – V – F – F.
- E) F – F – F – V – V.

**QUESTÃO 50** – A respeito da fisiopatologia e dos critérios diagnósticos da pré-eclâmpsia, assinale a alternativa correta.

- A) A alteração primária da doença está relacionada à invasão trofoblástica inadequada das artérias espiraladas, resultando em circulação útero-placentária de alta resistência.
- B) A presença de proteinúria é indispensável para o diagnóstico de pré-eclâmpsia.
- C) A disfunção endotelial sistêmica decorre principalmente da hipoperfusão materna secundária à vasoconstrição generalizada.
- D) A pré-eclâmpsia é definida exclusivamente por hipertensão após 20 semanas associada a sinais de lesão placentária.
- E) A liberação aumentada de prostaciclina em relação ao tromboxano A<sub>2</sub> explica a vasoconstrição e a agregação plaquetária observadas na doença.