

Ícone em bairro de Curitiba, casarão de 1876 ganhará nova função

A Prefeitura de Curitiba quer dar uma nova finalidade ao prédio histórico da antiga Casa do Núcleo Habitacional Santa Efigênia, localizado em frente ao Terminal do Barreirinha. A Câmara Municipal aprovou, nesta terça-feira (11/11), o projeto que autoriza o Executivo a adquirir o terreno. A proposta é transformar o imóvel na nova Casa da Leitura de Curitiba, dedicada à promoção de atividades literárias e culturais para a comunidade.

Construída em 1876, a edificação é considerada desde 2019 uma Unidade de Interesse Especial de Preservação (UIEP), devido ao seu valor arquitetônico e histórico. O imóvel, porém, apresenta desgaste estrutural e está fechado há anos. Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Serginho do Posto (PSD), o local está em uma área estratégica, na Avenida Anita Garibaldi, uma das principais vias de ligação entre o centro e a região norte da cidade.

“É um chalé de linhas românticas e influência da arquitetura dos imigrantes, que compunha a antiga estrada do Açungui, atual rua Mateus Leme, e fazia parte de uma série de ramais que ligavam o centro de Curitiba às colônias de imigrantes da época. Inicialmente, ela foi utilizada como moradia e, com o tempo, também para uso comercial. Hoje, temos a oportunidade de preservar mais um capítulo da história e da cultura da nossa cidade”, destacou o vereador.

Para a nova destinação, será necessário restaurar janelas, pisos e reforçar a estrutura. A área também é considerada vulnerável, com risco de invasão e depredação. “Essa situação representa não apenas uma ameaça ao patrimônio municipal, mas também um problema de segurança pública. O projeto busca preservar a memória da cidade e evitar a perda de um bem com valor histórico e cultural para Curitiba”, completou o líder do governo.

O casarão já abrigou, em outros tempos, a Associação Católica Filantrópica Santa Efigênia (Cafisi). O projeto de transformá-lo em Casa da Leitura parte da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), responsável por outras unidades do programa espalhadas pela cidade. A vereadora Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) defendeu que a Fundação assegure o uso efetivo do espaço, criando um polo cultural descentralizado capaz de valorizar a memória e a identidade do bairro.

De propriedade da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab-CT), o imóvel encontra-se fechado e cercado por tapumes para evitar depredações. O sobrado tem dois pavimentos, com cerca de 50 m² cada, em um terreno de 525,6 m². A Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (SMATI) precificou a compra em R\$ 756 mil, conforme o laudo nº 166/2025.

A Assessoria de Captação de Recursos e Gestão de Investimentos (FTCG), ligada à Secretaria Municipal de Finanças, informou que o pagamento será feito com recursos do superávit financeiro da própria FCC, conforme previsão da Lei Orçamentária Anual de 2025. Obrigações e débitos anteriores à transferência continuarão sob responsabilidade da Cohab-CT, enquanto a Fundação ficará encarregada das despesas de escritura e registro.

O projeto foi levado à votação em regime de urgência, com tramitação aprovada na semana passada. A proposta retorna ao plenário nesta quarta-feira (12/11) para votação em segundo turno, etapa final antes da sanção do Executivo.

Fonte: https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/icone-em-bairro-de-curitiba-casarao-de-1876-ganhara-nova-funcao/?utm_source=noticias-virais-rodape&utm_medium=internal-tribuna&utm_campaign=tribuna

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Câmara Municipal de Curitiba autorizou o executivo a adquirir o terreno no qual está o prédio histórico da antiga Casa do Núcleo Habitacional Santa Efigênia.
- (B) O Projeto é transformar o imóvel na Casa da Leitura de Curitiba.
- (C) O imóvel já abrigou também a Associação Católica Filantrópica Santa Efigênia.
- (D) O imóvel da antiga Casa do Núcleo Habitacional Santa Efigênia foi construído no século XVIII.
- (E) Para transformar o imóvel na casa da Leitura de Curitiba será necessário restaurar janelas, pisos e reforçar a estrutura.

02) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafos:

- (A) Chalé – Terreno.
- (B) Prefeitura – Terreno.
- (C) Frente – Fechado.
- (D) Proposta – Necessário.
- (E) Sobrado – Estrutural.

03) Assinale a alternativa na qual a letra ç da palavra NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra ç na palavra Executivo:

- (A) Histórico.
- (B) Época.
- (C) Recursos.
- (D) Conforme.
- (E) Cidade.

04) Assinale a alternativa na qual a palavra seja acentuada pela mesma regra que justifica a acentuação na palavra imóvel:

- (A) Influência.
- (B) Responsável.
- (C) Românticas.
- (D) Capítulo.
- (E) Ganhará.

05) Assinale a alternativa na qual as duas palavras sejam proparoxítonas:

- (A) Câmara – Prédio.
- (B) Patrimônio – Católica.
- (C) Estratégico – Histórico.
- (D) Memória – Arquitetônico.
- (E) Vulnerável – Pública.

06) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: A proposta retorna ao plenário nesta quarta-feira (12/11) para votação em segundo turno, etapa final antes da sanção do Executivo.

- (A) Lugar.
- (B) Modo.
- (C) Negação.
- (D) Tempo.
- (E) Intensidade.

07) Assinale a alternativa cuja crase seja empregada pela mesma justificativa do seu emprego no período: O projeto foi levado à votação em regime de urgência, com tramitação aprovada na semana passada.

- (A) Executou suas tarefas às pressas e não agradou.
- (B) O convite foi enviado à diretora.
- (C) A festa será às seis horas.
- (D) A música produz efeitos semelhantes à poesia.
- (E) À medida que o tempo passa, tudo fica pior.

08) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da primeira vírgula no período: Inicialmente, ela foi utilizada como moradia e, com o tempo, também para uso comercial.

- (A) Isolar o adjunto adverbial.
- (B) Separar o vocativo.
- (C) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.
- (D) Isolar expressão explicativa.
- (E) Separar oração coordenada sindética.

09) Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

I - A palavra pagamento possui sufixo.

II - As palavras finalidade e comunidade possuem sufixos.

III - A palavra descentralizado possui prefixo e sufixo.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Todas as afirmativas são incorretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são corretas.
- (D) Apenas a afirmativa III é correta.
- (E) Todas as afirmativas são corretas.

10) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: “O projeto busca preservar a memória da cidade e evitar a perda de um bem com valor histórico e cultural para Curitiba”, completou o líder do governo.

- (A) Sujeito.
- (B) Vocativo.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Predicativo do Sujeito.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA

11) Ingrid resolveu comprar um apartamento no condomínio Viver Bem, o primeiro apartamento que visitou tem 80 m² e custa R\$ 370.000,00. No mesmo prédio, visitou um apartamento maior com 105 m², sabendo que o preço por metro quadrado é o mesmo do apartamento menor, o valor desde segundo imóvel que visitou é igual a:

- (A) R\$ 475.525,00.
- (B) R\$ 485.625,00.
- (C) R\$ 492.325,00.
- (D) R\$ 495.825,00.
- (E) R\$ 502.685,00.

12) No ano de 2025, a campanha de marketing da empresa X teve um orçamento de R\$ 1.640.800,00. Para o ano de 2026, o orçamento terá uma redução de 1/5 em relação ao ano anterior. Se o valor de 2026 vai ser liberado em 4 parcelas de igual valor, cada parcela é de:

- (A) R\$ 288.720,00.
- (B) R\$ 302.620,00.
- (C) R\$ 328.160,00.
- (D) R\$ 344.020,00.
- (E) R\$ 356.160,00.

13) O dono de uma lanchonete coletou uma amostra com 7 valores do tempo de entrega do seu delivery (15, 17, 18, 28, 24, 29 e 30 minutos). Considerando estes dados, a diferença entre o valor da mediana e da média é igual a:

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

14) Artur se desloca para o seu trabalho a pé. Todos os dias sai de casa, passa na panificadora tomar seu café e vai trabalhar. Para ir de casa até a panificadora tem três opções de caminhos diferentes e da panificadora até o trabalho são outros quatro. Considerando estas informações e que ele sempre cumpre esta rotina, quantos caminhos diferentes ele pode percorrer neste trajeto?

- (A) 5.
- (B) 7.
- (C) 10.
- (D) 11.
- (E) 12.

15) Um atleta amador percorre 2000 metros em 12 minutos. Ele pretende correr uma meia-maratona (21 km) e se conseguir manter o seu ritmo de corrida, vai terminar a prova com o tempo (em horas) de:

- (A) 1,7 horas.
- (B) 1,9 horas.
- (C) 2,0 horas.
- (D) 2,1 horas.
- (E) 2,4 horas.

<u>INFORMÁTICA</u>

16) Assinale a alternativa que apresenta a praga virtual que tem como característica principal uma técnica na qual o golpista usa da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas em benefício próprio, normalmente para ter acesso não autorizado a computadores ou informações:

- (A) Hijackers.
- (B) Sniffers.
- (C) Cavalo de Troia.
- (D) Engenharia social.
- (E) Spam.

17) Para que uma rede de computadores Wi-Fi seja montada em modo conhecido como infraestrutura, é necessária a presença de um equipamento que centraliza todas as comunicações desta rede. Esse equipamento é conhecido como:

- (A) Ponto de acesso – AP - Access Point.
- (B) Placa de rede.
- (C) Repetidor.
- (D) Cookies.
- (E) Cabo de rede.

18) Sobre o significado dos termos Intranet e Extranet, analise os itens a seguir:

I - Uma intranet é, no mais simples conceito, um site interno a uma corporação.

II - São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.

III - Uma intranet é, no mais simples conceito, um site interno a uma corporação.

IV - Extranet é quando as empresas liberam acesso de parte de sua rede de comunicação interna para pessoas previamente determinadas (funcionários de empresas parceiras, como fornecedores, distribuidores, franquias e até mesmo para clientes finais).

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente I e II estão corretos.
- (B) Somente II e III estão corretos.
- (C) Somente II e IV estão corretos.
- (D) Somente I, II e IV estão corretos.
- (E) Somente I, III e IV estão corretos.

19) No Microsoft Word, a função “Ctrl + T” é usada para:

- (A) Copiar o texto.
- (B) Colar o texto.
- (C) Selecionar o texto inteiro.
- (D) Salvar o documento.
- (E) Imprimir o arquivo.

20) A criptografia tem a função de:

- (A) Transformar dados em texto legível.
- (B) Proteger dados tornando-os ilegíveis a terceiros.
- (C) Criar senhas fracas.
- (D) Remover backups.
- (E) Desabilitar antivírus.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O rastreio do câncer colorretal é de suma importância, pois propicia o diagnóstico precoce de lesões pré-neoplásicas e conseqüentemente seu manejo. Ele deve ser realizado a partir dos 45 anos em pacientes sem histórico familiar importante da doença e preferencialmente com colonoscopia. Paciente foi submetido ao rastreio com retirada completa de pólipos de 1,5cm em cólon transversal, cuja histologia demonstrou ser um pólipo hiperplásico. O próximo exame deve ser realizado preferencialmente em:

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 1 ano.
- (D) 3 anos.
- (E) Entre 5 e 10 anos.

22) De acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e prevenção da aterosclerose de 2025, qual o critério abaixo define o paciente como categoria de risco de alto risco cardiovascular, em detrimento das categorias baixo, intermediário, muito alto e extremo risco cardiovascular?

- (A) LDL-c > 160-189 mg/dL.
- (B) Escore de risco calculado $\geq 20\%$ em 10 anos.
- (C) Evento aterosclerótico cardiovascular prévio manifesto.
- (D) Ausência de diabetes mellitus tipo 2.
- (E) CAC (escore de cálcio coronário) > 300 UA (angiotomografia de coronárias).

23) Paciente de 48 anos, portador de cardiomiopatia hipertrófica em forma apical (Yamaguchi) e com fibrilação atrial, vinha em uso de succinato de metoprolol 100 mg e dabigatrana 150 mg de 12/12 horas para controle de sintomas. Apresentou hematúria maciça, com instabilidade hemodinâmica e choque hipovolêmico. Após estabilização clínica e transfusão de hemoderivados, realizou tomografia que evidenciou imagem sugestiva de neoplasia de bexiga. Ao ser avaliado por um urologista, este indicou abordagem cirúrgica de urgência. Antes de iniciar a cirurgia, é necessário fazer a reversão da anticoagulação com:

- (A) Protamina.
- (B) Andexanet alfa.
- (C) Complexo protrombínico.
- (D) Idarucizumab.
- (E) Concentrado de plaquetas.

24) Paciente do sexo masculino, 55 anos, diabético e dislipidêmico com diagnóstico aos 51 anos. Procura atendimento em emergência devido a quadro de vômitos, distensão e dor abdominal. Nega tabagismo e etilismo. Informa que se o pai teve um AVC isquêmico com 61 anos e faleceu em decorrência de um IAM aos 70 anos; mãe obesa e dislipidêmica e irmã de 45 anos com aterosclerose. Exames na admissão: glicemia de jejum 250 mg/dL (referência <100mg/dL); transaminases de 180 U/L (referência <50U/L); triglicerídeos 1.880 mg/dL (referência <200mg/dL), amilase 500 U/L (referência 30-118U/L); lipase 250 U/L (referência <68U/L); creatinina 2,2 mg/dL (referência 0,6-1,2mg/dL); leucócitos 18.000/mm³ (referência 5.000-11.000/mm³). Considerando a suspeita diagnóstica de pancreatite, as informações fornecidas pelo paciente e os exames realizados, qual a causa mais provável e qual o diagnóstico diferencial a ser estabelecido?

- (A) Pancreatite devido à insuficiência renal – úlcera gástrica.
- (B) Pancreatite em decorrência de diabetes descompensado – septicemia.
- (C) Pancreatite devido à hipertrigliceridemia – pancreatite de etiologia biliar.
- (D) Pancreatite auto-imune – pancreatite devido à hipertrigliceridemia.
- (E) Pancreatite alcoólica – pancreatite de etiologia biliar.

25) Paciente se apresenta com infecção respiratória de provável etiologia bacteriana. Durante a escolha do antimicrobiano ideal, o médico opta por escolher um antibiótico da classe dos macrolídeos. Assinale abaixo qual foi o antibiótico escolhido.

- (A) Claritromicina.
- (B) Levofloxacino.
- (C) Amoxicilina + Ácido clavulânico.
- (D) Gentamicina.
- (E) Doxiciclina.

26) Paciente do sexo masculino, 35 anos, apresentou sinais de hemólise aguda, icterícia, dor lombar e palidez após ter tomado cloroquina em um “kit” de tratamento para COVID-19. O esfregaço de sangue periférico revelou eritrócitos que parecem ter uma ou mais mordidas na periferia da célula (células mordidas ou bolhosas), além de eritrócitos com inclusões denominadas corpúsculos de Heinz, que são partículas de hemoglobina desnaturada. Qual o diagnóstico mais provável frente a este quadro clínico?

- (A) Anemia hemolítica auto-imune.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Deficiência de G6PD.
- (D) Beta talassemia major.
- (E) Esferocitose hereditária.

27) Em qual das seguintes condições o sinal de Giordano positivo é mais provável de ser encontrado?

- (A) Cistite aguda.
- (B) Síndrome nefrótica.
- (C) Hiperplasia prostática benigna.
- (D) Pielonefrite aguda.
- (E) Cisto renal simples.

28) Paciente 62 anos, sexo masculino, usuário de drogas injetáveis, descobre que é portador de infecção pelo vírus da hepatite C, após investigação de alteração de transaminases, confirmada por carga viral positiva por técnica de PCR. Submetido a exames iniciais que demonstram função renal normal e marcadores não-invasivos negativos para a presença de fibrose hepática avançada (APRI < 1). É submetido a tratamento por 12 semanas com sofosbuvir e daclatasvir e repete a carga viral 12 semanas após o término de tratamento com resultado negativo. Nesse momento a melhor conduta é:

- (A) Dar alta para o paciente, uma vez que está curado de hepatite C.
- (B) Repetir semestralmente Anti-HCV para manutenção de vigilância de re-infecção.
- (C) Repetir anualmente carga viral para manutenção de vigilância de re-infecção.
- (D) Reiniciar tratamento com o mesmo esquema terapêutico por 24 semanas.
- (E) Repetir anualmente Anti-HCV para manutenção de vigilância de re-infecção.

29) Paciente do sexo feminino, 46 anos, imunossuprimida por tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, inicia há 48 horas com quadro de febre alta (39°C), associado a tosse com expectoração amarelada e dor pleurítica em base de hemitórax direito. Procura a emergência apresentando taquipnéia, com frequência respiratória de 34rpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente. Teste rápido de COVID negativo. É submetida a radiografia de tórax que demonstra pneumonia lobar em lobo inferior do pulmão direito. É internada e inicia tratamento com ceftriaxone e azitromicina. Em 72 horas de tratamento não apresenta melhora clínica. Neste momento a conduta mais adequada é:

- (A) Troca empírica do tratamento antibiótico para ampliar espectro.
- (B) Prosseguir a intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
- (C) Dosar ADA e fazer pesquisa de BAAR no escarro.
- (D) Associar Itraconazol ao tratamento.
- (E) Repetir exame radiológico para avaliar a possibilidade de complicações.

30) Paciente do sexo masculino 36 anos, descobriu recentemente ser HIV positivo, pois foi consultar com quadro arrastado de 3 semanas de febre, fadiga, tosse com pouca expectoração e perda de peso. Ao exame físico apresentava candidíase oral. O médico então solicitou alguns exames, com dosagens de CD4 e carga viral, que não ficaram prontos, mas desconfiou que o rapaz estivesse com CD4 baixo, pois apresentava linfopenia ao hemograma e aumento importante de LDH. Com a piora do quadro clínico e o aparecimento de dificuldade respiratória o médico decidiu solicitar vaga de internação com uma suspeita diagnóstica e tendo iniciado tratamento com:

- (A) Pneumonia bacteriana – ceftriaxone e azitromicina.
- (B) Aspergilose – fluconazol.
- (C) Tuberculose – esquema RIPE.
- (D) Pneumocistose – sulfametoxazol+trimetropima.
- (E) Candidíase invasiva – anfotericina B.

31) Recentemente popularizou-se para o tratamento da obesidade as famigeradas “canetas emagrecedoras”, muito devido a sua eficácia e segurança. Uma destas substâncias é chamada de tirzepatida, cujo mecanismo de ação é:

- (A) Agonista duplo de receptores GLP-1 e GIP.
- (B) Inibidores dos receptores SGLT-2 no rim.
- (C) Antagonista do hormônio GLP-1.
- (D) Antagonista triplo de receptores GLP-1, GIP e glucagon.
- (E) Ativador do receptor nuclear ativado pelo proliferador de peroxissoma gama.

32) Sobre as principais síndromes febris ictéricas, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A principal causa de mortalidade na síndrome de Weil é a insuficiência hepática fulminante.
- (B) A fase leptospirêmica da leptospirose é caracterizada pela presença de uveíte e meningite asséptica.
- (C) A febre terça benigna da malária é causada pelo Plasmodium malariae.
- (D) A forma oligossintomática da leishmaniose visceral é caracterizada clinicamente por esplenomegalia de grande monta.
- (E) O melhor exame para diagnóstico de febre tifoide na primeira semana de infecção é a hemocultura.

33) Paciente masculino, 54 anos, com diagnóstico de insuficiência renal crônica, estava em uso de anti-inflamatório não esteroidal há 2 semanas por dor em ombro direito. Apresenta-se edemaciado, hipertenso e referindo oligúria. Qual, dentre as alternativas a seguir, representa indicação de hemodiálise de urgência?

- (A) Acidose metabólica leve.
- (B) Hipercalemia refratária ao tratamento clínico.
- (C) Congestão pulmonar com boa resposta ao diurético.
- (D) Confusão mental associada a processo infeccioso.
- (E) Edema de membros inferiores.

34) Paciente masculino, 46 anos, relata episódios intermitentes de desconforto em hipocôndrio direito, que aconteceram nos últimos meses, evoluindo há 48 horas, com icterícia, colúria, acolia e prurido. Relata que a dor melhorou subitamente nas últimas horas, com desaparecimento de todos os sintomas. Nega febre. Nega uso de medicações, comorbidades prévias ou internações. Nega histórico familiar de doenças do trato digestivo. Ao exame físico geral e abdominal não são evidenciadas anormalidades. Neste momento, a principal hipótese diagnóstica é:

- (A) Síndrome de Gilbert.
- (B) Colecistite aguda.
- (C) Coledocolitíase.
- (D) Síndrome de Mirizzi.
- (E) Tumor periampular.

35) De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, qual é a meta pressórica de tratamento para um paciente hipertenso, que também é diabético?

- (A) <120x70mmHg.
- (B) <140x90mmHg.
- (C) <120x80mmHg.
- (D) <130x80mmHg.
- (E) <130x70mmHg.

36) A marcha ceifante geralmente está relacionada com:

- (A) Acidente vascular cerebral prévio.
- (B) Lesão cerebelar.
- (C) Doença de Parkinson.
- (D) Lesão por tabes dorsales.
- (E) Lesão por tumor cerebral.

37) Sobre as complicações crônicas do diabetes, é INCORRETO afirmar:

- (A) Pacientes com diabetes tipo II desenvolvem retinopatia proliferativa na mesma frequência que aqueles com diabetes tipo I.
- (B) Na fase II da nefropatia diabética, a excreção de albumina permanece normal.
- (C) O tipo mais frequente de neuropatia diabética é uma polineuropatia sensitivomotora simétrica distal.
- (D) A maioria das amputações não traumáticas de MMII ocorrem em pacientes diabéticos.
- (E) A doença macrovascular é a principal causa de morte em pacientes diabéticos.

38) De acordo com o 4º Consenso Brasileiro para manejo da infecção pelo H. pylori, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A sorologia é o melhor método não-invasivo para o controle de cura.
- (B) O controle de cura deve ser realizado após 2 semanas do término do tratamento de 14 dias.
- (C) O antígeno fecal é o exame de escolha invasivo para o diagnóstico da primoinfecção.
- (D) O H. pylori é uma bactéria gram positiva que além de aumentar o risco de câncer gástrico, tem associação positiva com outras doenças como púrpura trombocitopênica imune e deficiência de vitamina B12.
- (E) Em casos de úlcera gástrica pelo H. pylori, após o tratamento de 14 dias, é necessário manter o inibidor de bomba de prótons por tempo adicional de 4 a 8 semanas.

39) A vacinação é uma importante ferramenta no combate à doenças infecciosas, porém alguns cuidados são necessários na sua utilização. Os pacientes que serão submetidos a imunossupressão devem ter seu esquema atualizado, especialmente pois algumas vacinas são contra-indicadas (pelo risco de desenvolvimento da doença vacinal) ou por diminuição de sua eficácia vacinal. Assinale a alternativa abaixo que contempla uma vacina contra-indicada em pacientes com imunossupressão medicamentosa grave:

- (A) Hepatite B.
- (B) HPV.
- (C) Febre amarela.
- (D) Meningocócica conjugada ACWY.
- (E) Pneumo 20.

40) Paciente do sexo masculino, 57 anos, com história de hipertensão, diabetes e tabagismo comparece à emergência com quadro de dispnéia progressiva, ortopnéia e dispnéia paroxística noturna. Ao exame, está afebril, FC: 124bpm, FR: 30rpm, afebril, turgência jugular com pressão venosa central estimada em pelo menos 16cm de água, ictus com aproximadamente 3 polpas digitais, hipercinético e desviado para o 6º espaço intercostal, linha axilar anterior esquerda. Ausculta cardíaca com ritmo de galope em 3 tempos; ausculta respiratória com estertores inspiratórios nos dois terços inferiores dos campos pulmonares. Quais dos achados radiográficos abaixo seriam mais comumente esperados no paciente descrito acima?

- (A) Linhas B de Kerley.
- (B) Faveolamento.
- (C) Alargamento do mediastino.
- (D) Consolidação com broncograma aéreo.
- (E) Linfonomegalia.

41) Está CORRETO afirmar sobre a Lei nº 8080/90, de regulamentação do SUS:

- (A) É um dos objetivos do SUS a execução de ações de vigilância sanitária.
- (B) A direção do SUS é exercida no âmbito dos municípios pelo Ministério da Saúde.
- (C) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
- (D) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em todas as instâncias.
- (E) A internação domiciliar não está prevista no âmbito do SUS.

42) Em pacientes com infarto agudo do miocárdio de parede inferior, as derivações que orientam a pesquisa de infarto de ventrículo direito concomitante são:

- (A) aVR.
- (B) V3R e V4R.
- (C) D2 e D3.
- (D) V5 e V6.
- (E) aVF.

43) Uma paciente do sexo feminino de 28 anos, estudante de contabilidade, foi procurada pela unidade básica de saúde devido ter tido contato prolongado com paciente portadora de tuberculose pulmonar bacilífera. Está assintomática, com radiografia de tórax normal e sem comorbidades. Na triagem, foi realizado PPD, com resultado de 2 mm. O serviço dispõe de teste IGRA e TRM-TB (teste rápido molecular para tuberculose). Com base nas recomendações atuais, qual deve ser a conduta diagnóstica mais adequada neste momento?

- (A) Solicitar TRM-TB no escarro da paciente para descartar tuberculose latente.
- (B) Considerar o PPD negativo como definitivo e liberar a paciente sem necessidade de novos exames.
- (C) Repetir o PPD em 72 horas para verificar reação booster.
- (D) Repetir PPD ou realizar IGRA após 8 a 12 semanas da exposição.
- (E) Iniciar tratamento empírico para tuberculose latente apenas pelo risco ocupacional.

44) Paciente de 40 anos apresenta Na⁺ sérico de 118 mEq/L, sem sintomas graves, com osmolaridade plasmática baixa e osmolaridade urinária elevada. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Hipernatremia hipovolêmica.
- (B) Hiponatremia por SIADH.
- (C) Pseudohiponatremia por hiperglicemia.
- (D) Hiponatremia hipervolêmica por insuficiência cardíaca.
- (E) Hipernatremia euvolêmica.

45) Paciente do sexo feminino de 32 anos procura a unidade básica de saúde com queixa de corrimento vaginal esbranquiçado, sem odor, associado a prurido intenso e dispareunia leve. Refere que os sintomas surgem frequentemente após o uso de antibióticos. Exame especular: mucosa vaginal hiperemiada, com placas brancas aderidas. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial indicada?

- (A) Candidíase vulvovaginal – tratar com antifúngico tópico ou oral.
- (B) Vaginose bacteriana – tratar com metronidazol oral.
- (C) Tricomoníase – tratar casal com metronidazol oral.
- (D) Vaginite inespecífica – observação e higiene local.
- (E) Herpes genital – iniciar antiviral oral.

46) O exame utilizado como rastreio de artrite reumatóide devido sua alta sensibilidade e baixa especificidade é o (a):

- (A) Fator antinuclear.
- (B) Proteína C reativa.
- (C) Velocidade de hemossedimentação.
- (D) Fator reumatóide.
- (E) Anti-CCP.

47) Acerca das leucemias, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A leucemia mais comum em adultos é a leucemia linfóide crônica.
- (B) O achado de bastonetes de Auer é patognomônico da leucemia mielóide crônica.
- (C) O exame considerado padrão-ouro para tipagem das leucemias é o cariótipo.
- (D) As leucemias secundárias possuem melhor prognóstico que as leucemias primárias.
- (E) A presença do cromossomo Philadelphia na leucemia linfóide aguda tem implicação prognóstica.

48) O escore de Hestia é um escore utilizado que orienta os pacientes com tromboembolismo pulmonar, quanto a necessidade de internação. Não faz parte dos critérios deste escore:

- (A) Gravidez.
- (B) Necessidade de suplementação de oxigênio.
- (C) Suporte social inadequado.
- (D) Indicação de analgesia endovenosa.
- (E) TEP diagnosticado em paciente em uso de AAS.

49) Paciente do sexo feminino, 62 anos, obesa, com dor crônica em mãos e joelhos, realiza radiografia de coluna que demonstra achado de osteófitos. Considerando este contexto clínico, o significado e a etiologia do achado, são mais condizentes com:

- (A) Imagens radiolucidas arredondadas na região subcondral. Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Colapso do osso subcondral. Espondilite anquilosante.
- (C) Proeminências ósseas nas bordas da articulação. Osteoartrite.
- (D) Redução do espaço articular. Esclerose sistêmica.
- (E) Depósito de cristais de urato. Gota.

50) Qual assertiva abaixo faz parte dos critérios de ROMA IV para o diagnóstico de síndrome do intestino irritável ou faz parte do manejo da doença?

- (A) Sintomas pelo menos 1 vez no mês.
- (B) Alteração do aspecto das fezes.
- (C) Sintomas iniciados nos últimos 2 meses.
- (D) Uso de loperamida para o padrão de constipação.
- (E) Uso de lactulose para o padrão diarréico.