

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA E UNIPROFISSIONAL EM FÍSICA MÉDICA DO ARAÚJO JORGE – HOSPITAL DE CÂNCER

PROCESSO SELETIVO

ODONTOLOGIA TIPO A

CADERNO DE QUESTÕES 08/02/2026

CONTEÚDO DE ABRANGÊNCIA	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 10
Conhecimentos Específicos da Área Profissional	11 a 40

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Siga a sua própria luz.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. O(A) candidato(a) deverá marcar o alvéolo correspondente ao tipo de prova ("A" ou "B") no Cartão-Resposta certificando-se que a opção confere com o caderno de questões recebido. Em caso de dupla marcação ou não marcação, será atribuída nota zero à prova. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

QUESTÃO 01

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a organização da atenção oncológica tem como finalidade garantir o cuidado integral às pessoas com câncer. Nesse contexto, constitui um de seus objetivos centrais

- (A) assegurar acesso universal e integral às ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos em oncologia.
- (B) centralizar o atendimento oncológico exclusivamente em serviços hospitalares de alta complexidade.
- (C) priorizar o atendimento oncológico apenas aos usuários com diagnóstico confirmado em estágios avançados da doença.
- (D) restringir o acesso aos serviços especializados de oncologia com base em critérios exclusivamente econômicos.

QUESTÃO 02

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece diretrizes e objetivos voltados à organização do cuidado integral às pessoas com câncer, considerando a relevância epidemiológica e social da doença. Qual objetivo dessa política está diretamente relacionado à melhoria dos desfechos em saúde e à redução dos impactos do câncer na população?

- (A) Priorizar intervenções curativas em detrimento das ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e cuidados paliativos, com foco exclusivo no tratamento da doença.
- (B) Centralizar a organização do cuidado oncológico nos serviços especializados de alta complexidade do SUS, limitando a atuação da Atenção Primária à Saúde e da rede de cuidados.
- (C) Restringir as ações de prevenção e controle do câncer às iniciativas do setor saúde, desconsiderando a atuação intersetorial e a participação de outros setores envolvidos.
- (D) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e reduzir a mortalidade e a incapacidade relacionadas ao câncer, por meio de ações integradas de promoção, prevenção, cuidado e reabilitação.

QUESTÃO 03

As políticas e os programas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a organização das ações e serviços em todo o território nacional, definindo diretrizes para a promoção da saúde, a atenção básica, a participação social e o financiamento do cuidado. Esses instrumentos são fundamentais para fortalecer o acesso, a qualidade e a equidade no sistema público de saúde brasileiro. Nesse contexto, o Programa Previne Brasil representa uma mudança relevante na organização e no financiamento da Atenção Primária à Saúde, pois

- (A) substitui integralmente a Política Nacional de Promoção da Saúde, priorizando ações curativas e individuais.
- (B) elimina os princípios da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, centralizando a tomada de decisões no nível federal.
- (C) redefine os critérios de financiamento da Atenção Básica, incorporando indicadores de desempenho, cadastro da população e incentivos às ações estratégicas.
- (D) estabelece a Atenção Básica como um serviço complementar ao setor privado, restringindo o acesso universal.

QUESTÃO 04

Leia o texto a seguir.

Na análise da situação de saúde, determinados indicadores expressam a frequência de eventos relacionados à ocorrência de doenças e óbitos em uma população, enquanto outros descrevem a estrutura populacional e suas transformações ao longo do tempo, como envelhecimento, fecundidade e distribuição etária. A interpretação conjunta desses indicadores é fundamental para compreender os padrões de adoecimento e morte e para orientar o planejamento das ações em saúde.

Disponível em: <https://dmapk.com.br/wp-content/uploads/2025/02/R.-Bonita-et-al-Epidemiologia-Basica.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2026.

O trecho acima refere-se, respectivamente, aos indicadores de

- (A) vigilância epidemiológica e cobertura dos serviços de saúde, voltados ao monitoramento de agravos e à oferta assistencial.
- (B) incidência acumulada e transição epidemiológica, relacionadas à ocorrência de novos casos e às mudanças no perfil de doenças ao longo do tempo.
- (C) prevalência pontual e estrutura socioeconômica, associadas à distribuição de casos existentes e às condições sociais.
- (D) morbimortalidade e demográficos, que expressam a frequência de doenças e óbitos e a composição populacional.

QUESTÃO 05

Leia o caso a seguir.

Um estudo epidemiológico investigou a associação entre o hábito de fumar e um determinado tipo de câncer. Entre 20 casos da doença identificados, 16 indivíduos apresentavam histórico de tabagismo. O grupo controle foi composto por 160 indivíduos, dos quais 25% tinham histórico de tabagismo. A tabela a seguir resume os dados do estudo.

Exposição	Doença		total
	sim	não	
Tabagismo +	16	40	56
Tabagismo -	4	120	124
Total	20	160	

Com base nos dados apresentados, qual o *odds ratio* (OR) que expressa a associação entre tabagismo e a ocorrência desse tipo de câncer?

- (A) 10 vezes maior.
- (B) 12 vezes maior.
- (C) 14 vezes maior.
- (D) 16 vezes maior.

QUESTÃO 06

Leia o texto a seguir.

Trata-se de uma norma legal que assegura à pessoa com suspeita ou diagnóstico de neoplasia maligna o direito ao início do primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde em prazo determinado, contado a partir da confirmação diagnóstica, com o objetivo de reduzir atrasos assistenciais e melhorar o prognóstico.

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acessado em: 14 jan. 2026.

O trecho acima refere-se à

- (A) Lei nº 8.080/1990.
- (B) Lei nº 8.142/1990.
- (C) Lei nº 12.732/2012.
- (D) Lei nº 12.401/2011.

QUESTÃO 07

A Saúde Baseada em Evidências (SBE) pressupõe a avaliação crítica dos estudos científicos, considerando aspectos como validade interna, risco de vieses, precisão das estimativas e aplicabilidade dos resultados ao contexto assistencial. A escolha do delineamento metodológico adequado depende da pergunta de pesquisa formulada, especialmente quando se busca avaliar intervenções em saúde. Diante de uma pergunta de pesquisa voltada à avaliação do efeito causal de uma intervenção, qual delineamento metodológico é mais apropriado, quando eticamente e operacionalmente viável?

- (A) Estudo transversal analítico.
- (B) Estudo de coorte observacional.
- (C) Ensaio clínico randomizado.
- (D) Ensaio comunitário não randomizado.

QUESTÃO 08

A escolha adequada do delineamento epidemiológico é essencial para garantir validade aos resultados e coerência com o objetivo do estudo. Em pesquisas que buscam avaliar a relação entre exposição e desfecho ao longo do tempo, alguns delineamentos são mais apropriados do que outros. Qual delineamento epidemiológico é mais indicado quando se pretende acompanhar indivíduos expostos e não expostos para estimar a ocorrência de novos casos de uma doença?

- (A) Estudo de coorte.
- (B) Estudo transversal.
- (C) Estudo ecológico.
- (D) Estudo de caso-controle.

QUESTÃO 09

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a organização da atenção oncológica envolve diferentes instrumentos normativos, como políticas públicas, mecanismos de regulação do acesso e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia (PCDT). Cada um desses instrumentos possui finalidades distintas na estruturação da assistência e na tomada de decisão em saúde. Considerando esse arranjo normativo, os PCDT em Oncologia caracterizam-se principalmente por

- (A) definir diretrizes gerais para a organização da rede de atenção oncológica e estabelecer prioridades estratégicas da política pública de saúde.
- (B) orientar decisões clínicas e terapêuticas com base em evidências científicas, padronizando condutas e promovendo cuidado equânime no SUS.
- (C) regular o acesso dos usuários aos serviços oncológicos especializados por meio de critérios administrativos e fluxos de encaminhamento institucional.
- (D) estabelecer normas relacionadas ao financiamento, à contratualização e à gestão administrativa dos serviços oncológicos no SUS.

QUESTÃO 10

De acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia (PCDT), elaborado para orientar a atenção oncológica no âmbito do Sistema Único de Saúde, constitui um de seus objetivos centrais

- (A) padronizar o diagnóstico e o tratamento das neoplasias com base em evidências científicas.
- (B) orientar a prescrição de medicamentos de alto custo pelos profissionais de saúde, conforme critérios técnicos.
- (C) orientar a prática clínica do profissional substituir na tomada de decisão terapêutica.
- (D) definir critérios administrativos relacionados ao financiamento da atenção oncológica.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 11

Entre os sinais e sintomas associados ao câncer de boca, descritos pelo Instituto Nacional de Câncer, está a disartria. O termo disartria refere-se à

- (A) dificuldade na articulação da fala.
- (B) alteração na qualidade da voz.
- (C) dificuldade respiratória.
- (D) dor ao engolir alimentos sólidos.

QUESTÃO 12

Em pacientes oncológicos, a remoção de glândulas salivares, o uso de medicamentos antieméticos, a radioterapia na região de cabeça e pescoço, bem como a quimioterapia, são fatores que, devido a alteração no fluxo salivar, potencializam as lesões de

- (A) abfração.
- (B) abrasão.
- (C) atrição.
- (D) erosão.

QUESTÃO 13

Considere uma lesão caracterizada por uma parede cística fibrosa, revestida total ou parcialmente por epitélio, que exhibe uma camada basal de células colunares ou cúbicas com núcleos hipercromáticos, com polaridade reversa e vacuolização citoplasmática basilar. Tal lesão é predominantemente encontrada em pacientes jovens, e mais de 90% são localizadas na mandíbula, usualmente na região posterior. Clinicamente é assintomática e, radiograficamente, apresenta-se associada ao deslocamento de um molar inferior à margem inferior da mandíbula. As características descritas são relacionadas ao

- (A) cementoblastoma.
- (B) odontoma composto.
- (C) odontoma complexo.
- (D) ameloblastoma unicístico.

QUESTÃO 14

Uma criança nasce em uma maternidade e apresenta fissura labiopalatina, condição identificada ao exame físico logo após o parto. Essa informação é registrada em documento oficial específico que serve de base para o registro do nascimento em um sistema nacional de informações em saúde. O documento e o sistema responsáveis por esse registro são, respectivamente,

- (A) prontuário hospitalar e SIH.
- (B) certidão de nascimento e SIH.
- (C) declaração de nascido vivo e SINASC.
- (D) ficha de notificação compulsória e SINAN.

QUESTÃO 15

O flúor é amplamente utilizado na prática odontológica por seu efeito preventivo contra a cárie dentária. No entanto, a ingestão aguda em doses elevadas pode provocar toxicidade. Em toxicologia do flúor, a dose provavelmente tóxica considerada como referência para avaliação clínica corresponde a quantos miligramas por quilo de peso corporal?

- (A) 0,5.
- (B) 1,2.
- (C) 5,0.
- (D) 7,5.

QUESTÃO 16

Praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação é uma competência do cirurgião-dentista definida

- (A) pela Lei n. 5.081/1966.
- (B) pela Lei n. 4.324/1964.
- (C) pela Resolução CFO n.262/2024.
- (D) pelo Código de Ética Odontológica.

QUESTÃO 17

Um paciente em tratamento oncológico, em razão de diagnóstico de câncer de boca, recebeu recomendação médica para a realização de quimioterapia profilática. Considerando as finalidades dos diferentes tipos de quimioterapia, esse tratamento tem como objetivo

- (A) aliviar sinais e sintomas em doença avançada, sem impacto necessário na sobrevida do paciente.
- (B) eliminar possíveis células neoplásicas residuais não detectáveis e reduzir o risco de recidiva da doença.
- (C) reduzir o volume tumoral com a finalidade de tornar a lesão passível de ressecção cirúrgica.
- (D) controlar temporariamente a progressão da neoplasia, proporcionando aumento da sobrevida sem possibilidade de cura.

QUESTÃO 18

Um cirurgião dentista foi solicitado a avaliar as condições de saúde bucal de um paciente que está realizando radioterapia anti-hemorrágica. Essa modalidade se caracteriza como radioterapia

- (A) pré-operatória.
- (B) profilática.
- (C) paliativa.
- (D) curativa.

QUESTÃO 19

O padrão histológico caracteriza-se pela presença de ilhas ou folículos de epitélio odontogênico imersos em um estroma de tecido conjuntivo fibroso. As células periféricas dessas ilhas são colunares, semelhantes aos ameloblastos, com periferia em paliçada e polaridade nuclear reversa, enquanto as células centrais se assemelham ao retículo estrelado do órgão do esmalte. Nesse caso, as referidas características histopatológicas correspondem ao padrão

- (A) plexiforme.
- (B) folicular.
- (C) de células basais.
- (D) de células granulares.

QUESTÃO 20

Em anestésicos locais utilizados na prática odontológica, alguns conservantes adicionados às soluções podem desencadear reações adversas em determinados grupos de pacientes. O conservante associado a possíveis complicações em pacientes asmáticos é

- (A) metilparabeno.
- (B) propilparabeno.
- (C) cloreto de sódio.
- (D) bissulfito de sódio.

QUESTÃO 21

Durante o atendimento odontológico de uma gestante, o cirurgião dentista deve considerar as particularidades farmacológicas dos anestésicos locais e seus possíveis efeitos materno fetais. Nesse contexto, a anestesia local requer escolha criteriosa do fármaco. Considerando as contraindicações na gestação, o anestésico local e o motivo de sua contraindicação são, respectivamente,

- (A) prilocaína e risco de metemoglobinemia.
- (B) lidocaína e risco de toxicidade sistêmica materna.
- (C) articaína e aumento da permeabilidade placentária.
- (D) mepivacaína e potencial efeito vasoconstritor placentário.

QUESTÃO 22

No contexto do atendimento odontológico, diferentes fármacos com ação anti-inflamatória podem ser utilizados. Entre os medicamentos a seguir, aquele classificado como anti-inflamatório esteroidal, pertencente ao grupo dos corticosteroides, é

- (A) celecoxibe.
- (B) naproxeno.
- (C) meloxicam.
- (D) dexametasona.

QUESTÃO 23

Leia o caso a seguir.

Paciente em tratamento oncológico, queixa-se ao médico assistente sobre estar sentindo dor e queimação em sua boca, sendo solicitada a avaliação de cirurgião-dentista. Na avaliação clínica observaram-se lesões esbranquiçadas removíveis à raspagem, associadas à sensação de ardor na mucosa oral, compatíveis com candidíase oral.

Para o adequado atendimento odontológico deste paciente, qual deve ser a prescrição inicial realizada pelo cirurgião-dentista?

- (A) Aciclovir.
- (B) Nistatina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Metronidazol.

QUESTÃO 24

Durante o estadiamento de um paciente diagnosticado com câncer de boca, a avaliação clínica e os exames de imagem demonstram comprometimento de três linfonodos cervicais regionais e ausência de metástase à distância. De acordo com o sistema TNM utilizado na classificação do câncer de boca, a classificação correta para linfonodos e metástase é

- (A) N0 e M1.
- (B) N1 e M1.
- (C) N1 e M2.
- (D) N2 e M0.

QUESTÃO 25

Entre as neoplasias malignas que acometem a cavidade bucal, diferentes tipos histológicos podem ser identificados. Em relação à frequência de ocorrência desses tumores, o tipo mais prevalente de câncer de boca é o

- (A) carcinoma epidermoide.
- (B) melanoma de mucosa.
- (C) sarcoma de origem óssea.
- (D) tumor maligno de glândulas salivares.

QUESTÃO 26

Um paciente apresenta infecção odontogênica associada a dor, edema e presença de exsudato purulento, com suspeita de envolvimento de bactérias anaeróbias estritas Gram negativas, frequentemente encontradas em infecções orais profundas. Considerando esse perfil microbiológico, o antibiótico adequado para o tratamento é

- (A) metronidazol.
- (B) azitromicina.
- (C) amoxicilina.
- (D) cefalexina.

QUESTÃO 27

No exame clínico odontológico, é possível identificar manifestações bucais associadas a doenças sistêmicas, que podem auxiliar no diagnóstico ou no acompanhamento do paciente. Considerando essa relação, quais das condições a seguir correspondem, respectivamente, a uma manifestação bucal e à doença sistêmica a ela associada?

- (A) Candidíase oral e infecção pelo HIV.
- (B) Cárie dentária e hipertensão arterial.
- (C) Afta traumática e anemia ferropriva.
- (D) Gengivite descamativa e diabetes mellitus.

QUESTÃO 28

Durante o exame clínico odontológico de uma criança, observam-se incisivos centrais superiores com formato em fenda e molares permanentes com aspecto globoso e irregular, conhecidos como molares em amora. Essas alterações dentárias são manifestações orais clássicas de uma doença sistêmica adquirida por transmissão vertical. A doença e o agente etiológico responsáveis por essas manifestações são, respectivamente,

- (A) rubéola congênita e vírus da rubéola.
- (B) sífilis congênita e *Treponema pallidum*.
- (C) toxoplasmose congênita e *Toxoplasma gondii*.
- (D) citomegalovirose congênita e citomegalovírus.

QUESTÃO 29

Leia o caso a seguir.

Paciente diagnosticado com câncer de boca, cuja avaliação clínica e exames de imagem demonstram tumor primário classificado como T4, associado a comprometimento linfonodal regional compatível com N2, sem evidências de metástase à distância.

Considerando os critérios de estadiamento do câncer de boca, esse paciente encontra-se no estágio

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

Durante o atendimento odontológico de um paciente internado em ambiente hospitalar, em tratamento quimioterápico em razão de câncer de boca, o cirurgião dentista indica o uso de cloreto de cetilpiridíneo.

Nesse contexto, a finalidade desse agente é

- (A) promover analgesia tópica em mucosas inflamadas.
- (B) estimular a cicatrização tecidual em feridas cirúrgicas orais.
- (C) atuar como antifúngico sistêmico em pacientes imunossuprimidos.
- (D) realizar antisepsia da cavidade oral, reduzindo a carga microbiana.

QUESTÃO 31

Leia o caso a seguir.

Durante o atendimento odontológico de um paciente internado em ambiente hospitalar, em tratamento oncológico para câncer de boca, o cirurgião-dentista utiliza a terapia de fotobiomodulação com laser de baixa potência como recurso adjuvante no manejo da mucosite oral.

Nesse contexto, o principal mecanismo de ação desse tipo de laser é

- (A) estímulo mitocondrial com aumento da produção de ATP celular.
- (B) aumento da temperatura tecidual com efeito cauterizante local.
- (C) destruição direta de microrganismos por efeito fototérmico.
- (D) indução de necrose celular seletiva em tecidos inflamados.

QUESTÃO 32

Durante o atendimento odontológico de um paciente adulto procedente de área rural, observa-se lesão ulcerada extensa em mucosa oral, de bordas irregulares, aspecto granulomatoso, base infiltrada e superfície com múltiplos pontos hemorrágicos, conferindo aparência moriforme. O paciente relata perda de peso e sintomas respiratórios associados. O exame histopatológico da lesão revela processo inflamatório granulomatoso crônico, com presença de estruturas fúngicas com brotamentos múltiplos, descritas classicamente como em "roda de leme". Considerando os achados clínicos e histopatológicos, o diagnóstico compatível é

- (A) histoplasmose.
- (B) paracoccidioidomicose.
- (C) carcinoma espinocelular.
- (D) leishmaniose mucocutânea.

QUESTÃO 33

Durante a avaliação clínica de um recém-nascido, observam-se micrognatia acentuada, glossoptose e dificuldade respiratória associada, além da presença de fissura palatina. Essas alterações craniofaciais interferem no posicionamento da língua, na respiração e na alimentação do paciente, podendo também repercutir no desenvolvimento dentário e oclusal ao longo do crescimento. O diagnóstico compatível com esse conjunto de características é a síndrome de

- (A) Apert.
- (B) Pierre Robin.
- (C) Van der Woude.
- (D) Treacher Collins.

QUESTÃO 34

Segundo o protocolo da *International Association of Dental Traumatology (IADT)*, alguns tipos de traumatismo dentoalveolar apresentam indicação específica para o uso de contenção rígida. De acordo com essas diretrizes, em quais situações esta contenção está indicada?

- (A) Concussão e subluxação.
- (B) Avulsão dentária e concussão.
- (C) Fratura radicular e fratura alveolar.
- (D) Luxação extrusiva e luxação lateral.

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Durante o atendimento odontológico de um paciente oncológico internado, em tratamento quimioterápico e com risco aumentado para infecções oportunistas na cavidade oral, o cirurgião-dentista indica a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana como recurso adjuvante no controle da carga microbiana, especialmente em áreas de mucosite e lesões infecciosas superficiais. Essa terapia utiliza um fotossensibilizador que, após ativação por luz em um comprimento de onda específico, promove a inativação de microrganismos.

Um exemplo de fotossensibilizador indicado nessa terapia é

- (A) clorexidina.
- (B) iodopovidona.
- (C) azul de metileno.
- (D) peróxido de hidrogênio.

QUESTÃO 36

Durante a avaliação odontológica de um paciente hospitalizado em tratamento oncológico, o cirurgião-dentista observa no prontuário médico a presença de trombocitopenia. Esse achado significa e pode estar associado, respectivamente, a

- (A) diminuição do número de leucócitos no sangue e linfoma de Hodgkin, por infiltração exclusiva de linfonodos.
- (B) redução da concentração de hemoglobina circulante e câncer de boca, por sangramento tumoral crônico.
- (C) deficiência de fatores plasmáticos de coagulação e câncer de fígado, por redução da síntese hepática.
- (D) redução do número de plaquetas circulantes e leucemia, por comprometimento da medula óssea.

QUESTÃO 37

Durante o atendimento odontológico de um paciente hospitalizado em tratamento oncológico, em uso contínuo de metotrexato, o cirurgião dentista deve estar atento às manifestações orais associadas a esse fármaco. A alteração oral mais frequentemente relacionada ao uso do metotrexato é

- (A) osteonecrose dos maxilares.
- (B) pigmentação melânica.
- (C) hiperplasia gengival.
- (D) mucosite oral.

QUESTÃO 38

Na área da saúde, houve atualização da terminologia utilizada para designar a chamada infecção hospitalar, de modo a ampliar o conceito e adequá-lo aos diferentes níveis de atenção e cuidado. Atualmente, a nomenclatura adotada para essa condição é

- (A) infecção nosocomial.
- (B) infecção hospitalar clássica.
- (C) infecção relacionada à assistência à saúde.
- (D) infecção adquirida em ambiente hospitalar.

QUESTÃO 39

Um paciente hospitalizado apresenta indicação de cirurgia oral a ser realizada pelo cirurgião dentista, com necessidade de uso de bisturi elétrico. Durante a avaliação pré-operatória, deve se identificar uma condição clínica específica que, associada ao uso desse equipamento, pode representar risco imediato e potencialmente fatal ao paciente. A condição e a justificativa corretas são, respectivamente,

- (A) presença de prótese valvar cardíaca mecânica e risco de endocardite infecciosa.
- (B) uso de anticoagulantes orais diretos e risco aumentado de sangramento intraoperatório.
- (C) diagnóstico de anemia moderada e redução da capacidade de transporte de oxigênio durante o procedimento.
- (D) presença de marcapasso cardíaco implantável e possibilidade de interferência eletromagnética com arritmias graves.

QUESTÃO 40

No contexto da odontologia hospitalar, o cirurgião dentista deve reconhecer instrumentos utilizados para identificação de disfunção orgânica em pacientes com infecção. A escala SOFA (*Sequential Organ Failure Assessment*) é empregada para avaliar a gravidade da sepse por meio da análise de diferentes sistemas fisiológicos. Entre os critérios utilizados por essa escala, encontra-se

- (A) nível sérico de glicose.
- (B) contagem de plaquetas.
- (C) frequência cardíaca.
- (D) temperatura corporal.

RASCUNHO**RASCUNHO**