



T0574042N

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

# MÉDICO

## OTORRINOLARINGOLOGIA

NOME \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

### Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

### Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

### Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto NÃO poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

### Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto AOCB, no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aocp**



## Língua Portuguesa

### Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

**3**

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- ( ) No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- ( ) Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) F – F – V.  
(E) F – V – V.

**4**

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.  
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.  
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.  
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.  
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

**5**

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

## Raciocínio Lógico

6

Se  $x$  e  $y$  são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de  $\frac{x+8y}{x-y}$  é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

## Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

## Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

**13**

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

**14**

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

**15**

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

## Conhecimentos Específicos

16

**Assinale a alternativa que melhor contempla a delimitação anatômica da válvula nasal interna.**

- (A) Lóbulo alar, crus medial da cartilagem lateral inferior, septo caudal e borda nasal.
- (B) Lóbulo alar, crus medial da cartilagem lateral superior, septo caudal e borda nasal.
- (C) Margem caudal da cartilagem lateral superior, cabeça da concha nasal inferior e septo nasal.
- (D) Margem caudal da cartilagem lateral superior, crus medial da cartilagem lateral inferior e septo nasal.
- (E) Margem caudal da cartilagem lateral inferior, cabeça da concha nasal média e septo nasal.

17

**Assinale a alternativa correta a respeito da função do reflexo cêrvico-ocular.**

- (A) Estabilizar o olhar mantendo na fóvea a imagem de um objeto que se desloca contra um cenário estacionário.
- (B) Corrigir alguns movimentos de rotação da cabeça em baixa frequência.
- (C) Estabilizar a cabeça espacialmente, com ação na musculatura cervical.
- (D) Estabilizar na retina imagens de um campo visual móvel.
- (E) Estabilizar o campo visual durante os movimentos cefálicos.

18

**O teste de diapasão que melhor contempla resultado de uma perda auditiva do tipo condutiva à direita e audição normal contralateral é o**

- (A) Teste de Weber lateralizado para a direita.
- (B) Teste de Weber lateralizado para a esquerda.
- (C) Teste de Rinne negativo para a esquerda.
- (D) Teste de Rinne positivo para a direita.
- (E) Teste de Rinne e Weber positivo bilateral.

19

**Qual das seguintes alternativas apresenta o melhor exame de imagem para monitorar a evolução na terapêutica de pacientes com otite externa necrotizante?**

- (A) Tomografia computadorizada do osso temporal com contraste.
- (B) Tomografia computadorizada do osso temporal sem contraste.
- (C) Ressonância magnética de Orelhas Internas.
- (D) Cintilografia óssea com Tecnécio-99.
- (E) Cintilografia óssea com Gálio-67.

20

**Qual dos seguintes sinais tomográficos é característico do nasoangiofibroma juvenil?**

- (A) Sinal do degrau.
- (B) Massa que vai do seio maxilar até a coana.
- (C) Lesão em “bolha de sabão” ou “favo de mel”.
- (D) Sinal de Holman-Miller.
- (E) Sinal do bico.

21

**A localização da bola fúngica mais associada a complicações infecciosas cerebrais e/ou orbitais é**

- (A) frontal.
- (B) etmoidal.
- (C) esfenoidal.
- (D) maxilar.
- (E) septal.

22

**Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de distúrbios respiratórios do sono em crianças.**

- (A) Estreitamento velofaríngeo.
- (B) Hipertrofia de Base de Língua.
- (C) Obesidade.
- (D) Hiperplasia adenotonsilar.
- (E) Classificação de Friedmann III.

**23**

Paciente de 50 anos, sem comorbidades (incluindo obesidade), com exame físico normal, após avaliação, recebeu diagnóstico de ronco primário. Nesse cenário, qual é a melhor opção de tratamento?

- (A) CPAP.
- (B) Aparelho Intraoral.
- (C) Uvulopalatofaringoplastia.
- (D) Perda Ponderal.
- (E) Avanço Maxilomandibular.

**24**

Qual das seguintes alternativas contraindica o uso de eletroestimulação do nervo hipoglosso?

- (A) Mais de 10% de apneia do sono central.
- (B) Idade  $\geq$  18 anos.
- (C) Índice de Massa Corpórea  $\leq$  37.
- (D) Classificação de Mallampati modificado tipo II.
- (E) Índice de Apneia-Hipopneia de 25.

**25**

Qual é a principal causa de estridor laríngeo em recém-nascidos e lactentes?

- (A) Laringomalácia.
- (B) Paralisia de pregas vocais.
- (C) Estenose subglótica.
- (D) Hemangioma laríngeo.
- (E) Atresia laríngea.

**26**

No final do mês de setembro, chega ao pronto-socorro uma criança de 5 anos com quadro de febre alta, irritabilidade, choro rouco e dispneia. Não tomou nenhuma das vacinas previstas. Houve piora do quadro clínico, com piora da dispneia, quando o paciente passou a adotar uma postura de hiperextensão da cabeça com a boca aberta e queixo elevado. Foi realizada radiografia cervical em perfil, que encontrou o sinal do polegar. A suspeita diagnóstica para esse caso é

- (A) Laringotraqueobronquite viral.
- (B) Epiglotite.
- (C) Laringite estridulosa.
- (D) Falso crupe.
- (E) Laringite catarral.

**27**

Qual é a causa mais frequente de paralisia laríngea pseudobulbar?

- (A) Degeneração supranuclear progressiva.
- (B) Acidente vascular encefálico na cápsula interna.
- (C) Malformação de Arnold Chiari.
- (D) Síndrome de Wallenberg.
- (E) Siringobulbia.

**28**

Criança de 7 anos de idade apresenta quadro de desatenção e dificuldade de desenvolvimento escolar, associadas às queixas de ouvir ruídos contínuos em ouvidos e de tonturas esporádicas. No exame otorrinolaringológico, o teste de Rinne indicou perda auditiva neurosensorial bilateralmente. Otoscopia normal. A audiometria evidenciou disacusia neurosensorial bilateral moderadamente severa. Fez exame de imagem, que diagnosticou malformação de Mondini. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor descreve essa doença.

- (A) A malformação na porção apical da cóclea, associada a vestíbulo e aqueduto vestibular dilatados.
- (B) Ausência de modíolo e septo interescalar.
- (C) A cóclea menor, com defeito no modíolo e no septo interescalar, podendo haver gusher e ampla comunicação com o conduto auditivo interno.
- (D) Completa ausência de cóclea, mas com vestíbulo e canais semicirculares anatômicos.
- (E) Cápsula ótica incompleta de formato redondo ou oval e sem a presença do conduto auditivo interno.

**29**

Paciente do sexo masculino apresenta queixa de lesões ulceradas em gengivas, com fundo granuloso e pontilhado hemorrágico. Foi realizado estudo microscópico da lesão e encontrado o agente com aspecto etiológico em roda de leme.

A hipótese diagnóstica mais provável desse caso é

- (A) sífilis.
- (B) tuberculose.
- (C) leishmanioses.
- (D) paracoccidioidomicose.
- (E) gengivite ulceronecrosante aguda (GUNA).

**30**

**Paciente de 40 anos está com queixa de tontura ao girar a cabeça para a direita. A única alteração no exame físico foi a manobra de Dix-Hallpike, que evidenciou nistagmo com componente vertical para cima e torcional à direita. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a melhor opção de tratamento.**

- (A) Labirintite; prescrever betaistina.
- (B) Acidente Vascular Encefálico; fazer trombólise.
- (C) Doença de Ménière; prescrever betaistina.
- (D) Vertigem Posicional Benigna de Canal Posterior Direito; realizar Manobra de Epley à esquerda.
- (E) Migrânea Vestibular; prescrever venlafaxina.

**31**

**Sobre o exame para diagnosticar a doença de Ménière definida, assinale a alternativa correta.**

- (A) A eletrococleografia é obrigatória para o diagnóstico.
- (B) A Ressonância Magnética de Orelha Interna é obrigatória para o diagnóstico.
- (C) A audiometria é obrigatória para o diagnóstico.
- (D) A prova calórica é obrigatória para o diagnóstico.
- (E) Não há necessidade de exames complementares para o diagnóstico.

**32**

**A respeito da paroxísmia vestibular, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A estrutura responsável pela compressão é geralmente a artéria cerebelar anteroinferior, sendo menos comum a artéria cerebelar posteroinferior.
- (B) A compressão vascular pulsátil sobre o nervo causa descargas efápticas.
- (C) A sintomatologia clássica é a presença de várias crises diárias, rápidas e breves de tontura, durando de segundos a poucos minutos.
- (D) O uso da oxcarbazepina pode dificultar a realização do diagnóstico da forma definida.
- (E) O contato neurovascular detectado pela ressonância não é necessário para diagnosticar a doença.

**33**

**Quanto às curvas encontradas na timpanometria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O timpanograma tipo As é aquele em que há um aumento da complacência máxima, que acontece à pressão atmosférica.
- (B) O timpanograma tipo Ad tem complacência máxima com valor elevado, muitas vezes com curva aberta, mas que acontece à pressão atmosférica.
- (C) O timpanograma tipo B tem curva com pico diminuído quando se varia a pressão no conduto auditivo externo.
- (D) O timpanograma tipo C tem pico da curva deslocado para o lado direito do gráfico.
- (E) O timpanograma tipo D é caracterizado por uma ponta de pico (padrão I).

**34**

**Em relação aos potenciais auditivos, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico é um exame de média latência.
- (B) O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico frequência-específico gera um gráfico para as frequências testadas, mas não gera limiar eletrofisiológico correspondente para cada frequência.
- (C) O P300 é um potencial cortical evocado de longa latência.
- (D) A avaliação do P300 é uma forma subjetiva de quantificar os distúrbios do Processamento Auditivo Central.
- (E) O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico é um exame subjetivo, que depende da cooperação do paciente.

**35**

**Sobre a presbiacusia, é correto afirmar que**

- (A) a hereditariedade tem papel pouco relevante.
- (B) a audiometria pouco ajuda no topodiagnóstico.
- (C) a produção de ácido gama-aminobutírico no colículo inferior sobe com a idade.
- (D) o uso de aparelhos de amplificação sonora individual é a uma ótima opção de reabilitação.
- (E) os aparelhos de amplificação sonora individual costumam ter alta aceitação inicial.

**36**

Paciente de 85 anos queixa-se de zumbido e hipoacusia; nega outras queixas. Sem anormalidades no exame otorrinolaringológico. Realizou audiometria, que evidenciou perda auditiva descendente, maior em frequências agudas. Com base nesse caso, qual é a causa mais provável do zumbido do paciente?

- (A) Presbiacusia.
- (B) Disfunção temporomandibular.
- (C) Labirintite.
- (D) Otosclerose.
- (E) Otite Média Crônica.

**37**

Sobre o hum venoso, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma causa de zumbido que não é síncrono com o batimento cardíaco.
- (B) A rotação contralateral do pescoço geralmente melhora o sintoma.
- (C) Há piora do sintoma com a rotação ipsilateral do pescoço.
- (D) O estado circulatório hipercinético na gestação não influencia na fisiopatologia.
- (E) Frequentemente, ausculta-se um sopro ruidoso em região supraclavicular.

**38**

A respeito da síndrome tônica do tensor do tímpano, assinale a alternativa correta.

- (A) Há a queixa de zumbido contínuo por movimentos involuntários relativos ao aumento da atividade do músculo tensor do tímpano.
- (B) Esclerose múltipla é uma causa.
- (C) O diagnóstico é de exclusão.
- (D) Benzodiazepínicos são boas opções de tratamento.
- (E) O choque acústico é um diagnóstico que exclui a síndrome tônica do tensor do tímpano.

**39**

Paciente de 35 anos apresenta queixa de paralisia facial súbita há 4 horas; nega outros sintomas. Ao exame físico, evidenciou-se paralisia facial periférica à esquerda em posição de repouso e sem movimentos à esquerda de elevar as sobrancelhas, fechar os olhos, sorrir e fazer um bico com os lábios. Sem outros achados. Exames complementares sem alterações. Diante desse contexto, a hipótese diagnóstica mais provável é

- (A) Paralisia de Bell à esquerda.
- (B) Paralisia de Bell à direita.
- (C) Síndrome de Ramsay Hunt à esquerda.
- (D) Síndrome de Ramsay Hunt à direita.
- (E) Otite externa necrotizante.

**40**

Sobre a Síndrome de Melkersson-Rosenthal, é correto afirmar que

- (A) se caracteriza por paralisia facial periférica de instalação súbita e isolada.
- (B) um dos achados do exame físico é a língua geográfica.
- (C) apresenta edema na hemiface paralisada.
- (D) é mais frequente em idosos.
- (E) afeta mais o gênero masculino.

**41**

Paciente de 50 anos, tabagista desde a adolescência, chega para atendimento com queixa de disфония de longa data. Foi realizado exame de laringoscopia, o qual mostrou uma lesão que compromete ambas as pregas vocais, com mobilidade preservada. Para a suspeita de neoplasia de laringe, em que estadiamento T do sistema TNM esse paciente se enquadra?

- (A) Tis.
- (B) T1a.
- (C) T1b.
- (D) T2.
- (E) T3.

**42**

**Qual das seguintes lesões tem geralmente maior potencial de malignizar em um intervalo de 10 anos?**

- (A) Adenoma pleomórfico de parótida.
- (B) Cistoadenoma linfomatoso papilar de parótida.
- (C) Mioepitelioma de parótida.
- (D) Oncocitoma de glândulas salivares menores.
- (E) Linfangioma de cavidade bucal.

**43**

**Sobre o câncer de laringe, com base na Portaria nº 874/2013, que institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.**

- (A) Pacientes com tumores em estágio Tis não se enquadram nessa política, uma vez que ela pouco fala sobre detecção precoce de câncer.
- (B) Um paciente com disfonia suspeita deve se direcionar automaticamente para um hospital terciário, sem necessidade de avaliação prévia na atenção primária.
- (C) O enfrentamento do tabagismo e do etilismo não faz parte dessa portaria.
- (D) O Sistema Único de Saúde não pode ser ressarcido caso participe da reabilitação vocal de um cliente segurado por um plano de saúde privado.
- (E) Inquéritos populacionais são ferramentas que podem ser usadas nas diretrizes da vigilância, do monitoramento e da avaliação desse tipo de câncer.

**44**

**Acerca dos cuidados paliativos em tumores de cabeça e pescoço, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A sedação paliativa pode ser necessária para o controle do sofrimento intolerável, com evidência da irreversibilidade clínica do agravo à saúde e quando os tratamentos se mostrarem falhos, sem trazerem benefícios à qualidade de vida do paciente.
- (B) O Sistema Único de Saúde é facultado de ofertar cuidados de palição na Atenção Básica.
- (C) As Unidades de Alta Complexidade em Oncologia podem atuar no controle da dor, podendo envolver o uso de opioides.
- (D) Alterações funcionais e neurovasculares da região da cabeça e pescoço podem ocasionar disfagia e dispneia.
- (E) A morfina parenteral no controle da dor pode aumentar o risco de intoxicação na insuficiência renal.

**45**

**Paciente de 25 anos, vítima de trauma de face com fratura nasal, apresenta laceração importante da mucosa nasal, além de perfuração septal em área 2 de Cottle. Nesse contexto, sobre o tratamento desse caso, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os melhores resultados estéticos ocorrem em até 1 ano para a redução das fraturas nasais.
- (B) A fibrose atrapalha a estabilidade das estruturas reduzidas.
- (C) A redução aberta das fraturas é feita em nível ambulatorial, dentro do consultório.
- (D) A rinosseptoplastia aberta deve ser realizada entre 3 a 6 meses de trauma.
- (E) Hemostáticos não devem ser usados.

**46**

**Em relação ao tratamento das fraturas de mandíbula, assinale a alternativa correta.**

- (A) No acesso cirúrgico intraoral, deve-se atentar ao nervo facial.
- (B) Na associação de fraturas que envolvem o terço médio facial, pode ser realizada uma traqueotomia ou uma intubação submentoniana.
- (C) A imobilização maxilomandibular deve ser, sempre que possível, realizada depois da fixação dos segmentos fraturados.
- (D) A fratura do côndilo mandibular que não apresenta perda da dimensão vertical do ramo pode ser tratada com imobilização maxilomandibular ou utilização de aparelho ortodôntico com elásticos.
- (E) Os aparelhos ortodônticos com elásticos são contraindicados na fratura do côndilo mandibular sem perda da dimensão vertical do ramo.

**47**

**Paciente de 50 anos queixa-se de roncos e sonolência diurna. Ao exame físico, apresenta tonsilas palatinas grau 4, classificação de Mallampati modificado I, bem como Índice de Massa Corpórea de 37 kg/m<sup>2</sup>. Fez exame de polissonografia, que mostrou Índice de Apneia-Hipopneia de 20. Nesse contexto, o tratamento mais indicado para o caso é**

- (A) ressecção de base de língua.
- (B) septoplastia.
- (C) amigdalectomia das palatinas.
- (D) uvulopalatofaringoplastia.
- (E) faringoplastia lateral.

**48**

**A respeito da eletroestimulação do nervo hipoglosso no tratamento da Apnéia Obstrutiva do Sono, assinale a alternativa correta.**

- (A) Índice de Massa Corpórea menor ou igual a 37 kg/m<sup>2</sup> contraindica o procedimento.
- (B) Uma das indicações é um Mallampati modificado tipo IV na avaliação clínica.
- (C) O padrão circunferencial de obstrução na velofaringe apresentou melhor resposta à terapia.
- (D) Os pacientes geralmente ficam 24 horas de observação em Unidade de Terapia Intensiva após o procedimento.
- (E) A sonoendoscopia pouco ajuda a avaliar esses pacientes antes do procedimento.

**49**

**A cirurgia endoscópica nasossinusal é uma ferramenta que pode ser bastante útil dentro da otorrinolaringologia. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Uma adequada visualização da axila da concha superior é importante antes de se iniciar o acesso à região do recesso do seio frontal.
- (B) Quando há a necessidade de uma antróstomia ampla, deve-se estendê-la em direção à região da fontanela anterior.
- (C) Recomenda-se ingerir cúrcuma já na primeira semana de pós-operatório.
- (D) No acesso transeptal para o acesso do seio esfenoidal, deve-se fazer a remoção da porção cartilaginosa posterior do septo nasal, da lâmina perpendicular do etmoide, do vómer e do L-strut.
- (E) A abordagem inicialmente medial e inferior da lamela basal da concha média é segura para evitar lesões da lâmina papirácea e base de crânio.

**50**

**Chega para um médico da atenção primária um paciente de 70 anos com queixa de hipoacusia bilateral progressiva. Ele refere grande incômodo para ouvir, dificultando a comunicação com familiares. Durante a avaliação, detectou-se uma perda auditiva do tipo neurosensorial bilateral descendente moderada. Com base na Portaria nº 793/2012 do Ministério da Saúde, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada que a equipe da Unidade Básica de Saúde deve adotar para esse caso.**

- (A) Encaminhar o paciente para atendimento hospitalar para que essa reabilitação seja feita inicialmente em nível terciário.
- (B) Orientar que o paciente procure um serviço privado para comprar um aparelho de amplificação sonora individual.
- (C) Encaminhar o paciente para um Centro Especializado de Reabilitação auditiva, mantendo o seguimento compartilhado com a atenção primária.
- (D) Aguardar a progressão da presbiacusia para o nível profundo, quando o paciente poderá ter acesso ao aparelho de amplificação sonora individual.
- (E) Solicitar novo exame de audiometria.

**51**

**Sobre a biossegurança e a segurança do paciente em procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos otorrinolaringológicos, assinale a alternativa correta.**

- (A) Espéculos nasais reutilizáveis devem passar, no mínimo, por desinfecção de alto nível.
- (B) Eventos adversos no consultório de otorrinolaringologia são isentos de notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- (C) Ainda não há protocolo operacional padrão para videonasoscopia, videolaringoscopia e videonasolarigoscopia nos consultórios e serviços de otorrinolaringologia.
- (D) As óticas rígidas de laringoscopia são dispensadas de desinfecção.
- (E) Os espéculos de ouvido podem ser esterelizados com solução de álcool a 20%.

**52**

**Paciente de 38 anos procura atendimento em unidade de emergência referindo vertigem súbita de grande intensidade. Nega outros sintomas. Ao exame, apresenta otoscopia sem alterações, head impulse test com sacada corretiva ao girar a cabeça para a direita, nistagmo espontâneo à esquerda, teste de Skew sem alterações. Com base nessas informações, assinale a alternativa que melhor apresenta, respectivamente a hipótese diagnóstica e o tratamento indicado nesse caso.**

- (A) AVC de fossa posterior. Tratar com trombólise em conjunto com equipe de neurologia.
- (B) Neurite Vestibular. Tratar em conjunto com a equipe de otorrinolaringologia e fonoaudiologia com exercícios de reabilitação vestibular.
- (C) Síndrome de Ménière. Prescrever betatistina e dar alta.
- (D) Migrânea Vestibular. Prescrever flunarizina e dar alta.
- (E) VPPB. Encaminhar para manobra de Epley com equipe de fonoaudiologia.

**53**

**As amigdalectomias são cirurgias muito comuns na otorrinolaringologia. Sobre o consentimento informado para esse procedimento e os demais aspectos éticos, assinale a alternativa correta.**

- (A) O médico pode deixar de informar sobre os riscos raros do procedimento, desde que explique os mais frequentes.
- (B) Com o termo devidamente assinado, o médico fica isentado de informar ao paciente o seu diagnóstico.
- (C) O paciente ou seu responsável legal tem o direito de decidir se opta ou não por seguir com o tratamento cirúrgico.
- (D) É importante garantir ao paciente por escrito a cura por meio da amigdalectomia
- (E) Um termo bem escrito permite ao médico modificar condutas inicialmente propostas.

**54**

**Um adolescente de 17 anos vai sozinho ao consultório de otorrinolaringologia e revela informações que não deseja que seus pais saibam. Conforme determina o código de ética médica, assinale a alternativa que melhor contempla a conduta que o médico deve adotar.**

- (A) Chamar imediatamente os pais para o consultório, pois o menor de idade ainda não tem direito ao sigilo.
- (B) Contar aos pais as informações que eles pedirem.
- (C) Solicitar a assinatura de um termo de sigilo para manter as informações confidenciais.
- (D) Solicitar ao adolescente pagamento de valor extra pelo sigilo profissional.
- (E) Manter o sigilo, exceto se houver situações de risco iminente à saúde do paciente ou de terceiros.

**55**

**Qual das seguintes alternativas apresenta a melhor opção para fortalecer a cultura de segurança e responsabilidade do profissional de saúde?**

- (A) Advertir sobre a culpa individual de cada profissional e criar punições exemplares para quem não atuar na cultura da segurança.
- (B) Promover uma cultura na qual profissionais e gestores compartilhem a responsabilidade pela segurança, incentivando a notificação e o aprendizado a partir dos incidentes, mas também de forma preventiva.
- (C) Confiar exclusivamente nas auditorias do núcleo de segurança do paciente, sem estimular notificações espontâneas.
- (D) Focar apenas as notificações graves, para reduzir os demais tipos.
- (E) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 96 horas.

**56**

**São princípios do Sistema Único de Saúde, EXCETO**

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) descentralização político-administrativa.
- (C) participação da comunidade.
- (D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- (E) equilíbrio participativo.

**57**

**De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, compete à União**

- (A) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- (B) executar ações e serviços de vigilância epidemiológica.
- (C) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (D) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- (E) executar serviços de saúde bucal.

**58**

**De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.**

- (A) É permitida a participação direta de empresas na assistência à saúde em hospitais gerais.
- (B) A contratação de instituição privada exige a aprovação formal da União, dos Estados e dos Municípios.
- (C) É vedada a ação da iniciativa privada em ações de planejamento familiar.
- (D) Serviços privados contratados pelo poder público podem ter seus proprietários em cargos de chefia no Sistema Único de Saúde.
- (E) A remuneração dos serviços privados de saúde será definida no mês de janeiro de cada ano.

**59**

**Sobre a telessaúde no contexto da Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os atos do profissional de saúde praticados nessa modalidade terão validade localizada apenas no estado de saúde da inscrição do profissional.
- (B) É obrigatória a inscrição secundária do profissional de saúde ao exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- (C) A confidencialidade não é expressada nessa lei, pois ela já é contemplada pela Lei Geral de Proteção de Dados.
- (D) O paciente pode solicitar atendimento presencial a qualquer momento.
- (E) A lei presume concordância do paciente ao usar meios digitais, não havendo necessidade de consentimento livre e esclarecido.

**60**

**Em relação às fontes de recursos do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal nº 8.080/1990, é correto afirmar que**

- (A) os recursos são elaborados em proposta pelas direções nacional, estadual e municipal.
- (B) a lei proíbe doações para o Sistema Único de Saúde.
- (C) multas arrecadadas no âmbito do Sistema Único de Saúde não são fontes de recursos.
- (D) alienações patrimoniais e rendimentos de capital podem ser considerados fontes de recursos no Sistema Único de Saúde.
- (E) as receitas próprias arrecadadas pelo SUS devem ser enviadas de forma central ao Fundo Nacional de Saúde.

