



T0578038N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

MÉDICO PSIQUIATRIA

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto NÃO poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOCP**, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- () No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- () Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
- (B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
- (C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
- (D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
- (E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

Raciocínio Lógico

6

Se x e y são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de $\frac{x+8y}{x-y}$ é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

15

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

Conhecimentos Específicos

16

Durante o exame do estado mental, a avaliação da orientação temporal, espacial e autopsíquica constitui componente fundamental. Qual das seguintes alternativas caracteriza corretamente a orientação autopsíquica?

- (A) Capacidade de identificar o local onde se encontra.
- (B) Conhecimento sobre data, dia da semana e horário atual.
- (C) Habilidade de recordar eventos recentes.
- (D) Reconhecimento da própria identidade e dados pessoais.
- (E) Capacidade de manter atenção concentrada.

17

No transtorno depressivo maior, segundo os critérios do DSM-5-TR, qual é o período mínimo de duração dos sintomas necessário para estabelecer o diagnóstico?

- (A) 2 semanas.
- (B) 1 mês.
- (C) 6 semanas.
- (D) 3 meses.
- (E) 1 semana.

18

Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) constituem primeira linha no tratamento de transtornos depressivos. Qual mecanismo de ação caracteriza essa classe farmacológica?

- (A) Bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2.
- (B) Bloqueio da recaptação de serotonina no terminal pré-sináptico.
- (C) Antagonismo dos receptores GABA.
- (D) Inibição da acetilcolinesterase.
- (E) Inibição da monoaminoxidase.

19

Na abordagem inicial de paciente com agitação psicomotora em serviço de emergência, qual conduta deve ser priorizada?

- (A) Administração imediata de antipsicótico intramuscular.
- (B) Contenção física mecânica.
- (C) Regulação verbal e estabelecimento de vínculo terapêutico.
- (D) Sedação profunda com benzodiazepínicos.
- (E) Isolamento em ambiente fechado.

20

O sistema multiaxial do DSM foi modificado no DSM-5. Assinale a alternativa que apresenta como são organizadas as informações diagnósticas atualmente.

- (A) Cinco eixos distintos mantidos da versão anterior.
- (B) Três eixos principais com subdivisões.
- (C) Sistema dimensional único.
- (D) Classificação baseada em gravidade sintomática.
- (E) Diagnósticos listados conjuntamente com especificadores.

21

Paciente do sexo masculino, 28 anos, apresenta há 3 meses delírios persecutórios, alucinações auditivas de comando e deterioração funcional significativa. Nega uso de substâncias. Os exames laboratoriais e de neuroimagem estão normais. O diagnóstico mais provável nesse caso é

- (A) transtorno esquizofreniforme.
- (B) esquizofrenia.
- (C) transtorno delirante.
- (D) transtorno psicótico induzido por substância.
- (E) transtorno psicótico breve.

22

Paciente de 35 anos em uso de haloperidol 10 mg/dia há 2 semanas desenvolve febre (40 °C), alteração do nível de consciência, rigidez muscular generalizada e sudorese profusa. Exames revelam CPK: 15.000 U/L e leucocitose. Qual complicação deve ser considerada prioritariamente?

- (A) Agranulocitose.
- (B) Síndrome neuroléptica maligna.
- (C) Miocardite.
- (D) Catatonia.
- (E) Síndrome serotoninérgica.

23

Idosa de 78 anos, hospitalizada por pneumonia, desenvolve confusão mental flutuante, desorientação e alucinações visuais. Familiares relatam que ela estava cognitivamente preservada antes da internação. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável nesse caso.

- (A) Doença de Alzheimer.
- (B) Demência vascular.
- (C) Delirium.
- (D) Demência por corpos de Lewy.
- (E) Transtorno depressivo maior.

24

Na síndrome de abstinência alcoólica, qual medicação constitui primeira escolha para prevenção de convulsões e delirium tremens?

- (A) Haloperidol.
- (B) Carbamazepina.
- (C) Tiamina.
- (D) Diazepam.
- (E) Naltrexona.

25

Paciente de 25 anos apresenta padrão persistente de instabilidade emocional, relacionamentos intensos e instáveis, medo de abandono e episódios de automutilação. Nesse contexto, qual transtorno de personalidade é mais provável?

- (A) Transtorno de Personalidade Antissocial.
- (B) Transtorno de Personalidade Histriônica.
- (C) Transtorno de Personalidade Narcisista.
- (D) Transtorno de Personalidade Dependente.
- (E) Transtorno de Personalidade Borderline.

26

No Transtorno Obsessivo-Compulsivo, qual neurotransmissor está primariamente envolvido na fisiopatologia?

- (A) Serotonina.
- (B) Noradrenalina.
- (C) GABA.
- (D) Acetilcolina.
- (E) Dopamina.

27

Criança de 8 anos apresenta dificuldade de concentração, inquietude motora e impulsividade há 18 meses, comprometendo rendimento escolar. Os sintomas ocorrem em casa e na escola. Qual é a primeira linha de tratamento farmacológico nesse caso?

- (A) Risperidona.
- (B) Metilfenidato.
- (C) Sertralina.
- (D) Ácido valproico.
- (E) Aripiprazol.

28

Segundo critérios diagnósticos, na depressão pós-parto, qual período caracteriza o início dos sintomas?

- (A) Durante a gravidez até 4 semanas após o parto.
- (B) Primeiras 4 semanas após o parto.
- (C) Primeiras 12 semanas após o parto.
- (D) Durante a gravidez até 12 semanas após o parto.
- (E) Durante a gravidez até 2 semanas após o parto.

29

Paciente relata episódios de paralisia muscular súbita durante vigília, desencadeados por emoções intensas, associados a sonolência diurna excessiva e alucinações hipnagógicas. O diagnóstico mais provável nesse caso é

- (A) apneia obstrutiva do sono.
- (B) narcolepsia.
- (C) síndrome das pernas inquietas.
- (D) transtorno do movimento periódico dos membros.
- (E) insônia crônica.

30

Paciente apresenta crença inabalável de que seus pensamentos estão sendo transmitidos para outras pessoas. Qual fenômeno psicopatológico está presente nesse caso?

- (A) Inserção de pensamento.
- (B) Roubo de pensamento.
- (C) Difusão de pensamento.
- (D) Eco de pensamento.
- (E) Bloqueio de pensamento.

31

Adolescente de 16 anos apresenta episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de vômitos autoinduzidos, preocupação excessiva com peso e forma corporal. IMC encontra-se na faixa normal. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) anorexia nervosa tipo purgativo.
- (B) bulimia nervosa.
- (C) transtorno de compulsão alimentar.
- (D) transtorno alimentar restritivo/evitativo.
- (E) Pica.

32

Paciente de 35 anos, com lúpus eritematoso sistêmico, desenvolve quadro psicótico agudo após uso de prednisona 80 mg/dia por 2 semanas. Apresenta alucinações auditivas, delírios persecutórios e agitação psicomotora. Nesse contexto, qual é a abordagem farmacológica inicial mais apropriada?

- (A) Redução gradual do corticoide + antipsicótico.
- (B) Manutenção do corticoide + antidepressivo.
- (C) Suspensão abrupta do corticoide + benzodiazepínico.
- (D) Aumento da dose do corticoide + estabilizador do humor.
- (E) Troca para corticoide tópico + antipsicótico.

33

Paciente em uso de carbamazepina para transtorno bipolar inicia tratamento com fluoxetina. Assinale a alternativa que apresenta a interação farmacológica que deve ser monitorizada nesse caso.

- (A) Aumento dos níveis de carbamazepina por inibição do CYP3A4.
- (B) Redução dos níveis de fluoxetina por indução do CYP3A4.
- (C) Síndrome serotoninérgica por potencialização.
- (D) Redução dos níveis de carbamazepina por competição enzimática.
- (E) Aumento dos níveis de fluoxetina por inibição da P-glicoproteína.

34

Paciente de 65 anos apresenta declínio cognitivo progressivo, alucinações visuais recorrentes, flutuação da cognição e sintomas parkinsonianos. Qual biomarcador no líquor seria mais específico para o diagnóstico nesse caso?

- (A) Proteína tau total elevada.
- (B) Proteína tau fosforilada elevada.
- (C) Beta-amiloide 42 reduzida.
- (D) Alfa-sinucleína reduzida.
- (E) Proteína 14-3-3 positiva.

35

Paciente com depressão maior refratária a múltiplos antidepressivos será submetida à eletroconvulsoterapia. Ela apresenta hipertensão arterial e marca-passo cardíaco. Nesse contexto, qual consideração anestésica é mais importante?

- (A) Contraindicação absoluta devido ao marca-passo.
- (B) Uso de succinilcolina está contraindicado.
- (C) Necessidade de desligar o marca-passo durante procedimento.
- (D) Monitorização cardiológica intensiva e ajuste de parâmetros.
- (E) Substituição por anestesia local.

36

No acompanhamento de adolescentes com disforia de gênero, segundo diretrizes internacionais, qual critério é fundamental para considerar intervenções hormonais?

- (A) Idade mínima de 16 anos.
- (B) Persistência da disforia por período mínimo de 2 anos.
- (C) Capacidade de consentimento informado e acompanhamento multidisciplinar.
- (D) Ausência completa de comorbidades psiquiátricas.
- (E) Aprovação de ambos os responsáveis legais.

37

Paciente apresenta midríase, hipertermia, taquicardia, agitação e bruxismo após uso recreativo de substância. Relata sensação de energia e euforia. Qual substância provavelmente foi utilizada?

- (A) Cocaína.
- (B) MDMA (ecstasy).
- (C) LSD.
- (D) Cannabis.
- (E) Heroína.

38

Na esquizofrenia, alterações estruturais cerebrais incluem redução volumétrica de regiões específicas. Qual achado neuroanatômico é mais consistentemente encontrado?

- (A) Atrofia do cerebelo.
- (B) Dilatação dos ventrículos laterais.
- (C) Redução do volume do tálamo.
- (D) Atrofia do córtex occipital.
- (E) Aumento do volume da amígdala.

39

Paciente com transtorno de pânico em terapia cognitivo-comportamental apresenta melhora dos sintomas, mas mantém evitação de situações específicas. Qual técnica terapêutica seria mais indicada nessa fase?

- (A) Reestruturação cognitiva.
- (B) Exposição gradual *in vivo*.
- (C) Relaxamento progressivo.
- (D) Psicoeducação sobre ansiedade.
- (E) Técnicas de respiração.

40

Na avaliação do risco de nova tentativa de suicídio (não fatal) em pacientes atendidos em emergência, qual fator constitui o preditor mais forte?

- (A) Idade avançada (> 65 anos).
- (B) Sexo masculino.
- (C) História de tentativa prévia.
- (D) Episódio depressivo grave.
- (E) Ausência de suporte social.

41

O controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos pilares da gestão participativa. Conforme a Lei Federal nº 8.080/1990 e suas regulamentações, em sua atuação, os Conselhos de Saúde na esfera municipal devem, de forma deliberativa,

- (A) aprovar o plano de saúde municipal e o relatório de gestão anuais, fiscalizando a execução das políticas de saúde.
- (B) gerenciar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, realizando as transferências entre as unidades.
- (C) elaborar a legislação sanitária local, sem necessidade de aprovação da Câmara Municipal.
- (D) definir os salários e planos de carreira dos servidores da saúde municipal, sem interferência do executivo.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica no território, diretamente.

42

Uma gerente de projetos de 38 anos, conhecida por sua eficiência e energia, procurou atendimento médico devido a uma mudança significativa em seu estado de humor nos últimos dois meses. Ela relata sentir uma tristeza profunda e constante, perdeu o prazer em seus passatempos favoritos (como jardinagem e natação) e sua produtividade no trabalho diminuiu drasticamente devido à fadiga persistente e à dificuldade de concentração, apesar de dormir de 10 a 12 horas por noite. Apresenta também aumento do apetite, com preferência por carboidratos, resultando em ganho de peso de 5 kg. Expressa sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, chorando frequentemente sem um motivo aparente. Durante a anamnese, menciona um período, há cerca de cinco anos, no qual se sentiu “invencível” por aproximadamente três semanas, dormindo apenas 3-4 horas por noite sem cansaço, estava extremamente produtiva em vários projetos simultâneos e fez compras de alto valor impulsivamente (incluindo um carro de luxo), das quais se arrependeu posteriormente.

Considerando esse quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica inicial mais indicada.

- (A) Transtorno de Ansiedade Generalizada com sintomas depressivos; terapia cognitivo-comportamental focada na redução da preocupação.
- (B) Transtorno Depressivo Maior, episódio atual único; início de tratamento com um inibidor seletivo de recaptção de serotonina (ISRS).
- (C) Transtorno Esquizoafetivo, tipo depressivo; introdução de um antipsicótico atípico em baixa dose.
- (D) Transtorno de Adaptação com humor deprimido; psicoterapia de apoio com foco na resolução de estressores recentes.
- (E) Transtorno Bipolar do tipo I, em episódio depressivo atual; início de tratamento com um estabilizador de humor.

43

Em relação à Terapia Interpessoal (TIP), assinale a alternativa correta.

- (A) É uma terapia de longo prazo, focada na exploração de conflitos inconscientes da infância.
- (B) Sua principal indicação é o tratamento de transtornos de personalidade graves, como o Transtorno de Personalidade Borderline.
- (C) É uma terapia focada no presente, breve e estruturada, que visa melhorar os relacionamentos interpessoais e o funcionamento social do paciente.
- (D) Utiliza técnicas como exposição e prevenção de resposta para tratar transtornos ansiosos.
- (E) Tem como objetivo principal a reestruturação cognitiva de pensamentos disfuncionais.

44

Um paciente de 50 anos, com longo histórico de uso de álcool, é internado após uma queda. No terceiro dia, desenvolve tremores grosseiros, sudorese profusa, taquicardia e insônia severa. Relata ver “aranhas nas paredes” e conversar com elas. Está desorientado no tempo e espaço. A família confirma interrupção abrupta do álcool. Diante desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a condição que melhor descreve o quadro e a principal intervenção farmacológica para controle dos sintomas?

- (A) Intoxicação alcoólica aguda; observação.
- (B) Delirium tremens; benzodiazepínicos parenterais (IM ou IV).
- (C) Encefalopatia de Wernicke; tiamina IV.
- (D) Transtorno psicótico induzido por álcool; antipsicótico.
- (E) Abstinência não complicada de álcool; clonidina.

45

A Lei Federal nº 8.080/1990 estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS) com base em princípios e diretrizes. A articulação contínua das ações e serviços de saúde, sejam eles preventivos ou curativos, individuais ou coletivos, em todos os níveis de complexidade, visando a uma atenção completa ao usuário, remete diretamente ao princípio da

- (A) descentralização.
- (B) integralidade.
- (C) equidade.
- (D) regionalização.
- (E) universalidade.

46

Qual transtorno é caracterizado por uma incongruência acentuada e persistente entre o sexo atribuído no nascimento (características sexuais biológicas) e o gênero sentido ou expresso por um indivíduo, que causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida?

- (A) Transtorno de Identidade Dissociativa.
- (B) Transtorno de Personalidade Esquizotípica
- (C) Transtorno Bipolar Tipo I.
- (D) Disforia de Gênero.
- (E) Transtorno do Espectro Autista.

47

Em psicopatologia, o conceito de “esquizofrenia hebefrênica” (atualmente classificada no DSM-5-TR como “esquizofrenia com características de desorganização proeminentes”) historicamente se referia a um subtipo de esquizofrenia caracterizado por

- (A) delírios persecutórios proeminentes e alucinações auditivas.
- (B) mutismo, posturas bizarras e negativismo intenso.
- (C) início tardio da doença e predominância de sintomas negativos.
- (D) episódios maníacos e depressivos concomitantes com sintomas psicóticos.
- (E) comportamento desorganizado, discurso incoerente e afeto embotado ou inadequado.

48

Uma mulher de 48 anos, desde a adolescência, tem preocupação excessiva e irreal com a simetria de objetos em casa. Passa horas arrumando itens até que estejam “perfeitos”. Se algo está fora do lugar, sente ansiedade insuportável e precisa corrigir, atrasando-se para o trabalho e os encontros sociais. Reconhece que as preocupações são exageradas, mas não resiste aos rituais. Nega pensamentos repetitivos sobre contaminação ou impulsos agressivos. Queixa-se principalmente de sensação de que as coisas não estão “certas” se não estiverem perfeitamente alinhadas. Qual é o diagnóstico mais provável para esse caso, de acordo com o DSM-5-TR?

- (A) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) com obsessões de simetria e compulsões de alinhamento.
- (B) Transtorno de Personalidade Obsessivo-Compulsiva.
- (C) Transtorno Dismórfico Corporal.
- (D) Transtorno de Acumulação.
- (E) Transtorno de Ansiedade Generalizada.

49

A direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por uma série de atribuições no âmbito de seu território. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a atribuição que compete prioritariamente à esfera municipal, conforme a Lei Federal nº 8.080/1990, refletindo a base da atenção à saúde.

- (A) Formular a política de saúde indigenista.
- (B) Coordenar as ações de saúde em nível nacional, incluindo a definição de prioridades.
- (C) Gerenciar e executar os serviços de atenção primária à saúde e hospitalar de baixa complexidade em seu território.
- (D) Normatizar os procedimentos para o controle de qualidade de produtos e serviços de saúde em todo o país.
- (E) Participar da formulação e execução da política de saneamento básico em nível federal.

50

No campo da psicopatologia descritiva, qual conceito se refere à incapacidade do indivíduo de reconhecer sua própria doença ou deficiência, atribuindo-a a outros fatores ou negando sua existência?

- (A) Anosognosia.
- (B) Alexitimia.
- (C) Anedonia.
- (D) Apraxia.
- (E) Despersonalização.

51

No exame do estado mental, quando um paciente apresenta uma fala monótona, com pouca variação de tom e inflexão, esse achado é mais bem descrito como

- (A) taquilalia.
- (B) disprosódia.
- (C) dislalia.
- (D) verbigeration.
- (E) palilalia.

52

Qual transtorno de ansiedade se caracteriza por preocupação e ansiedade excessivas e difíceis de controlar sobre uma variedade de eventos ou atividades, estando esses sintomas presentes na maioria dos dias por pelo menos 6 meses?

- (A) Transtorno de pânico.
- (B) Fobia específica.
- (C) Agorafobia.
- (D) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).
- (E) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

53

A Lei Federal nº 8.080/1990 prevê a participação complementar da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essa participação, é correto afirmar que

- (A) a iniciativa privada pode atuar no SUS sem necessidade de regulamentação ou fiscalização, desde que ofereça serviços gratuitos.
- (B) os serviços privados podem substituir completamente a rede pública de saúde em regiões onde há deficiência de oferta.
- (C) a participação da iniciativa privada na assistência à saúde deve ser sempre preferencial em relação aos serviços públicos.
- (D) os serviços de saúde privados, quando complementares ao SUS, devem ser contratados ou conveniados, observando-se as diretrizes do sistema e dando-se preferência às entidades filantrópicas.
- (E) a participação da iniciativa privada é permitida apenas em caráter de urgência e emergência, sob contratação direta sem licitação.

54

Um paciente de 65 anos, com histórico de múltiplos AVCs isquêmicos, apresenta declínio cognitivo abrupto após cada evento, com platôs. Tem déficits focais de memória, linguagem (dificuldade em nomear objetos) e função executiva. A esposa relata ausência de alucinações proeminentes ou flutuações cognitivas marcadas e parkinsonismo mínimo. De acordo com o DSM-5-TR, qual é o diagnóstico neurocognitivo mais provável nesse caso?

- (A) Transtorno Neurocognitivo Maior devido à Doença de Alzheimer.
- (B) Transtorno Neurocognitivo Maior com Corpos de Lewy.
- (C) Transtorno Neurocognitivo Maior Frontotemporal.
- (D) Transtorno Neurocognitivo Maior devido à Doença de Parkinson.
- (E) Transtorno Neurocognitivo Maior Vascular.

55

Uma paciente de 22 anos tem tido, há 3 meses, episódios de irritabilidade intensa, dorme 3-4 horas por noite e tem energia inesgotável, iniciando vários projetos (compra impulsiva de cursos online, planejamento de viagem, escrita de livro) e abandonando-os rapidamente. Fala incessantemente, com ideias saltando entre assuntos, e gasta dinheiro de forma descontrolada. Durante um desses episódios, acreditou ser uma “influencer digital renomada” e tentou convencer desconhecidos a investir em seus projetos digitais. Previamente, teve períodos de tristeza e apatia por semanas. Considerando o quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável e a abordagem terapêutica inicial mais indicada.

- (A) Transtorno de Personalidade Borderline e terapia comportamental dialética.
- (B) Episódio depressivo maior com características psicóticas e antidepressivo.
- (C) Transtorno Esquizoafetivo e antipsicótico de segunda geração.
- (D) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e psicoestimulante.
- (E) Transtorno Bipolar I em episódio maníaco com características psicóticas e um estabilizador de humor e antipsicótico.

56

Condição puerperal que é uma emergência psiquiátrica de alto risco para mãe e bebê e que é caracterizada por início súbito de sintomas psicóticos, maníacos ou depressivos graves.

O enunciado se refere ao(à)

- (A) Disforia puerperal (“Baby Blues”).
- (B) Transtorno Depressivo Pós-parto.
- (C) Psicose Puerperal.
- (D) Transtorno de Ansiedade Pós-parto.
- (E) Transtorno Obsessivo-Compulsivo Pós-parto.

57

No manejo da agitação psicomotora em um paciente na emergência, quando a etiologia não está totalmente definida ou há suspeita de causa não psicótica (como abstinência alcoólica), qual classe de fármacos é frequentemente utilizada devido à sua rápida ação sedativa e ansiolítica, com efeito miorrelaxante, e que não apresenta ação antipsicótica primária?

- (A) Antipsicóticos típicos.
- (B) Antipsicóticos atípicos.
- (C) Estabilizadores de humor.
- (D) Antidepressivos.
- (E) Benzodiazepínicos.

58

A saúde do trabalhador é uma área de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e um direito fundamental. Conforme a Lei Federal nº 8.080/1990, as ações de saúde do trabalhador incluem

- (A) a gestão exclusiva de planos de saúde ocupacionais privados para todos os trabalhadores.
- (B) a fiscalização apenas das empresas de grande porte quanto às condições de trabalho.
- (C) a elaboração de normas técnicas sobre ergonomia aplicáveis apenas a trabalhadores da área da saúde.
- (D) o custeio exclusivo de indenizações por acidentes de trabalho, sem participação do empregador.
- (E) a avaliação do impacto que as tecnologias e as condições de trabalho provocam na saúde, bem como a informação ao trabalhador sobre os riscos.

59

Qual classe de antidepressivos é mais notável pela exigência de restrições dietéticas rigorosas, especialmente em relação a alimentos ricos em tiramina (como queijos maturados, vinhos tintos, carnes processadas), para evitar o risco de uma crise hipertensiva grave e potencialmente fatal?

- (A) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS).
- (B) Antidepressivos atípicos (ex.: bupropiona).
- (C) Inibidores da monoaminoxidase (IMAO).
- (D) Antidepressivos tricíclicos (ADTs).
- (E) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (ISRSN).

60

Uma mulher de 68 anos, com depressão maior grave e resistente a múltiplos tratamentos, apresenta desidratação e perda de peso por recusa alimentar há duas semanas, associada a apatia extrema e mutismo. Há risco iminente de complicações médicas. Tentou três antidepressivos e TCC por 6 meses, sem resposta. Qual modalidade terapêutica tem maior taxa de resposta e início de ação mais rápido para reverter essa situação de risco à vida?

- (A) Terapia de estimulação magnética transcraniana (EMT) focada no córtex pré-frontal.
- (B) Eletroconvulsoterapia (ECT).
- (C) Psicoterapia psicodinâmica intensiva em regime de internação.
- (D) Transplante de microbiota fecal.
- (E) Quetiapina como monoterapia antidepressiva.

