



T0582034N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

MÉDICO REUMATOLOGIA

NOME

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOCP**, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- () No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- () Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

Raciocínio Lógico

6

Se x e y são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de $\frac{x+8y}{x-y}$ é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

15

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

Conhecimentos Específicos

16

Gestante de 28 anos, com 34 semanas de gestação e diagnóstico de síndrome antifosfolípide obstétrica, está em uso de heparina de baixo peso molecular (1 mg/kg, 2 x/dia) e AAS (100 mg/dia). Em relação à anticoagulação dessa paciente no período pré e no pós-parto, assinale a alternativa correta.

- (A) Antes do parto, a anticoagulação deve ser suspensa com 24 horas de antecedência e retornada 6 a 8 horas pós-parto, sendo mantida por 6 a 8 semanas.
- (B) Antes do parto, a anticoagulação deve ser suspensa com 48 horas de antecedência e retornada 12 horas pós-parto, sendo mantida por 12 a 15 semanas.
- (C) Antes do parto, a anticoagulação deve ser suspensa com 12 horas de antecedência e retornada 12 horas pós-parto, sendo mantida por 10 a 12 semanas.
- (D) Antes do parto, a anticoagulação deve ser suspensa com 72 horas de antecedência e retornada 72 horas pós-parto, sendo mantida por 4 a 6 semanas.
- (E) Antes do parto, a anticoagulação deve ser suspensa com 12 horas de antecedência e retornada 6 horas pós-parto, sendo mantida por 8 a 10 semanas.

17

Paciente foi encaminhada para o reumatologista por apresentar artralgia, fraqueza muscular, fadiga, fenômeno de Raynaud e dispneia. Exames laboratoriais evidenciaram aumento de provas inflamatórias, e a presença de FAN 1/640 com padrão nuclear pontilhado grosso e de anti-U1-ribonucleoproteína em altos títulos. Considerando esse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A pneumopatia intersticial usual, com presença de vidro fosco e bronquioloectasias com distribuição basal, posterior e periférica na tomografia de tórax, é a forma mais comum de acometimento intersticial.
- (B) Sexo masculino, altos títulos de Ac-anti-RNP, presença de anti-Ro-52 e piores níveis basais na prova função pulmonar são fatores de risco para progressão da doença intersticial pulmonar, enquanto a presença de artrite é um fator protetor.
- (C) A artrite costuma ser mais leve do que no lúpus eritematoso sistêmico, sem evidências de artrite erosiva.
- (D) Envolvimento renal ocorre em cerca de 40% dos pacientes, sendo a glomerulonefrite proliferativa difusa a forma mais comum.
- (E) A miopatia inflamatória habitualmente é grave e, por vezes, responde de forma lenta ao tratamento.

18

Ao avaliar uma radiografia de coluna vertebral, são observados sindesmófitos paravertebrais assimétricos e grosseiros. Na radiografia de mãos, há lesões descritas como “pencil in cup”. Diante desses achados, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Espondiloartrite axial.
- (B) Hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH).
- (C) Artrite psoriásica.
- (D) Espondiloartrite periférica.
- (E) Artrite reumatoide.

19

Qual das seguintes medicações NÃO tem eficácia comprovada até o momento no tratamento da síndrome seca em pacientes com síndrome de Sjögren?

- (A) Ciclosporina tópica.
- (B) Cevimeline.
- (C) Ômega-3.
- (D) Metotrexato.
- (E) Soro autólogo.

20

Em relação ao tratamento da artrite séptica bacteriana, assinale a alternativa correta.

- (A) Para pacientes com *S. aureus* metilina-resistente (MRSA), indica-se ceftazidima combinada a aminoglicosídeo.
- (B) Em casos de bacilo gram-negativo, indica-se oxacilina 2 g, endovenosa, a cada 4 horas.
- (C) Em casos suspeitos de *P. aeruginosa*, indica-se vancomicina 15 a 20 mg/kg/dose, endovenosa, a cada 8 ou 12 horas.
- (D) Para infecções por bactérias gram-positivas, o antibiótico de escolha para a terapia inicial empírica recomendada é a vancomicina 15 a 20 mg/kg/dose, endovenosa, a cada 8 ou 12 horas.
- (E) Infecção por *S. aureus* metilina-sensível pode ser tratada com vancomicina combinada a cefalosporina de 3ª geração.

21

Uma paciente com diagnóstico de artrite reumatoide soropositiva estava em uso de infliximabe, com bom controle da doença. Iniciou com mialgia e lesões eritematosas em regiões fotossensíveis, levantando suspeita de lúpus induzido por droga. Qual é o padrão de FAN mais encontrado nessa situação?

- (A) Pontos isolados.
- (B) Nuclear homogêneo.
- (C) Pontilhado fino denso.
- (D) Nucleolar aglomerado.
- (E) Pontilhado grosso.

22

Mulher, 29 anos, apresenta quadro de febre, eritema nodoso em membros inferiores e artrite em tornozelos. Com base nesses achados, qual seria a principal hipótese a ser investigada?

- (A) Síndrome de Sjögren.
- (B) Amiloidose.
- (C) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (D) Sarcoidose.
- (E) Poliarterite nodosa.

23

Paciente de 63 anos, com sobrepeso, hipertenso e diabético, foi encaminhado ao reumatologista devido à presença de tofos gotosos em bolsa olecraniana e joelhos. Exames laboratoriais evidenciam dosagem sérica de ácido úrico de 10 mg/dl. Diante desse caso clínico, assinale a alternativa que apresenta a medicação uricorrredutora que deve ser iniciada e o alvo terapêutico recomendado.

- (A) Alopurinol 300 mg/dia. Alvo terapêutico: 6 mg/dl.
- (B) Benzbromarona 100 mg/dia. Alvo terapêutico: 6 mg/dl.
- (C) Alopurinol 100 mg/dia. Alvo terapêutico: 5 mg/dl.
- (D) Benzbromarona 50 mg/dia. Alvo terapêutico: 5 mg/dl.
- (E) Lesinurade 200 mg/dia. Alvo terapêutico: 6 mg/dl.

24

Homem, 55 anos, apresenta quadro de livedo reticular, pé caído, artralgia e dor testicular. A principal hipótese diagnóstica e sua associação são respectivamente

- (A) tromboangeíte obliterante e tabagismo.
- (B) poliarterite nodosa e hepatite C.
- (C) vasculite criobulinêmica e hepatite C.
- (D) poliarterite nodosa e hepatite B.
- (E) vasculite criobulinêmica e hepatite B.

25

Paciente do sexo feminino, 71 anos, tem histórico de cirurgia bariátrica, infarto do miocárdio há 8 meses e queda recente com fratura de punho. Apresenta radiografia com fratura de T12 e L1 e densitometria óssea com T-score de -3,2 em fêmur, além de relato de quedas frequentes. Com base no exposto, qual é a melhor escolha de tratamento para essa paciente?

- (A) Ácido zoledrônico.
- (B) Teriparatida.
- (C) Denosumabe.
- (D) Risedronato.
- (E) Romosozumabe.

26

Paciente de 45 anos iniciou, há três meses, quadro de fraqueza muscular simétrica e proximal dos membros, associado a manchas eritematosas peripalpebrais e pápulas violáceas nas superfícies extensoras das interfalângicas. Os exames laboratoriais revelam positividade do autoanticorpo anti-TIF-1- γ . Esse autoanticorpo está comumente associado a qual manifestação?

- (A) Doença pulmonar intersticial.
- (B) Calcinose.
- (C) Dermatomiosite responsiva à terapêutica.
- (D) Vasculite cutânea.
- (E) Neoplasia.

27

Ao analisar uma radiografia de coluna vertebral nota-se o estreitamento e a calcificação dos discos intervertebrais com aspecto de “biscoito wafer”, discos com múltiplos vácuos e sindesmófitos grosseiros. As articulações sacroilíacas estão preservadas. Diante desses achados, qual é a principal suspeita clínica?

- (A) Espondilite anquilosante.
- (B) Ocronose.
- (C) Artrite psoriática.
- (D) Hemocromatose.
- (E) Amiloidose.

28

Em relação à febre reumática, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Após infecção de orofaringe pelo estreptococo do grupo A em indivíduo com suscetibilidade genética para desenvolver febre reumática, ocorre resposta imune caracterizada pela ativação de linfócitos T, com produção de TNF e IFN-gama, e ausência da produção de anticorpos.
- () Classicamente, a artrite é caracterizada como poliartrite que acomete pequenas articulações, com padrão migratório, assimétrico, autolimitado e com duração menor que quatro semanas mesmo sem tratamento específico.
- () A coreia é uma manifestação autolimitada com remissão espontânea após um tempo médio de 3 semanas.
- () Pacientes com febre reumática que apresentaram cardite, com insuficiência mitral leve residual ou com resolução da lesão valvar, devem manter a profilaxia secundária até os 21 anos de idade.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – V – F.

29

Mulher, 38 anos, iniciou com febre recorrente, apresentando um pico diário de 39 °C, geralmente no início da noite, associada à artralgia de padrão inflamatório em punhos, joelhos e tornozelos. Foi diagnosticada com doença de Still e iniciou tratamento com prednisona e metotrexato, porém mantém refratariedade ao quadro. Considerando esse caso clínico, qual seria a melhor opção terapêutica?

- (A) Iniciar tocilizumabe.
- (B) Iniciar azatipriona.
- (C) Iniciar adalimumabe.
- (D) Iniciar rituximabe.
- (E) Iniciar infliximabe.

30

Arboviroses são doenças ocasionadas por vírus transmitidos através da picada de artrópodos hematófagos, como mosquitos e carrapatos. Alguns desses vírus são altamente artritogênicos. Em relação à febre Chikungunya, assinale a alternativa correta.

- (A) Passados os primeiros 14 dias da doença, cerca de 90% dos pacientes evoluem para a forma subaguda, com predomínio dos sintomas articulares.
- (B) Comumente apresenta padrão assimétrico e monoarticular, na maioria das vezes, de caráter incapacitante.
- (C) Entre os fatores reconhecidos como associados com a persistência dos sintomas musculoesqueléticos, estão: sexo masculino, idade acima de 40 anos, pouco envolvimento articular na fase aguda e diabetes mellitus.
- (D) Dos pacientes que evoluem para a fase crônica, cerca de 40% apresenta padrão inflamatório. Geralmente, o quadro é poliarticular, aditivo, simétrico e intermitente, associado ou não à rigidez matinal.
- (E) A maioria dos pacientes que cronificam apresentam manifestações musculoesqueléticas localizadas ou difusas com padrão não inflamatório. Os sintomas mais frequentes são dor articular, mialgia, fadiga, cefaleia, rigidez, depressão, transtornos do humor e distúrbios do sono.

31

Paciente do sexo masculino, 69 anos, recebeu recentemente o diagnóstico de esclerose sistêmica forma cutânea difusa. Ele apresenta fenômeno de Raynaud com capilaroscopia de padrão SD, anticorpos anti-Scl-70, RNA polimerase III, envolvimento cardíaco e gastrointestinal. Diante desse quadro clínico, quantos fatores de risco esse paciente apresenta para desenvolvimento de doença pulmonar intersticial?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

32

A febre familiar do mediterrâneo é uma doença autoinflamatória. Assinale a alternativa que apresenta a tríade clássica de sintomas e o tratamento dessa doença.

- (A) Febre recorrente, rash cutâneo e conjuntivite. Tratamento: colchicina.
- (B) Febre recorrente, dor abdominal e serosite. Tratamento: canaquinumabe.
- (C) Febre recorrente, rash cutâneo e serosite. Tratamento: canaquinumabe
- (D) Febre recorrente, dor abdominal e artrite. Tratamento: colchicina.
- (E) Febre recorrente, rash cutâneo e artrite. Tratamento: anakinra.

33

Uma paciente que se queixa de dor muscular associada a desconforto ósseo em região de fêmur apresenta ao reumatologista uma radiografia solicitada pelo ortopedista. Ao analisar a imagem, nota-se uma linha radiolucida no meio da placa cortical, com esclerose nas margens. Considerando essas informações, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Osteoblastoma.
- (B) Osteomalácia.
- (C) Doença de paget.
- (D) Osteonecrose.
- (E) Condrioblastoma.

34

Ao examinar uma paciente, o reumatologista observa um espessamento no dorso dos dedos e a incapacidade de opor uma mão espalmada à outra, caracterizando o sinal da prece positivo. Esse achado está frequentemente associado a qual doença?

- (A) Doença falciforme.
- (B) Acromegalia.
- (C) Amiloidose.
- (D) Artrite reumatoide.
- (E) Diabetes mellitus.

35

Paciente, 53 anos, apresenta poliartralgia simétrica de interfalangeanas proximais associada à sinovite. O diagnóstico é de artrite reumatoide soronegativa e o tratamento é iniciado com o uso de metotrexato 15 mg/semana. Após três meses, a paciente retorna para consulta e, ao examiná-la, ela apresenta o DAS-28 de 2,6. Qual deve ser a conduta nesse caso?

- (A) Associar leflunomida.
- (B) Associar sulfassalazina.
- (C) Manter metotrexato.
- (D) Iniciar adalimumabe.
- (E) Iniciar upadacitinibe.

36

A velocidade de hemossedimentação (VHS) e a proteína c reativa (PCR) são os marcadores de inflamação mais utilizados na prática clínica. Em relação a esses exames, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A PCR costuma ser um pouco maior nas mulheres.
- (B) Os níveis de PCR aumentam mais de mil vezes durante uma infecção aguda e atingem o pico máximo em 2 a 3 dias.
- (C) A VHS aumenta com a idade e varia com a raça.
- (D) O uso de corticosteroides e anti-inflamatórios não hormonais aumenta a VHS, assim como a presença de neoplasias, trauma, anemia, gestação, hipercolesterolemia e doença renal.
- (E) Se o estímulo é removido, os níveis de PCR caem rapidamente, com uma meia-vida de aproximadamente 19 horas.

37

Paciente com quadro de alodinia e hiperalgesia há 8 meses. Associado ao quadro, apresenta insônia, esquecimentos frequentes, humor depressivo e dor muscular difusa que piora ao realizar as atividades diárias. Assinale a alternativa que apresenta um medicamento que pode ser usado para tratamento dessa condição.

- (A) Duloxetine, com dose terapêutica de 150 mg/dia.
- (B) Pregabalina, com dose que pode chegar a 600 mg/dia.
- (C) Gabapentina, com dose que pode chegar a 3.200 mg/dia.
- (D) Amitriptilina, com dose que pode chegar a 75 mg/dia.
- (E) Ciclobenzaprina com dose que pode chegar a 45 mg/dia.

38

Um paciente de 56 anos, com queixa de fraqueza muscular há 7 meses, é encaminhado ao reumatologista. Ao examiná-lo nota-se enfraquecimento proximal e distal dos braços e das pernas, bem como dos flexores dos dedos. Em seus exames laboratoriais, apresentou CPK com valor de 820 U/L. Diante desse quadro, qual seria a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Polimiosite.
- (B) Síndrome antissintetase.
- (C) Miosite por corpos de inclusão.
- (D) Miopatia necrosante imunomediada.
- (E) Dermatomiosite.

39

Mulher, 44 anos, tabagista, etilista, diabética e com diagnóstico de espondiloartrite axial não radiográfica, apresenta HLA B27 positivo, provas inflamatórias baixas e edema de medula óssea na ressonância de sacroilíacas. Quantos fatores de risco ela apresenta para evoluir para a forma radiográfica da doença?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

40

A síndrome do dente coroado é decorrente da deposição de cristais de pirofosfato de cálcio diidratado em qual articulação?

- (A) Joelho.
- (B) Atlantoaxial.
- (C) Tornozelo.
- (D) Cotovelo.
- (E) Ombro.

41

Segundo a lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Em relação à participação complementar dos serviços privados, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (B) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- (C) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia no Sistema Único de Saúde.
- (D) Os serviços contratados devem seguir as normas técnicas e administrativas e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Secretária Estadual de Saúde.

42

Paciente tem histórico de psoríase, associada à dactilite e artrite periférica, com radiografia de mãos apresentando formação óssea justa-articular. Realiza o acompanhamento pelo SUS. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta uma medicação aprovada para o tratamento dessa paciente, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da artrite psoriásica de 2021.

- (A) Tofacitinibe.
- (B) Ustequinumabe.
- (C) Risanquizumabe.
- (D) Guselcumabe.
- (E) Upadacitinibe.

43

Segundo as normas da Resolução nº 2.314 sobre a telemedicina, nos atendimentos de doenças crônicas ou doenças que requeiram acompanhamento por longo tempo por telemedicina, a consulta presencial com o médico assistente do paciente deve ocorrer em intervalos não superiores a quanto tempo?

- (A) 90 dias.
- (B) 120 dias.
- (C) 180 dias.
- (D) 240 dias.
- (E) 360 dias.

44

Um dos princípios que o SUS estabelece por meio da lei nº 8.080/1990 é o princípio de integralidade, o qual diz respeito

- (A) ao direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (B) ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (C) ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (D) à igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

45

Paciente apresenta artralgia em joelhos, estando em acompanhamento com reumatologista. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de alongamento mais adequado a ser orientado para esse paciente.

- (A) Passivos.
- (B) Ativos estáticos.
- (C) Ativos dinâmicos.
- (D) Balístico.
- (E) Facilitado.

46

Uma das opções de tratamento para pacientes com espondiloartrite axial que não responderam adequadamente à terapia convencional é o Ixequizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado. Em relação ao mecanismo de ação desse imunobiológico, assinale a alternativa correta.

- (A) Inibidor do receptor da interleucina(IL)-6.
- (B) Modulador seletivo da coestimulação dos linfócitos T.
- (C) Inibidor da subunidade p40 das IL-12 e IL-23.
- (D) Inibidor da subunidade p19 da IL-23.
- (E) Inibidor do receptor da IL-17A.

47

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, as comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que apresenta uma de suas atividades.

- (A) Saúde bucal.
- (B) Saúde do trabalhador.
- (C) Saúde indígena.
- (D) Saúde mental.
- (E) Internação domiciliar.

48

Uma paciente jovem, com diagnóstico de lúpus, internada em ambiente hospitalar, necessitou do uso de rituximabe para controle da atividade da doença. Durante a infusão do medicamento, apresentou choque anafilático e evoluiu para óbito. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº36 de 2013, a notificação desse evento adverso deve ser realizada em até quanto tempo a partir do ocorrido?

- (A) Em até 72 horas.
- (B) Até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância.
- (C) Em até 24 horas.
- (D) Em até 48 horas.
- (E) Até 7 dias úteis.

49

Assinale a alternativa que apresenta um objetivo específico da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

- (A) Formação profissional e educação permanente, por meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado.
- (B) Humanização da atenção, buscando-se a efetivação de um modelo centrado no usuário, baseado nas suas necessidades de saúde.
- (C) Promover hábitos de vida saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, como ações de prevenção às doenças crônicas.
- (D) Definir diretrizes gerais para estruturação das linhas de cuidado e organização da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
- (E) Organizar a referência e a contrarreferência estaduais e regionais por meio da regulação com definição de critérios e do fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da rede, de acordo com as necessidades de saúde dos usuários.

50

Paciente de 67 anos, em uso de alendronato há 4 anos, apresentou, no último ano, fratura de fêmur e fratura vertebral em T11. Sua densitometria mostra colo de fêmur com T-Score de -3,4. De acordo com os Protocolos Clínicos e as Diretrizes Terapêuticas de Osteoporose, de outubro de 2025, do Ministério da Saúde, qual medicação deverá ser iniciada para essa paciente?

- (A) Calcitonina.
- (B) Ácido zoledrônico.
- (C) Denosumabe.
- (D) Romosozumabe.
- (E) Teriparatida.

51

Para um paciente com diagnóstico recente de dermatomiosite, qual é a recomendação quanto ao início da prática de exercício físico?

- (A) Iniciar após queda de 50% do valor da CPK.
- (B) Início precoce, pois o exercício físico pode exercer efeito anti-inflamatório sistêmico e local.
- (C) Manter repouso nas primeiras 4 semanas após o início do tratamento.
- (D) Iniciar os exercícios após controle da atividade de doença.
- (E) Manter repouso total nas duas primeiras semanas e, após esse período, iniciar os exercícios de maneira leve e progressiva.

52

Para uma mulher de 29 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, em uso de hidroxicloroquina e azatioprina, qual medicamento deve ser evitado devido ao risco de toxicidade hematológica?

- (A) Procaïnâmica.
- (B) Nimesulida.
- (C) Alopurinol.
- (D) Hidralazina.
- (E) Minociclina.

53

Assinale a alternativa que apresenta uma das competências da direção municipal do Sistema de Saúde.

- (A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e dos serviços de saúde.
- (C) Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.
- (D) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (E) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

54

Entre os seguintes glicocorticoides, qual apresenta maior duração de ação?

- (A) Hidrocortisona.
- (B) Prednisona.
- (C) Betametasona.
- (D) Cortisona.
- (E) Metilprednisolona.

55

Paciente em uso de golimumabe para tratamento de espondiloartrite axial apresenta elevação de TGO e TGP em duas vezes o limite superior da normalidade. De acordo com o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas de espondiloartrite axial, nesse caso, uma conduta adequada é

- (A) suspender a medicação e repetir o exame em 30 dias.
- (B) reduzir a dose em 50%.
- (C) suspender o uso do medicamento até TGO e TGP normalizarem e reiniciar com 50% da dose.
- (D) interromper o uso do medicamento.
- (E) suspender o uso do medicamento até TGO e TGP normalizarem e reiniciar com a dose plena.

56

No caso de um homem com espondiloartrite periférica, em uso de sulfassalazina, um dos possíveis efeitos adversos é

- (A) úlcera gástrica.
- (B) doença pulmonar intersticial.
- (C) neuropatia periférica.
- (D) hipertensão.
- (E) oligospermia.

57

Mulher de 73 anos apresenta cefaleia, claudicação de mandíbula e escotomas visuais. Já fez uso de metotrexato e leflunomida, além de manter-se em uso de doses altas de prednisona, porém continua com atividade da doença. Assinale a alternativa que apresenta o imunobiológico indicado para essa paciente.

- (A) Abatacepte.
- (B) Adalimumabe.
- (C) Tocilizumabe.
- (D) Rituximabe.
- (E) Ustekinumabe.

58

Sobre a Lei Federal nº 8.080/1990, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida, no âmbito dos Municípios, pelo Conselho regional de Saúde.
- () A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
- () Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- () A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico faz parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – V.

59

Paciente com artrite reumatoide irá necessitar do uso de imunobiológico. Ao avaliar os exames, ela apresenta um PPD de 5 mm e radiografia de tórax sem alterações. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.

- (A) Solicitar IGRA.
- (B) Iniciar imunobiológico.
- (C) Solicitar tomografia de tórax.
- (D) Iniciar quimioprofilaxia para tuberculose e administrar o imunobiológico após 30 dias do início da profilaxia.
- (E) Iniciar quimioprofilaxia para tuberculose e administrar o imunobiológico após 60 dias do início da profilaxia.

60

Uma adolescente de 14 anos com nefrite lúpica revela ao médico que está grávida e pede sigilo. Em relação ao sigilo médico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os casos que envolvem crianças e adolescentes devem ser revelados a seus pais ou representantes legais.
- () O médico deve manter o sigilo profissional, desde que a adolescente tenha capacidade de discernimento.
- () O sigilo deve ser mantido, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

- (A) F – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

