



T0590023N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

ODONTÓLOGO SAÚDE COLETIVA (PÚBLICA)

NOME

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOCP**, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- () No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- () Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

Raciocínio Lógico

6

Se x e y são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de $\frac{x+8y}{x-y}$ é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

15

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

Conhecimentos Específicos

16

Paciente feminina de 49 anos, bastante ansiosa, vem para atendimento de urgência odontológica. Questionada sobre sua saúde sistêmica, relatou que está em tratamento para lúpus eritematoso sistêmico. Ela refere muita dor no primeiro molar inferior, mas demorou para buscar ajuda porque tem muito medo do tratamento odontológico e, nos últimos tempos, tem sentido cansaço, fraqueza e perda de peso. O cirurgião-dentista observa, em algumas áreas expostas do corpo, um aumento de pigmentação (cotovelos e palmas das mãos). No atendimento odontológico, relata, em determinado momento, estar sentindo náuseas, vômitos e dor abdominal intensa. Apresenta, também, queda da pressão arterial. Isso ocorre antes mesmo que o dentista possa finalizar a anamnese. Qual é o diagnóstico presuntivo dessa condição?

- (A) Lipotimia.
- (B) AVC hemorrágico.
- (C) Insuficiência adrenal aguda.
- (D) Síncope vasopressora.
- (E) Infarto agudo do miocárdio.

17

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo a alguns princípios. Dentre esses princípios, está a forma como serão estabelecidas as prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Como isso deverá ser feito?

- (A) As lideranças políticas de cada local (Estado ou Município) é que serão responsáveis por essas decisões.
- (B) Os conselhos municipais de saúde decidirão quais são as prioridades de cada local. O conselho estadual de saúde aprovará (ou não) e enviará os recursos necessários e as orientações de como atingir as metas.
- (C) Os dados epidemiológicos é que darão os subsídios para estabelecer as prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (D) Uma assembleia composta pela sociedade civil, trabalhadores e lideranças políticas é que decidirá as prioridades, a alocação de recursos e a programação.
- (E) Um acordo entre Estados e Municípios (comissão gestora bipartite), com o apoio da sociedade civil, deverá estabelecer prioridades, metas à alocação de recursos e orientação programática.

18

As redes de atenção à saúde (RAS) constituem-se de três elementos fundamentais: uma população e as regiões de saúde, uma estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde. O conhecimento profundo da população usuária de um sistema de atenção à saúde é o elemento básico que torna possível romper com a gestão baseada na oferta e instituir uma gestão baseada nas necessidades de saúde da população. Para tanto, é preciso haver uma articulação íntima com a população. Quem deve ser o articulador junto à população?

- (A) Representantes do Conselho Local de Saúde.
- (B) Representantes do Conselho Municipal de Saúde.
- (C) O gestor municipal.
- (D) A Atenção Primária em Saúde (APS) e as equipes da estratégia Saúde da Família (eSF).
- (E) As universidades juntamente com o gestor local para que ocorra um planejamento baseado em ciência.

19

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma estratégia reconhecida como uma das maiores conquistas da saúde pública, capaz de conter o avanço da cárie dentária. Para que um programa de fluoretação das águas tenha a eficiência esperada, é necessário que as concentrações de íon flúor (fluoreto) estejam dentro de uma faixa ótima, de forma ininterrupta e constante. No tocante à responsabilidade pelo controle de níveis ótimos de fluoreto na água de abastecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Regional de Odontologia é que detém a responsabilidade sobre os teores ótimos de íons fluoreto na água de abastecimento.
- (B) O programa VIGIFLUOR, do governo federal, monitorado pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, é o responsável pelo monitoramento de quantidades ótimas de íons fluoreto nas águas de abastecimento.
- (C) A responsabilidade pelo monitoramento dos íons fluoreto nas águas de abastecimento é exclusiva de cada município, através de inspeções regulares em pontos determinados de coleta de água feitas pela companhia responsável pelo abastecimento público de água da localidade.
- (D) A responsabilidade pelo monitoramento da qualidade da água em relação aos teores de fluoretos é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em conjunto com os Conselhos Regionais de Odontologia.
- (E) O programa VIGIFLUOR, do governo federal, monitorado pelas universidades locais e supervisionado pela Unicamp, é o responsável por orientar as quantidades ótimas de fluoretos nas águas de abastecimento público de cada localidade (considerando níveis naturais de flúor e temperatura média ambiental).

20

Uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) refere-se à realização periódica de pesquisas nacionais de saúde bucal. A última foi realizada em 2023 e teve como objetivo principal avaliar o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira em relação às condições mais prevalentes, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e atenção à saúde bucal. Qual foi o critério utilizado para avaliar as consequências clínicas da cárie não tratada?

- (A) Índices ceo-d/CPO-D.
- (B) Índices pufa e PUFA.
- (C) Índice CPI.
- (D) Uso e necessidade de próteses dentárias.
- (E) Condição da oclusão dentária.

21

Assinale a alternativa correta a respeito da odontologia minimamente invasiva.

- (A) Toda dentina cariada deve ser removida, até alcançar uma dentina de consistência firme.
- (B) Toda dentina cariada com características de atividade (amolecida e úmida) deve ser removida, pois não tem capacidade reacional.
- (C) A técnica da remoção seletiva apresenta altos índices de sucesso e independe da resposta do complexo dentinopulpar.
- (D) A técnica da remoção seletiva de tecido cariado sustenta que todo tecido cariado das paredes laterais da cavidade deve ser removido.
- (E) A presença de bactérias viáveis na dentina é o fator determinante da progressão do processo cariioso e determina a continuidade do processo de desmineralização.

22

Paciente de 3 anos é levado por seus pais para atendimento odontológico de urgência após sofrer traumatismo em boca. Ao exame clínico, foi observada a luxação extrusiva do elemento 5.1 e a luxação lateral do elemento 6.1. Em relação a esse caso clínico e às possíveis consequências, assinale a alternativa correta.

- (A) Casos de fraturas transversais no terço médio ou apical apresentam prognóstico mais favorável. Nesses casos, a observação e o controle são sempre a primeira opção de tratamento.
- (B) Para verificar a presença de fraturas e deslocamentos, bem como a presença de agentes estranhos, a melhor técnica radiográfica nessa idade é a técnica periapical, que oferece melhores detalhes.
- (C) Em casos de fratura cervical, a conduta mais racional e com melhor prognóstico é a esplintagem rígida por um período de 30 a 45 dias.
- (D) Para o controle da dor em crianças, recomenda-se a dipirona, em dose de 15 mg/Kg, com intervalos de 6 horas entre cada administração.
- (E) O anestésico mais bem indicado em casos como o descrito é a articaína 4%, devido ao seu poder de penetração em tecidos ósseos e baixos efeitos adversos.

23

As precauções e o isolamento de pacientes baseados na transmissão de infecções são indicados para interromper ou reduzir o risco de transmissão de microrganismos nos ambientes de saúde. Uma recomendação que é válida para todos os tipos de precaução baseada em transmissão é

- (A) o uso de touca.
- (B) a utilização de filtros HEPA nos ambientes assistenciais de saúde.
- (C) a desinfecção das superfícies próximas ao paciente utilizando o quaternário de amônia de 5ª geração.
- (D) a correta identificação dos pacientes e de sua condição de saúde.
- (E) a higienização das mãos.

24

No Sistema Único de Saúde (SUS), a odontologia operava de forma isolada, mas a integração entre serviços trouxe melhorias tanto nos diagnósticos quanto nos tratamentos, o que foi essencial para aumentar a eficácia das intervenções e assegurar atendimentos mais precisos. Ao considerar a execução do plano de tratamento odontológico, são priorizados procedimentos conforme a necessidade clínica do paciente, orientando-o sobre cuidados e possíveis intercorrências durante o tratamento. Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta a porta de entrada pela qual o SUS proporciona a integralidade na atenção à saúde, inclusive odontológica.

- (A) Estratégia Saúde da Família.
- (B) Centro de Especialidades Odontológicas.
- (C) Política Nacional de Saúde Bucal.
- (D) Redes de Atenção de Serviços Integrados de Consórcios Intermunicipais (SEVICI).
- (E) Programa de pré-triagem em Atenção Primária em Saúde.

25

Paciente de 17 anos de idade busca atendimento devido a abscesso no elemento 4.7. Ao realizar o exame clínico, percebe-se enfartamento ganglionar e presença de febre. Devido a esses sintomas, o clínico decide realizar a prescrição de antibioticoterapia. Considerando a presença de bactérias anaeróbias nos abscessos, assinale a alternativa que apresenta o antibiótico com melhor atividade contra esse grupo de bactérias.

- (A) Amoxicilina.
- (B) Metronidazol.
- (C) Cefalosporinas de 1ª e 2ª geração.
- (D) Cefalosporinas de 4ª geração.
- (E) Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração.

26

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) conta com 19 comissões intersetoriais que acompanham e fiscalizam as ações e os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e tem como objetivo ampliar a participação social. Cada comissão é composta por até 36 membros, entre titulares e suplentes, indicados pelo CNS, com representações de gestores(as), trabalhadores(as) e usuários(as) do SUS. Entre as comissões, encontra-se a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB), a qual se caracteriza por ser uma

- (A) comissão consultiva e deliberativa.
- (B) comissão composta de forma paritária nacionalmente com responsabilidade deliberativa.
- (C) comissão intersetorial, pois mobiliza o ente federal, estadual e municipal.
- (D) comissão que propõe, autoriza e acompanha políticas públicas.
- (E) comissão consultiva e não deliberativa.

27

Paciente de 27 anos, sexo masculino, usuário de cigarro eletrônico, apresenta-se para consulta odontológica de rotina. Ao exame clínico, é observada uma lesão branca em palato. Considerando que várias são as hipóteses diagnósticas que podem ser levantadas, quanto às desordens orais potencialmente malignas, assinale a alternativa correta.

- (A) Desordens orais potencialmente malignas representam um grupo heterogêneo de condições clinicamente definidas associadas a um risco alto de progressão para o carcinoma espinocelular oral.
- (B) A desordem oral potencialmente maligna mais prevalente no mundo é a eritroplasia, com prognóstico ruim.
- (C) Leucoplasia é a denominação dada a qualquer elevação de mucosa, ainda que seja resultante da colonização por *Candida*.
- (D) O uso frequente do tabaco sem fumaça causa uma placa branca bucal distinta chamada queratose do tabaco sem fumaça, que geralmente exibe um risco muito baixo de transformação maligna.
- (E) A etiologia da leucoplasia está bem definida, com o tabaco e o álcool sendo fortemente relacionados à patologia, de forma conjunta ou isoladamente.

28

Uma variedade de doenças pode levar à disfunção hepática e a uma coagulopatia concomitante. Portanto, o sangramento é uma preocupação para os cirurgiões-dentistas quando os pacientes com doenças hepáticas requerem procedimentos invasivos. Além disso, a utilização de medicamentos e de anestésicos locais também requer cuidados. Referente ao atendimento a esses pacientes, assinale a alternativa correta.

- (A) Antes de procedimentos cirúrgicos, como exodontias, o cirurgião-dentista deve solicitar um hemograma completo, com contagem de plaquetas, o que já permite prever como será sua cicatrização.
- (B) A articaína deve ser evitada para pacientes com problemas hepáticos devido à sua metabolização.
- (C) Drogas como o metronidazol, anti-inflamatórios não esteroides e analgésicos opioides devem ser evitadas ou prescritas com cautela.
- (D) É prudente considerar a prescrição de benzodiazepínicos para os pacientes com comprometimento da função hepática, minimizando a possibilidade de episódios de ansiedade. O diazepam é o benzodiazepínico de escolha nesses casos.
- (E) Hipergeusia é uma manifestação frequente no paciente com disfunção hepática, assim como a presença de língua fissurada e língua geográfica.

29

Paciente de 72 anos se apresenta para tratamento odontológico. Ao exame clínico, observa-se a presença de uma lesão em palato duro, de coloração arroxeadada, sendo a pigmentação difusa (ou seja, com bordos mal delimitados). O paciente não relata dor e radiograficamente o aspecto da lesão é de destruição irregular (“roído de traças”). Após a realização da biópsia, o diagnóstico foi de melanoma da mucosa oral. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O melanoma de mucosa oral é bem menos agressivo do que o melanoma cutâneo, com taxas de sobrevida acima de 5 anos.
- (B) Óbito decorrente do melanoma de mucosa oral geralmente é em decorrência de metástases à distância.
- (C) Pacientes que apresentam lesões amelanóticas têm um prognóstico melhor do que os pacientes com lesões pigmentadas.
- (D) Lesões maculares têm prognóstico pior que as lesões nodulares.
- (E) A conduta terapêutica em casos de melanoma mucoso consiste em radioterapia e quimioterapia. Em casos mais agressivos, está indicada a ressecção cirúrgica.

30

Com base na avaliação das condições de oclusão dentária realizada no Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal, SB Brasil 2023, assinale a alternativa que apresenta o índice utilizado para a dentição permanente.

- (A) Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico.
- (B) Malalignment Index.
- (C) Dental Aesthetic Index (DAI).
- (D) Handcapping Labio-Lingual Deviations (HLD).
- (E) Occlusion Feature Index.

31

A Lei Complementar nº 323/2006 estabeleceu a estrutura de carreira, reestruturou o sistema de remuneração e dispôs sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Sobre essa lei, assinale a alternativa correta.

- (A) As gratificações atribuídas aos servidores que atuam nos serviços de psiquiatria e infectologia das diversas unidades hospitalares serão o adicional de periculosidade, de insalubridade e de risco de vida, e essas gratificações são mantidas mesmo quando o servidor estiver em licença para tratamento de saúde.
- (B) A única forma de o servidor conquistar a modalidade de progressão por qualificação ou desempenho profissional é através da realização de horas de capacitação.
- (C) A progressão por tempo de serviço consiste na passagem do servidor de uma referência para a imediatamente superior no respectivo cargo e ela ocorre a cada três anos.
- (D) O exercício de sobreaviso será feito através de escala elaborada pela chefia imediata. Sobreaviso refere-se à permanência do servidor em seu posto de trabalho a postos para atendimentos emergenciais que se fizerem necessários.
- (E) A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina é de 30 horas semanais e deverá ser cumprida exclusivamente em regime de 6 horas diárias de segunda a sexta-feira.

32

Paciente de 11 anos, sexo feminino, é levada por sua mãe para iniciar o tratamento odontológico. Questionada a respeito de ter algo que a incomode, a paciente respondeu que há uma bolhinha, semelhante a uma bexiguinha, que aparece e desaparece de tempos em tempos na face lingual do lábio inferior. Apesar de o dentista examinar, não pôde observar nenhuma lesão no local naquele momento. A criança disse que realmente fazia algumas semanas que não aparecia. Questionada pelo dentista, ela disse que tem o hábito de morder o lábio inferior, principalmente na época das provas escolares (o que tinha ocorrido há mais ou menos um mês). Considerando as informações mencionadas, é correto afirmar que essa lesão provavelmente é um(a)

- (A) hiperplasia fibrosa.
- (B) lipoma.
- (C) rânula.
- (D) hemangioma ou malformação vascular.
- (E) mucocele.

33

Bom conhecimento anatômico e conhecimento e cumprimento das normas de biossegurança são fundamentais para evitar acidentes e complicações em cirurgia oral menor. A respeito de acidentes e complicações em cirurgia oral menor, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A manobra de Valsava é indicada para estabelecer o diagnóstico da comunicação buccossinusal.
- () Em abscessos palatinos que se localizam no primeiro molar superior, a incisão deve ser feita no sentido transversal e não anteroposterior.
- () Após um procedimento cirúrgico para exodontia do terceiro molar inferior, se o paciente relatar sensação de formigamento, comichão, dormência, ardor, inchaço ou sensibilidade dolorosa na língua, o profissional deve desconfiar que houve trauma ou secção no nervo lingual.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – F.

34

Paciente de 42 anos, sexo masculino, trabalhador da construção civil, passou por um procedimento de exodontia do primeiro pré-molar superior esquerdo devido à fratura envolvendo coroa e raiz. Sobre as orientações que esse paciente deve receber após o procedimento cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve ser orientado a fazer repouso pelo maior tempo possível apenas no primeiro dia pós-exodontia.
- (B) Atividades físicas e exposição ao sol devem ser evitadas por um período de dois dias.
- (C) Para evitar deslocar o coágulo, o paciente deve evitar ficar tomando água o tempo todo.
- (D) Ao tomar líquidos, o paciente deve dar preferência à utilização de canudos para evitar o deslocamento do coágulo.
- (E) A presença de dor pulsátil e persistente a partir do terceiro dia pós-cirúrgico pode ser um indicativo de desenvolvimento de um quadro de alveolite.

35

A reabsorção dentária é uma enfermidade que determina a reabsorção de dentina, cimento ou ambos, podendo comprometer a manutenção do dente. Sua etiologia é multifatorial e pode ser interna ou externa. Em relação ao exposto, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A reabsorção interna tem como características radiográficas a localização na cavidade pulpar, ter aspecto radiográfico _____, ser _____, apresentar a cavidade pulpar _____ e o periodonto _____.

- (A) regular / simétrica / alterada / normal
- (B) irregular / simétrica / inalterada / normal
- (C) regular / assimétrica / inalterada / alterado
- (D) regular / simétrica / alterada / alterado
- (E) irregular / assimétrica / inalterada / alterado

36

Medidas de controle ambiental são aquelas que visam prevenir a dispersão e reduzir a concentração de partículas infectantes no ambiente dos serviços de saúde. Em consultórios e clínicas de odontologia, essas medidas são muito importantes, visto que os pacientes ficam (praticamente) o tempo todo com a boca aberta e expostos à contaminação do ar. Em odontologia, além dos microrganismos que têm a capacidade de aerossolização, também há a produção de aerossóis pelos equipamentos odontológicos (caneta de alta rotação, jato de bicarbonato e acionamento da seringa tríplice com a utilização simultânea do botão de ar e do botão de água). Assim, para reduzir a concentração de aerossóis contendo partículas infectantes em suspensão nos consultórios, o Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas

- (A) 2 trocas de ar por hora.
- (B) 3 trocas de ar por hora.
- (C) 4 trocas de ar por hora.
- (D) 5 trocas de ar por hora.
- (E) 6 a 15 trocas de ar por hora.

37

É uma anomalia de desenvolvimento na qual o esmalte se projeta em direção à bi ou trifurcação radicular, alterando o contorno da junção amelocementária. Tem importância no desenvolvimento da doença periodontal na área de furca, podendo ser confundida radiograficamente com problema de origem endodôntica. A qual anomalia o enunciado se refere?

- (A) Projeção cervical de esmalte.
- (B) *Dens in dente*.
- (C) Pérola de esmalte.
- (D) *Dens evaginatus*.
- (E) Taurodontismo.

38

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, instituiu as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. De acordo com essa RDC, o Núcleo de Segurança do Paciente deve fazer a notificação dos eventos adversos ocorridos no serviço de saúde que integra. Essa notificação deverá ser feita a qual órgão?

- (A) Conselho Regional e Federal ao qual o profissional pertence.
- (B) Secretaria Municipal de Saúde.
- (C) Secretaria Estadual de Saúde.
- (D) Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- (E) Vigilância Epidemiológica.

39

Paciente vivendo com HIV apresenta-se para tratamento odontológico. Relata que sua imunidade está um pouco baixa e que percebeu uma espécie de "grosseirão" na mucosa da gengiva inferior. Ao consultar seu exame de contagem de linfócitos CD4, o dentista verifica que está em 320 células por mm³ de sangue. Ao realizar o exame clínico, percebe, na mucosa gengival da mandíbula, em região de canino e pré-molares do lado direito, que a junção mucogengival não está visível devido à presença de uma placa avermelhada e granular. O diagnóstico presuntivo é de candidose eritematosa. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Em indivíduos saudáveis, a candidose raramente se manifesta na gengiva.
- () A nistatina pode ser utilizada neste caso como suspensão oral, porém, se fosse uma gestante no terceiro trimestre gestacional, não deveria ser prescrita.
- () Outra condição clínica, o eritema linear gengival, também é resultado da infecção por *Candida*, mas espécies bacterianas observadas em periodontites convencionais também podem estar presentes.

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

40

Ao realizar o exame clínico da cavidade bucal para determinar o plano de tratamento, em algumas situações, o paciente já perdeu vários dentes e há dúvidas em relação à qual molar superior está presente. Para poder fazer essa diferenciação, algumas considerações anatômicas devem ser feitas. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do segundo molar permanente superior.

- (A) Presença do tubérculo de Carabelli associada à cúspide mesiopalatina.
- (B) Cúspides mesiais muito maiores que as distais.
- (C) Face palatina maior em relação à face vestibular.
- (D) Presença de ponte de esmalte proeminente entre as cúspides mesiolingual e distovestibular.
- (E) Sulco ocluso-palatino longo e profundo, alcançando o centro da face lingual e transformando-se em uma depressão reta, rasa e larga que se continua pela raiz lingual.

41

Acompanhamos pelas mídias, de tempos em tempos, a solicitação de compra ou de inclusão de novos medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS, inclusive através de medidas judiciais. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, são atribuições

- (A) do Conselho Nacional de Saúde, assessorado por um comitê formado por representantes dos Conselhos Federais de Medicina e de Farmácia.
- (B) da Associação Médica Brasileira, com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.
- (C) do Conselho Federal de Medicina, com apoio de representantes das principais Instituições de Ensino do país.
- (D) da Diretoria de Vigilância em Saúde.
- (E) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

42

Uma das Diretrizes do SUS pressupõe a continuidade da relação de cuidado com a construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. O enunciado refere-se à Diretriz do SUS denominada

- (A) Regionalização.
- (B) Resolutividade.
- (C) Longitudinalidade.
- (D) Coordenação do cuidado.
- (E) Ordenação das Redes de Atenção.

43

Uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) da Unidade Básica de Saúde (UBS) vai realizar atividades na escola de sua área de abrangência, pactuada no Programa Saúde na Escola (PSE). O PSE é um programa intersetorial da Saúde e da Educação do qual todos os municípios podem participar. Os profissionais da ESB elegeram uma creche pública de sua área de abrangência para iniciar essa atividade. Sobre essa atividade, assinale a alternativa correta.

- (A) Considerando o tipo de atividade que será realizada, envolvendo um ou dois Ministérios, como o da Educação e o da Saúde, ela é considerada no 1º nível de aplicação, que é o de ação governamental ampla.
- (B) Considerando que a faixa etária das crianças que frequentam as creches no Brasil é de 0 a 3 anos de idade, não há indicação para a utilização de dentifrício fluoretado para as crianças, pelo risco de fluorose.
- (C) Nessa atividade, deve ser feita a evidenciação de placa, a orientação de higiene bucal, a escovação dental supervisionada e o bochecho com fluoreto de sódio (NaF 0,5%) ao final das atividades.
- (D) Nas crianças com lesão de cárie ativa, uma boa opção de tratamento é a aplicação do cariostático, que não requer a remoção do tecido cariado para ser aplicado e é de baixo custo. O verniz fluoretado tem a mesma efetividade, porém custo maior, o que torna o cariostático a primeira opção de tratamento.
- (E) Caso o cirurgião-dentista identifique lesões de cárie cavitadas, que possam ser abertas com o uso de instrumentos manuais, deverá realizar o tratamento restaurador atraumático, considerado uma opção de manejo da cárie dentária capaz de produzir restaurações, em muitos casos, tão duradouras quanto as de amálgama.

44

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), e a Lei Federal nº 8.080/1990 regulamentou o seu funcionamento. Dentre os princípios doutrinários do SUS, um deles refere-se ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema. Qual é esse princípio?

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Descentralização político-administrativa dos serviços.
- (D) Integralidade.
- (E) Regionalização e Hierarquização dos serviços prestados.

45

Paciente de 19 anos de idade, sexo masculino, retorna para dar continuidade ao tratamento odontológico após realizar a cirurgia para exodontia do terceiro molar inferior esquerdo no Centro de Especialidades Odontológicas. Ele se queixa que, após a cirurgia, ficou com um formigamento na metade da língua do lado esquerdo. Casos de parestesia não são incomuns após exodontias complicadas de terceiros molares inferiores. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Todos os anestésicos locais podem causar lesão do nervo, pois eles são neurotoxinas.
- () Em alguns casos, a perda de sensibilidade (parestesia) não é a manifestação clínica da lesão nervosa, podendo ocorrer também a hiperestesia (sensação dolorosa desencadeada por estímulos geralmente não nocivos) e a disestesia (sensibilidade aumentada a estímulos nocivos).
- () Casos de parestesia não são incomuns depois da administração anestésica.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

46

Desordens potencialmente malignas que acometem a boca são alterações que apresentam aproximadamente 4,5% de prevalência na população mundial. Assinale a alternativa que contém uma condição que NÃO é considerada uma desordem potencialmente maligna.

- (A) Penfigoide das membranas mucosas.
- (B) Eritroplasia.
- (C) Queilite actínica.
- (D) Lesão liquenoide.
- (E) Atrofia por deficiência de ferro.

47

O Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar foi estabelecido no âmbito do Sistema Único de Saúde para regulamentar o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- () Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, exclusivamente, os procedimentos médicos, de enfermagem e de assistência social.
- () O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão exclusivamente nos níveis da medicina preventiva e terapêutica.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

48

Paciente de 3 anos e 7 meses de idade, sexo masculino, é levado por sua avó para tratamento odontológico de urgência. A criança tem temperamento difícil, mora com os pais, mas passa o dia com a avó, pois seus pais trabalham fora. A avó relata que levou a criança nesse dia, pois os pais não conseguiram dormir devido a queixas da criança durante a noite relacionadas à dor de dente. Ao exame físico, foi constatado que o primeiro molar inferior esquerdo apresentava cárie profunda, além de vários outros dentes apresentarem lesões de cárie envolvendo dentina e com coloração amarelada. A higiene bucal era deficiente, e a avó relatou alto consumo de alimentos açucarados. Considerando esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O cirurgião-dentista deve fazer as orientações para a avó sobre questões relacionadas à higiene bucal e ao consumo de açúcares, prescrever medicação para a dor, mas não deve intervir clinicamente, já que os pais não estão presentes para autorizar o tratamento.
- (B) Considerando a dificuldade para o tratamento dessa criança, a melhor opção é o tratamento restaurador atraumático no elemento 7.4 com cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável.
- (C) Em casos em que durante a execução do tratamento restaurador atraumático houver a possibilidade de exposição pulpar, porém sem sintomatologia clínica e/ou radiográfica indicativa de comprometimento pulpar, é possível deixar a dentina amolecida na parede de fundo.
- (D) O cirurgião-dentista deve considerar a realização da técnica de ART em outra sessão para os outros dentes cavitados dessa criança. Para sua realização, é necessária a utilização de curetas sem corte para evitar a remoção excessiva de dentina e a exposição pulpar.
- (E) Em outra sessão, considerando que o cirurgião-dentista opte por realizar o tratamento restaurador atraumático, ele não deverá utilizar a anestesia, pois sua utilização descaracteriza a técnica de ART e contribui para piorar o comportamento infantil.

49

No último levantamento de saúde bucal realizado no Brasil (SB Brasil 2023), a avaliação da condição periodontal utilizou o Índice Periodontal Comunitário (CPI). Esse índice permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e presença de cálculo ou bolsa e é obtido por meio da sondagem do sulco gengival ou bolsa periodontal de seis pontos em cada um dos dentes índices. Assinale a alternativa que apresenta esses dentes índices avaliados no CPI no último levantamento de saúde bucal brasileiro.

- (A) No CPI, são avaliados os primeiros e segundos molares permanentes, além do incisivo central superior direito e incisivo central inferior esquerdo.
- (B) Os dentes índices avaliados são: 16, 26, 36, 46, 11 e 31.
- (C) Os dentes índices avaliados são os segundos molares permanentes, além dos incisivos centrais superior e inferior do lado direito.
- (D) Os dentes índices avaliados são os segundos molares permanentes, além dos incisivos centrais superior e inferior do lado esquerdo.
- (E) No CPI, os dentes índices avaliados são os primeiros e segundos molares permanentes, além dos incisivos centrais superior e inferior do lado direito.

50

A segurança do paciente diz respeito ao direito de toda pessoa de receber cuidados de saúde sem sofrer danos evitáveis. Isso significa que os serviços de saúde devem estar organizados para prevenir falhas, identificar riscos com antecedência e corrigir problemas de forma rápida e eficaz. O Programa Nacional de Saúde do Paciente (PNSP) fundamenta-se em princípios e diretrizes que incluem, entre outros, o estímulo à participação dos pacientes e familiares. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um item considerado importante para melhorar a segurança dos pacientes.

- (A) Evitar a divulgação de erros ocorridos no atendimento aos pacientes para evitar constrangimentos e insegurança por parte dos pacientes.
- (B) Evitar todo tipo de burocracia no serviço, como os Termos de Consentimento Informado, que apenas confundem os pacientes e atrasam a prestação de atendimento.
- (C) O prontuário médico deve ser reservado à equipe de saúde, que deverá anotar apenas o essencial, evitando o acúmulo de informações desnecessárias.
- (D) A grande mídia deve ser utilizada para informar os cidadãos de que eles podem e devem solicitar aos profissionais da saúde que lavem as mãos antes de examinar ou realizar um procedimento ou saber se o medicamento que está sendo administrado é o correto.
- (E) Os pacientes devem ser lembrados da autonomia do médico sobre as decisões na saúde e que sua conduta não depende da autorização de pessoas que não têm formação técnica na área.

51

Os fluoretos são os principais responsáveis pelo declínio da cárie dentária em países desenvolvidos e no Brasil. No Brasil, a base dos sistemas de prevenção de cárie, segundo a lógica de associação de métodos, assenta-se na associação

- (A) da água fluoretada com os dentifrícios fluoretados.
- (B) dos dentifrícios fluoretados associados à aplicação semestral do gel fluoretado.
- (C) do gel fluoretado associado aos bochechos semanais com flúor (NaF 0,5%).
- (D) da água fluoretada com os bochechos semanais fluoretados (NaF 0,2%).
- (E) do gel fluoretado associado ao uso de materiais restauradores liberadores de flúor.

52

Gestante com 14 semanas de gestação apresenta-se para tratamento odontológico, referindo dor no segundo molar superior direito há alguns dias. Por recear o tratamento odontológico nesse período, evitou buscar o atendimento, mas agora a medicação que estava utilizando já não surte efeito. O cirurgião-dentista, após realizar a anamnese, realiza o exame físico, mas considera necessária a realização de uma radiografia periapical para conseguir fechar o diagnóstico, mas a gestante está insegura em realizar a radiografia. Qual é a dose de radiação que um feto recebe em uma tomada radiográfica quando a gestante está utilizando avental de chumbo e colar cervical e são empregados filmes ultrarrápidos?

- (A) 50 mGy.
- (B) 5 mGy.
- (C) 0,5 mGy.
- (D) 0.01 mGy.
- (E) 0,0001 mGy.

53

Resíduos de saúde são os resíduos gerados em estabelecimento caracterizado como serviço de saúde ou naquele que, embora de interesse à saúde, não tenha suas atividades vinculadas diretamente à prestação de assistência à saúde humana ou animal. Assinale a alternativa que apresenta um resíduo que pode ser descartado como resíduo comum (grupo D).

- (A) Gaze contendo pequena quantidade de sangue utilizada para conter sangramento pós-exodontia de dente decíduo.
- (B) Luvas com a presença de saliva.
- (C) Filmes de raios X.
- (D) Lâminas de bisturi utilizadas apenas para o acabamento de restaurações de resina composta.
- (E) Dentes decíduos extraídos no consultório odontológico.

54

A respeito do Planejamento e do Orçamento do Sistema Único de Saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal ao nível municipal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, Estados, do Distrito Federal e da União.
- () Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- () Subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa só serão possíveis quando não houver nenhuma outra sem finalidade lucrativa que possa desempenhar as mesmas atividades.
- (A) V – V – V.
 (B) F – F – V.
 (C) V – V – F.
 (D) F – V – F.
 (E) F – F – F.

55

Cirurgião-dentista em atendimento a uma senhora de 72 anos de idade perfura seu dedo com a cureta periodontal, sendo que havia sangue na cureta no momento do acidente. Ele se levanta e faz a higiene das mãos com água e sabonete durante 15 segundos e retorna para finalizar o procedimento. O acidente ocorreu em uma quinta-feira no final do expediente, era véspera de feriado e ele havia marcado uma viagem para o mesmo dia. Considerando que essa senhora era uma pessoa de seu círculo de relacionamentos, ele não buscou atendimento no dia do acidente. Na segunda-feira, no entanto, estava arrependido e foi buscar atendimento para receber a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), mas não conseguiu contato com essa senhora para que ela fosse junto realizar a testagem. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Considerando o perfil da paciente e o fato de ela não estar disponível para ir com ele realizar a testagem, não haveria indicação de realizar a PEP.
- (B) Devido ao tempo transcorrido, mais de 72 horas, não há mais indicação para a realização da PEP.
- (C) Apesar de não ter ido buscar o atendimento no dia, ele agiu corretamente ao parar o atendimento, realizar a higiene das mãos durante 15 segundos e só então retomar os procedimentos que estava realizando.
- (D) Como a pele do profissional estava íntegra no momento do acidente, não havia risco de transmissão do HIV, mesmo com a perfuração ocorrida.
- (E) O profissional deve ser avaliado quanto às hepatites virais e, apesar de não haver tempo para a profilaxia, deverá ser acompanhado durante 6 meses.

56

O exame radiográfico é o principal exame complementar de diagnóstico para o cirurgião-dentista, considerando o diagnóstico de alterações bucais. Para conseguir avaliar de forma adequada as imagens radiográficas, o dentista precisa considerar alguns princípios, um deles refere-se a quanto conseguimos separar nas imagens radiográficas as diferentes estruturas. Assinale a alternativa que apresenta a denominação desse princípio.

- (A) Densidade radiográfica.
 (B) Contraste radiográfico.
 (C) Nitidez radiográfica.
 (D) Radiolucidez.
 (E) Distorção radiográfica.

57

Considerando aspectos da cariologia relacionados à prevenção sob o aspecto da Odontologia baseada em evidências, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de dentifrícios com baixa concentração de fluoretos reduz o risco da cárie dentária ao mesmo tempo em que reduz o risco de fluorose esteticamente indesejável.
- (B) O uso do dentifrício com fluoreto na prevenção e controle da cárie dentária é um dos tópicos com maior evidência científica na área da Odontologia.
- (C) Dentifrícios com baixa concentração de fluoretos devem ser considerados para uso em crianças menores, pois, mesmo que sejam ingeridos em alta quantidade, não contribuem para o desenvolvimento de fluorose.
- (D) É recomendado que as crianças aguardem ao menos 15 minutos antes de escovar os dentes após se alimentarem para reduzir a abrasividade dentária.
- (E) A quantidade de dentifrício que deve ser utilizada por crianças até 3 anos de idade é o equivalente a um grão de ervilha (aproximadamente 0,3 g).

58

Em 2006, teve início o Programa Telessaúde Redes, uma iniciativa do SUS contemplada na Lei nº 8.080/1990. Sobre essa modalidade de atendimento no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telessaúde, terão validade apenas no estado em que este tenha o registro de seu conselho de classe.
- (B) A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal.
- (C) O paciente tem o direito à recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- (D) Compete aos conselhos federais de fiscalização do exercício profissional a normatização ética relativa à prestação de serviços previstos nessa modalidade de atendimento.
- (E) A prática da telessaúde requer o consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal.

59

Para se estabelecer o plano de tratamento odontológico e alcançar o sucesso, deve-se realizar um perfeito exame do paciente e um diagnóstico preciso. O exame não se limita apenas à verificação de lesões da cavidade bucal, sendo de extrema importância o primeiro contato com o paciente, com a aplicação da anamnese. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e o tratamento para um dente que apresenta lesão de cárie profunda atingindo a polpa (observado radiograficamente), que ainda está vital, porém sem queixas de dor dentária.

- (A) Pulpite reversível / acompanhamento.
- (B) Pulpite reversível / capeamento pulpar direto.
- (C) Pulpite irreversível assintomática / pulpotomia parcial.
- (D) Pulpite irreversível assintomática / tratamento endodôntico radical (pulpectomia).
- (E) Pulpite reversível assintomática / acompanhamento.

60

Paciente de 19 anos de idade busca atendimento odontológico com queixa de dor relacionada aos terceiros molares, tendo sido solicitada uma radiografia panorâmica para fazer seu encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Na radiografia, observa-se que os dois terceiros molares superiores se apresentam anormalmente pequenos, tratando-se, portanto, de um caso de microdontia. Considerando essa condição, assinale a alternativa que apresenta o estágio de desenvolvimento do dente envolvido e o possível fator etiológico relacionado.

- (A) Estágio de capuz / hereditário.
- (B) Estágio de campânula / disfunção endócrina.
- (C) Estágio de iniciação / exposição à radiação excessiva.
- (D) Estágio de capuz / pressão sobre a área.
- (E) Estágio de broto / disfunção endócrina.

