



T0589022N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

ODONTÓLOGO

ODONTOLOGIA HOSPITALAR

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto NÃO poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto AOCP, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- () No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- () Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

Raciocínio Lógico

6

Se x e y são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de $\frac{x+8y}{x-y}$ é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

15

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

Conhecimentos Específicos

16

Para realizar um tratamento odontológico adequado, é fundamental que o diagnóstico das condições de saúde do paciente seja estabelecido corretamente, e isso só é possível a partir de um exame clínico bem conduzido. Após a realização da anamnese, devem ser feitos o exame físico com a avaliação dos sinais vitais, o exame do sistema estomatognático e os exames complementares. Em relação ao hemograma, qual é o significado do termo pancitopenia?

- (A) O termo refere-se à redução do total de hemácias, de hemoglobina, do VCM e do RDW, ou seja, refere-se à redução de todos os índices hematimétricos.
- (B) Pancitopenia é a presença de eritrócitos e de leucócitos imaturos no sangue.
- (C) Pancitopenia é o termo dado à redução de hemácias com aumento de leucócitos no sangue.
- (D) A pancitopenia é um quadro em que ocorre a redução de hemácias, leucócitos e plaquetas ao mesmo tempo.
- (E) O termo refere-se à redução do número de proteínas citoplasmáticas das células endoteliais, comprometendo a cascata de coagulação.

17

Um bebê é levado às pressas por seus pais ao pronto atendimento hospitalar. Questionados a respeito do ocorrido, os pais relatam que a criança estava brincando com sua irmãzinha quando colocou uma xícara de brinquedo na boca e, acidentalmente, a engoliu. Eles notaram que o bebê está com dificuldade para respirar e o levaram ao pronto atendimento, pois não conseguiram remover o objeto. Trata-se de um caso de obstrução grave de vias aéreas por corpo estranho. Qual é a melhor manobra a ser realizada em casos assim?

- (A) Realizar a compressão abdominal (manobra de Heimlich) para conseguir a expulsão do corpo estranho.
- (B) Devem ser executados ciclos repetidos de 5 golpes nas costas alternados com 5 compressões torácicas até que o objeto seja expelido ou o bebê fique inconsciente.
- (C) Devem ser executados ciclos repetidos de 3 compressões abdominais alternados com 2 golpes nas costas até que o objeto seja expelido ou o bebê fique inconsciente.
- (D) Deve ser realizada a compressão abdominal por 3 vezes seguidas e, caso o objeto não seja expelido, realizar golpes nas costas (10 vezes). As manobras deverão ser repetidas até que o objeto seja expelido.
- (E) Realizar apenas compressões torácicas até que o objeto seja expelido.

18

Para garantir a segurança e a saúde no trabalho em ambiente hospitalar, é imprescindível que o trabalhador utilize adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Após a utilização, desde que não apresentem sinais ou suspeita de contaminação química, biológica ou radiológica, os EPI deverão ser segregados de acordo com sua classificação por grupos e descartados como resíduos do grupo

- (A) A1.
- (B) A2.
- (C) A3.
- (D) A4.
- (E) D.

19

Ao realizar o exame clínico odontológico de um senhor de 49 anos de idade, internado em Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, observa-se que o primeiro molar inferior esquerdo apresenta grande mobilidade e drenagem purulenta espontânea via sulco gengival, com um linfonodo submandibular aumentado. Em relação às características dos linfonodos, assinale a alternativa que apresenta características consideradas típicas em casos como o descrito.

- (A) Consistência fibrosa, móvel, dolorido, quente.
- (B) Consistência firme, fixo, dolorido, quente.
- (C) Consistência pétreia, móvel, indolor, quente.
- (D) Consistência pétreia, fixo, indolor, frio.
- (E) Consistência fibrosa, móvel, dolorido, frio.

20

Aproximadamente um terço das infecções adquiridas em ambiente hospitalar tem origem na Unidade de Terapia Intensiva. A respeito do controle de infecções em Odontologia Hospitalar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Considerando os riscos aumentados de propagação de infecções em UTI, os produtos para saúde passíveis de processamento, independentemente da sua classificação de risco, devem ser submetidos ao processo de limpeza dentro da própria UTI, em pia designada especialmente para essa finalidade.
- () Para garantir a eficiência da limpeza manual, a fricção dos instrumentais utilizados em ambiente hospitalar deve ser feita com acessórios abrasivos, mas que não liberem partículas.
- () A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio da inspeção visual com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem de, no mínimo, três vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

21

A presença de cálculo dentário é comum em pacientes internados em hospitais e dificulta a limpeza adequada dos dentes, favorecendo o acúmulo de biofilme nos dentes. A remoção do cálculo através de procedimentos de raspagem e alisamento radicular pode deixar os dentes sensíveis. Para reduzir a sensibilidade, dentifrícios com diferentes tipos de aditivos ou combinações podem ser utilizados, apresentando evidências de superioridade na redução da sensibilidade, em relação ao dentifrício fluoretado convencional. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Dentifrícios contendo citrato de potássio (0,5%) são a melhor indicação nesses casos.
- (B) Dentifrícios obliteradores de ação imediata, como os que contêm 8% de arginina/carbonato de cálcio associados aos sais de zinco, são boas indicações nesses casos.
- (C) Os dentifrícios com agentes dessensibilizantes com ação neural são os mais indicados nesses casos, como os dentifrícios à base de fosfosilicato de cálcio e sódio.
- (D) Dentifrícios à base de nitrato de potássio (5%) e fluoreto de sódio (1.450 ppm) em base de sílica são a melhor indicação para reduzir a sensibilidade após procedimentos de raspagem e alisamento radicular.
- (E) Dentifrícios de ação neural, como os dentifrícios à base de acetato de estrôncio, são os mais indicados, principalmente quando aliados a nanopartículas de hidroxiapatita, que prolongam seu efeito dessensibilizante.

22

Paciente que será submetido à radioterapia em região de cabeça foi encaminhado à equipe de odontologia hospitalar para avaliação de suas condições de saúde bucal e para os tratamentos necessários. Será utilizada uma dose cumulativa de radiação acima de 40 Gy. Após exame clínico e radiográfico, foi constatada necessidade de intervenção apenas no elemento 45, que, embora não apresentasse vitalidade pulpar, apresentava sintomatologia dolorosa e sem radiolucidez. Nesse caso, qual é o tratamento mais indicado?

- (A) A exodontia é o único tratamento indicado nesse caso e deve ser realizada em até 14 dias antes da radioterapia.
- (B) O tratamento endodôntico combinado ao tratamento periodontal é a melhor indicação nesse caso e deve ser realizado em até 14 dias antes da radioterapia.
- (C) Pode ser feito o tratamento endodôntico ou a exodontia em até 21 dias antes da radioterapia.
- (D) A exodontia é o único tratamento possível e deve ser realizada 60 dias antes da radioterapia, pelo risco de osteorradionecrose.
- (E) O melhor tratamento nesse caso é o tratamento endodôntico, que deve ser realizado após a finalização da radioterapia.

23

Pacientes internados em hospitais muitas vezes não conseguem se comunicar adequadamente. Dessa forma, cuidados adicionais durante procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar devem ser tomados para garantir que o desconforto com a anestesia local seja o mínimo possível e que a técnica anestésica seja a mais adequada possível. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Anestésicos tópicos podem provocar a anestesia de uma área de 2 ou 3 mm da mucosa, reduzindo o desconforto da penetração da agulha.
- (B) Para garantir o efeito desejado do anestésico tópico, é recomendado que ele seja aplicado em mucosa seca e deixado em contato por um tempo mínimo de 1 a 2 minutos.
- (C) Ao realizar a punção da mucosa, os tecidos devem ser pouco tensionados, pois tecidos mais frouxos no momento da punção permitem que a agulha penetre com o mínimo de resistência.
- (D) Orienta-se que a agulha seja introduzida gradualmente para que os tecidos sejam anestesiados antes da penetração da agulha. Assim, após depositar o anestésico, deve-se aguardar 2 ou 3 segundos para avançar a agulha novamente.
- (E) A injeção lenta do anestésico impede que a solução dilacere o tecido em que está sendo depositada. Ela é definida como o depósito de 1 mL da solução anestésica local em não menos que 60 segundos. Portanto, um tubete cheio requer aproximadamente 2 minutos para ser depositado.

24

Em ambiente hospitalar, a equipe de Odontologia é chamada para realizar o atendimento de uma criança de seis anos de idade que pesa 20 quilos. Sua família sofreu um acidente de carro e ela bateu a boca. Está com bastante sangramento na região anterossuperior. Ao exame clínico, percebe-se que houve o deslocamento para vestibular do elemento 51 e o rompimento do freio labial superior. Para realizar esse atendimento, a equipe opta pela técnica anestésica supraperiosteal. Quais são a quantidade máxima de tubetes anestésicos para essa criança e a quantidade recomendada para realizar essa técnica?

- (A) A quantidade máxima de tubetes anestésicos (mepivacaína 3% sem vasoconstrictor) é de 2,5 tubetes, e a quantidade recomendada para essa técnica é de 0,3 mL.
- (B) A quantidade máxima de tubetes anestésicos (mepivacaína 3% sem vasoconstrictor) é de 3,0 tubetes, e a quantidade recomendada para essa técnica é de 0,6 mL.
- (C) A quantidade máxima de tubetes anestésicos (mepivacaína 3% sem vasoconstrictor) é de 3,5 tubetes, e a quantidade recomendada para essa técnica é de 0,6 mL.
- (D) A quantidade máxima de tubetes anestésicos (mepivacaína 3% sem vasoconstrictor) é de 1,5 tubetes, e a quantidade recomendada para essa técnica é de 0,9 mL.
- (E) A quantidade máxima de tubetes anestésicos (mepivacaína 3% sem vasoconstrictor) é de 1,5 tubetes, e a quantidade recomendada para essa técnica é de 0,6 mL.

25

Em alguns procedimentos odontológicos mais invasivos, mesmo em pacientes normalmente cooperativos, pode ser indicada a sedação mínima. A sedação é particularmente útil em pacientes hipertensos, com asma ou com distúrbios convulsivos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Apesar da segurança de uso, os benzodiazepínicos apresentam alta incidência de efeitos adversos, sendo o mais comum deles a depressão respiratória.
- (B) Uma quantidade significativa dos pacientes (10 a 15%) pode apresentar os chamados efeitos paradoxais, ou seja, ao invés da sedação esperada, o paciente apresenta excitação, agitação e irritabilidade.
- (C) A sedação com os benzodiazepínicos é indicada em gestantes para reduzir a ansiedade e os riscos de complicações durante o atendimento. No terceiro trimestre, particularmente, é indicada para reduzir as chances de parto prematuro.
- (D) É preferível a utilização de diazepam ou midazolam em crianças, ao invés de outros agentes sedativos como a prometazina, a hidroxizina e o hidrato de cloral.
- (E) Para idosos, o sedativo mais bem indicado é o midazolam, pois é o que apresenta a menor meia-vida ($t_{1/2}$).

26

Paciente de 42 anos, sexo masculino, internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e submetido à ventilação mecânica deve passar por avaliação pela equipe odontológica. Considerando que a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é a Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) mais recorrente em UTI, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os procedimentos para controle do biofilme peribucal e bucal devem ser iniciados em até 72 horas da admissão do paciente na UTI.
 - () Quando houver a presença de biofilme lingual denso no dorso da língua, este deve ser removido com a utilização de um raspador de língua para permitir sua efetiva remoção.
 - () Após os procedimentos de limpeza, deve ser aplicado no dorso lingual, no palato e na superfície do tubo orotraqueal gel de clorexidina 4% para reduzir nova formação de biofilme.
- (A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – F – V.
(D) F – V – F.
(E) V – F – F.

27

Reduzir ou eliminar os nichos retentivos de biofilme na cavidade bucal é essencial para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde em ambiente hospitalar. Nesse sentido, a técnica denominada ART (Tratamento Restaurador Atraumático) é de grande importância. Assinale a alternativa que apresenta o material mais adequado para a realização dessa técnica.

- (A) CIV convencional.
(B) CIV tipo I.
(C) CIV tipo III.
(D) CIV de alta viscosidade.
(E) CIV reforçado com metal.

28

Paciente de 78 anos, sexo masculino, diagnosticado com doença arterial coronariana, passou por um tratamento de angioplastia com a colocação de um *stent*, o que levou à necessidade de utilização de um antiagregante plaquetário (clopidogrel) para evitar a reestenose da artéria. O paciente apresenta alguns dentes com grande mobilidade devido à doença periodontal e que deverão ser extraídos. Considerando a necessidade de realização das exodontias, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realizar profilaxia antibiótica para esse paciente.
(B) O clopidogrel deve ser suspenso 7 dias antes da realização de cirurgias.
(C) O uso de anestésico local lidocaína 2% com adrenalina é totalmente contraindicado nesse paciente pelo risco de ocorrência de isquemia e arritmia.
(D) Embora o uso de até dois tubetes de anestésicos locais contendo vasoconstrictor (adrenalina 1: 100.000) seja seguro em pacientes com doença arterial coronariana, pode ocorrer aumento significativo da glicemia, o que contraindica seu uso.
(E) O clopidogrel é um antiagregante plaquetário que não precisa ser suspenso quando cirurgias odontológicas serão realizadas, porém, em pacientes que utilizam o AAS, é preciso que seja feita a suspensão 7 dias antes do procedimento cirúrgico.

29

Estudos refutam o tabu de que pessoas com necessidades especiais têm alto limiar de dor, quando, na verdade, o que ocorre é uma capacidade limitada de se comunicar ou de expressar a dor. Para esses pacientes, cirurgiões-dentistas devem adotar regimes analgésicos próprios durante procedimentos odontológicos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Como é difícil para os profissionais conseguirem prever a ocorrência de dor e sua extensão em pacientes com necessidades especiais, o profissional pode terceirizar a prescrição para os responsáveis, que já estão mais acostumados com a manifestação da dor em seus filhos.
- (B) A analgesia preemptiva na anestesia pulpar em paciente com pulpite irreversível pode induzir um efeito superior na anestesia intraoperatória nesses pacientes.
- (C) Para os procedimentos odontológicos eletivos em odontopediatria, os analgésicos mais indicados são o paracetamol e o ibuprofeno. A dipirona não deve ser utilizada pelo risco de ocorrência de agranulocitose e aplasia medular.
- (D) O principal mediador da toxicidade do paracetamol é a N-acetil-p-benzoquinona imina, um produto tóxico do paracetamol. Em crianças, no entanto, há menor produção desse subproduto, e o risco de toxicidade é menor do que em adultos.
- (E) Devido aos efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroides, o cirurgião-dentista pode utilizar os corticosteroides em dose única como alternativa. No entanto, em procedimentos em gestantes, lactantes, hipertensos, diabéticos e nefropatas, esses corticosteroides não devem ser utilizados.

30

A preocupação do cirurgião-dentista quanto ao manejo de eventuais complicações crônicas do diabetes na boca foca a capacidade de reparo tecidual e a resposta do hospedeiro diante de processos infecciosos. Sobre o atendimento odontológico a pacientes diabéticos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É importante a prescrição de antibióticos de forma profilática para pacientes diabéticos para garantir adequado reparo alveolar pós-exodontias.
- () A hipoglicemia é contraindicação absoluta para a execução de qualquer procedimento odontológico.
- () A hiperglicemia só é contraindicada quando existe o risco de cetoacidose diabética ou estado hiperglicêmico hiperosmolar.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

31

Gestantes podem e devem ser atendidas por cirurgiões-dentistas durante todo o período gestacional, no entanto alguns cuidados são necessários. A respeito do atendimento a gestantes, assinale a alternativa correta.

- (A) A diminuição da função neutrofílica e linfocítica torna as gestantes mais suscetíveis à doença periodontal.
- (B) O granuloma piogênico (granuloma gravídico) é uma lesão comum em gestantes e surge geralmente no terceiro trimestre gestacional.
- (C) O anestésico local de escolha para gestantes é a mepivacaína 3% sem vasoconstrictor, pois é o anestésico sem vasoconstrictor que promove maior tempo de analgesia.
- (D) O ibuprofeno é o analgésico e o anti-inflamatório de escolha para gestantes no segundo e no terceiro trimestres de gestação, porém deve ser evitado durante a amamentação.
- (E) Não há restrições para o uso de penicilinas durante a gestação, no entanto as cefalosporinas, a eritromicina e a clindamicina devem ser evitadas devido ao potencial de hepatotoxicidade materna.

32

Na área de neonatologia e maternidade, o cirurgião-dentista pode participar da equipe multidisciplinar que avalia o recém-nascido. Sobre as características e alterações bucais típicas nessa população, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre que for identificada a aparência da ponta da língua em formato de coração está indicada a frenotomia, independentemente de outras características da língua.
- (B) Pérolas de Epstein são a denominação dada a nódulos que se originam da lâmina dentária e se localizam na face vestibular do rebordo de recém-natos. Nódulos de tamanho superior a 2 mm devem ser removidos cirurgicamente, pois interferem na amamentação.
- (C) Dentes natais e neonatais são ocorrência comum. Quando identificados na maternidade, o cirurgião-dentista deve proceder à exodontia precocemente devido ao risco de aspiração.
- (D) A epúlide, tumor benigno dos tecidos moles, congênito, cor rósea (igual à mucosa adjacente), inserido na mucosa alveolar, tem como tratamento de escolha sua ressecção cirúrgica imediata.
- (E) Em bebês com hipotonia, a amamentação deve ser complementada desde o início com mamadeira, evitando a perda de peso nos primeiros dias de vida.

33

Paciente de 42 anos, sexo feminino, fumante, busca atendimento odontológico devido a lesões que observou em mucosa jugal direita e esquerda. Seu avô paterno teve câncer bucal e ela está preocupada com as lesões observadas. Ela revela que está passando por um período de muito estresse e ansiedade devido a um processo complicado de divórcio. Além das lesões em boca, relatou perda de cabelo e presença de pápulas com prurido em superfícies flexoras das extremidades. Ao realizar o exame intrabucal, foram observadas lesões brancas bilateralmente em mucosa jugal posterior, com linhas brancas entrelaçadas. Essas linhas brancas foram identificadas como estrias de Wickham pelo dentista. Questionada sobre sintomatologia dolorosa, a paciente disse que não sente dor; tem apenas medo de que possa ser o início de um câncer bucal. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) As lesões descritas representam a primeira manifestação do líquen plano erosivo. Requerem tratamento à base de corticoides para que não progridam para a forma mais agressiva.
- (B) As estrias de Wickham são patognomônicas do líquen plano reticular. Normalmente nenhum tratamento é necessário para essa patologia.
- (C) Para concluir o diagnóstico dessa condição, é necessária a realização de biópsia. Um epitélio atrófico com infiltrado inflamatório com número significativo de plasmócitos é indicativo de uma lesão penfigoide, cujas características clínicas foram descritas no enunciado.
- (D) Trata-se de uma reação liquenoide causada pelo hábito de fumar. Cessado o hábito, as lesões desaparecerão, deixando, a princípio, uma área eritematosa subjacente, que, com o tempo, desaparecerá.
- (E) As lesões descritas são a manifestação do líquen plano multiforme. Seu tratamento deve ser feito por médicos devido ao comprometimento sistêmico. As lesões da mucosa desaparecerão com o tratamento sistêmico instituído.

34

Artigos para a saúde que são utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados a esses sistemas, são denominados artigos críticos e, para garantir a segurança de seu reuso, devem ser submetidos ao processo de esterilização após a limpeza e demais etapas do processo. Acerca do processo de esterilização, assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME Classe II deve: manter a temperatura ambiente entre 16 e 21 °C; garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²; manter um diferencial de pressão positivo entre os ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 2,5 Pa.
- (B) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado no primeiro ciclo do dia em um pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6).
- (C) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito semanalmente, e a carga só poderá ser liberada para utilização após a leitura negativa do indicador biológico.
- (D) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.
- (E) Não é permitido o uso de embalagens de papel kraft, papel-toalha, papel-manilha e tecido de algodão para a esterilização de produtos que serão utilizados em hospital.

35

Um paciente que está passando por atendimento odontológico em ambiente hospitalar será submetido a múltiplas exodontias; logo após a administração da anestesia local, começou a apresentar loquacidade, aumento de ansiedade, cefaleia latejante, tremores, transpiração, fraqueza, tontura, palidez, espasmos musculares faciais e aumento das frequências respiratória e cardíaca. Trata-se de um caso de sobredosagem de anestésico local. Qual das seguintes condutas NÃO está indicada em casos assim?

- (A) Posicionar o paciente em posição de Trendelenburg.
- (B) Acalmar o paciente e avaliar os sinais vitais.
- (C) Administrar oxigênio por máscara.
- (D) Acionar equipe médica.
- (E) Em caso de pressão sanguínea elevada, administrar um vasodilatador, como a nitroglicerina sublingual.

36

A doença mão-pé-boca é uma infecção comum em todo o mundo, especialmente em crianças. Na maior parte dos casos, a doença é leve e se resolve espontaneamente. Os seres humanos são o reservatório da infecção. A transmissão ocorre principalmente por meio do contato direto com secreções orais e nasais, fluido vesicular e fezes de pessoas infectadas, assim como por meio de gotículas e aerossóis. As lesões orais podem atingir qualquer área da mucosa bucal e seu tamanho varia de 2 mm a mais de 1 cm de diâmetro. Devido à presença de lesões bucais, o dentista é comumente chamado a participar do tratamento dessa condição, particularmente nos casos em que a doença se agrava e a criança precisa de internação hospitalar. Em relação ao diagnóstico e ao manejo dessa condição, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Devido ao alto poder de propagação, recomenda-se o isolamento do paciente, o controle da dor e da febre com analgésicos e antipiréticos e a hidratação adequada.
- () Essa condição é causada por uma enterobactéria e seu tratamento deve ser feito com antibióticos β -lactâmicos durante 10 a 14 dias. Por ser uma condição sistêmica, a prescrição deverá ser feita por médicos.
- () A terapia fotodinâmica antimicrobiana combinada ao uso de laser de baixa potência tem demonstrado resultados bastante satisfatórios, com melhora significativa dos quadros de dor após uma sessão.

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – F.

37

A diabetes é a sexta causa primária de internações no Brasil e contribui em até 50% para outros fatores causais de internação, como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial. A descompensação metabólica na diabetes geralmente é classificada em cetoacidose diabética (CAD) ou síndrome hiperosmolar hiperglicêmica (SHH). Quanto ao atendimento de pacientes diabéticos, assinale a alternativa correta.

- (A) As três características fundamentais da CAD são hiperglicemia, acidose e visão embaçada.
- (B) Características comuns da CAD são fraqueza, letargia, náusea e anorexia.
- (C) A glico-hemoglobina reflete uma média ponderada dos níveis glicêmicos em um período de 30 a 45 dias.
- (D) O limite máximo de glico-hemoglobina para a realização de exodontias com cicatrização satisfatória é de 7%.
- (E) Alterações na resposta imune de pacientes com diabetes podem influenciar a resposta à doença periodontal, com destaque para os eosinófilos, as principais células envolvidas na fagocitose.

38

De acordo com o Ministério da Saúde, entre as pessoas com imunossupressão, estão pessoas vivendo com HIV (PVHIV), portadores de imunodeficiência primária grave e doenças autoimunes, transplantados, pacientes em terapia renal substitutiva e pessoas que fazem uso contínuo de imunossupressores. Nesse grupo, destaca-se a psoríase, uma doença imunomediada de grande importância clínica, comum na população mundial e de significativa relevância na prática odontológica. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) As únicas manifestações orais da psoríase relacionadas à odontologia são na língua: língua geográfica e língua fissurada.
- (B) Caso seja necessária a prescrição de anti-inflamatório para pacientes com psoríase, a melhor opção é a dexametasona em dose única.
- (C) O melhor momento para o atendimento de pacientes com psoríase é logo após o almoço, quando os níveis glicêmicos estão adequados e com menores níveis de cortisol.
- (D) A articaína pode ser a melhor escolha para o procedimento anestésico local durante o tratamento de pacientes com psoríase.
- (E) O cirurgião-dentista deve estabelecer um bom relacionamento com o paciente, visando a não necessidade de protocolos farmacológicos de redução da ansiedade, com o uso de benzodiazepínicos, por exemplo, pois são contraindicados para esse grupo de pacientes.

39

O uso adjunto de antimicrobianos sistêmicos melhora os desfechos da Raspagem e Alisamento Radicular (RAR), porém algumas orientações devem ser seguidas para obtenção de um desfecho mais favorável. O conhecimento sobre a composição e o comportamento da microbiota periodontal na saúde e na doença é essencial para o estabelecimento de tratamentos periodontais efetivos. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Atualmente alguns patógenos periodontais, denominados “patógenos-chave”, são capazes de fugir da resposta do hospedeiro e mediar a conversão de toda a comunidade microbiana para a disbiose, o que contribui para o processo de destruição periodontal. O principal patógeno-chave é o *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (A.a.).
- (B) A administração sistêmica de antibióticos mitiga algumas limitações da administração local e atualmente pode ser considerada como forma isolada de tratamento periodontal, principalmente em pacientes com limitações de movimentos.
- (C) Considerando a patobiologia da periodontite e a das infecções clássicas e as evidências, que demonstraram que um patógeno específico é efetivamente reduzido por uma combinação específica de antibióticos, foi validado o tratamento da periodontite com a prescrição de uma combinação de antibióticos, sem a necessidade de ação mecânica em todos os casos.
- (D) Estudos que avaliaram o tratamento mecânico realizado de forma isolada demonstraram superioridade em relação à combinação da RAR com antibióticos sistêmicos, o que também reduz os efeitos indesejáveis da terapia antimicrobiana sistêmica (como a resistência, por exemplo).
- (E) Todos os microrganismos aeróbios são intrinsecamente resistentes ao metronidazol, porém este, quando associado à amoxicilina, pode levar a melhorias nos parâmetros clínicos não somente devido à redução do A.a., mas também devido a uma mudança benéfica mais ampla na composição da microbiota subgengival.

40

Para alguns pacientes, será essencial realizar a terapia cirúrgica periodontal para obter sucesso no tratamento da periodontite. Alguns fatores influenciam a reparação clínica pós-cirurgia periodontal. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Espera-se uma melhor reparação de defeitos supraósseos quando comparados aos defeitos intraósseos.
- (B) O tabagismo é uma contraindicação para a cirurgia periodontal devido à influência negativa sobre a redução da profundidade de sondagem das bolsas periodontais.
- (C) Se a conservação da área papilar durante a cirurgia for realizada, um maior ganho de inserção clínica pós-cirurgia pode ser alcançado.
- (D) Quanto mais profundo for o componente intraósseo do defeito periodontal, menor será o ganho de inserção clínica pós-cirúrgica nos retalhos de acesso.
- (E) Defeitos intraósseos de três paredes têm uma possibilidade muito menor de mostrar um ganho de inserção clínico quando comparados aos defeitos de uma parede depois do debridamento cirúrgico.

41

Compreende-se como cuidados paliativos as ações e os serviços de saúde para alívio da dor, do sofrimento e de outros sintomas em pessoas que enfrentam doenças ou outras condições de saúde que ameaçam ou limitam a continuidade da vida. Sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A oferta dos cuidados paliativos só deve ser feita quando nada mais pode ser oferecido ao paciente.
- (B) Os cuidados paliativos estão contemplados no SUS apenas para pacientes com câncer terminal, em que nenhum tratamento surtiu efeito.
- (C) Um dos princípios do PNCP é a promoção da melhoria do curso da doença e o reconhecimento do sofrimento em suas dimensões física, psicoemocional, espiritual e social.
- (D) A prestação de cuidados paliativos deve ser feita por equipe multi e interdisciplinar que é composta exclusivamente por médicos, enfermeiros e psicólogos.
- (E) A equipe de odontologia só participará da prestação de cuidados paliativos se estiver vinculada a algum estabelecimento hospitalar.

42

O termo câncer de cabeça e pescoço designa as neoplasias malignas que se desenvolvem em todos os segmentos de cabeça e pescoço, exceto pele e sistema nervoso central. O câncer bucal é o câncer mais comum de cabeça e pescoço. Embora as lesões neoplásicas ou suspeitas possam ser detectadas por inspeção visual, os programas de prevenção não têm tido sucesso, e os pacientes continuam chegando para tratamento com as lesões já em estágio avançado. Assim, é importante saber quais as regiões da boca que são mais acometidas pelo carcinoma espinocelular, o mais comum dentre as neoplasias da cavidade bucal, para melhorar sua detecção em estágios precoces. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta as regiões mais comuns para o surgimento do carcinoma espinocelular.

- (A) Palato mole, assoalho bucal, região retromolar.
- (B) Palato mole, assoalho bucal e fundo de sulco vestibular.
- (C) Ventre lingual, fundo de sulco vestibular e mucosa jugal.
- (D) Lábio inferior, fundo de sulco vestibular e ventre lingual.
- (E) Áreas ventrolaterais da língua, assoalho bucal e área retromolar.

43

Paciente do sexo feminino, 13 anos de idade, diagnosticada com leucemia linfocítica de células T, após uma semana em tratamento com metotrexato desenvolveu mucosite grau 4. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Mucosite de grau 4 é aquela em que a paciente apresenta úlceras e não consegue ingerir alimentos sólidos, mas consegue ingerir alimentos líquidos.
- (B) A equipe de odontologia deve utilizar clorexidina 0,5% para realizar a higiene bucal dessa paciente, considerando o risco alto de ocorrência de bacteremia a partir da cavidade bucal.
- (C) O laser para tratamento curativo da mucosite deve ser aplicado de forma pontual nas áreas acometidas com eritema, pseudomembrana e lesões ulcerativas.
- (D) Em casos como o descrito, está indicada a utilização do laser infravermelho com dose de 4 J/cm².
- (E) A mucosite bucal é classificada de acordo com o estado geral do paciente, tendo como principais parâmetros a contagem de linfócitos e o fluxo salivar do paciente.

44

No atendimento de urgências, principalmente em ambiente hospitalar, é comum o cirurgião-dentista se deparar com casos de violência contra populações vulneráveis. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Se uma mulher buscar atendimento de urgência e o cirurgião-dentista acreditar que se trata de um caso de violência contra a mulher, deverá comunicar o médico para que este faça a notificação compulsória do caso.
- (B) A verificação por parte do cirurgião-dentista de que alguma colega de trabalho tenha sofrido assédio sexual enseja a necessidade de comunicação do fato à autoridade policial.
- (C) O prazo para fazer denúncias de violência de qualquer tipo é de 7 dias a partir do ocorrido.
- (D) Fazer a notificação da violência contra a mulher significa quebrar o sigilo profissional/paciente, o que pode ser punido pelo Conselho de Ética da classe odontológica.
- (E) Há obrigatoriedade da notificação da violência contra a mulher sempre que esta for verificada no serviço público. No serviço privado, embora seja desejável, não é obrigatória.

45

A respeito dos Princípios e Diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), assinale a alternativa correta.

- (A) A cultura de segurança do paciente enfatiza que todos os trabalhadores, incluindo gestores e profissionais envolvidos no cuidado com o paciente, assumam a responsabilidade pela sua própria segurança e pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.
- (B) Considera-se que o termo “segurança do paciente” é a eliminação do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- (C) Para garantir a segurança do paciente, é fundamental que a equipe priorize atingir as metas operacionais (que garantem que todos os profissionais trabalhem dentro de protocolos rígidos instituídos pela gerência) e, em seguida, as ações de segurança do paciente e, só então, considere as metas financeiras.
- (D) Entre as estratégias de implementação do PNSP, está a articulação com o Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Educação para a inclusão do tema segurança do paciente nos currículos de formação em saúde de nível superior.
- (E) O PNSP instituiu no Ministério da Saúde um Comitê de Implementação do PNSP, instância colegiada, de caráter deliberativo, com a finalidade de direcionar as ações que visem à melhoria da segurança do cuidado em saúde através da padronização dos cuidados em todas as esferas governamentais.

46

Uma equipe de odontologia é chamada para realizar a avaliação das condições de higiene bucal de um senhor de 77 anos, internado devido a uma descompensação em seu quadro de diabetes. Na porta do quarto onde esse senhor estava internado, havia um aviso de MDR, indicando que ele estava colonizado por microrganismos resistentes a múltiplas drogas. Considerando que no Brasil 50% das infecções hospitalares são causadas por MDR, pacientes como o descrito são colocados em precaução de contato, o que envolve sua colocação em um quarto privado, além de outras medidas. Em relação a esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As precauções por contato incluem o uso de luvas e aventais quando houver o contato com o paciente e seu entorno.
- () Os profissionais de saúde devem higienizar as mãos e utilizar equipamentos de proteção individual apenas se tiverem contato com o paciente, para garantir a humanização do atendimento.
- () Antes de sair do quarto, os aventais e as luvas devem ser removidos e descartados em lixeira própria localizada ao lado da porta do quarto.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – F.

47

O princípio da bioética que traz a obrigação de o profissional respeitar a vontade, a crença e os valores morais do paciente é o da

- (A) compaixão.
- (B) justiça.
- (C) não maleficência.
- (D) autonomia.
- (E) beneficência.

48

A Lei nº 6.320/1983 dispõe sobre normas gerais de saúde, estabelece penalidades e dá outras providências. Sobre o que dispõe essa lei, assinale a alternativa correta.

- (A) As pessoas devem prestar as informações de saúde solicitadas pela autoridade de saúde, a fim de permitir a realização de estudos e pesquisas.
- (B) Toda pessoa tem o direito à proteção da saúde, sendo o Estado responsável pela promoção e conservação de sua saúde.
- (C) Aos profissionais de saúde cabe o conhecimento sobre doenças transmissíveis e os cuidados em relação à sua propagação. Quando julgarem pertinentes, essas informações serão compartilhadas com a população.
- (D) Toda gestante puérpera ou nutriz tem direito de receber do Estado orientação e controle médicos, odontológico e de enfermagem, atenção no parto, medicamentos básicos e alimentação supletiva.
- (E) Toda pessoa tem autonomia sobre seu corpo, podendo doar e receber órgãos e/ou tecidos humanos de acordo com sua vontade, independentemente de critérios médicos.

49

Quanto à odontologia hospitalar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A odontologia hospitalar é uma área da odontologia que atua em pacientes que necessitem de atendimento em ambiente hospitalar, internados ou não, ou em assistência domiciliar.
- () O cirurgião-dentista deve seguir as sugestões e orientações das equipes médicas em ambiente hospitalar, como forma de conseguir implementar novas tecnologias em seu trabalho na instituição.
- () Quando o cirurgião-dentista identificar manifestações bucais de doenças sistêmicas, deverá solicitar o atendimento médico para realizar seu tratamento para não incorrer em infração ética.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) F – V – F.

50

O órgão que representa o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, é a

- (A) Vigilância Epidemiológica.
- (B) Vigilância Ambiental.
- (C) Vigilância Sanitária.
- (D) Diretoria de Atenção Primária em Saúde.
- (E) Diretoria de Emergências em Saúde Pública.

51

Na sala de espera de um hospital, à noite, encontram-se os seguintes pacientes: (1) menino de 7 anos de idade que bateu a boca quando jogava futebol com seus amigos e teve o incisivo central superior fraturado com exposição pulpar; (2) paciente de 29 anos de idade, gênero masculino, com hemorragia subsequente a uma exodontia; (3) mulher acompanhando seu filho de dois anos de idade, o qual caiu e bateu a boca, rompendo o freio labial superior; (4) uma gestante que aguarda atendimento devido à dor relacionada à erupção do elemento 3.8. O cirurgião-dentista de plantão opta por atender primeiro o paciente (2). Qual é o princípio do SUS que ele utilizou para realizar essa escolha?

- (A) Universalidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Equidade.
- (D) Transversalidade.
- (E) Hierarquização.

52

A Rede Alyne é a principal estratégia do Ministério da Saúde para reorganizar a rede de serviços materno-infantis do país. É importante que o cirurgião-dentista conheça o foco principal desse programa para fortalecer a rede de cuidados às gestantes, priorizando o tratamento a quem tem maior risco. Nesse contexto, é necessário considerar que a alta razão de mortes maternas evitáveis no Brasil atinge principalmente mulheres

- (A) indígenas.
- (B) das regiões norte e nordeste.
- (C) entre 13 e 17 anos de idade.
- (D) acima dos 35 anos de idade.
- (E) pardas e pretas.

53

Considere que você é preceptor em um hospital do SUS e, durante a execução de suas atividades no ambiente hospitalar com seus alunos, depara-se com um caso clínico que lhe suscita dúvidas em relação à melhor conduta clínica a ser instituída. Querendo demonstrar aos seus alunos a importância de basear as ações clínicas em evidências científicas e para definir a melhor estratégia de ação, você utiliza a odontologia baseada em evidências. Ao demonstrar como fazer buscas em bases de dados, você encontra um artigo de relato de caso que traz a descrição de um caso semelhante ao que você tem em mãos e com um bom desfecho clínico. Considerando a fórmula de Estimated Percentage of Reproducibility of Information (EPIR), quais são as chances de se chegar ao mesmo resultado clínico?

- (A) 20%.
- (B) 30%.
- (C) 40%.
- (D) 60%.
- (E) 70%.

54

Segundo a Lei Federal nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. De acordo com essa lei, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter

- (A) excepcional e transitório.
- (B) contemplativo.
- (C) substitutivo.
- (D) complementar.
- (E) emergencial.

55

A terminalidade é uma condição clínica que diz respeito a uma doença que segue seu curso natural sem responder a quaisquer procedimentos ou terapias que a medicina possa oferecer. É preciso ter conhecimento sobre o processo de morrer para poder ajudar a pessoa e sua família da melhor maneira possível. Sobre os cuidados odontológicos em pacientes críticos e em cuidados paliativos e sobre a humanização do cuidado, assinale a alternativa correta.

- (A) Os profissionais de saúde devem prezar pelo aspecto técnico de sua profissão principalmente quando se trata de pacientes terminais. Dessa forma, deve-se evitar que sentimentos como a compaixão interfiram em seu diagnóstico e forma de trabalho.
- (B) O sofrimento espiritual que acompanha uma doença terminal pode ser minimizado com falas de encorajamento, como “tenha fé”, pois, dessa forma, a pessoa terá mais confiança no tratamento e na equipe que a atende.
- (C) Todo esforço deve ser feito para que um paciente terminal fique em ambiente hospitalar, onde há os melhores recursos para prolongar a vida e as pessoas mais bem capacitadas para realizar manobras de ressuscitação quando estas forem necessárias.
- (D) Profissionais de saúde devem manter-se em um nível elevado em relação ao paciente; toda a autoridade do profissional deve ser sentida pelo paciente quanto à sua condição, às decisões que deverão ser tomadas para prolongar sua vida, custe o que custar, para que, dessa forma, o paciente saiba que está em mãos competentes, que tomarão as melhores decisões em seu nome.
- (E) Fadiga imensa e sentimento de fraqueza fazem parte do processo de morrer. Para quem está morrendo, é mais confortável estar discretamente desidratado. Soro intravenoso não reverterá o processo. Portanto, algumas atitudes em ambiente hospitalar deveriam ser repensadas.

56

A Lei Federal nº 8.080/1990 dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo um elenco de atribuições. Em relação à saúde bucal, especificamente, compete à Direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)

- (A) formular de forma centralizada a política para execução de ações em saúde, que deverá ser acatada pelos municípios em sua totalidade.
- (B) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde bucal.
- (C) organizar, a partir da rede regionalizada, a hierarquização dos serviços de saúde bucal.
- (D) coordenar e, em caráter emergencial apenas, fiscalizar os investimentos de saúde bucal.
- (E) gerir recursos de consórcios intermunicipais destinados aos serviços de saúde bucal.

57

A equipe de odontologia de um hospital estava realizando a higiene bucal de um paciente em cuidados paliativos quando ocorreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe sabia que, apesar de o paciente não querer ser reanimado, porque estava cansado de dar trabalho à família, esta não aceitava essa posição do paciente. A respeito desse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Considerando a posição da família e a política de humanização do cuidado, o cirurgião-dentista deverá proceder às manobras de ressuscitação em respeito à posição da família.
- () A ação do cirurgião-dentista em cuidados paliativos restringe-se aos cuidados relacionados à higienização da boca e dos dentes, ao selamento de lesões abertas com cimento de ionômero de vidro e à aplicação de soluções quimioterápicas para o controle da dor e a redução da microbiota patogênica. Não cabe a ele realizar manobras de ressuscitação.
- () O cirurgião-dentista tem papel importante no convencimento do paciente sobre a possibilidade de novos tratamentos e cura, ainda que improváveis, para que ele aceite os procedimentos de ressuscitação ou de intubação, prolongando a vida.

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – F.

58

Paciente de 67 anos de idade é levado por seus familiares ao hospital após sofrer lesões em face devido a uma queda. Após a família descrever como foi essa queda, a equipe chegou à conclusão de que se tratava de um caso de síncope vasovagal. Sobre essa condição, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A síncope vasovagal caracteriza-se pelo desmaio. A perda de consciência é transitória e repentina, e o paciente perde o tônus postural, podendo sofrer lesões em decorrência da queda.
- (B) Na síncope vasovagal, inicialmente, o paciente apresenta sensação de quentura na face e no pescoço, com aspecto pálido e sudorético.
- (C) Pupilas contraídas, respiração superficial, hipotensão e bradicardia são características da síncope vasovagal.
- (D) A conduta nessa situação deverá ser colocar o paciente em posição supina, com os membros inferiores levemente elevados, podendo administrar oxigênio.
- (E) A síncope vasovagal ocorre por falta de disponibilidade de oxigênio ou de glicose para o cérebro e raramente produz complicações mais sérias.

59

A Portaria nº 529/2013 instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Acerca dessa portaria, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O desempenho do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP) deve ser avaliado periodicamente pelo PNSP e, quando necessário, deve ser feita a recomendação de sua suspensão.
- (B) De acordo com essa portaria, o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente deve ser ampliado.
- (C) O CIPNSP deve propor e validar guias e manuais voltados à segurança do paciente, incluindo a prevenção de quedas e úlceras por pressão.
- (D) A portaria prevê o envolvimento de pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
- (E) O CIPNSP é composto por representantes de órgãos de diferentes entidades, como dos Conselhos Federais de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Farmácia.

60

A respeito do que dispõe a Lei Federal nº 8.080/1990 sobre saúde bucal, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem garantir _____, _____, _____ e _____, individual e coletivo(a), inseridos(as) no contexto da integralidade da atenção à saúde.

- (A) acesso / encaminhamento / prevenção / notificação
- (B) notificação / promoção / prevenção / encaminhamento
- (C) promoção / diagnóstico / tratamento / encaminhamento
- (D) promoção / prevenção / recuperação / reabilitação odontológica
- (E) promoção / diagnóstico / notificação / tratamento

