

Domingo de manhã

**GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026**

**43 – MÉDICO (PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA)**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.





**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 01** – No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a incorporação de políticas voltadas à equidade tem implicações diretas sobre os processos de gestão, organização do trabalho, planejamento de serviços e condições institucionais que atravessam diferentes áreas profissionais. Nesse contexto, uma diretriz alinhada às iniciativas de promoção da equidade no SUS consiste em:

- A) Estruturar estratégias de equidade centradas em programas específicos, mantendo as demais áreas da gestão e da organização dos serviços regidas por diretrizes gerais de planejamento.
- B) Integrar a perspectiva da equidade aos processos de gestão, planejamento e organização do trabalho em saúde, considerando seus efeitos sobre o acesso, as condições de trabalho e a produção do cuidado.
- C) Desenvolver ações de equidade prioritariamente nos serviços assistenciais, articulando-as de forma complementar às políticas de gestão e planejamento institucional.
- D) Incorporar ações de equidade por meio de iniciativas programáticas vinculadas a áreas técnicas específicas, responsáveis por orientar a implementação dessas estratégias no sistema de saúde.
- E) Promover estratégias de equidade voltadas principalmente à qualificação das práticas profissionais, sem necessariamente alterar os processos institucionais de organização dos serviços.

**QUESTÃO 02** – A transformação digital em saúde tem sido apontada como elemento estratégico para a qualificação do cuidado, da gestão e da produção de informações no SUS. Contudo, sua implementação envolve desafios relacionados à governança de dados, à organização dos serviços e à garantia de direitos dos usuários. Considerando o debate contemporâneo sobre transformação digital em saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A digitalização das informações em saúde favorece a integração entre sistemas e serviços, podendo ampliar a capacidade de planejamento e gestão, desde que associada a mecanismos de governança e proteção de dados.
- B) A incorporação de tecnologias digitais nos serviços de saúde tende a ocorrer de forma predominantemente técnica, sendo os aspectos éticos e regulatórios definidos posteriormente aos processos de implementação.
- C) A adoção de soluções digitais no SUS está vinculada principalmente à modernização de sistemas de registro e armazenamento de informações clínicas.
- D) A implementação de soluções digitais no SUS depende prioritariamente da atuação de fornecedores de tecnologia responsáveis pela gestão e segurança das informações em saúde.
- E) O uso de tecnologias digitais em saúde se orienta principalmente pela ampliação da eficiência administrativa, mantendo relativa autonomia em relação às políticas públicas de saúde.

**QUESTÃO 03** – A relação entre educação e saúde no SUS tem sido compreendida como dimensão estratégica para a qualificação das práticas profissionais e para o fortalecimento da participação social. Nesse contexto, diferentes abordagens pedagógicas orientam os processos formativos em saúde. Assinale a alternativa que indica uma perspectiva coerente com a articulação entre ensino e práticas de saúde no SUS.

- A) A formação em saúde deve estruturar-se prioritariamente em torno da consolidação de conhecimentos técnico-científicos, cabendo às experiências de participação social um papel complementar no processo formativo.
- B) A qualificação da formação em saúde depende principalmente da ampliação de conteúdos especializados e da consolidação de competências clínicas específicas.
- C) As atividades educativas em saúde devem concentrar-se em espaços formais de ensino, nos quais seja possível garantir maior controle sobre os conteúdos e métodos pedagógicos.
- D) Os processos educativos em saúde podem contribuir para a construção de práticas profissionais mais críticas e comprometidas com o território ao promover o diálogo entre diferentes saberes e experiências sociais.
- E) A organização do ensino em saúde orienta-se prioritariamente pela padronização de conteúdos e metodologias, com o objetivo de garantir uniformidade.

**QUESTÃO 04** – A organização da Atenção Especializada no SUS demanda articulação com os demais níveis de atenção e integração com os processos de regulação, gestão do cuidado e organização das redes de atenção à saúde. Nesse contexto, uma diretriz coerente com a organização da atenção especializada no SUS consiste em:

- A) A Atenção Especializada organiza-se prioritariamente em serviços de referência que atuam com relativa autonomia em relação à Atenção Primária, visando maior eficiência na oferta de procedimentos especializados.
- B) A ampliação da oferta de consultas e procedimentos especializados constitui a principal estratégia para qualificar o acesso da população a esse nível de atenção.
- C) A organização da Atenção Especializada orienta-se principalmente pela concentração de tecnologias e profissionais especializados em serviços hospitalares de maior complexidade.
- D) A gestão da Atenção Especializada baseia-se prioritariamente na expansão de serviços especializados, independentemente das dinâmicas regionais de demanda e das estratégias de coordenação do cuidado.
- E) A Atenção Especializada deve integrar-se às redes de atenção à saúde, articulando-se com a Atenção Primária e com mecanismos de regulação que favoreçam a continuidade do cuidado.

**QUESTÃO 05** – A ampliação do uso de sistemas de informação e bases de dados no SUS tem aumentado as possibilidades de análise epidemiológica, planejamento e monitoramento das políticas públicas. Nesse contexto, o uso estratégico das informações em saúde deve:

- A) Priorizar a centralização dos bancos de dados em instituições privadas especializadas em tecnologia da informação.
- B) Restringir o acesso às informações em saúde aos profissionais diretamente responsáveis pelo atendimento clínico.
- C) Favorecer a produção e o compartilhamento qualificado de informações entre gestores, serviços e equipes, respeitando os princípios de governança e proteção de dados.
- D) Concentrar a análise das informações em saúde em áreas técnicas específicas, desvinculando-as dos processos de planejamento e gestão.
- E) Utilizar bases de dados apenas para fins administrativos, evitando sua incorporação em processos de avaliação e planejamento das políticas de saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 06** – A indução e a refutação têm papel importante no campo da inferência e do raciocínio causal em epidemiologia e saúde pública. Considerado o problema da indução, qual pensador do século XX ficou conhecido por criticar o indutivismo e colocar importância central na Doutrina da Refutação?

- A) Austin Bradford Hill.
- B) David Hume.
- C) Jakob Henle.
- D) Karl Popper.
- E) Thomas Bayes.

**QUESTÃO 07** – Em relação a situações de emergência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Em acidentes por serpentes do gênero Colubrídeos (cobra-cipó, papa-pinto), podem ocorrer reações de hipersensibilidade, hemorragia local ou sistêmica.
- B) Em acidentes com a aranha-marrom, o veneno tem ação proteolítica e hemolítica.
- C) Os acidentes por lepidópteros decorrem do contato com lagartas urticantes conhecidas como taturana, bicho-peludo, entre outros nomes.
- D) Os acidentes por himenópteros podem provocar uma síndrome do envenenamento por ataques múltiplos de abelhas, exigindo rápida hospitalização.
- E) Os acidentes por *Tityus bahiensis* (escorpião-preto) provocam o quadro mais grave pela sua ação proteolítica e hemorrágica, sendo mais frequentes em crianças.

**QUESTÃO 08** – As vacinas atenuadas, compostas por vírus vivos, são utilizadas para prevenir as seguintes doenças, EXCETO:

- A) Hepatite A.
- B) Rotavírus.
- C) Rubéola.
- D) Sarampo.
- E) Varicela.

**QUESTÃO 09** – Sobre a síndrome metabólica em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Algumas de suas definições, com variados pontos de corte dos critérios utilizados, podem subestimar sua prevalência.
- B) Crianças e adolescentes com Índice de Massa Corporal normal e aumento da adiposidade abdominal também representam risco para síndrome metabólica.
- C) A doença hepática gordurosa não alcoólica é doença hepática rara em crianças e adolescentes, e costuma ser assintomática na fase de esteatose inicial.
- D) A hiperuricemia é um achado frequente em pacientes com síndrome metabólica. O consumo elevado de frutose está associado ao aumento da produção de ácido úrico.
- E) Há várias definições de síndrome metabólica e a maioria ainda considera a presença de obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e alteração do metabolismo de carboidratos, embora outros fatores de risco têm sido associados a essa síndrome.

**QUESTÃO 10** – Uma mulher de 60 anos, com função renal normal, tem alterações ósseas (osteopenia e osteoporose) e apresenta hipercalcemia acompanhada de concentrações elevadas de paratormônio. Nesse sentido, sobre a hipótese diagnóstica de hiperparatireoidismo primário e suas características, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Sintomas clássicos estão relacionados a lesões em órgãos-alvo diretamente ligados ao metabolismo do cálcio, em especial, os ossos e os rins.
- B) A densitometria óssea pode demonstrar redução da densidade mineral mais importante em ossos corticais, como o fêmur e rádio.
- C) Podem estar presentes sintomas neuromusculares, como fraqueza muscular, fadiga, parestesias e atrofia muscular proximal.
- D) Hipercalcemia e hiperfosfatemia do hiperparatireoidismo primário ocorrem por ação direta do paratormônio no túbulo renal.
- E) A manifestação renal mais comum do hiperparatireoidismo primário é a nefrolitíase.

**QUESTÃO 11** – Um paciente de 32 anos queixa-se de dor na fossa cubital, provocada no trajeto do bíceps, exacerbada com a supinação contra resistência, recordando-se de um evento desencadeante após esforço físico. Como manobra semiológica para auxiliar o diagnóstico de tendinopatia do bíceps distal com possível ruptura, o examinador tenta inserir seu dedo indicador sob o tendão, em trajeto da posição lateral para medial, junto ao cotovelo do paciente. Qual é o nome desse teste?

- A) Impacto ou de Neer.
- B) Gancho ou *hook*.
- C) Jobe.
- D) Patte.
- E) Roos.

**QUESTÃO 12** – A respeito de doenças do sistema arterial periférico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O uso diagnóstico do Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é indicado para avaliação da presença de claudicação intermitente.
- B) Um ITB de 0,80 é interpretado como doença arterial obstrutiva periférica grave.
- C) O aneurisma da artéria poplítea apresenta risco de trombose, podendo causar isquemia aguda da extremidade e ameaçar a viabilidade do membro.
- D) A doença ou fenômeno de Raynaud primário apresenta três fases: palidez (vasoconstrição), cianose (estase capilar) e hiperemia (vasodilatação compensatória).
- E) A acrocianose pode ser uma das manifestações cutâneas em pacientes com anticorpos antifosfolípidos.

**QUESTÃO 13** – Sobre as medidas de impacto, em uma metanálise sobre prevenção de determinada doença, a Redução Absoluta do Risco (RAR), ou seja, a proporção absoluta de eventos que deixam de acontecer nos indivíduos tratados, foi relatada como sendo 4,0/100 pessoas-ano. Nesse caso, o Número Necessário para Tratar (NNT), ou seja, o número de indivíduos a serem tratados por determinado tempo para evitar um evento, é igual a:

- A) 25 pessoas-ano.
- B) 100 pessoas por 2,5 anos.
- C) 2,5 pessoas-ano.
- D) 10 pessoas por 25 anos.
- E) 0,5 pessoas-ano.

**QUESTÃO 14** – Considerando os achados em exames pulmonares, assinale a alternativa em que a relação entre o ruído adventício pulmonar ou pleural e sua respectiva causa está INCORRETA.

- A) Crepitantes finos – obstrução parcial da traqueia.
- B) Crepitantes bolhosos – pneumonite.
- C) Roncos – corpo estranho.
- D) Sibilos – asma brônquica.
- E) Sopro tubário – consolidação pulmonar.

**QUESTÃO 15** – Sobre a avaliação de pacientes, a anamnese e o exame clínico são componentes iniciais do acolhimento. Nesse sentido, com base nas características ou achados, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A hipofonese da primeira bulha cardíaca (B1) pode ocorrer em pacientes obesos com parede torácica espessa.
- B) A hiperfonese da B1 pode ocorrer em pacientes com estados hiperdinâmicos, como anemia e tireotoxicose.
- C) A segunda bulha cardíaca (B2) coincide com o início da diástole e é formada pela abertura sequencial de dois componentes, o aórtico e o pulmonar.
- D) Desdobramento da B1 pode ser normal, mas pode refletir um achado em pacientes com bloqueio do ramo direito do feixe de Hiss.
- E) Quando ocorre o desdobramento da B1, tem-se o desdobramento do som em componente mitral e tricúspide.

**QUESTÃO 16** – Sobre o uso de antidepressivos tricíclicos em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São considerados fármacos de primeira linha para tratamento do transtorno depressivo maior em crianças e adolescentes devido à alta eficácia e segurança comprovada.
- B) O uso de tricíclicos em crianças exige monitorização clínica rigorosa devido ao risco de efeitos anticolinérgicos, sedação, hipotensão ortostática e cardiotoxicidade.
- C) Antes do início do tratamento com tricíclicos em crianças e adolescentes, recomenda-se avaliação cardiológica e eletrocardiograma basal.
- D) A toxicidade dos antidepressivos tricíclicos em superdosagem é elevada, sendo uma das razões para sua restrição como primeira linha na população pediátrica.
- E) Podem ser utilizados em crianças e adolescentes principalmente em quadros específicos, como TDAH refratário, enurese noturna e transtornos ansiosos resistentes.

**QUESTÃO 17** – Sobre a indicação de terapia multiprofissional no Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) As terapias multiprofissionais devem ser evitadas, pois prejudicam a autonomia da criança com TEA.
- B) A fonoaudiologia é indicada apenas quando há deficiência intelectual associada.
- C) Intervenções multiprofissionais, como fonoaudiologia, psicopedagogia e terapias expressivas, visam promover comunicação, funcionalidade e inclusão social.
- D) A equoterapia não apresenta nenhuma aplicação reconhecida em TEA.
- E) O tratamento do TEA deve ser exclusivamente farmacológico.

**QUESTÃO 18** – Sobre o uso de antidepressivos atípicos (vilazodona, mirtazapina, vortioxetina e trazodona) em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A mirtazapina pode ser utilizada *off-label* em crianças e adolescentes, especialmente quando há comorbidade com insônia, inapetência ou ansiedade.
- B) A trazodona é frequentemente utilizada em dose baixa como hipnótico em população pediátrica, apesar de não ser um antidepressivo de primeira linha.
- C) A vortioxetina atua como modulador multimodal da serotonina, com efeitos em múltiplos receptores serotoninérgicos.
- D) A vilazodona associa inibição da recaptação de serotonina com agonismo parcial do receptor 5-HT<sub>1A</sub>.
- E) Todos os antidepressivos atípicos possuem aprovação formal como fármacos de primeira linha para depressão maior em crianças e adolescentes.

**QUESTÃO 19** – Em relação aos fármacos não estimulantes utilizados no tratamento do TDAH em crianças e adolescentes (atomoxetina, clonidina e imipramina), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A atomoxetina atua como inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, aumentando sua disponibilidade principalmente no córtex pré-frontal.
- B) A clonidina é um agonista alfa-2 adrenérgico que reduz a liberação de noradrenalina, sendo útil especialmente em TDAH associado a comportamentos impulsivos, agressivos e distúrbios do sono.
- C) A imipramina exerce efeito sobre os sistemas noradrenérgico e serotoninérgico, podendo ser utilizada em casos selecionados de TDAH refratário.
- D) Os fármacos não estimulantes apresentam início de ação geralmente mais lento do que os psicoestimulantes.
- E) A atomoxetina atua predominantemente como antagonista dopaminérgico D<sub>2</sub>, justificando seu uso no TDAH.

**QUESTÃO 20** – Sobre a farmacologia e os neurotransmissores envolvidos no tratamento do transtorno de tique em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Antipsicóticos típicos e atípicos reduzem tiques principalmente por antagonismo dopaminérgico D2.
- B) A clonidina e a guanfacina atuam como agonistas alfa-2 adrenérgicos, modulando a liberação de noradrenalina.
- C) A risperidona é considerada uma opção eficaz e com melhor perfil de tolerabilidade em relação aos antipsicóticos típicos.
- D) Benzodiazepínicos são considerados tratamento de primeira linha para tiques motores e vocais crônicos.
- E) O envolvimento dopaminérgico nos circuitos córtico-estriatais está bem estabelecido na fisiopatologia dos tiques.

**QUESTÃO 21** – Sobre as indicações de internação psiquiátrica em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O risco iminente de suicídio ou a autoagressão grave constituem indicações clássicas de internação psiquiátrica.
- B) A presença de sintomas psicóticos graves com prejuízo importante do juízo de realidade pode justificar internação.
- C) A incapacidade dos responsáveis de garantir supervisão e segurança adequadas pode ser critério para internação.
- D) A internação psiquiátrica é indicada como primeira escolha para o manejo de dificuldades escolares isoladas, sem comorbidades psiquiátricas graves.
- E) Quadros de agitação psicomotora grave ou agressividade com risco a terceiros podem ser critérios para internação.

**QUESTÃO 22** – Sobre a indicação de terapias multiprofissionais em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A psicopedagogia é indicada para dificuldades de aprendizagem associadas ou não a transtornos do neurodesenvolvimento.
- B) A fonoaudiologia é fundamental em transtornos da comunicação, linguagem e deglutição.
- C) A arteterapia e a musicoterapia podem auxiliar na expressão emocional e no desenvolvimento socioafetivo.
- D) A equoterapia pode ser indicada em transtornos neuromotores e do desenvolvimento global.
- E) As terapias multiprofissionais suspendem o tratamento médico e psicoterápico em transtornos psiquiátricos graves.

**QUESTÃO 23** – Sobre a farmacologia e os neurotransmissores envolvidos no tratamento dos transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) Benzodiazepínicos atuam primariamente por bloqueio dopaminérgico e são considerados primeira linha no tratamento da ansiedade infantil.
- B) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) aumentam a disponibilidade sináptica de serotonina e são considerados tratamento de primeira linha.
- C) Antipsicóticos típicos são os fármacos mais indicados para transtornos de ansiedade em crianças.
- D) A noradrenalina não participa da fisiopatologia dos transtornos de ansiedade.
- E) Antidepressivos tricíclicos são preferidos aos ISRS devido ao melhor perfil de segurança em crianças.

**QUESTÃO 24** – Sobre a interdição judicial e a capacidade civil de crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Crianças são consideradas absolutamente incapazes conforme o Código Civil, independentemente de diagnóstico psiquiátrico.
- B) A interdição judicial visa proteger a pessoa incapaz para os atos da vida civil.
- C) Transtornos mentais graves podem fundamentar medidas judiciais de proteção quando há prejuízo da capacidade de autodeterminação.
- D) A avaliação psiquiátrica forense é essencial para subsidiar decisões judiciais envolvendo capacidade e curatela.
- E) Crianças e adolescentes podem ser interditados judicialmente da mesma forma que adultos, com plena aplicação do instituto da curatela.

**QUESTÃO 25** – Sobre a aplicação da avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Contribui para o diagnóstico diferencial entre transtornos do neurodesenvolvimento.
- B) Deve considerar idade, escolaridade, contexto sociocultural e nível de desenvolvimento.
- C) Pode auxiliar no planejamento de intervenções terapêuticas e educacionais.
- D) Pode substituir o exame clínico psiquiátrico, bem como a anamnese.
- E) É útil na avaliação de funções cognitivas como atenção, memória, linguagem e funções executivas.

**QUESTÃO 26** – Sobre a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) no contexto escolar de crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) A escola pode recusar matrícula de aluno com deficiência por falta de estrutura adequada.
- B) A inclusão escolar é opcional e depende da gravidade do transtorno mental.
- C) É garantido à criança e ao adolescente com deficiência o direito à educação inclusiva, com adaptações razoáveis e apoio especializado quando necessário.
- D) A responsabilidade pela inclusão é exclusivamente da família.
- E) A lei da inclusão se aplica apenas a escolas públicas.

**QUESTÃO 27** – Sobre o exame psiquiátrico e os exames complementares em Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O exame psiquiátrico deve ser adaptado ao nível de desenvolvimento cognitivo e emocional da criança ou do adolescente.
- B) A anamnese deve incluir informações provenientes de múltiplas fontes, como os pais, a escola e os cuidadores.
- C) Exames complementares são sempre obrigatórios para o diagnóstico de transtornos psiquiátricos na infância.
- D) Avaliações neuropsicológicas podem auxiliar no diagnóstico diferencial de transtornos do neurodesenvolvimento.
- E) Exames laboratoriais e de neuroimagem são indicados conforme suspeita clínica, não de forma rotineira.

**QUESTÃO 28** – Sobre os principais teóricos da psicoterapia aplicados à Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Melanie Klein contribuiu para a compreensão das relações objetais precoces e do brincar como forma de expressão psíquica.
- B) Donald Winnicott destacou a importância do ambiente suficientemente bom e do *holding* no desenvolvimento infantil.
- C) John Bowlby formulou a teoria do apego, relevante para a compreensão de vínculos e de transtornos psicopatológicos na infância.
- D) Aaron Beck desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental, amplamente adaptada para crianças e adolescentes.
- E) Sigmund Freud desenvolveu modelos psicoterápicos voltados para adultos, sem aplicações na infância.

**QUESTÃO 29** – Sobre o uso de fármacos antipsicóticos em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) Antipsicóticos típicos e atípicos apresentam o mesmo perfil de efeitos extrapiramidais em crianças e adolescentes.
- B) O uso de antipsicóticos em crianças dispensa monitorização metabólica, pois o risco de síndrome metabólica é restrito à população adulta.
- C) Antipsicóticos atípicos, como risperidona e aripiprazol, podem ser indicados em crianças e adolescentes para o manejo da irritabilidade associada ao Transtorno do Espectro Autista.
- D) Antipsicóticos são indicados exclusivamente para esquizofrenia de início precoce na população pediátrica.
- E) O uso prolongado de antipsicóticos em crianças não afeta o crescimento nem os níveis de prolactina.

**QUESTÃO 30** – Sobre a farmacologia e os neurotransmissores envolvidos na ação dos estabilizadores do humor em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) O lítio atua exclusivamente como antagonista dopaminérgico D2.
- B) Os estabilizadores do humor modulam múltiplos sistemas neurotransmissores e vias intracelulares, incluindo GABA, glutamato e segundos mensageiros.
- C) O valproato não possui ação sobre sistemas GABAérgicos.
- D) A carbamazepina atua apenas como antidepressivo serotoninérgico.
- E) Estabilizadores do humor são contraindicados em qualquer faixa etária pediátrica.

**QUESTÃO 31** – Sobre a atuação da equipe multiprofissional no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) e sua composição mínima, assinale a alternativa correta.

- A) O CAPSi pode funcionar apenas com um médico psiquiatra e um psicólogo, não sendo obrigatória equipe multiprofissional ampliada.
- B) A equipe mínima do CAPSi é composta exclusivamente por profissionais de nível superior, sem necessidade de técnicos de enfermagem ou outros profissionais de nível médio.
- C) O número de profissionais do CAPSi é padronizado apenas pelo número de leitos disponíveis.
- D) A atuação da equipe do CAPSi é restrita ao atendimento individual, sem atividades grupais ou articulação com a rede.
- E) A equipe mínima multiprofissional inclui médico, enfermeiro, psicólogo, outros profissionais de nível superior e profissionais de nível médio, atuando de forma interdisciplinar e territorial.

**QUESTÃO 32** – Sobre a psicoterapia em crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, assinale a alternativa correta.

- A) Intervenções psicoterápicas visam a elaboração do trauma, o fortalecimento emocional e a prevenção de psicopatologias futuras.
- B) Apenas a psicoterapia psicodinâmica é indicada nesses casos.
- C) A psicoterapia deve ser evitada para não reativar memórias traumáticas.
- D) O atendimento deve excluir a família ou os cuidadores do processo terapêutico.
- E) Crianças vítimas de abuso sexual não apresentam risco aumentado de transtornos mentais.

**QUESTÃO 33** – Sobre a teoria de Aaron Beck aplicada à Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a alternativa correta.

- A) A teoria de Beck tem base exclusivamente no inconsciente e em conflitos intrapsíquicos.
- B) A terapia cognitiva de Beck não pode ser adaptada para crianças e adolescentes.
- C) Aaron Beck propôs que pensamentos automáticos disfuncionais influenciam emoções e comportamentos, sendo passíveis de modificação terapêutica.
- D) A abordagem cognitiva ignora o contexto familiar e social da criança.
- E) A teoria de Beck é aplicada apenas em transtornos psicóticos.

**QUESTÃO 34** – Sobre a farmacologia e os neurotransmissores relacionados ao tratamento do transtorno de linguagem em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) Medicamentos podem ser utilizados apenas para tratar comorbidades associadas, como TDAH ou transtornos de ansiedade, modulando sistemas como dopamina, noradrenalina e serotonina.
- B) O tratamento farmacológico é a principal abordagem terapêutica isolada para os transtornos de linguagem.
- C) Não há evidência de participação de neurotransmissores no desenvolvimento da linguagem.
- D) Antipsicóticos típicos são indicados para melhorar diretamente a aquisição da linguagem.
- E) Benzodiazepínicos são considerados fármacos de escolha para transtornos primários da linguagem.

**QUESTÃO 35** – Sobre a psicoterapia em crianças e adolescentes com doenças crônicas, assinale a alternativa correta.

- A) A psicoterapia é contraindicada em crianças com doenças clínicas crônicas.
- B) O foco psicoterápico deve ser exclusivamente a doença orgânica, sem considerar aspectos emocionais.
- C) A psicoterapia pode auxiliar na adesão ao tratamento, no manejo emocional da doença e no desenvolvimento psicológico saudável.
- D) Apenas abordagens psicodinâmicas podem ser utilizadas nesse contexto.
- E) Crianças com doenças crônicas não se beneficiam de intervenções psicoterápicas.

**QUESTÃO 36** – Sobre a epidemiologia dos transtornos mentais em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- A) Transtornos mentais na infância são raros, com prevalência inferior a 1%.
- B) A maioria dos transtornos mentais tem início exclusivamente na idade adulta.
- C) Não há diferenças epidemiológicas entre sexos nos transtornos do neurodesenvolvimento.
- D) Estudos epidemiológicos indicam prevalência significativa de transtornos mentais na infância e adolescência, com impacto funcional relevante.
- E) Dados epidemiológicos não influenciam políticas públicas de saúde mental.

**QUESTÃO 37** – Sobre a classificação da funcionalidade de crianças e adolescentes com deficiência intelectual, assinale a alternativa correta.

- A) A avaliação da funcionalidade inclui habilidades conceituais, sociais e práticas, sendo fundamental para o planejamento terapêutico.
- B) A classificação baseia-se exclusivamente no Quociente de Inteligência (QI).
- C) A funcionalidade não é considerada na avaliação diagnóstica atual.
- D) A funcionalidade é irrelevante para a definição de apoios educacionais e sociais.
- E) Crianças com o mesmo QI apresentam necessariamente o mesmo nível funcional.

**QUESTÃO 38** – Sobre a teoria kleiniana aplicada à Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a alternativa correta.

- A) Rejeita o uso do brincar como recurso terapêutico.
- B) Enfatiza as posições esquizoparanóide e depressiva como organizadoras do desenvolvimento psíquico precoce.
- C) Concentra-se apenas em adolescentes, sem aplicação à infância.
- D) Nega a existência de fantasias inconscientes na infância.
- E) Baseia-se exclusivamente em pressupostos cognitivistas.

---

**QUESTÃO 39** – Sobre os testes psicológicos WASI e WISC-IV, assinale a alternativa correta.

- A) O WASI é mais extenso e detalhado que o WISC-IV.
  - B) O WISC-IV é um instrumento breve de triagem cognitiva.
  - C) Ambos avaliam exclusivamente funções emocionais.
  - D) O WASI é um instrumento abreviado de avaliação da inteligência, enquanto o WISC-IV é uma bateria completa para crianças.
  - E) O WISC-IV não é indicado para crianças.
- 

**QUESTÃO 40** – Sobre a atuação do psiquiatra da infância e adolescência no CAPSi, assinale a alternativa correta.

- A) A atuação do psiquiatra no CAPSi é restrita à prescrição medicamentosa, sem participação em atividades coletivas ou interdisciplinares.
- B) O psiquiatra atua de forma integrada à equipe multiprofissional, participando do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e do cuidado territorial.
- C) O CAPSi destina-se exclusivamente ao atendimento de crianças com transtornos mentais leves.
- D) O CAPSi substitui completamente a rede de atenção básica e os serviços hospitalares.
- E) A atuação do psiquiatra no CAPSi exclui o trabalho com famílias e cuidadores.