

Sábado de tarde

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FDT 2025

PROFISSÃO: ENFERMAGEM

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES REFERE-SE **À PROFISSÃO OU ÁREA** PARA A QUAL REALIZOU A INSCRIÇÃO;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_07/11/2025 12:10:12



HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 01 – Considerando as reflexões apresentadas por Macedo e Medeiros (2025) acerca dos marcadores sociais da diferença, interseccionalidade e saúde coletiva, analise as assertivas abaixo sobre a interseccionalidade e assinale a alternativa correta.

- I. Não se limita ao acúmulo de identidades, mas funciona sobretudo como uma lente analítica que revela como estruturas sociais interagem e produzem efeitos políticos e legais.
 - II. Considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária estão inter-relacionadas e moldam-se mutuamente.
 - III. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02 – Considerando a divisão do território na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a partir de três níveis de atuação, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Território-área.
- 2. Território-microárea.
- 3. Território moradia.

Coluna 2

- () Corresponde à área de atuação do ACS.
- () Espaço de menor agregação social, permite aprofundar o conhecimento para o desenvolvimento de ações de saúde.
- () Representa o espaço-população adstrita.
- () Espaço onde se estabelece vínculo com uma unidade de saúde, permitindo melhor relação e fluxo população-serviços.
- () Subdivisão do território-área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- C) 2 – 1 – 3 – 3 – 3.
- D) 1 – 3 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 03 – Considerando a organização das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no SUS, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma rede oficialmente estabelecida atualmente.

- A) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
- B) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- C) Rede de Atenção à População Geral.
- D) Rede Alyne.

QUESTÃO 04 – Nos termos do artigo 200 da Constituição Federal de 1988, além de outras atribuições, ao Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:

- A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- B) Formular políticas e executar ações de saneamento básico.
- C) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 05 – Sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde de que trata a Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.
- () Toda pessoa tem a obrigação de participar dos conselhos e conferências de saúde.
- () Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
- () Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – V – V.

QUESTÃO 06 – A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes. São princípios da telessaúde:

- I. Autonomia do profissional de saúde.
- II. Consentimento livre e informado do paciente.
- III. Dignidade e valorização do profissional de saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Diversos indicadores englobam fatores determinantes da saúde e, por isso, devem ser considerados no planejamento, monitoramento e avaliação da situação de saúde. Informações relacionadas à escolaridade, renda e condições de moradia estão associadas a qual indicador?

- A) Saúde ambiental.
- B) Demográfico.
- C) Socioeconômico.
- D) Nutrição, crescimento e desenvolvimento.

QUESTÃO 08 – Conforme Carvalho, Pinho e Garcia (2017) sobre os conceitos e aplicações dos indicadores de mortalidade, taxas elevadas de mortalidade _____ podem refletir condições de baixo desenvolvimento socioeconômico, precária infraestrutura ambiental, bem como acesso e qualidade de recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Nesse contexto, a mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer até os 27 dias de vida; a taxa de mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer dos 28 aos 364 dias de vida; e a mortalidade _____ refere-se ao número de óbitos ocorridos no período compreendido entre 22 semanas completas de gestação e 7 dias completos após o nascimento por mil nascimentos totais na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) infantil – neonatal – pós-neonatal – perinatal
- B) infantil – perinatal – pós-neonatal – neonatal
- C) pós-neonatal – neonatal – infantil – neonatal
- D) neonatal – pós-neonatal – infantil – perinatal

QUESTÃO 09 – Considerando o acolhimento da demanda espontânea na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A equipe deve atender todas as pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida.
- B) A coexistência de agendas programadas e de demanda espontânea não amplia o acesso aos serviços de saúde.
- C) A implantação do acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar.
- D) Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população e do território.

QUESTÃO 10 – Considerando o debate apresentado por Costa (2017) acerca da Educação Interprofissional em Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A educação interprofissional em saúde define-se a partir de um processo de aprendizagem com, para e sobre outras profissões.
- () A finalidade da Educação Interprofissional em Saúde é formar profissionais colaborativos e integrados, rompendo com a formação uniprofissional tradicional.
- () A colaboração se sustenta em quatro pilares: compartilhamento, parceria, interdependência e poder.
- () Os termos multidisciplinar e interprofissional podem ser usados como sinônimos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – V.

QUESTÃO 11 – O SUS será _____ com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, também de outras fontes. A Lei ainda presume que a aplicação de _____ mínimos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios no setor de saúde será feita de forma progressiva, de acordo com critérios definidos em lei complementar, possibilitando a progressividade dos investimentos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) regulado – padrões
- B) regulado – serviços
- C) financiado – serviços
- D) financiado – recursos

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde efetua-se preferencialmente por meio da:

- A) Autonomia da escolha dos usuários entre os estabelecimentos da rede privada.
- B) Porta de entrada do SUS, definida pela Atenção Primária à Saúde.
- C) Porta de entrada principal do SUS, representada pelos serviços hospitalares de alta complexidade.
- D) Atenção domiciliar e serviços de pronto atendimento.

QUESTÃO 13 – As Políticas Públicas de Saúde são instrumentos fundamentais para garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente. No Brasil, o SUS representa uma das maiores redes de saúde pública do mundo, sustentada por princípios como a universalidade, integralidade e equidade (Albuquerque, 2005). Sobre o processo histórico da construção do SUS no Brasil, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A Reforma Sanitária brasileira teve como um de seus principais marcos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986 e defendeu a saúde como direito de cidadania e dever do Estado.
- () O SUS foi oficialmente instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado posteriormente pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1991.
- () Antes da criação do SUS, o sistema de saúde brasileiro era universal, com acesso garantido a toda a população por meio do INAMPS.
- () As Ações Integradas de Saúde (AIS) representaram uma tentativa de municipalização da saúde antes da Constituição de 1988.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – F.

QUESTÃO 14 – Em relação à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) conforme o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas abaixo:

- I. A RAS é composta unicamente por serviços da Atenção Primária à Saúde.
- II. A atenção às urgências e emergências é considerada componente da RAS.
- III. A coordenação do cuidado e o acesso regulado são princípios da RAS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 15 – Em relação aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), analise as assertivas abaixo:

- I. A PNH defende a ampliação da autonomia dos sujeitos, o protagonismo e a corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários.
- II. De acordo com a Política, a humanização restringe-se ao bom atendimento, com foco na cordialidade no trato com os usuários.
- III. Uma das diretrizes da PNH é a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.
- IV. A PNH propõe a indissociabilidade entre atenção e gestão dos serviços.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – A PNH tem como propósito a transversalização nas práticas de saúde por meio do reconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado. Nesse contexto, um dos dispositivos utilizados na transversalização da PNH é o(a):

- A) Acolhimento com classificação de risco e sistema de ausculta qualificada.
- B) Centralização do cuidado nas ações médicas e hospitalares.
- C) Hierarquização rígida dos processos decisórios nas instituições de saúde.
- D) Fortalecimento das relações verticalizadas entre gestores e usuários.

QUESTÃO 17 – Considerando os mecanismos para a ordenação da Rede de Atenção à Saúde no SUS instituídos pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta em relação aos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs).

- A) Sua celebração é facultativa e não interfere na pactuação das responsabilidades dos entes federativos.
- B) Definem as responsabilidades sanitárias, metas, indicadores e formas de monitoramento e avaliação entre os entes da federação.
- C) Substituem os instrumentos de planejamento como o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde.
- D) Definem somente as responsabilidades sanitárias e formas de monitoramento e avaliação entre os entes dos Estados.

QUESTÃO 18 – Sobre os princípios e diretrizes do SUS na sua interface e relação com as Políticas Públicas de Saúde e na implementação destas, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A equidade como princípio do SUS denota tratar igualmente todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades específicas.
- () A descentralização com comando único é uma diretriz do SUS que garante maior autonomia a estados e municípios na gestão da saúde.
- () A contribuição da comunidade na formulação e controle das políticas de saúde é garantida por meio dos conselhos e conferências de saúde.
- () A integralidade implica que o usuário deve ter acesso a todos os níveis de atenção, desde a promoção até o cuidado de alta complexidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – F – V – F.

QUESTÃO 19 – As equipes eMulti são formadas por profissionais de saúde de várias áreas, que trabalham juntos de forma complementar e integrada com as demais equipes da Atenção Primária à Saúde. Sobre as equipes eMulti, assinale a alternativa correta.

- A) Devem ser compostas somente por profissionais nutricionistas e fisioterapeutas, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- B) Devem ser compostas somente por profissionais fisioterapeutas e assistentes sociais, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional.
- C) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- D) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, assistentes sociais, entre outros, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional, independentemente de necessidades locais.

QUESTÃO 20 – Considerando o documento “Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?” (Ministério da Saúde, 2018), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada elemento ou princípio da PNEPS às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Educação Permanente em Saúde (EPS).
2. Planejamento ascendente.
3. Integração ensino-serviço.
4. Cogestão dos processos de trabalho.

Coluna 2

- () Presume a escuta de trabalhadores e de usuários na definição de prioridades formativas.
- () Apoiar-se na problematização das práticas e faltas reais dos serviços de saúde.
- () Busca articular instituições formadoras e os serviços de saúde na construção dos saberes.
- () Valoriza a construção coletiva e participativa dos processos de gestão e educação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em relação à produção do leite materno, analise a descrição abaixo:

- Há uma queda acentuada nos níveis sanguíneos maternos de progesterona, com consequente liberação de prolactina pela hipófise anterior, iniciando a secreção do leite. Há também a liberação de ocitocina durante a sucção, hormônio produzido pela hipófise posterior, que tem a capacidade de contrair as células mioepiteliais que envolvem os alvéolos, expulsando o leite neles contido.

A descrição refere-se à:

- A) Lactogênese fase I.
- B) Lactogênese fase II.
- C) Galactopoiese.
- D) Translactação.

QUESTÃO 22 – Considerando o disposto no documento "Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar", do Ministério da Saúde (2015), em relação ao aleitamento materno, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Apesar de a alimentação variar enormemente entre as pessoas, o leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres que amamentam do mundo.
- II. O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês a termo.
- III. Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite cru.
- IV. Nos primeiros meses, recomenda-se que a criança seja amamentada a cada 3 horas, pelo menos 20 minutos em cada mama.

- A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 23 – São ações estratégicas do eixo de atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido:

- I. Prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
- II. Utilização do "Método Canguru" para recém-nascido prematuro e de baixo peso.
- III. Alta qualificada do recém-nascido da maternidade, com vinculação da dupla mãe-bebê à Atenção Especializada, de forma precoce, para continuidade do cuidado.
- IV. As triagens neonatais universais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 24 – Em relação ao acompanhamento da criança, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O preenchimento da Caderneta permite que os familiares e cuidadores se apropriem das informações sobre a saúde da criança.
- () Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a faixa etária anterior é considerado um alerta para o desenvolvimento e deve-se orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança e marcar consulta de retorno em 30 dias.
- () As crianças menores de 2 anos devem ser medidas deitadas (comprimento) e as crianças com 2 anos ou mais devem ser medidas em pé (estatura), sendo que existe uma diferença de 0,7 cm entre a estatura da criança medida deitada e em pé, devendo-se fazer a correção do valor antes de registrá-lo no gráfico.
- () Para avaliação dos marcos de desenvolvimento, caso a criança tenha nascido prematura, é preciso corrigir a sua idade, diminuindo da idade atual o tempo que faltou para completar 40 semanas ou 9 meses de gestação, sendo que esta idade corrigida deve ser utilizada até 2 anos de idade cronológica e até 3 anos, se Idade Gestacional (IG) <28 semanas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – V – F – F.
- D) F – F – V – F.

QUESTÃO 25 – Em relação às triagens neonatais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O teste da orelhinha ou triagem auditiva deve ser realizada preferencialmente na maternidade entre 24 e 48h após o nascimento, ou, no máximo, durante o 1º mês de vida.
- B) O teste do coraçãozinho é realizado através da oximetria de pulso na maternidade após 24h de vida.
- C) O teste do desenvolvimento motor ou teste da perninha deve ser realizado preferencialmente na maternidade.
- D) O teste do pezinho deve ser realizado idealmente na maternidade ou entre o 3º a 5º dia.

QUESTÃO 26 – A equipe da Estratégia Saúde da Família foi acionada para uma visita domiciliar na casa de dona Lúcia, 42 anos, deficiente auditiva há 10 anos. Ela vive com o marido e o filho adolescente. O motivo da visita era o acompanhamento de uma ferida na perna decorrente de um acidente doméstico. Ao chegar, a equipe percebe que a comunicação com Dona Lúcia é mediada pelo marido, que se apresenta como seu intérprete. Ele informa que ela “não entende bem as coisas” e responde às perguntas no lugar dela. Por esse motivo ela somente sai de casa acompanhada por ele. Quando a enfermeira tenta utilizar gestos simples e escrita para se comunicar, o marido interrompe, dizendo que “ela não sabe ler direito” e que “fica nervosa” quando alguém tenta falar com ela dessa forma. Durante o curativo, Dona Lúcia demonstra ansiedade e tenta gesticular algo, mas o marido pede que ela fique quieta para que a enfermeira finalize o procedimento. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.

- A) A equipe deve manter o atendimento com o marido como intérprete para criar vínculo com dona Lúcia.
- B) A situação traz um alerta sobre violência psicológica, evidenciada, entre outros, pelo impedimento realizado pelo marido do acesso à comunicação de dona Lúcia.
- C) Ao registrar o caso no prontuário, a equipe deve evitar registrar a deficiência auditiva, para proteger dona Lúcia de qualquer exposição desnecessária.
- D) A situação caracteriza um modo adequado de facilitar a comunicação diante da ausência de intérprete.

QUESTÃO 27 – Em relação à gravidez na adolescência, analise a sentença abaixo:

Sabe-se que mães adolescentes, ou seja, as meninas que engravidam na faixa etária de 10 a 19 anos, apresentam os maiores riscos de eclâmpsia, endometrite puerperal e infecções sistêmicas do que mulheres de 20 a 24 anos (**1ª parte**). Existem fortes evidências de que parte considerável das relações sexuais entre adolescentes de 10 a 14 anos tendem a não ser consentidas, sendo a relação entre abuso sexual e gravidez nessa faixa etária um fenômeno de alta magnitude e requer abordagens diferenciada. (**2ª parte**). Cabe destacar que o Código Penal brasileiro caracteriza crime de estupro de vulnerável como qualquer ato sexual com pessoa menor de 14 anos, sendo que o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima eliminam a ocorrência do crime (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.

QUESTÃO 28 – São características do pré-natal inadequado, EXCETO:

- A) Iniciar o pré-natal antes do terceiro mês de gestação.
- B) Iniciar o pré-natal após o terceiro mês de gestação.
- C) Realizar até três consultas durante o pré-natal desde que iniciado no primeiro de gestação.
- D) Realizar, no mínimo, quatro consultas durante o pré-natal iniciado após o primeiro de gestação.

QUESTÃO 29 – Sobre as condições clínicas da gestante para avaliação em relação ao planejamento do local do parto, assinale a alternativa correta.

- A) Diabetes e Hipertireoidismo são considerados situações de risco intermediário, podendo ser indicado o planejamento do parto em Centro de Parto Normal (CPN) extra-hospitalar.
- B) Tuberculose em tratamento é considerada de risco habitual, podendo ser indicado parto domiciliar ou CPN extra-hospitalar.
- C) Hipertensão é considerada de risco intermediário, indicando o planejamento do parto em CPN peri-hospitalar.
- D) Placenta prévia é considerada um fator de risco para planejamento do parto em uma maternidade.

QUESTÃO 30 – A detecção precoce do câncer constitui-se de rastreamento e diagnóstico precoce. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O rastreamento busca identificar o câncer em estágio inicial em pessoas que apresentam sinais e sintomas suspeitos da doença.
- B) Uma das propriedades dos testes diagnósticos é a validade ou acurácia, que se refere à produção de resultados consistentes quando realizado várias vezes sob as mesmas condições.
- C) Os rastreamentos oportunistas tendem a ser mais custo-efetivos, ou seja, têm maiores efeitos benéficos a um custo menor.
- D) Valor preditivo corresponde à probabilidade de ter uma doença dados os resultados de um teste já realizado.

QUESTÃO 31 – Com o intuito de contrapor o consumo excessivo de exames, surge o conceito de prevenção _____, que se refere à prevenção de danos associados às intervenções médicas e busca proteger os indivíduos dos malefícios ocasionados por demasiadas intervenções de rastreamento, diagnósticas e terapêuticas em geral, apoiando-se na necessidade do uso racional dos recursos de saúde e na promoção do uso consciente dos dispositivos tecnológicos. Dessa forma, busca-se a diminuição da probabilidade de adoecimento inatrogênico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) primária
- B) secundária
- C) terciária
- D) quaternária

QUESTÃO 32 – O rastreamento mamográfico populacional no SUS deve ser realizado em mulheres na faixa etária entre 50 e 74 anos, mas não restringe o acesso das mulheres com idade entre 40 e 49 anos e acima de 74 anos sem sinais ou sintomas suspeitos. Em relação ao câncer de mama, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É considerado uma doença heterogênea, com grande variação no comportamento biológico, sendo a idade o principal fator de risco para o seu desenvolvimento.
- B) Um resultado com categoria BI-RADS 3 é considerado suspeito de malignidade, sendo necessário biópsia e estudo histopatológico.
- C) O rastreamento em mulheres mais jovens pode acarretar riscos, como a realização de exames desnecessários, biópsias, cirurgias, e o aumento da ansiedade, uma vez que alterações detectadas podem ser benignas, mas demandam tratamentos invasivos.
- D) A recomendação é que a mamografia de rastreamento seja oferecida às mulheres dentro da faixa etária recomendada, com periodicidade bienal.

QUESTÃO 33 – Paciente de 42 anos procura o pronto atendimento relatando dor intensa na região lombar esquerda, iniciada há cerca de duas horas. A dor começou de forma insidiosa, na região lombar esquerda, e aumentou progressivamente de intensidade, tornando-se muito forte, em cólica, sem alívio com mudança de posição ou repouso. Refere irradiação da dor para o flanco esquerdo, fossa ilíaca e bolsa escrotal, associada a náuseas, sudorese fria e palidez cutânea. Relata também disúria e urina escura, notando presença de "traços de sangue" na micção. Ao exame, encontra-se inquieto, com taquicardia leve, sem febre, com abdome plano, sem sinais de peritonismo, com desconforto à palpação do lado esquerdo. Com base nos achados clínicos apresentados, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Apendicite aguda.
- B) Cólica renal.
- C) Hernia inguinal estrangulada.
- D) Infecção do trato urinário (ITU).

QUESTÃO 34 – Em relação à caracterização da dor, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Cólica, peso, choque e queimação se referem à tipologia da dor.
- B) Uma dor explosiva, em segundos; rápida e progressiva, em 1 a 2h; e gradual, em várias horas, se refere às características da sua instalação.
- C) A Escala Numérica de Dor é uma ferramenta que caracteriza uma nota para qualificar a intensidade da dor referida, sendo que "ZERO" significa sem dor e "10" é uma dor máxima imaginável, e "8" é considerada uma dor moderada.
- D) Entre os fatores associados à dor com interesse na avaliação estão febre, vômitos, alteração do ritmo intestinal e alterações urinárias e ginecológicas.

QUESTÃO 35 – Em relação à avaliação primária e secundária no suporte avançado de vida, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O objetivo da avaliação primária é localizar alterações na cor da pele ou mucosas, assimetrias morfológicas, instabilidades hemodinâmicas, ruídos anômalos emitidos pelo paciente, alterações de motricidade e sensibilidade.
- B) Considera-se crítico todo o paciente que apresenta alterações significativas em qualquer etapa da avaliação.
- C) Se o paciente for considerado crítico, o tempo de permanência na cena deve ser o mínimo possível.
- D) A avaliação secundária é importante, porém não obrigatória, principalmente nos pacientes críticos ou se sua realização implicar em atraso de transporte.

QUESTÃO 36 – A necessidade da abordagem sobre suicídio e ideação suicida deve ser encarada como uma questão de saúde pública, visto os números alarmantes e o aumento dos casos em todas as faixas etárias e níveis socioeconômicos. Em relação ao tema, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Suicídios são evitáveis e um dos estados mais comuns encontrados nessa situação é a impulsividade, fenômeno de natureza transitória. Se a ajuda é fornecida no momento do impulso, a crise pode ser combatida.
- () Estabelecer um “contrato de não-suicídio” é uma técnica útil na prevenção do suicídio, válida em qualquer situação, e pessoas próximas ao paciente podem ser incluídas na sua negociação.
- () Pensamentos de suicídio recorrentes, alto nível de intenção de morrer no futuro imediato, agitação ou pânico e existência de plano de uso de métodos violentos e imediatos são algumas das indicações para hospitalização imediata.
- () Colocar o paciente em leito distante ao posto de enfermagem, para evitar incômodo aos demais pacientes, discutir o caso nas trocas de equipe, manter isolamento e supervisionar as idas ao banheiro são ações recomendadas em enfermagem.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.

QUESTÃO 37 – A estomia, abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico. Em relação à estomia, assinale a alternativa correta.

- A) As ileostomias referem-se às estomias confeccionadas no intestino grosso.
- B) A pessoa com estomia pode tomar banho com ou sem o equipamento coletor, de acordo com orientação e preferência, evitando-se temperatura elevada da água.
- C) A complicação mais frequente em pessoas com estomias é a hérnia paraestomia.
- D) A limpeza deve ser realizada preferencialmente com produtos que contenham algum percentual de álcool, como lenços umedecidos.

QUESTÃO 38 – As _____ podem ser rasas em áreas com pouca ou nenhuma gordura subcutânea, a depender da localização. Nas _____, a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. As _____, isto é, tecido de aparência seca, aderente e sem eritema ou flutuação, em membro isquêmico ou no calcâneo, não devem ser removidas. As _____ não devem ser usadas para descrever lesão por fricção, queimaduras por fita, dermatite associada à incontinência, maceração ou escoriação.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) úlceras por pressão de grau IV – lesões por pressão não classificáveis – escaras estáveis – úlceras por pressão de grau II
- B) escaras estáveis – úlceras por pressão de grau IV – úlceras por pressão de grau II – lesões por pressão não classificáveis
- C) úlceras por pressão de grau II – úlceras por pressão de grau IV – lesões por pressão não classificáveis – escaras estáveis
- D) lesões por pressão não classificáveis – escaras estáveis – úlceras por pressão de grau IV – úlceras por pressão de grau II

QUESTÃO 39 – A superlotação nos Serviços de Emergência Hospitalares (SEH) reflete o desequilíbrio entre a alta demanda por atendimento de pacientes com condições agudas e a limitada oferta de serviços assistenciais. Em relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tempo de espera para internação de até 1 hora após a decisão clínica é uma das características da superlotação.
- B) O principal marcador da superlotação é o aumento do tempo de permanência no SEH.
- C) O atraso no diagnóstico e no tratamento é a principal consequência, aumentando a taxa de mortalidade hospitalar, com óbitos evitáveis.
- D) A "pressão de porta" é um dos componentes da superlotação relacionado com a pressão exercida nos SEH pelo grande número de atendimentos em razão das baixas ofertas e resolubilidade das organizações de saúde não hospitalares.

QUESTÃO 40 – Fazem parte dos quatro conceitos centrais ou metaparadigmas das teorias e modelos teóricos da Enfermagem, EXCETO:

- A) Pessoa.
- B) Clínica.
- C) Saúde.
- D) Enfermagem.

QUESTÃO 41 – O Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, estabelece responsabilidades claras para o enfermeiro que vão além de suas atribuições privativas, atuando como integrante da equipe de saúde. Em relação às atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) As atividades do técnico e do auxiliar de enfermagem são de execução autônoma, cabendo ao enfermeiro apenas a validação final dos procedimentos mais complexos.
- B) O enfermeiro deve supervisionar, orientar e dirigir as atividades, descritas no art. 10 e 11 do referido Decreto, exercidas por técnicos e auxiliares de enfermagem.
- C) A supervisão do enfermeiro sobre as atividades dos técnicos e auxiliares é restrita a ambientes hospitalares de alta complexidade e centros cirúrgicos.
- D) O enfermeiro é responsável unicamente pela execução das atividades privativas, não tendo ingerência sobre o planejamento ou supervisão direta das ações dos demais níveis de enfermagem.

QUESTÃO 42 – Considerando a Resolução Cofen nº 736/2024, que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Avaliação de Enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos e objetivos, inicial e contínua, pertinente à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de diversas técnicas.
- B) O Diagnóstico de Enfermagem representa o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais, identificando problemas ou condições de vulnerabilidade.
- C) A Implementação de Enfermagem, etapa de execução das intervenções e atividades planejadas, deve ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro, sendo vedada a participação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, mesmo sob supervisão.
- D) O Planejamento de Enfermagem envolve a priorização de Diagnósticos de Enfermagem, a determinação de resultados esperados e exequíveis, e a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem.

QUESTÃO 43 – Lucas, de 5 meses, acompanhado pelos pais, chega à Unidade Básica de Saúde para continuidade de seu esquema vacinal. De acordo com a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025, considerando que até os 4 meses de idade Lucas recebeu todas as vacinas recomendadas para a sua faixa etária, ele deve receber a vacina

- A) pneumocócica 10-valente (1ª dose).
- B) meningocócica ACWY (2ª dose).
- C) hepatite A (1ª dose).
- D) meningocócica C (2ª dose).

QUESTÃO 44 – São substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dos produtos que contêm microrganismos inativados ou seus componentes (por exemplo: os toxoides tetânico e diftérico). Não são utilizados em vacinas que contêm microrganismos vivos (Brasil, 2024). O trecho refere-se aos:

- A) Estabilizantes.
- B) Adjuvantes.
- C) Conservantes.
- D) Antígenos.

QUESTÃO 45 – De acordo com a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2025, sobre o esquema básico e os limites etários para a administração da vacina rotavírus humano, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O esquema básico inclui 2 doses, aos 2 e aos 4 meses de idade, observando o intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias (em situações excepcionais).
- B) Crianças que receberam a 1ª dose podem receber a 2ª entre 3 meses e 15 dias a 23 meses e 29 dias de idade, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- C) Crianças com esquema em atraso devem atualizar a situação vacinal o mais breve possível. Caso não tenham recebido a primeira dose até a idade máxima recomendada (11 meses e 29 dias de idade), perdem oportunidade de serem vacinadas.
- D) Caso a 1ª dose não seja realizada dentro do intervalo preconizado (1 mês e 15 dias a 11 meses e 29 dias de idade), a criança deverá receber a 2ª dose para ter oportunidade de proteção.

QUESTÃO 46 – De acordo com o Guia de Vigilância integrada da Covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública (2024), analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O uso do antiviral está indicado para casos de síndrome gripal associados a condições ou fatores de risco para complicações, sendo a hipertensão arterial sistêmica uma das cardiovasculopatias que prioriza o tratamento precoce.
- () Em casos de Covid-19, o autoteste rápido de antígeno não é recomendado para fins de redução do período de isolamento, tanto para casos leves como para os assintomáticos confirmados laboratorialmente.
- () O vírus da gripe em animais não se transmite facilmente entre humanos. No entanto, embora seja incomum que as pessoas contraiam infecções por influenza diretamente de animais, infecções humanas esporádicas e surtos causados por certos vírus da influenza aviária e suína já foram relatados.
- () Alguns casos de influenza podem evoluir e apresentar complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 5 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 47 – De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2ª ed., 2019), analise as assertivas abaixo:

- I. O tratamento da tuberculose no Brasil é padronizado e oferecido exclusivamente pelo serviço público de saúde.
- II. O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes.
- III. A radiografia de tórax deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar. Juntamente com as radiografias de tórax, sempre devem ser realizados exames laboratoriais (baciloscopias, cultura e/ou teste rápido molecular) na tentativa de buscar o diagnóstico bacteriológico.
- IV. Não há evidências para utilização de prova tuberculínica (PT) como método auxiliar no diagnóstico de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar no adulto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48 – De acordo com o documento “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo” (2023), em relação ao tratamento não medicamentoso, a trombectomia mecânica é um procedimento _____ realizado por meio de _____, sendo indicado para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico agudo que apresentam _____ de grandes artérias cerebrais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cirúrgico – craniotomia – estenose
- B) endovascular – cateterismo – oclusão
- C) não invasivo – ultrassonografia – dilatação
- D) convencional – artroscopia – ruptura

QUESTÃO 49 – O diagnóstico clínico da doença de Alzheimer parte de um diagnóstico sindrômico de demência. De acordo com o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Alzheimer” (2017), o diagnóstico de demência é estabelecido quando há sintomas cognitivos ou comportamentais (neuropsiquiátricos) que atendem aos seguintes critérios, EXCETO:

- A) Interferem com a habilidade no trabalho ou em atividades usuais.
- B) Representam declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho.
- C) São explicáveis por delirium (estado confusional agudo) ou doença psiquiátrica maior.
- D) Afetam no mínimo dois domínios cognitivos ou comportamentais.

QUESTÃO 50 – Mulher, 55 anos, procura atendimento na Unidade de Pronto Atendimento com queixa de febre alta há 4 dias, acompanhada de cefaleia intensa, dor retro-orbital, mialgia e artralgia. Nega dor abdominal, vômitos, sangramentos importantes ou tontura. Ao exame físico, apresenta-se orientada, afebril no momento da consulta (temperatura de 36,8 °C), PA 120/70 mmHg, FC 85 bpm, com sangramento de pele induzido (prova do laço positiva). A paciente refere ser portadora de hipertensão arterial sistêmica, em uso regular de medicação, com boa adesão e controle. Considerando o caso clínico apresentado, o fluxograma de manejo clínico da dengue e o documento “Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico – Adulto e Criança” (2024), em qual grupo essa paciente deve ser classificada?

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.

QUESTÃO 51 – A terapia antirretroviral (Tarv) reduz a morbidade e a mortalidade relacionadas à aids, tem impacto na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV ou aids e estabelece o status de condição crônica do HIV. Sobre as recomendações em relação à Tarv, de acordo com o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos: Módulo 1: Tratamento” (2024), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Tarv deve ser iniciada após avaliação dos resultados de CD4 e carga viral.
- B) A pessoa vivendo com HIV ou aids deve ter claras as vantagens da Tarv, assim como a necessidade de não a interromper após seu início.
- C) Entre as pessoa vivendo com HIV ou aids com sinais e sintomas de comprometimento do sistema nervoso central, e na suspeita de infecções oportunistas, como meningite tuberculosa e meningite criptocócica, o início da Tarv deve ser postergado.
- D) A Tarv deve ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico da infecção pelo HIV.

QUESTÃO 52 – Os agentes biológicos que afetam o ser humano, os animais e as plantas são distribuídos em classes de risco. Conforme a Classificação de risco dos agentes biológicos (2022), relacione a Coluna 1 a Coluna 2, associando as seguintes classes às suas respectivas descrições.

Coluna 1

1. Classe de Risco 1.
2. Classe de Risco 2.
3. Classe de Risco 3.
4. Classe de Risco 4.

Coluna 2

- () Nessa classe o risco individual é moderado e o risco para a comunidade é limitado, para a qual existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas eficazes.
- () Até o momento, não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por esses agentes biológicos.
- () Os agentes biológicos representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Um exemplo é o HIV.
- () Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no ser humano ou nos animais adultos saudáveis.

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 4 – 2.
- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 2 – 4 – 3 – 1.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 53 – A RDC nº 15/2012 estabelece as diretrizes para as boas práticas no processamento de produtos para a saúde, visando garantir a segurança dos pacientes e a qualidade dos procedimentos. Considerando o disposto na Resolução, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O processamento de produtos para a saúde deve ser realizado em áreas distintas e seguir um fluxo unidirecional, evitando o cruzamento de materiais sujos, limpos e estéreis.
- () O transporte de produtos para a saúde processados pode ser realizado em recipientes abertos, desde que o tempo de transporte não exceda uma hora e seja feita a identificação completa do conteúdo para rastreabilidade.
- () É obrigatória a realização do teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
- () Todos os resíduos, mesmo de indicadores com resultado negativo, precisam de tratamento prévio antes do descarte.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – F – V – V.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 54 – Mulher, 45 anos, foi recentemente diagnosticada com Diabetes Mellito Tipo 2 (DM2). Durante a consulta de enfermagem inicial, ela relata histórico de hipertensão arterial sistêmica controlada e dislipidemia. Não apresenta histórico de hipoglicemia grave, expectativa de vida limitada ou complicações micro ou macrovasculares conhecidas relacionadas ao diabetes. Após a avaliação clínica e laboratorial, sua hemoglobina glicada (HbA1c) foi de 8,2%. Considerando o "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo II" (2024), qual é a meta recomendada de HbA1c para essa paciente, visando o manejo inicial e a prevenção de complicações a longo prazo?

- A) <5,5%.
- B) <6,0%.
- C) <6,5%.
- D) <7,0%.

QUESTÃO 55 – A automonitorização da glicemia (AMG) é uma ferramenta essencial no manejo do Diabetes Mellito Tipo 1 (DM1), permitindo ajustes terapêuticos e prevenção de complicações. Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do DM1 (2019), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A AMG é indicada para todos os pacientes com DM1, sendo fundamental para o ajuste das doses de insulina e avaliação contínua do tratamento.
- B) Melhor controle metabólico e menor número de hipoglicemias em pacientes com DM1 estão associados com a realização de maior número de testes e ajuste adequado da terapêutica conforme seus resultados.
- C) A avaliação do controle glicêmico deve se restringir à hemoglobina glicada (HbA1c), pois outros parâmetros, como a variabilidade glicêmica, não possuem relevância clínica significativa.
- D) A distribuição das tiras reagentes, para o AMG, segue as normas de cada local, recomendando-se, pelo menos, três a quatro testes por dia e aumentando o fornecimento de acordo com as necessidades do paciente.

QUESTÃO 56 – A assistência domiciliar (AD) apresenta diversos riscos que devem ser avaliados e gerenciados para garantir a segurança do paciente. Considerando os riscos inerentes à AD, constantes no guia “Atenção Domiciliar na Atenção Primária à Saúde” (2020), analise as assertivas abaixo:

- I. Contato com animais de estimação no domicílio não representa risco de infecção para pacientes em assistência domiciliar.
- II. Pacientes com disfagia apresentam risco aumentado de broncoaspiração, sendo importante posicionamento adequado durante a alimentação e o uso de espessante para líquidos, quando indicado, ou mudança de consistência da dieta.
- III. O uso de medicações como: anticoagulantes (varfarina, enoxaparina), salicilatos (AAS), anti-inflamatórios (ibuprofeno, diclofenaco) cápsula de vitamina E, ginkgo biloba estão relacionadas ao risco de sangramento.
- IV. O uso de benzodiazepínicos está relacionado às alterações fisiológicas que aumentam o risco de quedas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 57 – O “Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa” (2023), ao abordar o processo de envelhecimento humano, estabelece uma distinção fundamental entre senescência e senilidade. Considerando a avaliação de uma pessoa idosa, assinale a alternativa que apresenta uma condição que se alinha ao conceito de senilidade.

- A) Diminuição da força muscular e massa óssea, sem comprometimento funcional significativo para as atividades de vida diária.
- B) Desenvolvimento de doença de Alzheimer, com declínio cognitivo progressivo que impede a autonomia e a independência.
- C) Redução progressiva da capacidade auditiva para sons de alta frequência (presbiacusia).
- D) Surgimento de cabelos brancos, perda de pigmentação da pele e redução da elasticidade cutânea.

QUESTÃO 58 – O Teste de Fagerström para dependência de nicotina é uma ferramenta padronizada e amplamente utilizada para avaliar o grau de dependência física à nicotina em indivíduos tabagistas. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo (2020), em relação ao teste, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É composto por seis questões que abordam diferentes dimensões do comportamento tabagista, como o tempo para o primeiro cigarro após acordar e a quantidade de cigarros consumidos diariamente.
- () Um escore total de 5 pontos no Teste é indicativo de uma dependência muito elevada à nicotina, exigindo terapia farmacológica de alta intensidade.
- () A pontuação obtida no Teste é um elemento crucial para a tomada de decisão clínica, orientando a escolha da abordagem terapêutica mais adequada para o tratamento da dependência nicotínica.
- () Um dos seus objetivos é diagnosticar comorbidades psiquiátricas associadas ao tabagismo, como ansiedade e depressão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) F – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 59 – A Portaria SECTICS nº 14, de 08 de abril de 2024, do Ministério da Saúde, atualiza o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco de infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais no Brasil. Considerando as diretrizes atualizadas para a PEP, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A PEP está indicada para diversas situações de exposição, incluindo relações sexuais desprotegidas, acidentes ocupacionais com material biológico e situações de violência sexual.
- B) Para gestantes, independentemente da forma de exposição e da idade gestacional, os critérios para indicação de PEP para essa população são os mesmos aplicados a qualquer outra pessoa que tenha sido exposta ao HIV.
- C) As situações de exposição ao HIV constituem atendimento de urgência, em função da necessidade de início precoce da profilaxia para maior eficácia da intervenção. Nos casos em que o atendimento ocorrer após 72 horas da exposição, não está mais indicada a PEP.
- D) O esquema de tratamento antirretroviral para PEP geralmente tem duração de 30 dias e deve ser seguido rigorosamente para garantir sua máxima eficácia.

QUESTÃO 60 – De acordo com a Portaria SCTIE/MS nº 90/2022, são critérios de elegibilidade para a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV, EXCETO:

- A) Apresentar resultado sorológico positivo para o HIV, mas com carga viral indetectável há, pelo menos, seis meses.
- B) Idade a partir de 15 anos, com peso corporal igual ou maior a 35 kg, com vida sexualmente ativa e que apresentem contextos de risco aumentado para aquisição de infecção pelo HIV.
- C) Pessoas em parceria sorodiferentes para o HIV também são consideradas prioritárias para uso da PrEP.
- D) O simples pertencimento a um dos segmentos populacional não é suficiente para caracterizar indivíduos com exposição frequente ao HIV. Para essa caracterização, é necessário observar as práticas e parcerias sexuais, a dinâmica social, e os contextos específicos associados a um maior risco de infecção.