

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

A corrida contra o tempo para resgatar mais de duzentas pessoas presas no Monte Everest

Equipes de resgate foram enviadas às encostas tibetanas do Monte Everest, na fronteira entre o Tibete e o Nepal, após uma forte tempestade de neve deixar centenas de pessoas presas em acampamentos. Centenas de moradores locais e equipes especializadas trabalham para remover a neve que bloqueia o acesso à região, situada a quase cinco mil metros de altitude.

Cerca de trezentas e cinquenta pessoas já foram resgatadas e levadas a um local seguro, enquanto outras duzentas permanecem isoladas, aguardando evacuação. As nevascas começaram na noite de sexta-feira e se intensificaram rapidamente, surpreendendo os grupos de trilheiros e alpinistas.

Uma das sobreviventes relatou que o frio intenso tornou a hipotermia um risco real e que o clima deste ano está fora do normal. O grupo dela, formado por mais de dez pessoas, enfrentou ventos fortes e neve contínua durante a noite e precisou retornar no dia seguinte, caminhando por horas sobre trilhas completamente cobertas.

Moradores tibetanos auxiliaram os socorristas, levando alimentos e suprimentos para as equipes. A nevasca ocorreu durante o feriado nacional chinês conhecido como Semana Dourada, período de grande fluxo de turistas, o que agravou a situação.

As autoridades suspenderam o acesso à área turística do Everest, enquanto continuam as operações de resgate. A região enfrenta condições meteorológicas extremas: no Nepal, chuvas e deslizamentos de terra já causaram dezenas de mortes.

O Monte Everest, com quase nove mil metros de altitude, é o pico mais alto do mundo e atrai milhares de visitantes todos os anos. Nos últimos tempos, tem sofrido com superlotação, impactos ambientais e sucessivas mortes de alpinistas. O acesso ao Tibete é restrito e a circulação de informações é rigidamente controlada pelo governo, o que torna mais difícil acompanhar a situação em tempo real.

Mesmo assim, a imprensa estatal confirmou que o clima severo no Himalaia continua desafiando as equipes, que seguem em uma verdadeira corrida contra o tempo para retirar todos os sobreviventes da tempestade de neve.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy4jzlvvp05o>. adaptado.

Questão 01

Outras duzentas permanecem isoladas, aguardando "evacuação".

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma culta do pronome oblíquo para substituir o termo

destacado é:

- (A) Outras duzentas permanecem isoladas, a aguardando.
- (B) Outras duzentas permanecem isoladas, aguardando-lhe.
- (C) Outras duzentas permanecem isoladas, aguardando-a.
- (D) Outras duzentas permanecem isoladas, lhe aguardando.

Questão 02

Centenas de moradores locais e equipes especializadas trabalham.

Sintaticamente, é correto afirmar que o núcleo do sujeito é reconhecido:

- (A) como inexistente, já que o verbo "trabalham" tem sujeito indeterminado e expressa ação genérica.
- (B) pelo substantivo "equipes", visto que o termo "centenas" atua como quantificador e não exerce função de núcleo.
- (C) pelos vocábulos "centenas" e "equipes".
- (D) pelo termo "centenas", pois "equipes especializadas" funciona como adjunto adnominal que complementa o primeiro núcleo.

Questão 03

Mesmo assim, a imprensa estatal confirmou "que" o clima severo no Himalaia continua desafiando as equipes, "que" seguem em uma verdadeira corrida contra o tempo.

Em relação à classe gramatical, os termos destacados são, respectivamente,

- (A) pronome relativo e conjunção integrante.
- (B) pronome indefinido e conjunção explicativa.
- (C) conjunção integrante e pronome relativo.
- (D) conjunção coordenativa e pronome relativo.

Questão 04

As nevascas começaram na noite de "sexta-feira" e se intensificaram rapidamente.

Em relação à classe gramatical, o termo destacado trata-se de:

- (A) um adjetivo composto formado por dois substantivos, indicando qualidade do termo "noite".
- (B) uma locução nominal formada por preposição e substantivo.
- (C) um substantivo simples formado por um radical e um sufixo de tempo.
- (D) um substantivo composto formado por um numeral ordinal e um substantivo.

Questão 05

As autoridades suspenderam o acesso à área turística do Everest, enquanto continuam as operações de resgate.

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que, nesta frase,

- (A) o uso da crase em "as operações" é obrigatório, pois o substantivo "continuam" exige a preposição "a", que se funde ao artigo plural do substantivo; no entanto, o novo acordo ortográfico permite o uso ou não da crase por questões estilísticas.
- (B) o uso do acento indicativo de crase em "à área" é obrigatório, pois há a fusão da preposição exigida pelo substantivo "acesso" com o artigo definido feminino que acompanha o substantivo "área".
- (C) o uso da crase em "as operações" é facultativo, já que o "a" pode ser interpretado como preposição e não como artigo.
- (D) o uso da crase em "à área" é facultativo, pois o verbo "suspender" não exige preposição.

Questão 06

O Monte Everest, com quase nove mil metros de altitude, é o pico mais alto do mundo e "atrai" milhares de visitantes todos os anos.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo destacado nesta frase funciona como verbo:

- (A) transitivo indireto, pois exige complemento iniciado por preposição, implícita na estrutura.
- (B) transitivo direto, pois exige complemento sem preposição, representado pelo termo "milhares de visitantes".
- (C) intransitivo, pois a ação de "atrair" não recai sobre nenhum objeto expresso.
- (D) bitransitivo, pois possui dois complementos, um direto e outro indireto.

Questão 07

A intensa tempestade de neve nas encostas do Everest, descrita no texto base, revela um contexto em que o fenômeno natural, o turismo descontrolado e as restrições políticas se entrelaçam, evidenciando as múltiplas dimensões do desafio enfrentado pelas equipes de resgate.

De acordo com o texto base, é correto afirmar que:

- (A) o aumento do turismo na região, embora traga benefícios econômicos, tem contribuído para agravar os impactos ambientais e os riscos de acidentes nas encostas do Everest.
- (B) a complexidade da operação de resgate decorre não apenas das condições meteorológicas extremas, mas também do isolamento geográfico e do controle de informações imposto pelas autoridades locais.

- (C) a tempestade foi prevista com antecedência e, por isso, os trilheiros conseguiram se preparar adequadamente para enfrentá-la.
- (D) a atuação das equipes de resgate foi facilitada pelo livre acesso ao Tibete, onde jornalistas e estrangeiros puderam acompanhar os trabalhos de forma autônoma.

Questão 08

Trecho 1: Centenas de moradores locais e equipes especializadas trabalham para remover a neve que "bloqueia" o acesso à região, situada a quase cinco mil metros de altitude.

Trecho 2: O acesso ao Tibete é "restrito" e a circulação de informações é rigidamente controlada pelo governo, o que torna mais difícil acompanhar a situação em tempo real.

Em relação à significação das palavras destacadas, é correto afirmar que:

- (A) "bloqueia" e "restrito" possuem o mesmo valor de proibição absoluta, sendo sinônimos perfeitos em qualquer contexto.
- (B) "bloqueia" sugere apenas lentidão no acesso, enquanto "restrito" indica abundância de informações disponíveis.
- (C) ambas expressam ideia de permissão, já que indicam acesso monitorado e controlado.
- (D) ambas indicam ideia de limitação, pois "bloqueia" transmite o sentido de impedir fisicamente a passagem e "restrito" expressa o controle ou limitação de acesso a algo.

Questão 09

A região enfrenta condições meteorológicas extremas: no Nepal, chuvas e deslizamentos de terra já causaram dezenas de mortes.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) "meteorológicas" é acentuado por ser um vocábulo proparoxítono legítimo.
- (B) há um vocábulo acentuado por ser oxítono terminado em "o".
- (C) "já" recebe acento por ser um vocábulo oxítono terminado em "a".
- (D) há um vocábulo acentuado por ser oxítono terminado em "es".

Questão 10

O grupo dela, formado por mais de dez pessoas, enfrentou ventos fortes e neve contínua durante a noite e precisou retornar no dia seguinte, caminhando por horas sobre trilhas completamente cobertas de neve.

De acordo com a regência nominal, a preposição "de" é exigida pelo termo "cobertas" para indicar:

- (A) causa, por revelar o motivo de as trilhas estarem encobertas.
- (B) lugar, por assinalar a posição em que ocorreu a ação de cobrir.
- (C) matéria, pois expressa o elemento que recobre ou constitui a superfície mencionada.
- (D) instrumento, por indicar o meio utilizado para encobrir as trilhas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Em uma palestra sobre ética e raciocínio lógico, o professor Leonardo afirma:

"Ou o servidor cumpre suas obrigações, ou não as cumpre."

Essa afirmação representa logicamente:

- (A) A sentença é uma contradição, pois é sempre falsa.
- (B) A sentença é uma contingência, pois depende do contexto.
- (C) A sentença é uma tautologia, pois é verdadeira em qualquer situação.
- (D) A sentença é inválida, pois falta uma hipótese.

Questão 12

A empresa MetalArte Indústria de Componentes, especializada na fabricação de peças metálicas para bicicletas, recebeu um grande pedido de uma montadora internacional.

Durante a fase de testes de produtividade, verificou-se que 6 funcionários, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, conseguiram produzir 360 peças.

Com o novo contrato, o gerente de produção Rogério Lima decidiu ampliar a equipe e ajustar a jornada de trabalho para atender à demanda dentro do prazo. Assim, a nova configuração contará com 9 funcionários, cada um trabalhando 10 horas por dia durante 6 dias, mantendo as mesmas condições de eficiência.

Nessas circunstâncias, quantas peças a equipe deverá produzir ao final do período de 6 dias?

- (A) A equipe deverá produzir 890 peças.
- (B) A equipe deverá produzir 910 peças.
- (C) A equipe deverá produzir 925 peças.
- (D) A equipe deverá produzir 810 peças.

Questão 13

Um técnico de laboratório tem 5 frascos idênticos, sendo 2 com solução contaminada e 3 com solução pura. Ao escolher aleatoriamente um frasco, qual é a probabilidade de escolher uma solução pura?

- (A) A probabilidade é de 60%.
- (B) A probabilidade é de 14%.

- (C) A probabilidade é de 25%.
- (D) A probabilidade é de 52%.

Questão 14

Beto participou de um processo seletivo na empresa TechSol Inovações Digitais, que realizou um concurso interno de promoção para selecionar um novo coordenador de projetos. O processo avaliativo foi dividido em três etapas, cada uma com peso diferente, de acordo com sua importância na função. O peso de cada avaliação, sua descrição e a pontuação obtida por Beto foram:

Prova 1 (peso 2): avaliação teórica sobre gestão de processos — pontuação obtida: 6,0

Prova 2 (peso 3): estudo de caso prático em equipe — pontuação obtida: 8,0

Prova 3 (peso 5): apresentação individual de um plano de inovação — pontuação obtida: 7,0

Com base nesses resultados, o setor de Recursos Humanos determinou que a média final do candidato será a sua nota.

Qual nota Beto obteve no processo seletivo?

- (A) Beto obteve a nota 7,5.
- (B) Beto obteve a nota 7,1.
- (C) Beto obteve a nota 7,3.
- (D) Beto obteve a nota 7,0.

Questão 15

Durante uma reunião de equipe, a gerente Sandra afirmou:

"Se as metas forem alcançadas, os funcionários receberão um bônus."

As metas foram alcançadas.

Logo, os funcionários receberam um bônus"

Qual é o tipo de raciocínio lógico aplicado neste argumento?

- (A) Dedução.
- (B) Indução.
- (C) Negação.
- (D) Analogia.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

O diagnóstico diferencial das dores orofaciais é complexo, pois diversas condições podem mimetizar a dor de origem dentária (odontalgia). A Disfunção Temporomandibular (DTM) muscular (mialgia) é uma causa comum de dor orofacial não odontogênica, frequentemente referida para os dentes. Outras condições, como a neuralgia do trigêmeo, sinusite maxilar e dores de origem cervical, também podem se

manifestar na região orofacial. Qual característica clínica é mais sugestiva de uma dor de origem muscular (DTM) em vez de uma odontalgia de origem pulpar?

- (A) Dor difusa, em peso ou aperto, que piora com a função mandibular (mastigação, bocejo), frequentemente associada a pontos-gatilho musculares palpáveis e limitação de abertura bucal.
- (B) Dor associada a congestão nasal, pressão facial na região maxilar que piora ao inclinar a cabeça para frente, e sensibilidade nos seios paranasais, indicativa de sinusite.
- (C) Dor aguda, lancinante, de curta duração (segundos), desencadeada por estímulos leves em uma área específica da face (zona de gatilho), característica da neuralgia do trigêmeo.
- (D) Dor localizada em um dente específico, pulsátil, exacerbada por estímulos térmicos (frio ou calor) ou percussão vertical, sugestiva de pulpite ou periodontite apical.

Questão 17

O atendimento odontológico a pacientes com paralisia cerebral (PC) exige conhecimento das características da condição e adaptações no manejo. A PC é um grupo de distúrbios neuromotores não progressivos, causados por uma lesão no cérebro em desenvolvimento, resultando em alterações de tônus muscular, postura e movimento (espasticidade, atetose, ataxia). Manifestações orais como bruxismo, má oclusão, doença periodontal (dificuldade de higiene) e sialorreia (excesso de salivação) são comuns. Acerca do manejo odontológico do paciente com PC, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A estabilização da cabeça e do tronco do paciente durante o atendimento é frequentemente necessária, podendo ser feita com almofadas, faixas ou pelo auxílio de acompanhantes/equipe.

() O reflexo de mordida exacerbado é comum em alguns tipos de PC; o uso de abridores de boca e a proteção dos dedos do profissional são medidas de segurança importantes.

() A anestesia geral é o único método seguro para realizar qualquer procedimento odontológico invasivo em pacientes com PC, devido aos movimentos involuntários.

() A sialorreia (excesso de saliva) pode ser manejada com medicamentos anticolinérgicos (ex: escopolamina), toxina botulínica ou, em casos selecionados, cirurgia das glândulas salivares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 18

A cronologia e a sequência de erupção dos dentes decíduos são marcos importantes no desenvolvimento infantil, embora apresentem certa variabilidade individual. O conhecimento da normalidade permite ao profissional identificar precocemente possíveis distúrbios, como erupção ectópica ou agenesias. A dentição decídua completa é composta por 20 dentes (incisivos centrais, laterais, caninos, primeiros e segundos molares). Qual é a sequência de erupção mais frequentemente observada para os dentes decíduos?

- (A) Incisivos centrais e laterais superiores e inferiores irrompendo simultaneamente, seguidos pelos caninos, primeiros molares e segundos molares.
- (B) Incisivos centrais inferiores, seguidos pelos incisivos centrais superiores e laterais superiores, depois laterais inferiores, primeiros molares, caninos e segundos molares.
- (C) Caninos superiores e inferiores, seguidos pelos incisivos centrais e laterais, depois primeiros molares e, por último, segundos molares.
- (D) Primeiros molares inferiores e superiores, seguidos pelos incisivos centrais e laterais, depois caninos e, por último, segundos molares.

Questão 19

O controle da ansiedade em pacientes odontológicos é fundamental para o sucesso do tratamento e a segurança do procedimento. Em casos de ansiedade leve a moderada, a sedação mínima por via inalatória com a mistura de óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂) é uma técnica segura e eficaz, amplamente utilizada em diversos países, especialmente em odontopediatria. A técnica produz um estado de relaxamento e analgesia leve, mantendo o paciente consciente, responsivo a comandos verbais e com os reflexos protetores preservados. Analise as afirmativas a seguir sobre a sedação inalatória com N₂O/O₂:

I. O óxido nitroso é um gás de baixa solubilidade sanguínea, o que proporciona um rápido início de ação (indução) e uma rápida recuperação após a cessação da administração, pois é minimamente metabolizado e eliminado pelos pulmões.

II. A concentração de óxido nitroso administrada é titulada individualmente para cada paciente, iniciando-se com 100% de oxigênio e aumentando gradualmente a concentração de N₂O (geralmente não excedendo 50-70%) até atingir o nível de sedação desejado.

III. Ao final do procedimento, é obrigatória a administração de 100% de oxigênio por um período mínimo de 5 minutos para prevenir a "hipóxia de difusão", que pode ocorrer devido à rápida eliminação do N₂O dos alvéolos pulmonares.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.

- (C) I e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 20

A exodontia de dentes decíduos pode ser necessária em situações como anquilose, retenção prolongada que impede a erupção do sucessor permanente, ou infecções que representam risco ao germe do dente permanente. A técnica cirúrgica e os cuidados pós-operatórios em crianças requerem adaptações devido à anatomia (proximidade do germe permanente) e ao comportamento infantil. O uso de anestesia local adequada é crucial para o conforto e a colaboração da criança. Qual solução anestésica local é frequentemente considerada de primeira escolha para procedimentos de curta duração em odontopediatria, devido à sua menor duração de ação e menor toxicidade sistêmica?

- (A) Mepivacaína 3% sem vasoconstritor, pois oferece anestesia pulpar de duração adequada para procedimentos curtos (aprox. 20-40 min) com menor duração de anestesia em tecidos moles, reduzindo o risco de mordedura pós-operatória.
(B) Articaína 4% com epinefrina 1:200.000, devido à sua alta potência e capacidade de difusão óssea, sendo indicada para bloqueios mandibulares difíceis.
(C) Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000, por proporcionar anestesia de longa duração, ideal para cirurgias extensas em crianças sob sedação.
(D) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, por ser o padrão-ouro em termos de eficácia e segurança comprovada.

Questão 21

A vigilância epidemiológica em saúde bucal utiliza indicadores específicos para monitorar a ocorrência e a distribuição das doenças na população, orientando ações de prevenção e controle. Para a doença periodontal, índices como o Índice Periodontal Comunitário (CPI) e o Índice de Perda de Inserção (PIP) foram utilizados em levantamentos nacionais como o SB Brasil. O CPI avalia a presença de sangramento gengival, cálculo e bolsas periodontais (rasas e profundas) em dentes índice específicos, fornecendo um panorama da condição periodontal em nível populacional. Acerca da interpretação dos códigos do CPI, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- (__) O Código 0 (zero) indica que o sextante examinado está hígido, sem presença de sangramento, cálculo ou bolsas periodontais.
(__) O Código 1 indica a presença de sangramento gengival observado durante ou após a sondagem, sem a presença de cálculo ou bolsas.
(__) O Código 2 indica a presença de cálculo supra e/ou subgengival detectado pela sonda periodontal, podendo ou não haver sangramento.
(__) O Código 4 indica a presença de bolsa periodontal

profunda, com 6 mm ou mais de profundidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V, V.

Questão 22

A radiografia panorâmica é um exame extrabucal amplamente utilizado em odontologia por fornecer uma visão geral dos maxilares, dentes e estruturas adjacentes em uma única imagem. Contudo, por ser uma técnica tomográfica complexa (ortopantomografia), ela está sujeita a diversos artefatos e distorções de imagem, especialmente se o paciente não for posicionado corretamente no aparelho. O posicionamento da cabeça do paciente é crítico e utiliza referências como o Plano de Camper e o Plano Sagital Mediano. Acerca do posicionamento para radiografia panorâmica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O Plano de Frankfurt (linha tragus-ponto infraorbital) deve estar paralelo ao solo para garantir a correta inclinação da maxila e mandíbula na imagem.

(__) O Plano Sagital Mediano da cabeça do paciente deve estar perpendicular ao solo e centralizado em relação às guias laterais do aparelho, para evitar a magnificação ou redução horizontal assimétrica da imagem.

(__) O paciente deve ser posicionado com a coluna ereta (pescoço esticado) para evitar a sobreposição da imagem da coluna cervical sobre as estruturas anteriores da mandíbula.

(__) Os lábios devem permanecer fechados e a língua deve ser posicionada em contato com o palato durante toda a exposição para evitar a radiolucência da via aérea palatoglossal sobre os ápices dos dentes superiores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, F, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 23

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica que afeta múltiplos órgãos e sistemas, incluindo a cavidade oral. Pacientes diabéticos, especialmente os descompensados (com hiperglicemia persistente), apresentam um risco aumentado para diversas complicações orais. A relação entre DM e doença periodontal é bidirecional: o diabetes agrava a doença periodontal, e a doença periodontal dificulta o controle glicêmico. O cirurgião-dentista deve estar atento aos sinais orais do DM e adaptar o plano de tratamento. Qual

das seguintes manifestações orais NÃO é classicamente associada ao Diabetes Mellitus descompensado?

- (A) Liquen plano oral reticular, caracterizado por estrias brancas rendilhadas na mucosa jugal, geralmente assintomáticas.
- (B) Candidíase oral (infecção fúngica oportunista), frequentemente na forma de queilite angular ou estomatite protética.
- (C) Aumento da prevalência e severidade da doença periodontal, com maior perda de inserção e perda óssea alveolar.
- (D) Xerostomia (boca seca) e aumento do risco de cárie, especialmente cáries radiculares.

Questão 24

A gengivite induzida por biofilme é a forma mais comum de doença periodontal, caracterizada pela inflamação da gengiva marginal e papilar sem perda de inserção clínica ou óssea. O tratamento consiste na remoção do biofilme (placa bacteriana) e do cálculo dental (tártaro), que atua como fator retentor de biofilme, através da profilaxia profissional (raspagem supragengival e polimento coronário) e da instrução de higiene oral. Acerca do tratamento da gengivite, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O sangramento à sondagem é o principal sinal clínico utilizado para o diagnóstico e monitoramento da gengivite, indicando a presença de inflamação ativa.

(__)A raspagem supragengival, realizada com curetas ou ultrassom, visa remover o biofilme e o cálculo aderidos às superfícies coronárias dos dentes, acima da margem gengival.

(__)O polimento coronário com taça de borracha e pasta profilática, realizado após a raspagem, tem como objetivo principal remineralizar o esmalte dental.

(__)O controle eficaz do biofilme pelo paciente, através da escovação e uso do fio dental diários, é essencial para a resolução da gengivite e a manutenção da saúde gengival a longo prazo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 25

O Código de Ética Odontológico (CEO) estabelece os deveres fundamentais do cirurgião-dentista na relação com o paciente, com a equipe e com a sociedade. O sigilo profissional é um dos pilares desta relação, garantindo a confidencialidade das informações reveladas pelo paciente durante o tratamento. A quebra do sigilo só é permitida em situações muito específicas, previstas em lei ou pelo próprio código. Acerca do sigilo

profissional em odontologia, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O sigilo profissional abrange todas as informações (anamnese, diagnóstico, tratamento, imagens) obtidas em função da relação profissional, mesmo após a morte do paciente.

(__)Constitui justa causa para a quebra do sigilo profissional a notificação compulsória de doenças (ex: AIDS, Tuberculose) às autoridades sanitárias, conforme legislação específica.

(__)O cirurgião-dentista pode revelar fatos sigilosos em publicações científicas ou apresentações em congressos, desde que oculte a identidade do paciente através de codinomes ou iniciais.

(__)O profissional está obrigado a revelar informações sigilosas do paciente a planos de saúde ou convênios para fins de auditoria ou faturamento, mesmo sem autorização expressa do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 26

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) detalha os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando as bases estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Entre os princípios organizativos, a Descentralização Político-Administrativa, com direção única em cada esfera de governo, visa transferir responsabilidades e recursos da União para Estados e Municípios, aproximando a gestão das necessidades locais. Essa diretriz tem implicações profundas na gestão dos serviços de saúde bucal, desde a Atenção Primária até a especializada, impactando o financiamento, a contratação de pessoal e a organização da rede assistencial, buscando maior autonomia e capacidade de resposta às demandas regionais. Qual a principal consequência da descentralização para a gestão da saúde bucal no nível municipal?

- (A) A centralização de todas as decisões administrativas e financeiras referentes à saúde bucal na esfera federal (Ministério da Saúde), cabendo aos municípios apenas a execução das políticas definidas nacionalmente.
- (B) A obrigatoriedade de os municípios oferecerem todos os níveis de atenção em saúde bucal (primária, secundária e terciária) dentro de seus limites territoriais, independentemente de seu porte ou capacidade financeira.

- (C) A transferência da responsabilidade pela gestão e execução das ações e serviços de saúde bucal para o município, incluindo a administração das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, em muitos casos, dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), com financiamento tripartite (União, Estado, Município).
- (D) A privatização compulsória dos serviços odontológicos da Atenção Primária, permanecendo sob gestão municipal apenas os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e os serviços hospitalares.

Questão 27

As resinas compostas são os materiais de eleição para restaurações estéticas diretas. Sua composição básica inclui uma matriz orgânica (monômeros como BisGMA, UDMA, TEGDMA), partículas de carga inorgânica (sílica, zircônia, etc.) e um agente de união (silano) que conecta a carga à matriz. As propriedades do material (resistência, lisura, contração de polimerização) dependem do tipo, tamanho e quantidade das partículas de carga. Analise as afirmativas a seguir sobre a classificação das resinas compostas quanto às partículas de carga:

I.As resinas Micro-híbridas combinam partículas maiores (vidro de bário, ~0.6-1 μm) com partículas menores (sílica coloidal, ~0.04 μm), buscando um equilíbrio entre resistência mecânica e lisura superficial.

II.As resinas Nanoparticuladas contêm partículas primárias de tamanho nanométrico (~20-75 nm) e/ou aglomerados (clusters) dessas nanopartículas, permitindo alto conteúdo de carga, alta resistência e excelente polimento e manutenção de lisura.

III.As resinas Microparticuladas contêm apenas partículas submicrométricas de sílica coloidal (~0.04 μm), resultando em excelente lisura superficial e polimento, mas com propriedades mecânicas inferiores (menor resistência ao desgaste), sendo indicadas para áreas de baixo estresse mastigatório.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 28

O planejamento reverso em reabilitação oral, especialmente em casos envolvendo implantes ou próteses extensas, é um conceito fundamental para garantir que o resultado final atenda às expectativas estéticas e funcionais do paciente. Diferente do planejamento tradicional, que parte do diagnóstico e segue para o tratamento, o planejamento reverso começa pela definição do resultado protético desejado (ex: posição e forma dos dentes na prótese final) e, a partir daí, determina os passos cirúrgicos e

restauradores necessários para alcançar esse objetivo. Qual é a principal ferramenta utilizada no planejamento reverso para próteses sobre implante?

- (A) A radiografia panorâmica inicial, que permite avaliar a quantidade óssea disponível em altura e escolher o tamanho do implante antes de qualquer planejamento protético.
- (B) O articulador semi-ajustável (ASA), utilizado para montar os modelos de estudo e simular os movimentos mandibulares, definindo a oclusão antes da cirurgia.
- (C) O enceramento diagnóstico e o guia cirúrgico. O enceramento define a posição ideal dos dentes na futura prótese, e o guia cirúrgico, confeccionado sobre o modelo encerado, transfere esse planejamento para o ato cirúrgico, orientando a posição e angulação dos implantes.
- (D) A moldagem preliminar com alginato, que serve como base para a confecção de uma prótese total imediata, a ser instalada logo após a cirurgia de implantes.

Questão 29

O atestado odontológico é um documento legal que comprova um ato profissional praticado (ex: consulta, tratamento, afastamento). Sua emissão é um direito do paciente e um dever ético do cirurgião-dentista. O Código de Ética Odontológico (CEO) estabelece regras claras sobre a emissão de atestados, visando coibir fraudes e garantir a veracidade das informações. A emissão de um atestado falso ou de conteúdo inverídico constitui infração ética grave e pode ter implicações criminais. Analise as afirmativas a seguir sobre a emissão de atestados:

I.Constitui infração ética expedir atestado odontológico que não corresponda à veracidade dos fatos ou dos quais não tenha participado.

II.O cirurgião-dentista pode cobrar honorários específicos pela emissão de um atestado odontológico, desde que o valor seja previamente acordado com o paciente.

III.O atestado para fins de afastamento do trabalho ou da escola deve conter o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente ao diagnóstico, a identificação do profissional (nome e número de inscrição) e o tempo de dispensa concedido.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.

Questão 30

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) em consultórios odontológicos é uma etapa crucial da biossegurança, regulamentada pela Resolução RDC nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA) e pela Resolução CONAMA nº 358/2005. O objetivo é garantir o correto acondicionamento, tratamento e descarte dos diferentes tipos de resíduos gerados, minimizando riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Os resíduos são classificados em grupos (A, B, C, D, E) conforme seu risco. Qual grupo de resíduos inclui os materiais perfurocortantes utilizados em odontologia, como agulhas, lâminas de bisturi e brocas, e qual o tipo de acondicionamento exigido?

- (A) Grupo E (Perfurocortantes). Devem ser acondicionados em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados com o símbolo de risco biológico e a inscrição "Perfurocortante".
- (B) Grupo B (Químicos). Devem ser acondicionados em embalagens originais ou recipientes identificados, e enviados para tratamento específico, como incineração ou aterro industrial.
- (C) Grupo D (Comuns/Recicláveis). Devem ser acondicionados em sacos plásticos de cores específicas (ex: azul para papel) e encaminhados para a coleta seletiva municipal.
- (D) Grupo A (Infectantes). Devem ser acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos, identificados com o símbolo de risco biológico, e descartados como lixo comum após tratamento prévio.

Questão 31

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) orienta a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, priorizando a Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF pressupõe um trabalho em equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, Agente Comunitário de Saúde - ACS) responsável por um território definido (territorialização) e por uma população cadastrada (adscrição). A inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na ESF busca integrar as ações de saúde bucal ao cuidado longitudinal das famílias. Analise as afirmativas a seguir sobre os atributos da APS e o trabalho da ESB:

I.A Longitudinalidade do cuidado implica que a equipe acompanhe os usuários ao longo do tempo, estabelecendo um vínculo que permita um cuidado contínuo e a construção de um histórico de saúde.

II.A Coordenação do cuidado significa que a APS deve ordenar o fluxo do paciente na Rede de Atenção à Saúde (RAS), articulando o cuidado com outros níveis de atenção (ex: encaminhamento ao CEO) e assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento.

III.A Orientação Comunitária pressupõe que a equipe conheça as necessidades de saúde de sua população adscrita através de diagnóstico epidemiológico e social, planejando ações que respondam a essas necessidades coletivas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.

- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

Questão 32

O paciente idoso frequentemente apresenta condições bucais específicas relacionadas ao envelhecimento fisiológico, a comorbidades sistêmicas e à polifarmácia. A perda dentária (edentulismo parcial ou total) ainda é prevalente, e a reabilitação com próteses é comum. Além disso, alterações como a xerostomia (boca seca), o aumento do risco de cárie radicular e a maior prevalência de candidíase são desafios clínicos importantes na odontogeriatría. Acerca das condições bucais comuns no idoso, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A cárie radicular é altamente prevalente em idosos devido à exposição da superfície radicular (por retração gengival ou doença periodontal) e frequentemente associada à hipossalivação (xerostomia).

(__)A estomatite protética, uma forma de candidíase oral caracterizada por eritema sob a base da prótese total (geralmente superior), é comum em usuários de dentadura, especialmente se a higiene da prótese for deficiente ou se houver xerostomia.

(__)A perda do paladar (disgeusia ou ageusia) é uma consequência inevitável do envelhecimento fisiológico, não estando relacionada a fatores como medicamentos ou uso de próteses.

(__)O edentulismo total, embora ainda prevalente, tem diminuído nas coortes mais jovens de idosos, refletindo melhorias na prevenção e no acesso ao tratamento odontológico conservador ao longo da vida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 33

A anatomia da superfície oclusal dos dentes posteriores (pré-molares e molares) é rica em detalhes como cúspides, fossas, sulcos principais e secundários, que são fundamentais para a eficiência mastigatória e a estabilidade oclusal. O conhecimento desta anatomia é crucial para a correta escultura de restaurações e para o diagnóstico diferencial de estruturas normais versus patológicas. O primeiro molar inferior permanente é o maior dente da arcada inferior e geralmente apresenta cinco cúspides. Qual a disposição e o nome das cúspides do primeiro molar inferior permanente?

- (A) Três cúspides vestibulares (mésio-vestibular, vestibular mediana, disto-vestibular) e duas cúspides linguais (mésio-lingual, disto-lingual), separadas por um sulco central em formato de "W" ou "Y".

- (B) Duas cúspides vestibulares (mésio-vestibular, disto-vestibular) e duas cúspides linguais (mésio-lingual, disto-lingual), unidas por uma ponte de esmalte oblíqua.
- (C) Duas cúspides vestibulares (vestibular e disto-vestibular) e três cúspides linguais (mésio-lingual, lingual mediana, disto-lingual), com um sulco central reto.
- (D) Uma cúspide vestibular e uma cúspide lingual proeminentes, separadas por uma crista marginal mesial e distal bem definidas, típico de pré-molares.

Questão 34

O gesso odontológico é um material fundamental para a obtenção de modelos das arcadas dentárias, essenciais para diagnóstico, planejamento e confecção de dispositivos protéticos e ortodônticos. Existem diferentes tipos de gesso, classificados de acordo com suas propriedades físicas (resistência, expansão de presa), indicando seu uso específico. A manipulação correta, especialmente a proporção água/pó e a espatulação, é crucial para que o material atinja suas propriedades ideais. Qual tipo de gesso é indicado para a confecção de modelos de estudo e antagonistas em prótese, e qual o efeito de uma espatulação excessiva em sua presa?

- (A) Gesso Tipo V (Gesso Pedra de Alta Expansão). A espatulação excessiva melhora a adaptação marginal do gesso ao molde, mas não afeta suas propriedades de presa ou resistência.
- (B) Gesso Tipo III (Gesso Pedra). A espatulação excessiva (sobre-espatulação) acelera o tempo de presa, aumenta a expansão de presa e diminui a resistência final do gesso.
- (C) Gesso Tipo IV (Gesso Pedra Especial). A espatulação excessiva não altera o tempo de presa, mas melhora significativamente a lisura superficial e a resistência do modelo.
- (D) Gesso Tipo II (Gesso Comum). A espatulação excessiva retarda o tempo de presa, diminui a expansão de presa e aumenta a resistência final do gesso.

Questão 35

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) busca superar o modelo focado apenas na prevenção de doenças específicas, propondo ações intersetoriais que atuem sobre os determinantes sociais da saúde e que promovam a equidade e a qualidade de vida. No âmbito da saúde bucal, isso envolve estratégias como a fluoretação da água, a regulação de alimentos açucarados, a criação de ambientes livres de fumo e o estímulo à participação social. Analise as afirmativas a seguir sobre os princípios e eixos da PNPS aplicados à saúde bucal:

I.A Intersetorialidade é um princípio chave, buscando articular as ações de saúde bucal com outras políticas públicas (educação, saneamento, assistência social) para abordar os determinantes sociais.

II.O eixo da Alimentação Adequada e Saudável da PNPS tem interface direta com a saúde bucal, ao propor ações de regulação da publicidade de alimentos cariogênicos e de incentivo ao consumo de frutas e verduras.

III.O eixo de Prevenção e Controle do Tabagismo da PNPS contribui para a saúde bucal ao reduzir a prevalência de um dos principais fatores de risco para o câncer bucal e a doença periodontal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 36

A abordagem contemporânea para o manejo da doença cárie, conhecida como Odontologia de Mínima Intervenção (OMI), preconiza a preservação máxima da estrutura dental hígida. No tratamento de lesões de cárie em dentina, a filosofia mudou da remoção completa de todo tecido desmineralizado para a remoção seletiva de cárie. Esta abordagem diferencia a dentina infectada (amolecida, necrótica, contaminada) da dentina afetada (desmineralizada, mas com estrutura de colágeno preservada e passível de remineralização). Qual é o objetivo principal da remoção seletiva de cárie em cavidades profundas?

- (A) Remover a dentina infectada e parte da dentina afetada, deixando uma camada residual de tecido amolecido sobre a polpa para atuar como um "curativo biológico" antes de selar a cavidade.
- (B) Remover apenas a dentina superficialmente desmineralizada (mancha branca ou acastanhada), sem a necessidade de utilizar instrumentos rotatórios ou manuais, aplicando apenas um agente remineralizador.
- (C) Remover apenas a dentina infectada (amolecida e desorganizada) das paredes pulpar e circundantes, preservando a dentina afetada (mais firme e passível de remineralização), especialmente sobre a polpa, para evitar a exposição pulpar e manter a vitalidade do dente.
- (D) Remover todo o tecido cariado até atingir a dentina hígida (dura e sensível) em todas as paredes da cavidade, incluindo a parede pulpar, garantindo a completa eliminação das bactérias antes da restauração.

Questão 37

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece medidas de proteção aos trabalhadores de saúde, incluindo a obrigatoriedade de programas de imunização. Além da vacinação, a profilaxia pós-exposição (PEP) a material biológico potencialmente contaminado é uma medida de urgência crucial. Após um acidente percutâneo (ex: picada com agulha usada) ou exposição

de mucosa (ex: respingo nos olhos) com sangue ou fluido contendo sangue, o profissional deve procurar imediatamente o serviço de referência para avaliação do risco e início da PEP, se indicada. Analise as afirmativas a seguir sobre a PEP para HIV, HBV e HCV:

I.A PEP para HIV, com medicamentos antirretrovirais, deve ser iniciada o mais rápido possível, idealmente nas primeiras 2 horas e no máximo em 72 horas após a exposição de risco.

II.Para o HBV (Hepatite B), a PEP pode envolver a administração da vacina e/ou da Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B (HBIG), dependendo do status vacinal e da resposta sorológica (Anti-HBs) do profissional acidentado e do status do paciente-fonte.

III.Para o HCV (Hepatite C), a PEP com antivirais de ação direta (DAAs) é recomendada rotineiramente após qualquer exposição percutânea para prevenir a cronificação da infecção.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

Questão 38

A vacinação é uma das estratégias de prevenção primária mais eficazes em saúde pública, controlando e erradicando diversas doenças transmissíveis. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil oferece um calendário vacinal abrangente e gratuito para diferentes faixas etárias. Para os profissionais de saúde, incluindo a equipe odontológica, a imunização contra certas doenças é mandatória (conforme NR-32) ou fortemente recomendada devido ao risco ocupacional elevado. Acerca das vacinas recomendadas para profissionais de odontologia, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A vacina contra Hepatite B é obrigatória (NR-32), com esquema de 3 doses (0, 1, 6 meses) e necessidade de comprovação de soroconversão (Anti-HBs \geq 10 mUI/mL).

(__)A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola) é recomendada, especialmente para profissionais mulheres em idade fértil, para prevenir a rubéola congênita.

(__)A vacina contra a Influenza (gripe) é recomendada anualmente, pois os profissionais de saúde são um grupo de risco para adquirir e transmitir a doença.

(__)A vacina BCG (contra formas graves de tuberculose) deve ser administrada em dose única a todos os profissionais de saúde na admissão, independentemente da vacinação prévia na infância.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, F, V.

(B) F, V, V, F.

(C) V, V, F, V.

(D) V, V, V, F.

Questão 39

A Síndrome de Ardência Bucal (SAB) é uma condição crônica caracterizada por uma sensação de queimação na mucosa oral, geralmente na língua, lábios e palato, na ausência de lesões clínicas visíveis ou alterações laboratoriais que justifiquem os sintomas. O diagnóstico é de exclusão, após descartar causas locais (como candidíase, xerostomia, reações alérgicas) e sistêmicas (como deficiências vitamínicas, diabetes, alterações hormonais). A etiologia da SAB primária (idiopática) é considerada multifatorial, envolvendo componentes neuropáticos e psicogênicos. Acerca das características clínicas da SAB primária, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A dor ou ardência é tipicamente bilateral, piora ao longo do dia e frequentemente está associada a outros sintomas como boca seca (xerostomia subjetiva) e alterações no paladar (disgeusia).

(__)A condição afeta predominantemente mulheres na pós-menopausa, sugerindo uma possível influência hormonal na sua etiopatogenia.

(__)A presença de lesões brancas ou vermelhas na mucosa oral descarta o diagnóstico de SAB primária, indicando a necessidade de investigar outras patologias.

(__)O tratamento da SAB primária é curativo e envolve o uso de antibióticos de amplo espectro para eliminar a microbiota disbiótica associada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, F, F, V.

(B) F, F, F, V.

(C) F, V, V, F.

(D) V, V, V, F.

Questão 40

O diagnóstico preciso das condições pulpares e periapicais é o alicerce para o planejamento do tratamento endodôntico. Esse diagnóstico combina informações da anamnese (história da dor), exame clínico (testes de sensibilidade pulpar térmicos e elétricos, percussão, palpação) e exame radiográfico. A interpretação correta dos testes de sensibilidade é crucial para determinar a vitalidade pulpar. Analise as afirmativas a seguir sobre os testes de sensibilidade pulpar:

I.Os testes térmicos (frio ou calor) avaliam a resposta das fibras nervosas A-delta da polpa; uma resposta positiva indica vitalidade pulpar, mas não diferencia entre polpa saudável, pulpite reversível ou irreversível.

II.O teste elétrico pulpar (pulp tester) estimula as fibras nervosas A-delta através de uma corrente elétrica; um

limiar de resposta baixo geralmente indica polpa saudável, enquanto um limiar alto ou ausência de resposta sugere degeneração ou necrose.

III.A ausência de resposta a qualquer teste de sensibilidade (térmico ou elétrico) é um indicativo forte de necrose pulpar, embora resultados falso-negativos possam ocorrer em dentes traumatizados recentemente ou com canais calcificados.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

