

Interpretação de Texto

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

A velha

A velha um dia despirocou. Era como se uma sirene ambulatorial gritasse corredor adentro. Não se debruçava mais sobre os muros, janelas e balcões a colher as memórias sórdidas dos vizinhos e familiares.

Emudeceu oca e aquele olhar de ave de rapina que saltava curioso sobre o mundo a abandonou.

Era um corpo todo abandonado, como se o brilho da carne viva tivesse ganho a opacidade de um porco decapitado, daqueles abatidos e expostos nos açougues, e num silêncio-pânico daquela madrugada, algo lhe foi extorquido.

Desde a aparição do vírus na narrativa cotidiana, a velha ficou alerta. Observava tudo amedrontada. Era máscara na cara, os dedos ensopados de álcool e uma solidão corrosiva que havia se alojado como sua parceira de quarto.

Desassistida engolia a vida em atropelo: o café, a cápsula de antipsicótico, a bolacha Maria, tudo ingerido a contragosto. A resistência se via nos resíduos constantes entre os dentes que a velha puxava com os dedos, agoniada na tentativa de limpar.

Vivendo em cárcere privado, a velha não se lavava mais, não falava ao telefone e desistira do mundo que lhe privava de existir.

Assistia apática ao noticiário que calculava constantemente um cadáver a mais no número de mortos.

O calendário a engolia, arrancando-lhe as gramas, as dobras, as memórias de cinquenta anos atrás que ela recebia contrariada, e a casa agora era assombrada pelos defuntos do pai, do avô e da mãe que morrera quando completara a idade agora da filha. Todos a indagavam, pediam explicações, e ela, confusa, balbuciava respostas inaudíveis.

Não havendo mais o presente para lhe invadir os dias, o passado adentrava sua morada espaçoso. Os pássaros esbravejavam irritados desde que a velha desfalecera. No pote de alpiste vazio gotejava um pingo barrento que escorria da telha, e a velha não dormia, perturbada pelo berrante som da vida exterior.

Era estranha esta sensação de estar trancada sem ao menos passar as chaves na porta. Do que adiantava a liberdade das frestas entreabertas se a morte caçava os aposentados nas calçadas, parques e botecos?

BRISOLARA, Maria Isabel Teixeira. A velha. In: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Pandemia em contos. Florianópolis: UFSC, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/244169/Pandemia_em_contos-Ebook-2fev23.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso

em: 21 nov. 2025.

Questão 01

No trecho "Desde a aparição do vírus na narrativa cotidiana, a velha ficou alerta", a escolha lexical contribui para a construção da atmosfera do texto. Considerando o campo semântico, o sentido contextual e a relação entre os vocábulos, assinale a alternativa que apresenta a análise correta da significação da palavra "narrativa" nesse contexto.

- (A) O uso de "narrativa" remete a um sentido metafórico, indicando a construção discursiva e simbólica da pandemia no imaginário coletivo, com impacto psicológico na personagem.
- (B) "Narrativa", no contexto, carrega uma acepção denotativa e descreve a organização factual de relatos orais protagonizados por testemunhos domésticos.
- (C) Trata-se de um uso profissional do termo, típico de relatos jornalísticos formais, e que se refere, nesse caso, à estrutura técnica do texto narrativo com foco narrador-onisciente.
- (D) O termo "narrativa" está empregado em sentido literal e designa a progressão de enredos fictícios veiculados por diferentes formas de mídia, como romances ou novelas.

Questão 02

No trecho "A resistência se via nos resíduos constantes entre os dentes que a velha puxava com os dedos...", o emprego da forma verbal "se via" apresenta uma construção específica da regência do verbo "ver". Com base na norma culta e na classificação dos verbos quanto à predicação e ao uso pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo "ver", nesse contexto, é empregado de forma pronominal reflexiva, indicando que a própria resistência executa e sofre a ação de ver, configurando um uso com sujeito paciente.
- (B) O verbo "ver" está na forma pronominal passiva, e o pronome "se" atua como partícula apassivadora; o sujeito da oração é "a resistência", que sofre a ação de ser vista, sendo o termo "nos resíduos" um adjunto adverbial de lugar.
- (C) A forma verbal "se via" é uma construção impessoal, com o pronome "se" funcionando como índice de indeterminação do sujeito, e o termo "a resistência" exercendo função de objeto direto.
- (D) "Se via" corresponde a uma forma de voz passiva sintética, com o pronome apassivador "se" e o sujeito paciente "a resistência", exigindo, por isso, complemento agente da passiva oculto.

Questão 03

A construção narrativa do texto "A velha" transcende a descrição de uma experiência individual e propõe uma crítica simbólica a transformações sociais profundas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que expressa a mensagem central da narrativa.

- (A) A representação da personagem em dissolução psíquica simboliza a desagregação de vínculos humanos na modernidade, marcada por uma solidão imposta e por uma morte social silenciosa que antecede a morte física.
- (B) A narrativa evidencia os efeitos da pandemia sobre as populações idosas, destacando que o abandono estatal e familiar é responsável pela rápida degradação física e emocional das pessoas mais vulneráveis.
- (C) O texto retrata o envelhecimento como um processo irreversível de apagamento da subjetividade, demonstrando que o isolamento social apenas acelera o fim natural da existência.
- (D) O texto constrói uma denúncia sobre o colapso dos sistemas de saúde durante a pandemia, ao retratar uma personagem cujo sofrimento é ignorado pelas instituições responsáveis por garantir sua sobrevivência.

Questão 04

A construção simbólica da personagem no texto aponta para uma experiência de dissolução subjetiva que transcende os efeitos imediatos da pandemia. Com base nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação coerente com os recursos metafóricos e o percurso narrativo da personagem.

- (A) A solidão que invade a velha é apresentada como decorrência lógica de sua atitude passiva e indiferente, demonstrando que a reclusão é efeito exclusivo de suas escolhas existenciais progressas.
- (B) A presença constante dos mortos na narrativa revela a construção de um tempo psíquico circular, em que o passado suplanta o presente como forma de defesa ante o esvaziamento simbólico da realidade.
- (C) A metáfora "sirene ambulatorial" sugere a reativação da sensibilidade da velha diante do sofrimento coletivo, funcionando como um símbolo de resistência silenciosa ao colapso emocional.
- (D) O olhar "de ave de rapina" representa a memória ativa da personagem, que, ao abandonar tal postura, revela-se mais receptiva aos afetos e aos vínculos familiares, numa reconfiguração de seu lugar no mundo.

Questão 05

O texto apresenta uma progressão temática subjetiva e fragmentada, sustentada por recursos de coesão que dispensam conectores tradicionais e investem em repetições, elipses e encadeamentos semânticos não lineares. Com base nesse aspecto, assinale a alternativa que apresenta a análise correta sobre os mecanismos de coesão textual presentes na narrativa.

- (A) A coesão textual é construída majoritariamente pela repetição léxica e pela substituição pronominal explícita, com manutenção da cadeia coesiva centrada nas ações da personagem secundária, a filha.
- (B) A progressão textual ocorre por encadeamento lógico de fatos cronológicos, com uso predominante de pronomes relativos e advérbios temporais para estabelecer uma coesão sequencial objetiva e linear.
- (C) A narrativa opta por formas coesivas implícitas, como a omissão de termos e a retomada anafórica disfarçada, promovendo um encadeamento simbólico entre as imagens e os estados da personagem, sem prejuízo da continuidade temática.
- (D) O uso recorrente de conectores causais e conclusivos garante a lógica formal entre os parágrafos, assegurando ao leitor a identificação clara das relações de causa e consequência entre os estados da personagem.

Questão 06

Assinale a alternativa cuja palavra em destaque foi acentuada pela mesma regra que a palavra "resíduos" em "A resistência se via nos resíduos constantes entre os dentes que a velha puxava com os dedos, agoniada na tentativa de limpar".

- (A) Desde a aparição do vírus na narrativa cotidiana, a velha ficou alerta.
- (B) Todos a indagavam, pediam explicações, e ela, confusa, balbuciava respostas inaudíveis.
- (C) Assistia apática ao noticiário que calculava constantemente um cadáver a mais no número de mortos.
- (D) Era máscara na cara, os dedos ensopados de álcool e uma solidão corrosiva que havia se alojado como sua parceira de quarto.

Questão 07

No trecho "Desassistida engolia a vida em atropelo: o café, a cápsula de antipsicótico, a bolacha Maria, tudo ingerido a contragosto", a pontuação desempenha papel essencial na construção do sentido e na organização sintática e estilística da frase. Assinale a alternativa que apresenta a análise correta quanto ao uso dos dois-pontos e das vírgulas.

- (A) Os dois-pontos exercem a função de introduzir uma enumeração de termos que explicam o conteúdo do sintagma verbal anterior, e as vírgulas organizam elementos coordenados, garantindo clareza e progressão semântica.
- (B) Os dois-pontos assinalam uma conclusão do enunciado anterior e as vírgulas atuam como marcadores de intercalações adjetivas que qualificam os elementos listados.

- (C) Os dois-pontos indicam uma pausa enfática antes da enumeração e poderiam ser substituídos por ponto e vírgula sem prejuízo sintático; as vírgulas separam termos de mesma função sintática, mas sua ausência não comprometeria a estrutura da frase.
- (D) Os dois-pontos introduzem uma enumeração explicativa do termo "vida", enquanto as vírgulas separam orações coordenadas sindéticas, conferindo ritmo enumerativo ao enunciado.

Questão 08

Na frase "Era máscara na cara, os dedos ensopados de álcool e uma solidão corrosiva que havia se alojado como sua parceira de quarto", os termos "que" e "se" exercem funções morfossintáticas distintas. Com base na norma-padrão da gramática da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta desses termos.

- (A) O termo "que" é pronome indefinido com valor de generalização, e o "se" é partícula expletiva usada para reforço de aspecto durativo da ação verbal no pretérito mais-que-perfeito composto.
- (B) O termo "que" é pronome relativo com função de sujeito da oração subordinada adjetiva restritiva, e o "se" é pronome reflexivo, pois o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo pronominal "alojar-se".
- (C) O termo "que" funciona como conjunção integrante, introduzindo oração subordinada objetiva direta, e o "se" atua como índice de indeterminação do sujeito, sendo exigido por verbo intransitivo.
- (D) O termo "que" é pronome relativo, retoma o substantivo "solidão" e exerce a função de sujeito da oração seguinte; o "se" é pronome apassivador, indicando voz passiva sintética do verbo "alojar".

Questão 09

No trecho "Vivendo em cárcere privado, a velha não se lavava mais, não falava ao telefone e desistira do mundo que lhe privara de existir", os pronomes "se" e "lhe" cumprem funções sintáticas distintas e estão corretamente colocados segundo a norma padrão, uma vez que:

- (A) Ambos os pronomes são pronomes oblíquos átonos, estando corretamente colocados conforme a regência verbal e as regras de colocação pronominal: "se" como reflexivo em próclise exigida por palavra negativa e "lhe" como objeto indireto introduzido por pronome relativo.
- (B) O "se" é caso de pronome apassivador e justifica-se por estar acompanhado de verbo transitivo direto; já o "lhe" desempenha função de complemento nominal e, por essa razão, admite posição proclítica facultativa.

- (C) O pronome "se" atua como pronome reflexivo, sendo corretamente anteposto ao verbo por força de fator de atração (palavra negativa); já o "lhe" funciona como objeto direto e deveria estar posposto ao verbo, por ser forma átona em contexto afirmativo.
- (D) A colocação do "se" está incorreta, pois deveria estar após o verbo por não haver fator atrativo imediato; quanto ao "lhe", seu uso está adequado por exercer a função de agente da passiva e estar corretamente antes do verbo no tempo composto.

Questão 10

Na frase "Desde a aparição do vírus na narrativa cotidiana, a velha ficou alerta", o emprego da forma "alerta" respeita a norma culta quanto à concordância e à classificação gramatical do termo. Com base nessa construção, assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o uso da palavra "alerta" nesse contexto.

- (A) A palavra "alerta" é uma interjeição que, por sua natureza invariável, assume função de modificador do sujeito em estruturas atributivas com verbos de estado, como "ficar" e "continuar".
- (B) A palavra "alerta" é um adjetivo de dois gêneros, e sua forma singular deve-se ao fato de acompanhar um substantivo singular ("a velha"), mantendo-se no masculino por ser uma exceção de flexão na concordância nominal.
- (C) "Alerta" é um substantivo masculino usado predicativamente, e a ausência de artigo definido nesta construção exige o uso no masculino, conforme a regência do verbo "ficar".
- (D) O termo "alerta" funciona como advérbio de modo, é invariável e atua como predicativo do sujeito, mantendo-se no singular mesmo quando o sujeito é plural, como em "as crianças ficaram alerta".

Raciocínio Lógico

Questão 11

Um pesquisador analisa quatro afirmações gerais para identificar a conclusão mais coerente por analogia. Ele observa que "alguns sistemas adaptativos melhoram com feedback", "certas equipes aprendem com revisões constantes" e "vários algoritmos evolutivos aprimoram soluções por iterações sucessivas". Considerando essas relações, ele busca a conclusão mais alinhada ao padrão inferido entre os exemplos. Com base nesse conjunto, determine qual conclusão se ajusta logicamente a essa analogia.

- (A) A conclusão de que ciclos longos reduzem necessariamente a eficiência.
- (B) A conclusão de que processos iterativos tendem a produzir melhorias graduais.
- (C) A conclusão de que processos estáticos sempre geram estabilidade.

(D) A conclusão de que falhas em sistemas eliminam qualquer aprendizado.

Questão 12

Uma empresa teve receita de R\$ 240.000,00 em um trimestre e registrou, no trimestre seguinte, aumento de 12%. Em seguida, no terceiro trimestre, houve redução de 10% sobre o novo valor. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

(__) Após o aumento de 12%, a receita passou para R\$ 268.800,00.

(__) Após a redução de 10%, a receita ficou em R\$ 241.920,00.

(__) A variação líquida total nos dois trimestres foi um aumento de 1%.

(__) A variação líquida final corresponde a um aumento de R\$ 2.400,00 em relação ao valor inicial.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 13

Uma empresa utiliza urnas com bolas coloridas para simular eventos aleatórios em um treinamento. Em uma das atividades, a urna contém 5 bolas vermelhas e 7 bolas azuis, sendo realizados diversos sorteios com e sem reposição para estudo das probabilidades envolvidas. O instrutor apresenta quatro afirmações sobre esses sorteios e solicita que os participantes avaliem sua veracidade com base nos cálculos correspondentes. Considere as informações fornecidas e analise as assertivas a seguir.

I. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 7 bolas azuis; a probabilidade de sair uma bola vermelha em um único sorteio é $5/12$.

II. Se duas bolas forem retiradas com reposição, a probabilidade de ambas serem azuis é $(7/12)(7/12)$.

III. A probabilidade de sair pelo menos uma bola vermelha em dois sorteios com reposição é $1 - (7/12)(7/12)$.

IV. Retirando três bolas sem reposição, a probabilidade de todas serem vermelhas é $5/12$.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.

Questão 14

Um docente calcula a nota final de um estudante usando

três avaliações com pesos 2, 3 e 5. As notas obtidas foram 6, 8 e 7, respectivamente. Além disso, ele compara essa média ponderada com a média simples dessas mesmas notas para avaliar consistência no desempenho. Determine a diferença entre a média ponderada e a média simples.

- (A) A diferença entre as médias é 0,1.
- (B) A diferença entre as médias é 0,8.
- (C) A diferença entre as médias é 0,3.
- (D) A diferença entre as médias é 0,5.

Questão 15

Considere o conjunto A com 50 elementos e o conjunto B com 30 elementos. Sabe-se que exatamente 18 elementos pertencem simultaneamente a A e B. Um analista deseja calcular quantos elementos pertencem a $\neg(A \cup B)$, utilizando as leis de De Morgan e considerando um universo U com 100 elementos. Quantos elementos estão fora de A e de B.

- (A) 38 elementos.
- (B) 44 elementos.
- (C) 32 elementos.
- (D) 26 elementos.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

O Controle Social é um dos princípios organizativos do SUS, garantindo que a sociedade participe da formulação e fiscalização das políticas públicas de saúde. A Lei nº 8.142/90 define as instâncias colegiadas. Analise as assertivas abaixo sobre a composição e funcionamento dos Conselhos de Saúde.

I. Os Conselhos de Saúde devem ter composição paritária, ou seja, 50% dos membros devem ser representantes dos usuários, 25% dos trabalhadores de saúde e 25% de gestores/prestadores de serviço.

II. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

III. As Conferências de Saúde reúnem-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 17

A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) aposta na indissociabilidade entre atenção e gestão, e no protagonismo dos sujeitos. Seus princípios e diretrizes buscam alterar a lógica hierarquizada e verticalizada dos serviços de saúde. Analise as assertivas abaixo sobre os conceitos fundamentais da PNH.

I.O Acolhimento com Classificação de Risco é uma diretriz da PNH que visa garantir atendimento por ordem de chegada, assegurando a democracia no acesso a todos os usuários indistintamente.

II.A Transversalidade é um princípio da PNH que prevê o aumento do grau de comunicação intra e intergrupos, rompendo com o isolamento das práticas e saberes profissionais.

III.A Ambiência na PNH refere-se à criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade e favoreçam a interação entre pacientes, acompanhantes e profissionais.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.

Questão 18

As intoxicações exógenas por medicamentos e agrotóxicos (organofosforadoscarbamatos) são ocorrências frequentes na emergência. O manejo inicial envolve a estabilização clínica e, quando indicado, o uso de antídotos ou antagonistas específicos. Sobre a assistência nessas situações, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

() Na intoxicação por inibidores da colinesterase (organofosforadoschumbinho), o paciente apresenta síndrome colinérgica (sialorreia, miose, bradicardia, broncorreia). O antídoto de escolha para reverter os efeitos muscarínicos é a Atropina.

() O Carvão Ativado é indicado rotineiramente em todas as intoxicações, inclusive por cáusticos e corrosivos, devendo ser administrado mesmo se o paciente estiver rebaixado e sem via aérea protegida.

() Em caso de intoxicação por opioides (como morfina ou fentanil), o antagonista específico a ser administrado é a Naloxona, que reverte a depressão respiratória e do sistema nervoso central.

() A lavagem gástrica tem maior eficácia se realizada na primeira hora após a ingestão, mas é contraindicada se o paciente ingeriu substâncias corrosivas ou hidrocarbonetos devido ao risco de perfuração ou aspiração.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a

sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 19

Durante a consulta de enfermagem ginecológica, o enfermeiro realiza a coleta de material para o exame citopatológico (Papanicolau), fundamental para o rastreamento do câncer do colo do útero. Para garantir a qualidade da amostra e a fidelidade do resultado, é necessário seguir rigorosamente as recomendações do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e das Diretrizes Brasileiras. Considerando as recomendações técnicas para a coleta e o rastreamento, assinale a alternativa correta sobre o procedimento e a periodicidade.

- (A) Mulheres virgens devem iniciar o rastreamento aos 25 anos, utilizando-se espéculo de tamanho P, mesmo sem atividade sexual prévia, para garantir a linha de base do rastreamento.
- (B) A periodicidade recomendada para o rastreamento é anual para todas as mulheres sexualmente ativas, independentemente dos resultados anteriores, até os 75 anos de idade.
- (C) A coleta deve incluir amostras da ectocérvice e da endocérvice, sendo que a junção escamocolumnar (JEC) é a região de maior relevância para a detecção de lesões precursoras.
- (D) O uso de lubrificantes íntimos ou espermicidas nas 48 horas anteriores ao exame é recomendado para facilitar a introdução do espéculo e diminuir o desconforto da paciente.

Questão 20

Os acidentes ofídicos são comuns em diversas regiões do Brasil e o enfermeiro deve saber identificar as manifestações clínicas para auxiliar no diagnóstico e administrar o soro específico prescrito com segurança. Os dois gêneros de serpentes mais prevalentes causam síndromes distintas: botrópico (Jararaca) e crotálico (Cascavel). Sobre a assistência e clínica desses acidentes, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

() O acidente crotálico (Cascavel) caracteriza-se principalmente por ação neurotóxica, apresentando fácies miastênica (ptose palpebral), visão turva (diplopia) e urina de cor escura (mioglobinúria).

() O acidente botrópico (Jararaca) tem ação proteolítica e coagulante, causando dor intensa local, edema, equimose, bolhas e risco de hemorragias sistêmicas (gengivorragia, hematúria).

() O torniquete é um procedimento recomendado nos primeiros 30 minutos após a picada de qualquer serpente peçonhenta para retardar a absorção do veneno pela circulação linfática.

()A administração do soro antiveneno deve ser feita preferencialmente por via intramuscular profunda na região glútea para garantir absorção lenta e evitar reações anafiláticas imediatas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 21

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) estabelece normas rígidas para a conservação de imunobiológicos, sendo a Rede de Frio fundamental para garantir a potência das vacinas desde o laboratório produtor até o braço do usuário. Falhas na temperatura podem inativar os imunobiológicos, gerando prejuízos e riscos à saúde pública. Considerando as normas técnicas do Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde sobre equipamentos e controle de temperatura na sala de vacina, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

()As câmaras refrigeradas são os equipamentos preferenciais para o armazenamento de imunobiológicos na sala de vacinação, devendo a temperatura ser mantida entre +2°C e +8°C.

()No refrigerador doméstico, quando utilizado excepcionalmente, as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas devem ser alocadas na primeira prateleira, logo abaixo do congelador.

()A leitura da temperatura deve ser realizada diariamente, no mínimo duas vezes ao dia, no início e no final da jornada de trabalho, registrando-se as temperaturas máxima, mínima e de momento.

()As garrafas com água (bobinas reutilizáveis) devem ser colocadas na porta da geladeira doméstica para estabilização térmica, garantindo a manutenção da temperatura em caso de falta de energia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 22

O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis em todo o mundo. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais. Sobre a fisiologia da lactação, manejo clínico e problemas comuns na amamentação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F

para as falsas.

()O colostro, produzido nos primeiros dias pós-parto, tem menor teor de gordura e lactose comparado ao leite maduro, mas é riquíssimo em proteínas e imunoglobulinas, funcionando como a primeira vacina do bebê.

()A apojadura, ou "descida do leite", é um processo fisiológico normal que ocorre, em média, entre o terceiro e o quinto dia após o parto. Frequentemente, ela é acompanhada por um ingurgitamento mamário (mamas cheias, pesadas e às vezes doloridas) que é considerado fisiológico nessa fase inicial.

()Fissuras mamilares são causadas principalmente pela pega incorreta; o tratamento inclui a suspensão temporária da amamentação na mama afetada e aplicação de pomadas antibióticas profiláticas.

()O hormônio prolactina é responsável pela produção do leite e é estimulado pela sucção do bebê, enquanto a ocitocina é responsável pela ejeção do leite.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 23

A prevenção de Lesões por Pressão (LPP) é um indicador de qualidade da assistência de enfermagem e envolve medidas de redução de carga mecânica e cuidados com a pele. A escala de Braden é amplamente utilizada para prever o risco de desenvolvimento dessas lesões. Sobre as medidas de prevenção e estadiamento de LPP, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

()A mudança de decúbito deve ser realizada a cada 2 horas em pacientes acamados, podendo esse intervalo ser ampliado se o paciente estiver utilizando colchão especial viscoelástico e apresentar pele íntegra, conforme avaliação do enfermeiro.

()Uma Lesão por Pressão Estágio 1 caracteriza-se por pele íntegra com eritema que não embranquece à digitopressão, indicando lesão tecidual profunda iminente ou inicial.

()O uso de massagem vigorosa em proeminências ósseas avermelhadas é recomendado para estimular a circulação e prevenir a necrose tecidual.

()Coxins e travesseiros devem ser utilizados para manter proeminências ósseas (como joelhos e calcanhares) livres de contato direto umas com as outras ou com a superfície do leito (flutuação dos calcanhares).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.

- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 24

O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) na puericultura utiliza a Caderneta de Saúde da Criança para monitorar marcos importantes. O desenvolvimento neuropsicomotor segue um sentido céfalo-caudal e próximo-distal. Ao avaliar uma criança de 6 meses de idade durante a consulta de enfermagem, quais marcos do desenvolvimento são esperados para esta faixa etária, considerando os parâmetros do Ministério da Saúde?

- (A) Sustenta a cabeça firmemente, segue objetos com o olhar em 180 graus e emite sons guturais, mas não consegue sentar mesmo com apoio.
- (B) Anda com apoio, fala palavras dissílabas (dada, mama) e faz movimento de pinça superior (polegar e indicador).
- (C) Fica em pé sem apoio por alguns segundos e compreende o 'não' e o 'tchau'.
- (D) Rola (de bruços para costas e vice-versa), senta-se com apoio (inicia sem apoio) e transfere objetos de uma mão para a outra.

Questão 25

O cateterismo vesical de demora é um procedimento invasivo frequentemente realizado na prática clínica, que envolve a introdução de uma sonda através da uretra até a bexiga para drenagem urinária. Devido ao alto risco de Infecção do Trato Urinário Associada a Cateter (ITU-AC), a execução dessa técnica exige adesão rigorosa aos princípios de assepsia cirúrgica e manejo adequado dos dispositivos. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.A bolsa coletora de urina deve ser mantida, impreterivelmente, abaixo do nível da bexiga, sem tocar o chão, para evitar o refluxo urinário intraluminal e extraluminal, que constitui um dos principais fatores de risco para a migração de microrganismos e subsequente infecção.

II.Para a insuflação do balão de retenção da sonda, recomenda-se o uso de solução fisiológica 0,9% estéril, visto que, por ser uma solução isotônica, minimiza a osmose através da parede do balão e garante a estabilidade da fixação, prevenindo a perda de volume ao longo do tempo.

III.De acordo com a ANVISA (1), há indicação de introduzir gel lubrificante estéril, de uso único, com ou sem anestésico, na uretra masculina, durante a técnica de inserção do cateter vesical (Grau da evidência A-III). A recomendação é a utilização de substâncias hidrossolúveis, como a lidocaína geleia a 2%, na introdução do cateter.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) I e II.

Questão 26

O envelhecimento populacional traz o aumento da prevalência de demências e riscos de quedas. A avaliação multidimensional do idoso é ferramenta do enfermeiro. Sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento e cuidados específicos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)A presbiacusia é a perda auditiva neurosensorial progressiva relacionada à idade, que afeta inicialmente a percepção de sons de alta frequência (agudos).

(__)A incontinência urinária é uma consequência normal e inevitável do envelhecimento, não necessitando de investigação clínica, devendo-se apenas prescrever fraldas geriátricas.

(__)A polifarmácia (uso de múltiplos medicamentos) aumenta o risco de iatrogenias e quedas em idosos; medicamentos como benzodiazepínicos devem ser usados com extrema cautela devido ao risco de sedação e desequilíbrio.

(__)A vacinação contra Influenza e Pneumococo é prioritária na população idosa devido à imunossenescência e maior suscetibilidade a infecções respiratórias graves.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, V, V, V.

Questão 27

A prática da enfermagem no Brasil é regida pela Lei nº 7.498/1986 e regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987, que estabelecem as competências das diferentes categorias profissionais. Paralelamente, a Resolução COFEN nº 564/2017 institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, delineando as infrações e as respectivas penalidades disciplinares aplicáveis em caso de conduta inadequada. O conhecimento profundo sobre a tipificação das sanções e a autonomia privativa de cada membro da equipe é crucial para o exercício legal da profissão. Acerca das penalidades e competências previstas nestes diplomas legais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A penalidade de Advertência Verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas, sendo obrigatória a sua publicação no

Diário Oficial da União e nos meios de comunicação oficiais do Conselho Regional para garantir a transparência do processo administrativo disciplinar.

() A penalidade de Suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias, sendo a pena comunicada aos órgãos empregadores e, em casos de reincidência, convertida automaticamente em multa de até 15 vezes o valor da anuidade.

() Compete privativamente ao Técnico de Enfermagem a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada, bem como a chefia de serviço e de unidade de enfermagem, desde que o profissional comprove, no mínimo, cinco anos de experiência assistencial ininterrupta.

() A penalidade de Cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e em jornais de grande circulação, sendo esta penalidade de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, F, V.

Questão 28

Na avaliação neurológica de um paciente com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Traumatismo Cranioencefálico (TCE), a Escala de Coma de Glasgow (ECG) é a ferramenta padrão para monitorar o nível de consciência. A versão atualizada da escala (2018) incorporou a avaliação da reatividade pupilar (ECG-P) para refinar o prognóstico. Com base na aplicação da Escala de Coma de Glasgow, assinale a alternativa correta.

- (A) Na avaliação pupilar, se ambas as pupilas não reagem à luz, subtrai-se 1 ponto do somatório total da escala.
- (B) Se o paciente obedece a comandos motores, ele recebe a pontuação 5 na resposta motora.
- (C) A resposta verbal confusa pontua 4, enquanto a emissão de palavras inapropriadas pontua 3 e sons ininteligíveis pontua 2.
- (D) A abertura ocular ao chamado verbal pontua 4, enquanto a abertura espontânea pontua 3.

Questão 29

Durante o atendimento a um paciente em Parada Cardiorrespiratória (PCR) no ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem deve atuar em sincronia seguindo os protocolos de Suporte Avançado de Vida

Cardiovascular (ACLS). Identifica-se no monitor cardíaco um ritmo de Fibrilação Ventricular (FV). Diante desse ritmo chocável, assinale a alternativa que descreve a sequência prioritária e correta de ações após a confirmação do ritmo e a preparação do desfibrilador.

- (A) Realizar a desfibrilação imediata, seguida imediatamente por 2 minutos de RCP (compressões torácicas) sem checar o pulso logo após o choque.
- (B) Administrar Adrenalina 1mg IV antes do primeiro choque para aumentar a perfusão coronariana e a chance de sucesso da desfibrilação.
- (C) Realizar a desfibrilação e checar o pulso carotídeo imediatamente para verificar se houve reversão do ritmo para sinusal.
- (D) Realizar intubação orotraqueal antes da desfibrilação para garantir a oxigenação adequada durante o choque.

Questão 30

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. A Resolução COFEN nº 3582009 dispõe sobre a SAE e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos e privados. Considerando as etapas e definições legais do Processo de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

I.O Diagnóstico de Enfermagem é a etapa que envolve a interpretação e o agrupamento dos dados coletados, que culminam na tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos que representam as respostas da pessoa, família ou coletividade.

II.O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em cinco etapas sequenciais e inter-relacionadas: Coleta de dados, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação.

III.O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem podem realizar a etapa de Planejamento de Enfermagem de forma autônoma, prescrevendo cuidados de alta complexidade, desde que supervisionados remotamente.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) I, II e III.

Questão 31

A assistência de enfermagem ao paciente grande queimado nas primeiras horas é crítica para a sobrevivência. A reposição volêmica adequada visa prevenir o choque hipovolêmico e a insuficiência renal aguda. A Fórmula de Parkland é tradicionalmente utilizada para calcular o volume de fluidos necessário

nas primeiras 24 horas. Considere um paciente adulto de 70 kg com 40% de Superfície Corpórea Queimada (SCQ). Assinale a alternativa que apresenta o volume total estimado para 24 horas (usando 4mlkg%SCQ) e a estratégia correta de infusão segundo os protocolos clássicos.

- (A) 8.400 ml; com infusão rápida em bolus inicial de 2.000 ml e o restante conforme diurese.
- (B) 11.200 ml; sendo 50% infundido nas primeiras 8 horas e os 50% restantes nas 16 horas subsequentes.
- (C) 5.600 ml; sendo infundido em velocidade constante ao longo das 24 horas para evitar sobrecarga hídrica.
- (D) 11.200 ml; sendo 50% infundido nas primeiras 4 horas e os 50% restantes nas 20 horas subsequentes.

Questão 32

A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Um dos pilares do SUS é a definição clara de seus princípios doutrinários e organizativos, bem como das competências de cada esfera de governo. Analise as assertivas abaixo sobre a legislação estruturante do SUS.

I.O princípio da Integralidade de assistência é entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

II. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é regulamentada principalmente pela Lei nº 8.142/1990, que instituiu as Conferências e os Conselhos de Saúde.

III.A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter prioritário, substituindo os serviços públicos sempre que houver insuficiência de recursos estatais.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

Questão 33

A Lei nº 7.498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987 regulamentam o exercício da enfermagem no Brasil, definindo as categorias profissionais e suas respectivas atribuições. Em uma unidade de saúde, é essencial que cada membro da equipe atue dentro de sua competência legal para evitar o exercício ilegal ou a extrapolação de funções. Com base na legislação citada, assinale a alternativa que apresenta uma atividade PRIVATIVA do Enfermeiro, que não pode ser delegada a Técnicos ou

Auxiliares de Enfermagem.

- (A) Coleta de material para exames laboratoriais de rotina em pacientes acamados.
- (B) Administração de medicação endovenosa em pacientes graves na Unidade de Terapia Intensiva.
- (C) Execução de curativos em feridas crônicas, independentemente do estágio de cicatrização.
- (D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

Questão 34

A administração em enfermagem envolve funções de planejamento, organização, direção e controle. A supervisão em enfermagem é um processo educativo e contínuo, não apenas fiscalizatório. Na gestão de recursos materiais e dimensionamento de pessoal, o enfermeiro utiliza ferramentas e resoluções específicas. Analise as assertivas abaixo sobre gestão e dimensionamento.

I.O Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem deve basear-se em características relativas ao serviço de saúde, ao serviço de enfermagem e ao paciente, utilizando o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) como referência.

II.Na supervisão, a função educativa visa o desenvolvimento da equipe, enquanto a função administrativa foca apenas na punição de erros para garantir o cumprimento de normas institucionais.

III.A Resolução COFEN nº 543/2017 (atualizada/substituída) estabelece os parâmetros mínimos para dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem, considerando as horas de assistência segundo a complexidade do cuidado.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III.

Questão 35

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. A Lista Nacional de Notificação Compulsória (Portaria de Consolidação GMMS) define prazos e responsabilidades. Analise as assertivas abaixo sobre doenças específicas e seus prazos de notificação.

I.O Sarampo e a Poliomielite (Paralisia Flácida Aguda) são doenças de notificação compulsória imediata (em até 24 horas) para as esferas municipal, estadual e federal, devido ao risco de disseminação e metas de erradicação/eliminação.

II.A Dengue, em regra, tem notificação semanal, mas a ocorrência de Dengue com sinais de alarme, Dengue

grave ou óbito por Dengue exige notificação imediata.

III.A Tuberculose e a Hanseníase exigem notificação imediata em até 24 horas para o Ministério da Saúde, dada a gravidade clínica individual.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

Questão 36

O Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são as principais Condições Crônicas Não Transmissíveis enfrentadas na Atenção Básica. O rastreamento, diagnóstico e acompanhamento exigem do enfermeiro conhecimento sobre os critérios diagnósticos e metas terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Sociedades Brasileiras. Sobre o manejo dessas condições, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)O diagnóstico de Diabetes Mellitus pode ser confirmado com uma Hemoglobina Glicada (HbA1c) maior ou igual a 6,5%, realizada em método padronizado.

(__)Na aferição da pressão arterial, o manguito deve ser posicionado sobre a artéria braquial, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital, devendo o paciente estar com a bexiga vazia e sem ter fumado ou ingerido café nos 30 minutos anteriores.

(__)A meta pressórica padrão para pacientes hipertensos de alto risco cardiovascular é manter a PA abaixo de 140/90 mmHg, sendo aceitável níveis de até 150/90 mmHg para diabéticos para evitar hipoperfusão renal.

(__)O pé diabético é uma complicação frequente; o teste de sensibilidade com o monofilamento de 10g é o padrão-ouro para rastreamento da perda de sensibilidade protetora plantar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 37

Um paciente dá entrada no serviço de emergência apresentando fraqueza muscular severa, arritmia cardíaca e alterações eletrocardiográficas caracterizadas por ondas T apiculadas e alargamento do complexo QRS. Os exames laboratoriais confirmam um distúrbio eletrolítico grave comum em pacientes com insuficiência renal. Considerando o quadro clínico e os cuidados de enfermagem na administração de medicamentos,

assinale a alternativa que indica o distúrbio provável e a intervenção medicamentosa de urgência correta para proteção miocárdica e redistribuição iônica.

- (A) Hipocalemia; reposição rápida de Cloreto de Potássio em bolus endovenoso.
- (B) Hipercalcemia; administração de diuréticos de alça e hidratação vigorosa.
- (C) Hiponatremia; infusão rápida de solução salina hipertônica a 3%.
- (D) Hipercalcemia; administração de Gluconato de Cálcio e solução polarizante (insulina + glicose).

Questão 38

A Tuberculose (TB) continua sendo um grave problema de saúde pública. O enfermeiro na Atenção Básica desempenha papel crucial na busca ativa de sintomáticos respiratórios, diagnóstico, tratamento supervisionado (TDO) e controle de contatos. Analise as assertivas abaixo sobre as normas do Ministério da Saúde para o controle da Tuberculose.

I. Define-se como Sintomático Respiratório na busca ativa de TB pulmonar todo indivíduo que apresenta tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas (população geral), devendo-se solicitar exame de escarro (baciloscopia ou TRM-TB).

II. O esquema básico de tratamento para casos novos em adultos e adolescentes dura 6 meses, sendo 2 meses da fase intensiva (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol) e 4 meses da fase de manutenção (Rifampicina e Isoniazida).

III. A vacina BCG protege contra todas as formas de tuberculose e deve ser reaplicada na vida adulta caso o indivíduo não apresente a cicatriz vacinal no braço direito.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III.

Questão 39

A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por ações de prevenção, tratamento, reabilitação e palição em domicílio. O Programa Melhor em Casa organiza a AD em diferentes modalidades (AD1, AD2 e AD3). Sobre a organização e critérios da Atenção Domiciliar, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

(__)A modalidade AD1 destina-se a usuários com problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, sendo de responsabilidade das equipes de Atenção Básica (eSFeAP).

(__) Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) e as Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) são responsáveis pelos pacientes classificados como AD2 e AD3, que exigem maior frequência de cuidado e procedimentos mais complexos.

(__) Para a admissão no programa de Atenção Domiciliar, a presença de um Cuidador (familiar ou não) é irrelevante, sendo obrigação exclusiva da equipe de saúde prover todo o suporte contínuo 24 horas.

(__) A oxigenoterapia domiciliar e a ventilação mecânica não invasiva são procedimentos compatíveis com a modalidade AD3, destinada a usuários com maior complexidade técnica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

(A) V, F, V, F.

(B) V, V, F, V.

(C) V, V, V, V.

(D) F, V, F, V.

Questão 40

A emergência psiquiátrica exige do enfermeiro habilidades de comunicação, avaliação de risco e manejo seguro. A agitação psicomotora e o comportamento agressivo são comuns. A Contenção Mecânica é um procedimento terapêutico utilizado como último recurso quando falham as abordagens verbais e medicamentosas. Sobre os cuidados técnicos e éticos na contenção mecânica, assinale a alternativa correta.

(A) A contenção mecânica pode ser mantida por tempo indeterminado até que o paciente solicite a retirada e prometa cooperar com a equipe.

(B) A contenção deve ser realizada preferencialmente por 5 pessoas, sendo a monitorização dos sinais vitais e da circulação periférica obrigatória e frequente durante todo o período da restrição.

(C) A decisão de conter o paciente é exclusiva da equipe de segurança/vigilância do hospital, cabendo à enfermagem apenas a administração da medicação.

(D) O paciente deve ser contido em decúbito ventral (bрюços) para evitar broncoaspiração em caso de vômitos, garantindo a segurança das vias aéreas.

