

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO



ÁREA/ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM /
CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA

137

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- ✘ Além deste CADERNO, você deverá ter recebido o CARTÃO destinado às respostas das 40 (quarenta) questões de múltipla escolha formuladas na prova. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
- ✘ Verifique se esta prova corresponde à área/especialidade para a qual você se inscreveu.
- ✘ Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS; em caso afirmativo, **assine-o** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento.
- ✘ Se este caderno ou o cartão de respostas não contiver o descrito nos itens anteriores, notifique imediatamente ao fiscal.
- ✘ Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- ✘ Não é permitido copiar as respostas assinaladas no cartão.
- ✘ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **quatro horas**.
- ✘ Para preencher o cartão de respostas use, exclusivamente, caneta esferográfica de ponta média com tinta azul. Assinale **apenas uma** dentre as cinco opções de resposta apresentadas para cada questão.
- ✘ Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- ✘ Quando terminar, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que será invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.



01 Os acidentes ofídicos têm uma grande importância, em virtude de sua grande frequência e gravidade. A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, relacionada aos fatores climáticos e ao aumento da atividade humana nos trabalhos no campo. No serviço de emergência, identificar o animal causador do acidente é procedimento importante.

Identifique a alternativa que aponta o tipo de acidente ofídico com ocorrência nas regiões brasileiras.

- (A) Acidente Crotálico, Laquétrico, Elapídico, Botrópico.
- (B) Acidente Laquétrico, Elapídico, Botrópico, Escorpiônico.
- (C) Acidente Elapídico, Botrópico, Escorpiônico, Aracnídeo.
- (D) Acidente Botrópico, Escorpiônico, Aracnídeo, Crotálico.
- (E) Acidente Escorpiônico, Aracnídeo, Crotálico, Laquétrico.

02 No quase-afogamento, uma situação de ressuscitação específica é a possibilidade de sobreviver durante pelo menos algum período de tempo, após sufocação em decorrência de submersão em água, sem ventilação.

Marque a alternativa que indica a consequência mais comum.

- (A) Hipotermia.
- (B) Hipotonia.
- (C) Hipoxemia.
- (D) Hipotaxia.
- (E) Anóxia.

03 A fratura é a quebra da continuidade do osso e é definida de acordo com o tipo e extensão. As fraturas ocorrem quando o osso é submetido a estresse maior do que ele pode suportar.

Tendo como base os tipos de fraturas, correlacione a coluna abaixo.

| | | |
|---------------|-----|--|
| 1) Oblíqua | () | Uma fratura em que ossos foram esmagados. |
| 2) Cominuta | () | Uma fratura em que os fragmentos se dirigem para dentro. |
| 3) Depressiva | () | Extração de um fragmento ósseo por um ligamento ou tendão e sua fixação. |

| | | |
|---------------|-----|--|
| 4) Compressão | () | Uma fratura em que o osso foi dividido em vários fragmentos. |
| 5) Avulsiva | () | Uma fratura que ocorre no ângulo transversal do osso. |
| 6) Impacto | () | Fratura em que o fragmento ósseo se dirige para dentro de outro fragmento ósseo. |

- (A) 2; 5; 3; 4; 6; 1.
- (B) 4; 3; 5; 2; 1; 6.
- (C) 2; 6; 3; 1; 4; 5.
- (D) 4; 5; 1; 2; 6; 3.
- (E) 2; 5; 4; 3; 6; 1.

04 A área de urgência deve ser pensada também por nível de complexidade, a fim de otimizar recursos tecnológicos e força de trabalho das equipes, atendendo ao usuário segundo sua necessidade específica.

Tendo como base o programa de acolhimento com classificação de risco do MS, indique a alternativa que, por meio da identificação das cores, está correlacionada de forma correta com o nível de prioridade de assistência.

- (A) Prioridade 2 – Identificação azul
- (B) Prioridade 1 – identificação amarela
- (C) Prioridade 3 – Identificação verde
- (D) Prioridade 0 – identificação preta
- (E) Prioridade 4 – sem necessidade de identificação por cor.

05 As complicações pós-operatórias constituem um risco inerente nos procedimentos cirúrgicos. O enfermeiro desempenha uma função fundamental na tentativa de evitá-las e no reconhecimento imediato de seus sinais e sintomas.

Marque abaixo a alternativa correta, no que diz respeito ao que podem ser complicações pós-operatórias.

- (A) Obesidade, sobrecarga circulatória e bacteremia.
- (B) Hemorragia, trombose de veia profunda e retenção urinária.
- (C) Hipotensão, hipercalemia e úlcera por pressão.
- (D) Infiltração, choque séptico e neutropenia
- (E) As alternativas C e D são corretas.

06 Para o paciente adulto em pós-operatório de apendicectomia, a intervenção que se deve fazer, antes do início de dieta oral, é auscultar os sons intestinais, para prevenir complicações do tipo:

- (A) vômitos.
- (B) evisceração.
- (C) deiscência.
- (D) abscesso de parede.
- (E) íleo paralítico.

07 Identifique, dentre as atividades abaixo listadas, quais são aquelas que devem ser realizadas no pós-operatório da maioria das cirurgias e que fazem parte das orientações pré-operatórias.

- I Deambulação precoce.
- II Exercício de pés e pernas.
- III Mudança de decúbito.
- IV Respiração diafragmática.
- V Tosse.

- (A) Alternativas II e IV estão corretas.
- (B) Alternativas I e V estão corretas.
- (C) Alternativas II, III e V estão corretas.
- (D) Alternativas I, III e IV estão corretas.
- (E) Alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

08 Identifique, nas afirmativas descritas abaixo, quais os cuidados de enfermagem devem ser realizados no pós-operatório, até que o risco de possíveis complicações tenha desaparecido

- (A) Monitorizar os sinais vitais; Monitorar o estado hídrico; Avaliar dor, edema e estrias avermelhadas; Observar anormalidades na ferida operatória.
- (B) Estimular circulação dos MMSS, para facilitar a independência para a alimentação por via oral.
- (C) Avaliar o aparecimento de intoxicação medicamentosa.
- (D) Estimular a ingestão proteica e hídrica para acelerar o processo de cicatrização.
- (E) Manter o paciente em repouso absoluto, restrito ao leito, para evitar aumento da pressão arterial.

09 A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante atividades esportivas sob calor e umidade alta, é

- (A) a desidratação.
- (B) a hipertermia.
- (C) a intermação.
- (D) a descompressão.
- (E) a hipotermia.

10 A endocardite infecciosa pode ser prevenida, em muitos casos, pela identificação de fatores de risco, tais como

- (A) multiparidade.
- (B) coarctação da aorta.
- (C) pneumonias de repetição.
- (D) prolapso de válvula mitral.
- (E) trombose venosa profunda.

11 O Ministério da Saúde preconiza a implementação de quimioprofilaxia dos contatos íntimos, nos seguintes tipos de meningites:

- (A) virais e por *pseudomonas*.
- (B) meningocócica e tuberculosa.
- (C) meningocócica e por *haemophilus*.
- (D) por estafilococos e estreptococos.
- (E) meningocócica e por *salmonella*.

12 Com relação ao aleitamento materno, na presença de determinadas doenças avalie as afirmações abaixo.

- I Hepatite B: a vacina e a administração de imunoglobulina específica após o nascimento praticamente eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno.
- II Dengue: não há contra-indicações da amamentação em mães que contraiam dengue, pois há no leite materno um fator antidengue que protege a criança.

III Esse aleitamento deve ser recomendado em mães infectadas pelo HIV.

- (A) As afirmativas I, II, III estão corretas.
- (B) Apenas a afirmativa III está correta.
- (C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa II está correta.

13 Complicações hipertensivas na gravidez são as maiores causas de morbidade e mortalidade materna e fetal e ocorrem em cerca de 10% de todas as gestações.

Analise as afirmativas abaixo, assinalando com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas, e marque a opção correta.

() A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª semana de gestação, classicamente pelo desenvolvimento gradual de hipertensão e proteinúria.

() O sulfato de magnésio é a droga de eleição na terapia anticonvulsivante da eclâmpsia.

() Manter as vias aéreas livres, oxigenação adequada, sondagem vesical, punção venosa em veia calibrosa não fazem parte das medidas gerais no caso de eclâmpsia.

() A eclâmpsia ocorre apenas no período de gestação e é caracterizada pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou outra doença convulsiva.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, F, V, F.

14 No pós-operatório de cirurgia de médio e grande porte, os riscos de desenvolvimento de atelectasia pulmonar podem estar presentes, como a longa duração da anestesia e mudanças no padrão ventilatório, entre outros.

As ações de enfermagem que visam a prevenir essa condição, **NAO** incluem

- (A) orientar o paciente para evitar a tosse e a respiração profunda.
- (B) efetuar drenagem postural e percussão torácica, se necessário.
- (C) administrar os sedativos prescritos, cuidadosamente, a fim de evitar a depressão respiratória.
- (D) realizar mudança de decúbito frequente, sobretudo da posição supina para a posição ereta.
- (E) encorajar a mobilização precoce do leito para a cadeira, seguida pelo início de deambulação.

15 Assinale a alternativa correta.

- (A) Infecção puerperal é aquela que se origina do aparelho genital, após parto recente.
- (B) No caso de placenta prévia, deve-se fazer toque vaginal para confirmação do diagnóstico.
- (C) O descolamento prematuro de placenta é a separação abrupta da placenta após o parto do concepto, ocorrendo em gestação de 12 semanas.
- (D) No caso de aborto séptico, a mulher em idade reprodutiva apresenta-se apirética, com presença de sangramento vaginal e ausência de dor abdominal.
- (E) A síndrome HELLP é um termo que identifica uma das complicações da pré-eclâmpsia grave, que significa presença de hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e plaquetopenia.

16 A ação, omissão ou conivência que implique às desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem é considerada infração

- (A) de responsabilidade civil.
- (B) criminal.
- (C) técnica.
- (D) ética.
- (E) legal.

17 O câncer de cólon tem uma incidência frequente na população de pacientes idosos.

Seus sinais e sintoma mais comuns, nesses casos, são

- (A) hematêmese e melena.
- (B) vômitos e náuseas após a alimentação.
- (C) inapetência, irritabilidade aumentada e poliúria.
- (D) queixa de dor abdominal, obstrução intestinal e sangramento retal.
- (E) queixa de dor tipo queimação epigástrica e excesso de formação de gases intra-abdominais.

18 Dificuldade respiratória e disfonia são sinais indicativos da seguinte complicação pós-tireoidectomia total:

- (A) bronquiestasia pós-operatória.
- (B) lesão de glândulas paratireóides.
- (C) ansiedade e psicose pós-cirúrgica.
- (D) excesso de secreções brônquicas.
- (E) lesão no nervo laríngeo recorrente.

19 A enfermagem é uma profissão estruturada em conhecimentos científicos e técnicos que se constroem por meio de práticas sociais, éticas e políticas. O comportamento do profissional deve basear-se na ética, no compromisso social e profissional, no respeito, na responsabilidade, na atualização e na competência profissional. Para tanto, os enfermeiros devem conhecer e seguir os códigos de ética profissional e de deontologia, assim como a lei do exercício profissional.

Acerca desse tema, analise as proposições abaixo.

- I O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem considera, prioritariamente, a necessidade e o direito de assistência de enfermagem à população, os interesses do profissional e de sua organização.
- II A Lei nº 7.498/86, que dispõe acerca da regulamentação do exercício profissional da enfermagem, abrange normas e princípios, direitos e deve-

res pertinentes à conduta do profissional.

- III A elaboração do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem teve como referências a Declaração Universal dos Direitos do homem, o Código de Deontologia de Enfermagem e as normas internacionais e nacionais sobre pesquisa em seres humanos.
- IV Os profissionais de saúde que lidam com a vida humana são obrigados a exercer atividades que se coadunem com os preceitos dos Códigos Civil e Penal.

Estão corretas

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

20 O afastamento das superfícies ósseas intracapsulares e consequente rompimento das estruturas adjacentes nas lesões articulares denominam-se

- (A) hematoma capsular.
- (B) luxação.
- (C) contusão.
- (D) entorse ou torção.
- (E) fratura simples.

21 Dentre as causas da hipertensão associadas à insuficiência renal crônica, destacam-se

- (A) produção de hormônio antidiurético diminuída e febre.
- (B) hipoaldosteronismo e edema.
- (C) produção de renina diminuída e polidipsia.
- (D) sódio aumentado e retenção de líquido.
- (E) redução de fosfato e hiperproteinemia.

22 A supervisão da assistência de enfermagem, desenvolvida pela equipe, é uma das funções prioritárias do enfermeiro. Deve ser realizada, cotidianamente, nos diversos momentos do trabalho a ser executado.

Sobre o processo de supervisão, analise as afirmativas abaixo.

- I O processo de supervisão tem por objetivo o desenvolvimento do ser humano e deve ser implementado como estratégia de motivação e desenvolvimento pessoal.
- II A supervisão tem diferentes finalidades: controlar o trabalho desenvolvido pelo pessoal de enfermagem junto ao paciente; fornecer subsídios para a educação no trabalho; garantir ao paciente uma assistência de enfermagem de qualidade.
- III A supervisão da assistência de enfermagem é papel privativo do enfermeiro chefe de unidade.
- IV A supervisão pode acontecer durante a passagem de plantão, momento em que é realizada a avaliação da assistência prestada e quando são transmitidas as informações necessárias para garantir a continuidade da assistência.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

23 São cuidados de enfermagem a um cliente que foi submetido a um exame de cineangiocoronariografia, **EXCETO**

- (A) incentivar a ingestão de líquidos, para aumentar o débito urinário.
- (B) avaliar cor, temperatura e queixas de dor na extremidade afetada.
- (C) incentivar a deambulação precoce e mobilização ativa do membro afetado.
- (D) avaliar pulsos periféricos e monitorização cardíaca.
- (E) observar o local da punção ou dissecação, quanto à possibilidade de sangramento.

24 Em relação à autorização para permanência de acompanhante em ambiente hospitalar, a legislação garante esse direito a

- (A) crianças, adolescentes até 21 anos e idosos com idade acima de 65 anos.
- (B) idosos com idade acima de 60 anos e deficientes físicos.
- (C) idosos com idade acima de 65 anos.
- (D) crianças, idosos com idade acima de 59 anos e deficientes visuais.
- (E) crianças até 18 anos de idade e idosos com idade acima de 65 anos.

25 Um paciente oriundo do Serviço de Emergência foi admitido na UTI, com insuficiência respiratória importante e suspeita de tuberculose pulmonar.

De acordo com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde, um doente provável portador de tuberculose pulmonar é considerado positivo quando apresenta

- (A) duas baciloscopias diretas, negativas, e uma cultura positiva.
- (B) uma cultura positiva e imagem radiológica suspeita.
- (C) duas baciloscopias diretas, positivas.
- (D) uma baciloscopia positiva e imagem radiológica suspeita.
- (E) uma cultura de escarro positiva.

26 A leptospirose é uma doença transmissível, muito comum no verão, devido à contaminação das águas da chuva pela urina do rato infectado.

São sinais e sintomas do diagnóstico diferencial da leptospirose

- (A) febre, náuseas e vômitos.
- (B) diarreia, vômito e dor retro-orbital.
- (C) manchas de koplick, febre e cefaléia.
- (D) coriza, febre e anorexia.
- (E) febre, icterícia, artralgia e dor em panturrilha.

27 Quanto às cirurgias de tórax, analise as afirmativas abaixo.

- I A hiperventilação é uma complicação frequente no pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais altas, cujo principal sinal é a frequência respiratória elevada.
- II A gasometria arterial é um exame importante na monitorização do paciente em pós-operatório de cirurgia torácica, pois nos revela os volumes e capacidades pulmonares.
- III As enzimas CK e CKMB são importantes na monitorização do pós-operatório de cirurgia cardíaca, pois se elevam rapidamente quando há diminuição importante de aporte sanguíneo ao músculo cardíaco.
- IV O cateter de Swan-Ganz é utilizado para monitorização hemodinâmica e nos oferece dados importantes no pós-operatório cardíaco e torácico como: débito cardíaco, pressão venosa central e pressão na artéria pulmonar.
- V A expansibilidade torácica diminuída poderá ocasionar áreas de atelectasia pulmonar no período pós-operatório.

Estão corretas as afirmativas

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) III e V, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

28 A icterícia fisiológica pode ser detectada quando ocorre

- (A) um aumento da bilirrubina indireta no primeiro ano de vida.
- (B) uma diminuição da bilirrubina direta na primeira semana de vida.
- (C) um aumento da bilirrubina indireta na primeira semana de vida.
- (D) uma diminuição da bilirrubina direta no primeiro dia de vida.
- (E) um aumento da bilirrubina direta na primeira semana de vida.

29 O código de Ética da Enfermagem considera as infrações como leves, graves ou gravíssimas, de acordo com

- (A) o conhecimento científico e os antecedentes profissionais.
- (B) a natureza do ato e o conhecimento científico.
- (C) as circunstâncias de cada caso e os antecedentes profissionais.
- (D) a natureza do ato e os antecedentes profissionais.
- (E) a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.

30 Através da Resolução ANVISA nº 08 de 27/02/2009 fica expressamente proibida a esterilização química, isto é, por imersão, de artigos médicos hospitalares, considerados críticos.

Sendo assim esses artigos deverão sofrer esterilização por meio de

- (A) óxido de Etileno ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio.
- (B) calor seco em estufa.
- (C) desinfecção de alto nível em glutaraldeído.
- (D) autoclavação.
- (E) apenas as afirmativas “a” e “d” estão corretas.

31 Atualmente compreende-se a educação permanente como um processo que impulsiona a transformação da Instituição, criando oportunidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e profissional, dentro de uma visão crítica da realidade.

Levando-se em conta os objetivos da educação permanente, assinale com V a alternativa verdadeira e F a alternativa falsa, depois marque a sequência **CORRETA**

- () Desenvolver a flexibilidade das competências individuais e coletivas.
- () Capacitar, pedagogicamente, os Enfermeiros para difusão do conhecimento.
- () Coordenar o processo de avaliação de desempenho profissional.
- () Incentivar as pessoas ao autodesenvolvimento.

() Analisar e documentar os processos da Educação Permanente, visando a subsidiar a tomada de decisão em enfermagem.

- (A) F,V,V,V,V.
- (B) F,F,V,V,F.
- (C) V,V,V,F,F.
- (D) V,V,V,F,V.
- (E) F,V,V,F,V.

32 “A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE é atividade privativa do Enfermeiro, e utiliza método e estratégia de trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade”. A resolução COFEN 272 / 2002 dispõe sobre a SAE nas Instituições de Saúde Brasileiras.

Esse processo compreende as seguintes etapas:

- (A) anamnese, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem e supervisão do desenvolvimento da assistência de enfermagem.
- (B) exame físico, prescrição de enfermagem e relatório de enfermagem.
- (C) exame físico, diagnóstico de enfermagem, evolução de enfermagem e prescrição de enfermagem.
- (D) histórico de enfermagem, exame físico, prescrição de enfermagem, evolução clínica e relatório de enfermagem.
- (E) histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem e relatório de enfermagem.

33 A forma pela qual o profissional de saúde pode remover e impedir o crescimento da sua flora transitória pode ser obtida mediante

- (A) uso contínuo de máscara e capote.
- (B) imersão das mãos em solução de formol.

- (C) preparo cirúrgico das mãos.
- (D) uso de luvas.
- (E) antissepsia das mãos.

34 No exame físico de um paciente com celulite facial, o procedimento que o enfermeiro deve saber, em busca de uma associação comum com esta infecção, é

- (A) otoscopia em busca de otite média aguda.
- (B) ausculta respiratória em busca de pneumonia.
- (C) exame da cadeia linfática em busca de supuração ganglionar cervical.
- (D) exame da cavidade oral em busca de amigdalite.
- (E) exame da cavidade oral em busca de estomatite.

35 Qual a doença pulmonar relacionada à doença ocupacional, que está diretamente ligada a inalação de poeira de partículas de quartzo, entre 2 e 5 μm ?

- (A) Asbestose.
- (B) Siderose.
- (C) Baritose.
- (D) Silicose.
- (E) Estanose.

36 Bolsas transfundidas vazias ou que contêm menos de 50 mL de produto residual (sangue ou hemocomponentes) são classificadas, de acordo com a Resolução RDC n.º 33 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde), como sendo um resíduo do tipo

- (A) potencialmente infectante.
- (B) químico.
- (C) rejeito radioativo.
- (D) resíduo comum.
- (E) perfurocortante.

37 No ser humano, alguns agentes infecciosos e parasitários atuam como fatores de risco inter-relacionados que acabam interferindo em diferentes estágios do desenvolvimento tumoral.

Relacione o agente infeccioso ou parasitário com o tumor correspondente e marque a sequência correta.

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1) Epstein-Barr | () | Câncer de Colo uterino |
| 2) HPV (papiloma vírus) | () | Linfomas e carcinoma de nasofaringe |
| 3) vírus da Hepatite | () | Adenocarcinoma de estômago |
| 4) vírus da AIDS | () | Sarcoma de Kaposi |
| 5) Helicobacter pylori | () | Hepatocarcinoma |

- (A) 1, 2, 3, 4 e 5
(B) 2, 1, 3, 5 e 4
(C) 2, 1, 5, 4 e 3
(D) 4, 1, 5, 2 e 3
(E) 4, 1, 3, 4 e 5

38 As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários no ambiente hospitalar, e sua prevenção e controle envolvem medidas de vários níveis de complexidade.

Marque a alternativa que indica quais são as medidas a serem adotadas na prevenção e controle das infecções hospitalares.

- I Higienização das mãos antes e após procedimentos.
- II Utilização de protocolos para procedimentos invasivos.
- III Medidas de precaução de contato.
- IV Utilização de Equipamentos de Proteção Individual.

- (A) Apenas a I e IV estão certas.
(B) Apenas a I e II estão certas.
(C) I, II, III e IV estão certas
(D) Apenas a I, II e IV estão certas.
(E) Apenas a I, III e IV estão certas.

39 O edema agudo pulmonar é uma complicação comum das doenças cardíacas com disfunção miocárdica, que se caracteriza pelo acúmulo de líquido no pulmão.

Diante desse quadro dramático, o enfermeiro deve estar atento para as manifestações clínicas que são caracterizadas por

- (A) ansiedade, agitação, hipertensão arterial, dispnéia, tosse com expectoração espumosa, cianose.
(B) dispneia, hipotensão arterial, poliúria, turgência de jugulares, edema de membros inferiores, cianose.
(C) cefaleia pulsátil, hiperglicemia, hipertensão arterial, broncoespasmo severo com cianose labial.
(D) agitação psicomotora súbita, cianose central, sudorese, taquipneia e saída de secreção amarelada pelas narinas.
(E) ansiedade, dispneia, cianose central, sudorese profusa acompanhada de vômitos em jato, bradicardia e hipotensão.

40 Choque cardiogênico é uma forma severa de falência ventricular esquerda, hipoperfusão tecidual e falência de bomba cardíaca (Ratton, 2005).

Pode-se afirmar que é uma patologia desencadeada geralmente por

- (A) ICC.
(B) isquemia miocárdica.
(C) hipóxia cerebral.
(D) arritmias cardíacas.
(E) hipertensão arterial severa

