



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

021. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **05**:

O exercício da cancerologia é uma lição permanente de humildade. Nem bem acabamos de nos encher de orgulho ao comemorar a resposta brilhante de um doente a um esquema de tratamento engenhosamente escolhido, entra o seguinte com o mesmo diagnóstico, tratado da mesma forma, morto de falta de ar, cheio de dores, como se tivesse tomado água em vez dos remédios prescritos.

Embora a arte de curar exija conhecimento técnico, sensibilidade humana para auxiliar o doente na escolha do tratamento mais adequado e carisma para transmitir-lhe coragem para enfrentar as dificuldades que se apresentarem, tratar alguém com uma doença curável é muito mais fácil que tratar dos incuráveis. Para conseguir que um doente incurável viva o máximo de tempo com a menor carga de dor e encontre a morte com tranquilidade, é preciso muito mais. A tarefa exige não só conhecimento científico, mas também compreensão da alma humana em profundidade, apenas acessível aos que se dedicam com empenho ao penoso processo de aprendizado que o contato repetido com a morte traz.

Tratar alguém que de antemão sabemos ter pouco tempo de vida tem características muito próprias: a estratégia precisa ser cuidadosamente planejada, levando em conta riscos, benefícios e as expectativas daquela pessoa em particular, para que não seja desperdiçado nenhum dia com os efeitos indesejáveis impostos pelas medidas prescritas. Enquanto os doentes curáveis terão anos para se recuperar das consequências nocivas do tratamento, os incuráveis não podem se dar ao luxo de perder uma hora sequer. Eles esperam nossa ajuda para conseguir a melhor qualidade de vida que puderem ter, e para viver o maior tempo possível.

(Drauzio Varella. *Por um fio*, 2004. Adaptado)

- 01.** De acordo com o texto, médicos cancerologistas costumam passar por situações em que
- (A) profissionais da saúde não têm o conhecimento técnico necessário para o trabalho.
 - (B) familiares de pacientes fazem exigências relativas ao tratamento e seus procedimentos.
 - (C) colegas de outras especialidades interferem no tipo de tratamento estabelecido.
 - (D) pacientes distintos apresentam reações diferentes a um mesmo tipo de tratamento.
 - (E) efeitos nocivos do uso de certos medicamentos impedem a interrupção do tratamento.

- 02.** Segundo o texto, pessoas que têm contato frequente com a morte
- (A) demonstram ter mais conhecimento científico que a maioria dos indivíduos.
 - (B) acabam por se especializar nos cuidados direcionados a doentes incuráveis.
 - (C) podem aprender a compreender a alma humana de forma mais profunda.
 - (D) adquirem a capacidade de não se sensibilizar com o sofrimento humano.
 - (E) costumam sentir desconforto no convívio diário com pacientes incuráveis.
- 03.** A palavra destacada está empregada com sentido figurado no seguinte trecho:
- (A) “O exercício da cancerologia é uma lição permanente de **humildade**.” (1º parágrafo)
 - (B) “... comemorar a resposta **brilhante** de um doente a um esquema de tratamento...” (1º parágrafo)
 - (C) “Para conseguir que um doente **incurável** viva o máximo de tempo...” (2º parágrafo)
 - (D) “Tratar alguém que de antemão sabemos ter pouco **tempo** de vida...” (3º parágrafo)
 - (E) “Eles esperam nossa ajuda para conseguir a **melhor** qualidade de vida que puderem...” (3º parágrafo)
- 04.** Em “Para conseguir que um doente incurável viva o máximo de tempo com a menor carga de dor e encontre a morte **com tranquilidade**, é preciso **muito** mais.” (2º parágrafo), as expressões destacadas apresentam, correta e respectivamente, circunstâncias de
- (A) meio e modo.
 - (B) meio e intensidade.
 - (C) modo e afirmação.
 - (D) modo e intensidade.
 - (E) modo e modo.
- 05.** A norma-padrão de concordância verbal foi respeitada em:
- (A) O apoio e a presença da família podem atenuar o sofrimento dos doentes.
 - (B) Antigamente não haviam tantos medicamentos e exames médicos como hoje.
 - (C) Existe profissionais da saúde muito competentes e dedicados ao trabalho.
 - (D) A existência de diferentes especialidades médicas são algo importante.
 - (E) Atualmente se contam com um grande volume de conhecimentos médicos.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **06 a 09**:

Saudade da coxa de catupiry

Sou do tempo dos salgadinhos reconhecíveis.

Você me entende: do tempo em que, diante da bandeja, a gente não tinha dúvidas – o que ali estava era croquete, coxinha, empadinha. Sem chance de equívoco. Bem diferente, admita, dos dias de hoje, em que é preciso recorrer ao garçom para decifrar enigmas culinários, alguns deles tão complexos e empetecados que você se pergunta se não seriam, em vez de comida, peças decorativas. Sim, vivemos a era do salgadinho que demanda apresentação. Deveria vir com legenda.

Nada contra a modernização do tira-gosto. Mas me dê um tempo para me adaptar. Outro dia, num casamento, estenderam na minha direção um artefato aparentemente comestível, algo como uma coxinha esférica, acoplada a um talo branco. Era, de fato, uma minicoxinha – mas e o misterioso talo branco, grosso demais para ser palito? Na roda, um convidado mais ousado se aventurou a mastigá-lo, e aí se deu conta de que, naquele casamento chique, ele tinha na boca um vulgar pedaço de cana. Coxinha com cana – onde vamos parar? E o que fazer com o bagaço?

Muita coisa surgiu na vida de meus maxilares tão fatigados desde a primeira dentição. Na minha infância belo-horizontina não tinha shitake, rúcula e kiwi, por exemplo. Em compensação, tinha Crush, drops Dulcora, açúcar cândi, que depois sumiram do mapa.

Como sumiu o cajuzinho. Onde foi parar o cajuzinho? Você vai me dizer que não sei onde tem uma “dona” que faz. Coisas de Belo Horizonte: em alguma parte, tem sempre uma dona que faz o docinho, o salgadinho que desapareceu das vitrines. Não duvido de que nalgum recanto da capital haja uma dona do cajuzinho. Vai ver que é a mesma do bolinho de feijão.

(Humberto Werneck. *Esse inferno vai acabar*, 2011. Adaptado)

06. É correto afirmar que, em sua infância, o narrador

- (A) tinha o hábito de andar pela cidade de Belo Horizonte à procura de alguém que ainda fizesse cajuzinhos.
- (B) desconhecia certos ingredientes que seus familiares tinham o hábito de usar para fazer salgadinhos e docinhos.
- (C) costumava consumir certos produtos que, a partir de um certo momento, não se encontravam mais.
- (D) evitava ao máximo comer alimentos que contivessem ingredientes diferentes como shitake, rúcula ou kiwi.
- (E) enfrentou problemas relacionados à primeira dentição, o que o impediu de conhecer determinados alimentos.

07. O narrador inclui o leitor no texto no seguinte trecho:

- (A) “Sou do tempo dos salgadinhos reconhecíveis.” (1º parágrafo)
- (B) “Bem diferente, admita, dos dias de hoje...” (2º parágrafo)
- (C) “Nada contra a modernização do tira-gosto.” (3º parágrafo)
- (D) “Vai ver que é a mesma do bolinho de feijão.” (5º parágrafo)
- (E) “... em alguma parte, tem sempre uma dona que faz o docinho...” (5º parágrafo)

08. Considere as passagens a seguir:

- “... alguns deles tão complexos e **empetecados**...” (2º parágrafo)
- “Era, **de fato**, uma minicoxinha...” (3º parágrafo)
- “**Em compensação**, tinha Crush, drops Dulcora...” (4º parágrafo)

As expressões destacadas podem ser, correta e respectivamente, substituídas por:

- (A) realmente bonitos; assim; em contrapartida.
- (B) muito feios; provavelmente; em segundo lugar.
- (C) excessivamente artificiais; talvez; ao menos.
- (D) bastante estranhos; na verdade; além disso.
- (E) exageradamente enfeitados; realmente; por outro lado.

09. Assinale a alternativa que apresenta trecho do texto reescrito em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) ... é preciso chamar ao garçom para decifrar enigmas culinários...
- (B) Sim, chegamos na era do salgadinho que demanda de apresentação.
- (C) Mas me conceda a um tempo para me adaptar.
- (D) Na roda, um convidado mais ousado inventou de mastigá-lo...
- (E) Na minha infância belo-horizontina não se contava de shitake nos alimentos...

10. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.


O narrador foi _____ uma festa em que foram servidos salgadinhos muito diferentes dos tradicionais. Um convidado se atreveu _____ comer o misterioso talo branco que estava unido _____ coxinha.

- (A) a ... a ... à
- (B) à ... a ... a
- (C) a ... à ... a
- (D) a ... a ... a
- (E) à ... à ... à

11. Para a organização de um arquivo, uma empresa comprará 12 caixas organizadoras. A papelaria local vende cada caixa avulsa por R\$ 12,40 e vende um pacote fechado com 12 unidades dessas caixas por R\$ 133,92. Comparando-se o preço unitário de uma caixa no pacote fechado com o preço de uma caixa avulsa, verifica-se que a economia que será feita por caixa, na compra do pacote fechado, será de
- (A) R\$ 1,12.
 - (B) R\$ 1,24.
 - (C) R\$ 1,32.
 - (D) R\$ 1,40.
 - (E) R\$ 1,48.
12. Em uma gráfica, uma máquina A imprime 1 cartaz de determinado tipo a cada 40 segundos, e uma máquina B imprime 1 cartaz desse mesmo tipo a cada 50 segundos. Certo dia, essas máquinas começaram, às 8 horas, a impressão contínua de vários cartazes do tipo indicado. O primeiro horário em que a diferença entre os números de cartazes impressos pelas máquinas A e B era igual a 30 foi às
- (A) 8h20.
 - (B) 8h50.
 - (C) 9h10.
 - (D) 9h40.
 - (E) 10h30.
13. Uma empresa tem 120 funcionários no setor de produção e 96 funcionários no setor de montagem. Esses funcionários serão divididos no maior número possível de grupos mistos, de modo que cada um dos grupos tenha o mesmo número de funcionários do setor da produção e o mesmo número de funcionários do setor da montagem. Nessas condições, o número total de funcionários em cada grupo será igual a
- (A) 4.
 - (B) 5.
 - (C) 6.
 - (D) 8.
 - (E) 9.

14. Um departamento tem 60 funcionários, dos quais 40% são homens. Após uma reestruturação em que foram contratadas apenas mulheres, o número de homens passou a representar apenas 30% do novo total de funcionários. O número de mulheres contratadas durante aquela reestruturação foi igual a
- (A) 4.
 - (B) 10.
 - (C) 15.
 - (D) 20.
 - (E) 24.
15. Um grupo de 12 estagiários, trabalhando 4 horas por dia, consegue organizar 240 caixas de arquivo morto em 10 dias. Deseja-se organizar 600 caixas em apenas 6 dias, com jornada de 5 horas por dia. Para atingir esse objetivo, o número mínimo de novos estagiários que devem se juntar ao grupo já constituído é de
- (A) 22.
 - (B) 28.
 - (C) 32.
 - (D) 36.
 - (E) 40.
16. Foram realizados dois orçamentos, em lojas distintas, para a compra de cadeiras de certo tipo. Cada cadeira desse tipo custa R\$ 80,00 na loja A e R\$ 72,00 na loja B. Independentemente do número de cadeiras adquiridas, a loja A cobra R\$ 200,00 para entregá-las, e a loja B cobra R\$ 320,00. Considerando-se o valor cobrado para a entrega, o custo total nessas duas lojas será o mesmo se o número de cadeiras compradas for igual a
- (A) 13.
 - (B) 14.
 - (C) 15.
 - (D) 16.
 - (E) 20.
17. O quadrado do número de protocolos recebidos em um dia somado ao quádruplo desse mesmo número é igual a 500. Se cada protocolo leva 15 minutos para ser analisado, o tempo total gasto para analisar todos os protocolos recebidos nesse dia específico é igual a
- (A) 5 horas.
 - (B) 5 horas e 30 minutos.
 - (C) 6 horas.
 - (D) 6 horas e 15 minutos.
 - (E) 6 horas e 45 minutos.

18. Uma pesquisa sobre os hobbies preferidos de 1.200 jovens revelou o gráfico de setores a seguir:



De acordo com os dados apresentados, a quantidade de jovens que preferem videogames é igual a

- (A) 320.
 (B) 330.
 (C) 360.
 (D) 400.
 (E) 480.
19. Em abril, o time de futebol da prefeitura era formado por 20 atletas, sendo a média das suas alturas igual 1,77 m. Em maio, dois jogadores saíram do time, um com 1,73 m e outro com 1,70 m, e três novos jogadores se juntaram à equipe, sendo suas alturas respectivamente iguais a 1,78 m, 1,80 m e 1,83 m. Com essas mudanças, a média das alturas dos atletas desse time passou a ser igual a
- (A) 1,76 m.
 (B) 1,77 m.
 (C) 1,78 m.
 (D) 1,79 m.
 (E) 1,80 m.
20. O piso de uma sala de reuniões, que tem o formato de um hexágono regular com lado medindo 4 metros, será impermeabilizado ao custo de R\$ 50,00 por m². Considerando $\sqrt{3} \approx 1,7$, o custo dessa impermeabilização será igual a
- (A) R\$ 4.140,00.
 (B) R\$ 3.860,00.
 (C) R\$ 3.480,00.
 (D) R\$ 2.720,00.
 (E) R\$ 2.040,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No âmbito dos fundamentos de enfermagem, a observação clínica e o registro adequado são essenciais para a continuidade do cuidado e a segurança do paciente. Durante a verificação dos sinais vitais de um paciente internado, o auxiliar de enfermagem identifica alterações e as registra no prontuário.

Considerando os princípios que norteiam os registros de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O registro deve ser realizado de forma subjetiva, priorizando a interpretação pessoal do profissional sobre o estado clínico do paciente, desde que essa interpretação facilite a comunicação com a equipe.
- (B) O registro pode ser feito ao final do turno, reunindo todas as informações observadas, desde que não haja perda significativa de dados clínicos relevantes e que o profissional tenha anotações pessoais.
- (C) O registro deve ser claro, objetivo, completo e realizado imediatamente após o cuidado, utilizando linguagem técnica adequada e sem rasuras ou termos ambíguos.
- (D) O uso de abreviações não padronizadas é permitido quando amplamente utilizadas pela equipe, desde que não comprometa a rapidez do registro.
- (E) A anotação do auxiliar de enfermagem deve conter apenas os procedimentos realizados, sendo que sinais e sintomas observados no paciente devem ser registrados apenas pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem.

22. No contexto da assistência de enfermagem em clínica médica, o auxiliar de enfermagem desempenha papel fundamental na observação de sinais clínicos e na prevenção de complicações. Um paciente internado apresenta dispneia, cansaço aos mínimos esforços e edema em membros inferiores.

Considerando os cuidados de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve ser mantido em posição totalmente horizontal para favorecer o retorno venoso e melhorar a oxigenação.
- (B) A restrição hídrica deve ser iniciada como medida protocolar, mesmo sem prescrição, como padrão para redução do edema periférico.
- (C) O auxiliar de enfermagem deve monitorar sinais vitais, observar padrão respiratório e posicionar o paciente em semi-Fowler para facilitar a respiração.
- (D) O edema em membros inferiores é um achado irrelevante e não necessita ser comunicado à equipe de enfermagem.
- (E) A administração de oxigênio pode ser iniciada pelo auxiliar de enfermagem independentemente de prescrição, diante de sinais de dispneia.

23. No contexto da assistência de enfermagem em saúde mental, o auxiliar de enfermagem deve adotar condutas que favoreçam a segurança, o acolhimento e o vínculo com o paciente. Durante o atendimento, um paciente apresenta agitação psicomotora, fala acelerada e comportamento hostil.

Considerando as ações adequadas da equipe de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O auxiliar de enfermagem deve falar de forma clara e objetiva, evitar confrontos e acionar colegas da equipe multiprofissional caso o paciente se mantenha agitado.
- (B) O auxiliar de enfermagem deve conter o paciente física e imediatamente para evitar riscos e a escalada da agitação psicomotora.
- (C) O profissional deve elevar o tom de voz para mostrar autoridade diante do paciente e interromper o comportamento agitado e o ciclo de violência e agressão.
- (D) O paciente deve ser isolado para evitar estímulos externos que possam agravar o quadro.
- (E) O auxiliar de enfermagem deve ignorar o comportamento do paciente, evitando reforçá-lo.

24. Em relação às doenças transmissíveis e suas formas de prevenção, assinale a alternativa correta.

- (A) A transmissão por contato indireto ocorre exclusivamente por meio de gotículas respiratórias de curto alcance.
- (B) A vacinação constitui uma medida de prevenção específica, que atua na proteção individual e coletiva, contribuindo para a redução da circulação do agente infeccioso.
- (C) As doenças transmissíveis são causadas apenas por bactérias e vírus que são transmitidos de pessoa a pessoa ou de animal a pessoa.
- (D) A notificação de doenças transmissíveis é facultativa e deve ser realizada apenas em casos de surtos confirmados.
- (E) O período de incubação corresponde ao intervalo entre o início dos sintomas e a completa recuperação do indivíduo infectado.

25. No cuidado de enfermagem à pessoa idosa, é fundamental considerar as alterações fisiológicas do envelhecimento e suas implicações no cuidado. Durante o atendimento a um idoso internado, o auxiliar de enfermagem deve adotar condutas seguras e adequadas.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O envelhecimento não interfere na farmacocinética dos medicamentos, sendo desnecessárias mudanças na administração medicamentosa em idosos.
- (B) A redução da sensibilidade à dor no idoso dispensa a investigação de queixas álgicas, uma vez que são esperadas nessa faixa etária.
- (C) A hidratação do idoso deve ser restrita rotineiramente, como forma de prevenir sobrecarga circulatória.
- (D) As quedas em idosos são eventos inevitáveis do envelhecimento e não podem ser prevenidas por medidas de enfermagem.
- (E) O auxiliar de enfermagem deve estar atento ao risco aumentado de quedas, adotando medidas preventivas como manter ambiente seguro, auxiliar na deambulação e orientar o paciente e familiares.

26. No contexto da assistência à saúde da mulher, o conhecimento das fases do trabalho de parto é fundamental para a atuação segura da equipe de enfermagem. Durante o acompanhamento de uma gestante em trabalho de parto, o auxiliar de enfermagem deve ter ciência de que a fase

- (A) de dilatação inicia-se após a saída do feto e caracteriza-se por contrações uterinas intensas e regulares.
- (B) expulsiva ocorre antes da dilatação completa do colo do útero, sendo marcada por contrações irregulares e pouco dolorosas.
- (C) de dequitação corresponde ao período de dilatação cervical, que ocorre antes da saída do feto.
- (D) de dilatação é caracterizada pelo apagamento e pela dilatação do colo do útero até cerca de 10 cm, sendo geralmente a mais longa do trabalho de parto.
- (E) expulsiva e a dequitação ocorrem simultaneamente, não sendo possível distingui-las clinicamente.

27. Na assistência à criança, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é uma das ações fundamentais na atenção básica.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A ausência de sorriso social aos 2 meses de idade pode indicar atraso no desenvolvimento e deve ser comunicada à equipe de saúde.
- (B) A criança deve iniciar a deambulação aos 9 meses, sendo considerado atraso qualquer variação após essa idade.
- (C) O perímetro cefálico não é um parâmetro relevante após o nascimento, sendo dispensável seu acompanhamento nas consultas.
- (D) A introdução alimentar deve ocorrer antes dos 4 meses de idade, independentemente do tipo de aleitamento.
- (E) O choro frequente na infância não possui relação com o desenvolvimento e não deve ser considerado na avaliação clínica.

28. A realização de técnicas assépticas em procedimentos de enfermagem é fundamental para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. Durante a realização de um curativo, o auxiliar de enfermagem deve adotar condutas adequadas.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza da ferida deve ser realizada do local mais contaminado ao menos contaminado, visando remover rapidamente os microrganismos.
- (B) O uso de luvas dispensa a higienização das mãos antes e após o procedimento, desde que não haja contato direto com secreções.
- (C) O material estéril pode ser manipulado sem técnica específica, desde que não toque diretamente na ferida do paciente.
- (D) A limpeza da ferida deve ser realizada do local menos contaminado para o mais contaminado, utilizando técnica asséptica e material adequado.
- (E) O curativo pode ser realizado sem necessidade de avaliação prévia da ferida, desde que siga a rotina padronizada do serviço.

29. Um paciente internado em uma unidade clínica apresenta prescrição de antibiótico por via intramuscular. O auxiliar de enfermagem, ao preparar o procedimento, observa que o paciente refere dor intensa em aplicações anteriores e demonstra ansiedade.

Assinale a alternativa correta a respeito da técnica adequada e da segurança do paciente, considerando a assistência de enfermagem na administração de medicamentos por via intramuscular.

- (A) A aplicação deve ser realizada rapidamente, sem necessidade de comunicação com o paciente após aprovação do familiar, para reduzir o tempo do procedimento e possibilitar a superação da aversão.
- (B) O local de aplicação pode ser escolhido livremente pelo profissional, com foco na habilidade do auxiliar de enfermagem.
- (C) A massagem vigorosa no local após a aplicação de medicação intramuscular é sempre indicada para a redução da dor e é conhecida como técnica de do-in.
- (D) A agulha deve ser inserida em ângulo variável, de acordo com a preferência do profissional, para aplicação mais rápida.
- (E) O auxiliar de enfermagem deve escolher o local adequado, utilizar técnica correta, orientar o paciente sobre o procedimento e observar possíveis reações após a administração.

30. Em relação às boas práticas na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração de medicamentos deve priorizar a rapidez do procedimento, podendo a conferência ser realizada uma vez antes da aplicação.
- (B) A identificação do paciente realizada verbalmente dispensa a conferência com pulseira ou prontuário.
- (C) A via de administração pode ser adaptada pelo profissional conforme a preferência do paciente, respeitando a mesma classe de medicação, ainda que em outra via.
- (D) A administração de medicamentos deve seguir os princípios dos “certos”, incluindo paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e registro certo.
- (E) O registro da administração do medicamento pode ser realizado ao final do turno, em blocos, para otimizar o tempo de assistência.

31. J.C.I., um paciente acamado há vários dias, encontra-se internado em unidade clínica, apresentando mobilidade reduzida e dependência para atividades de autocuidado. Durante o banho no leito, o auxiliar de enfermagem observa áreas de hiperemia na região sacral.

Assinale a alternativa que apresenta quais cuidados adequados a equipe deve adotar, diante dessa situação, para a prevenção de lesões por pressão.

- (A) O banho no leito deve ser realizado com movimentos rápidos, quando próximo à área de hiperemia, priorizando manipulação rápida para evitar a dor.
- (B) A equipe deve realizar mudanças de decúbito regularmente, com marcação padronizada nas anotações de enfermagem, manter a pele limpa e seca e observar áreas de pressão durante os cuidados.
- (C) A hidratação da pele não interfere na integridade cutânea do paciente, ao contrário do senso comum, sendo contraindicado realizar procedimentos de hidratação em áreas com hiperemia.
- (D) A mudança de decúbito deve ocorrer apenas quando o paciente refere desconforto, respeitando sua percepção individual.
- (E) A observação da pele pode ser realizada uma vez ao dia, durante o banho, sem repetições desnecessárias.

32. Na Unidade Básica de Saúde, a atuação do auxiliar de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Sobre as ações de saúde realizadas nesse serviço de saúde, é correto afirmar que

- (A) as ações em saúde pública devem priorizar o atendimento curativo, que resolva agravos já instalados.
- (B) a educação em saúde é definida como uma ação pontual, desenvolvida em campanhas com os usuários.
- (C) o coração da atuação na atenção básica é o atendimento médico, e os profissionais de suporte fazem busca ativa e encaminhamento à avaliação médica.
- (D) a prevenção de doenças define-se como a realização de imunizações.
- (E) as ações de saúde pública incluem promoção da saúde, prevenção de doenças, educação em saúde e acompanhamento contínuo da população adscrita.

33. No contexto do controle de infecção relacionado à assistência à saúde, a correta classificação dos processos de esterilização e desinfecção é fundamental para garantir a segurança do paciente e da equipe.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A esterilização é o processo que elimina todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos, e é indicada para materiais críticos que entram em contato com tecidos estéreis.
- (B) A desinfecção de baixo nível elimina todos os microrganismos, incluindo esporos, sendo equivalente à esterilização em materiais hospitalares.
- (C) A limpeza dos materiais é opcional antes dos processos de desinfecção e esterilização, desde que sejam utilizados produtos químicos adequados.
- (D) Os materiais não críticos devem sempre ser submetidos à esterilização para garantir a segurança do paciente.
- (E) A desinfecção de alto nível é indicada apenas para superfícies ambientais, não sendo utilizada em artigos semicríticos.

34. Durante o atendimento em uma unidade de saúde, um auxiliar de enfermagem realiza cuidados a um paciente com diagnóstico ainda não definido, que apresenta febre e secreção respiratória.

Considerando as medidas de precaução e segurança, assinale a alternativa correta a respeito das condutas adequadas que o profissional deve adotar para a prevenção de infecções.

- (A) O uso de equipamentos de proteção individual deve ocorrer apenas após confirmação diagnóstica de doença transmissível.
- (B) As precauções-padrão devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, incluindo a higienização das mãos e o uso de EPI, conforme o risco de exposição.
- (C) A higienização das mãos pode ser realizada apenas ao final do atendimento, desde que não haja contato com sangue.
- (D) O uso de luvas elimina a necessidade de higienização das mãos durante a assistência ao paciente.
- (E) As precauções-padrão são indicadas apenas para pacientes internados, não sendo necessárias na atenção básica, uma vez que, nesse tipo de serviço, não há contato com bactérias multirresistentes.

35. No contexto da biossegurança em serviços de saúde, a adoção de medidas adequadas é essencial para a proteção dos profissionais, dos pacientes e do meio ambiente.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O descarte de resíduos perfurocortantes pode ser realizado em sacos plásticos resistentes, desde que devidamente identificados.
- (B) Os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados apenas em situações com risco evidente de contaminação por sangue.
- (C) Os resíduos perfurocortantes devem ser descartados imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à perfuração e devidamente identificados.
- (D) A reutilização de materiais descartáveis é permitida quando realizada pelo mesmo profissional e no mesmo paciente.
- (E) A higienização das mãos pode ser substituída pelo uso de luvas em procedimentos rotineiros.

36. J.B.S., sexo masculino, adulto, comparece à unidade com dúvidas sobre vacinação e relata receio quanto à segurança das vacinas.

Considerando as boas práticas em imunizações, assinale a alternativa correta.

- (A) A aplicação de vacinas pode ser realizada sem verificação do histórico vacinal, desde que o paciente relate estar com esquema incompleto.
- (B) As vacinas devem ser administradas apenas em indivíduos sem qualquer sintoma, sendo contraindicada a vacinação em situações de doenças leves.
- (C) A conservação das vacinas pode ocorrer em qualquer temperatura, desde que o frasco permaneça fechado até o momento do uso.
- (D) A verificação do histórico vacinal, a orientação ao usuário e a manutenção da cadeia de frio são etapas essenciais para garantir a eficácia e a segurança da vacinação.
- (E) A administração de vacinas não exige registro imediato, podendo ser anotada posteriormente em sistemas de informação.

37. No contexto da vigilância epidemiológica, a notificação compulsória de doenças é uma ferramenta essencial para o controle de agravos à saúde pública.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação de doenças deve ser realizada apenas após confirmação laboratorial do diagnóstico
- (B) A responsabilidade pela notificação é exclusivamente do médico, cabendo ao auxiliar de enfermagem e a outros profissionais da equipe a testagem e o relato a este profissional.
- (C) As doenças de notificação compulsória são aquelas que apresentam apenas alta taxa de mortalidade, uma vez que a sociedade precisa de acesso à informação sobre agravos letais.
- (D) A notificação deve ser realizada apenas em casos de surtos ou epidemias confirmados.
- (E) A notificação compulsória deve ser realizada por profissionais de saúde diante da suspeita ou confirmação de doenças previstas em lista oficial, contribuindo para ações de controle.

38. Uma equipe da Estratégia Saúde da Família realiza o acompanhamento de J.M.B., usuário acamado, em seu território adscrito, com hipertensão arterial de difícil controle e dificuldades de adesão ao tratamento, além de queixas de não poder comparecer à unidade em seu horário de funcionamento. O auxiliar de enfermagem participa das visitas domiciliares e das ações na unidade.

Considerando os princípios da atenção básica, assinale a alternativa correta.

- (A) O acompanhamento de J.M.B. deve ser contínuo, com ações de promoção da saúde, vínculo com a equipe e orientação ao usuário, considerando seu contexto familiar e social.
- (B) Uma vez que J.M.B. não procura espontaneamente a unidade de saúde para consulta, não é possível dar seguimento ao acompanhamento do caso. A equipe irá então relatar não adesão no prontuário familiar.
- (C) A assistência deve ser centrada no tratamento medicamentoso, priorizando o controle imediato da pressão arterial. Apontamentos sobre a adesão e cuidado familiar são secundários.
- (D) As ações da equipe devem focar apenas no indivíduo doente, em um caso de urgência como este, sem necessidade de envolver a família no cuidado.
- (E) O acompanhamento domiciliar é indicado apenas para pacientes acamados, não sendo necessário em outros casos.

39. No contexto da atenção à saúde, o acolhimento é uma diretriz fundamental para a organização dos serviços e para a qualidade do cuidado prestado à população.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento consiste na triagem de pacientes com base na ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (B) O acolhimento envolve escuta qualificada, identificação das necessidades do usuário e responsabilização da equipe pelo encaminhamento adequado.
- (C) O acolhimento deve ser realizado apenas por profissionais de nível superior, não sendo atribuição da equipe técnica.
- (D) O acolhimento tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera, sem necessidade de avaliação das demandas do usuário.
- (E) O acolhimento ocorre apenas em situações de urgência e emergência, não sendo necessário em atendimentos de rotina.

40. Um auxiliar de enfermagem, durante o preparo de medicação, sofre um acidente com material perfurocortante após a utilização de uma agulha. Imediatamente após o ocorrido, ele procura orientação na unidade de saúde.

Considerando as condutas relacionadas à saúde do trabalhador em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O profissional deve aguardar o término do turno para comunicar o acidente, organizando previamente suas atividades, sem prejudicar o plantão.
- (B) A lavagem do local do acidente pode ser realizada apenas com solução antisséptica, dispensando o uso de água e sabão.
- (C) O profissional deve realizar imediatamente a higienização do local com água e sabão, comunicar o acidente e seguir o protocolo institucional de avaliação e acompanhamento.
- (D) O acidente deve ser registrado apenas se houver contaminação com material ou fluido de usuário portador de doença infectocontagiosa, após sintomas ou sinais de infecção nas horas seguintes.
- (E) O uso de equipamentos de proteção individual dispensa a necessidade de notificação de acidentes com perfurocortantes, uma vez que luva, óculos e máscara protegem o profissional contra agravos.

