



# CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

## MÉDICO DIARISTA PEDIATRA

PROVA OBJETIVA  
TIPO 1



### SUA PROVA

Além deste caderno de questões contendo **80 (oitenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de sala o cartão de respostas.

As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



### TEMPO

- **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas.**
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões.**



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- No cartão de respostas, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchê-lo.
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado na folha de respostas.
- Confira o tipo do seu caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de questões com tipo diferente do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição do cartão de respostas em caso de erro.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

**Boa prova!**



## Língua Portuguesa

1

O texto abaixo, retirado do site “Somos Brasileiros”, explora o tema da saúde pública no Brasil.

*“O Brasil enfrenta vários desafios na área da saúde pública que impactam a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde:*

*Desigualdade no Acesso aos Serviços de Saúde. Apesar de ser um sistema de saúde universal, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde entre regiões urbanas e rurais, bem como entre diferentes classes sociais, continua a ser um problema significativo.”*

Sobre a estruturação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O primeiro parágrafo apresenta os problemas que serão desenvolvidos no parágrafo seguinte.
- (B) O segundo parágrafo mostra um problema que se refere à acessibilidade, citada no primeiro parágrafo.
- (C) O texto mostra um dos problemas da saúde pública no Brasil e uma possível resolução para esse problema.
- (D) A frase “Apesar de ser um sistema de saúde universal” indica um aspecto negativo de nosso sistema de saúde.
- (E) A desigualdade no acesso à saúde pública se prende unicamente ao local de moradia do usuário (regiões urbanas e rurais).

2

No mesmo artigo está presente um segundo aspecto de nosso sistema de saúde:

*“Financiamento e Recursos. A falta de recursos financeiros adequados e a gestão ineficiente dos fundos destinados à saúde são desafios críticos. Isso afeta a capacidade dos hospitais e centros de saúde em oferecer serviços de qualidade.”*

Sobre a estruturação ou significação desse texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O pronome demonstrativo “Isso” se refere a algo que é citado na continuidade do texto.
- (B) O termo “capacidade dos hospitais” alude à capacidade profissional dos funcionários que lá trabalham.
- (C) Os vocábulos – “Financiamento e Recursos” – do início do texto resumem tematicamente o seu conteúdo.
- (D) Ao afirmar que os problemas citados são “desafios críticos”, o texto indica que são problemas que nunca serão resolvidos.
- (E) A falta de recursos adequados e a ineficiência da gestão financeira são críticas dirigidas aos funcionários da área da saúde.

3

Leia o trecho a seguir.

*“O Brasil enfrenta altas taxas de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além de lidar com epidemias recorrentes, como o dengue e a gripe. A gestão dessas condições requer uma abordagem integrada e recursos substanciais.”*

No trecho, há uma série de expressões e vocábulos que necessitam de perfeita compreensão.

Assinale a opção que apresenta um significado adequado para o segmento destacado.

- (A) “doenças crônicas” são as que se repetem todos os anos.
- (B) “epidemias recorrentes” são aquelas que estão presentes em todo o país.
- (C) “o dengue e a gripe” são exemplos de doenças crônicas, citadas anteriormente.
- (D) As “condições” citadas, referem-se às condições financeiras no atendimento do público.
- (E) “abordagem integrada” se refere a uma participação coletiva na solução do problema.

4

*“Apesar dos desafios, o Brasil tem avançado significativamente em várias áreas da saúde pública:*

*Expansão da Cobertura de Saúde. A expansão da cobertura de saúde, especialmente com a implementação de programas de saúde da família e a ampliação da rede de unidades básicas de saúde, tem melhorado o acesso aos serviços”.*

Sobre o texto acima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O substantivo “acesso” poderia ser adequadamente substituído por ascender.
- (B) A “Expansão da Cobertura de Saúde” é visto como mais um problema a ser enfrentado.
- (C) O termo “tem melhorado” deveria ser corretamente substituído por “têm melhorado”.
- (D) O texto mostra um lado positivo da área de saúde pública, relacionado à expansão do serviço.
- (E) Após o segmento inicial, que funciona como uma espécie de título, há comentários sobre temas diferentes dos que estão presentes nesse título.

5

*“Não há investimento melhor para qualquer comunidade do que pôr leite em bebês. Cidadãos saudáveis são o maior bem que qualquer país pode ter.”*

Sobre esse pequeno segmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expressão “pôr leite em bebês” equivale semanticamente a “adotar bebês”.
- (B) O termo “qualquer comunidade” poderia ser, sem alteração semântica, substituída por “uma comunidade qualquer”.
- (C) A expressão “Não há investimento melhor” corresponde semanticamente a “Há investimento pior”.
- (D) O primeiro período mostra um exemplo de grau comparativo de inferioridade.
- (E) O segundo período do texto funciona como uma conclusão do primeiro.

6

“A saúde é o estado no qual as funções necessárias se cumprem insensivelmente ou com prazer.”

O termo “insensivelmente ou com prazer” poderia ser escrito de forma sintaticamente paralela e correta do seguinte modo:

- (A) sem sensibilidade ou sem prazer.
- (B) sem sensibilidade ou com prazer.
- (C) com sensibilidade ou com prazer.
- (D) insensivelmente ou prazerosamente.
- (E) insensivelmente ou prazenteramente.

7

Leia o texto a seguir.

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo. Junto com o selênio, forma a base nutricional que permite à tireoide trabalhar bem. Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

(Tua Saúde, 15/04/2026)

Assinale a opção que indica a finalidade principal desse texto.

- (A) Procurar ensinar o leitor sobre o funcionamento de seu corpo.
- (B) Informar o leitor sobre o papel dos nutrientes na saúde da tireoide.
- (C) Ensinar o leitor a como agir para manter o equilíbrio hormonal em dia.
- (D) Mostrar os caminhos práticos de como melhorar a saúde da tireoide.
- (E) Indicar quais os principais nutrientes participantes especificamente da saúde da tireoide.

8

“Quando o assunto é a saúde da tireoide, um nutriente se destaca como o mais essencial: o iodo. Ele é a matéria-prima usada pela glândula para produzir hormônios que controlam o metabolismo, a energia e o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo.”

Sobre a estruturação desse segmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Após o primeiro período, o texto mostra a conclusão da frase anterior.
- (B) O pronome relativo “que” tem por antecedente o substantivo “matéria-prima”.
- (C) A primeira frase – Quando o assunto é a saúde da tireoide – delimita o assunto a ser explorado no texto.
- (D) Ao dizer que o iodo é o nutriente mais essencial, o texto mostra a falta de importância dos demais nutrientes.
- (E) O termo “glândula” está mal-empregado, por não haver informação anterior sobre qual glândula o texto se refere.

9

“Entender o papel desses nutrientes e suas principais fontes ajuda a manter o equilíbrio hormonal em dia.”

Sobre os termos desse fragmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A forma verbal “ajuda” deveria estar no plural, pois o sujeito é plural.
- (B) A expressão “em dia” pode ser adequadamente substituída por “diariamente”.
- (C) As duas formas verbais “Entender” e “manter” exemplificam a estrutura de voz passiva.
- (D) O demonstrativo “desses” e o possessivo “suas” possuem o mesmo antecedente textual.
- (E) A informação passada ao leitor por esse segmento textual incentiva-o a procurar novas informações sobre o tema.

10

“O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil. O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.

Apesar da alta incidência, a percepção de bem-estar da população permanece vinculada apenas ao peso corporal total, ignorando os indicadores específicos de distribuição de gordura.”

Catraca Livre, 16/04/2026.

- (A) O período inicial mostra que o texto foi estruturado a partir da opinião de quem o escreveu.
- (B) A utilização do advérbio “apenas” tem a função de mostrar a única causa da ocorrência de infarto agudo do miocárdio.
- (C) Ao dizer que o infarto é “uma das principais causas de óbito” no Brasil, o texto informa que há outras causas de óbito igualmente importantes.
- (D) Na frase “O índice posiciona a condição como uma das principais causas de óbito no país.”, os termos “índice” e “condição” se referem ao mesmo termo anterior.
- (E) O segmento inicial “O Ministério da Saúde registra a ocorrência de 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano no Brasil” indica, de fato, a conclusão do texto.

11

“Entre as raízes mais estudadas pela ciência moderna, a cúrcuma ganha destaque pela sua ação direta sobre o fígado. Também conhecida como açafrão-da-terra, essa especiaria milenar contém a curcumina, composto com potente ação anti-inflamatória e antioxidante capaz de proteger as células hepáticas, reduzir o acúmulo de gordura e ajudar a equilibrar enzimas como ALT e AST, marcadores importantes de saúde do fígado.”

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Sobre a estruturação ou a significação desse pequeno texto, assinale a afirmativa correta.

- (A) Segundo o texto, “açafrão-da-terra” é o nome mais culto dado à cúrcuma.
- (B) “Cúrcuma” e “curcumina” são termos considerados textualmente sinônimos.
- (C) Pelos termos empregados, o texto foi redigido para o público leigo no assunto tratado.
- (D) Como mostra a grafia de “antioxidante”, o termo “anti-inflamatória” deveria ser grafado sem hífen.
- (E) A redução do acúmulo de gordura e o equilíbrio das enzimas são benefícios para o fígado, trazidos pela cúrcuma.

**12**

Leia o texto a seguir.

*“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.*

*Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer exercícios de alto impacto.”*

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

A finalidade principal desse pequeno texto é a de

- (A) prevenir doenças cardíacas.
- (B) promover a busca pela saúde.
- (C) divulgar a utilidade das academias.
- (D) incentivar o leitor a fazer caminhadas.
- (E) informar sobre métodos terapêuticos.

**13**

Leia o texto a seguir.

*“A caminhada regular fortalece o músculo do coração, melhora a circulação do sangue e contribui para a redução da pressão arterial. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente no transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que diminui a sobrecarga sobre todo o sistema cardiovascular.*

*Pessoas que caminham diariamente apresentam menor risco de infarto, derrame e outras complicações relacionadas ao coração. Esse benefício aparece mesmo em caminhadas de intensidade leve a moderada, sem necessidade de correr ou fazer os exercícios de alto impacto.”*

Anhanguera Pós-Graduação, 15/4/2026.

Assinale a opção em que o termo precedido da preposição **de** mostra função diferente das demais.

- (A) o músculo **do** coração.
- (B) a circulação **do** sangue.
- (C) a redução **da** pressão arterial.
- (D) em caminhadas **de** intensidade leve.
- (E) os exercícios **de** alto impacto.

**14**

*“A imagem da dor no peito como único sinal de um problema cardíaco está ultrapassada. Muitas doenças do coração evoluem de forma silenciosa, sem causar desconforto intenso no tórax, e começam com manifestações discretas que costumam ser atribuídas ao cansaço do dia a dia.*

*O cansaço ao subir escadas, a falta de ar leve durante atividades simples e o inchaço nos pés estão entre os primeiros alertas e merecem atenção antes que o quadro evolua.”*

O termo “cardíaco” é um adjetivo culto relacionado a “coração”. Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo culto está corretamente relacionado a um substantivo anterior.

- (A) Os meninos traziam marcas na testa; essas marcas cervicais podem ser sinais de maus-tratos.
- (B) Os cabelos fazem parte de nossa apresentação social; por isso os cuidados capilares nunca são exagerados.
- (C) Dores nos rins devem ser imediatamente analisadas; os incômodos hepáticos são sinais de moléstias graves.
- (D) A cera nos ouvidos impede uma perfeita audição; esse cuidado óptico deve fazer parte de nossas preocupações.
- (E) O cuidado com os dentes deve nos acompanhar todos os dias; a preocupação oftalmológica deve ser ensinada desde a infância.

**15**

Assinale a opção que apresenta a frase que deve ser incluída entre os textos argumentativos por apresentar a defesa de uma ideia com argumentos.

- (A) Beber água é fundamental; beber álcool não é fundamental.
- (B) Devemos sempre nos preocupar com nossa visão, assim como com nossa audição.
- (C) Devemos cuidar de nossa saúde, pois uma vida longa traz regularmente mais benefícios.
- (D) A pressão arterial é uma preocupação dos idosos, enquanto a anemia é uma preocupação de todos.
- (E) As atividades físicas devem ser praticadas diariamente, mesmo que sejam caminhadas de pequena extensão.

## Atualidades

16

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador utilizado para medir a atividade econômica de um país em determinado período. No seu cálculo, consideram-se apenas os bens e serviços finais produzidos, o que evita a dupla contagem de etapas intermediárias da produção. Além disso, o PIB é um indicador de fluxo, e não de estoque, refletindo apenas a produção realizada em um intervalo de tempo específico.

Considerando essa definição, assinale a opção correta.

- (A) O PIB representa toda a riqueza acumulada por um país ao longo de sua história, incluindo bens produzidos em anos anteriores e ativos já existentes na economia.
- (B) Para evitar dupla contagem, o cálculo do PIB considera, simultaneamente, os valores dos bens intermediários e dos bens finais produzidos em cada cadeia produtiva.
- (C) Se um país produzir R\$ 100 de trigo, R\$ 200 de farinha e R\$ 300 de pão, o valor agregado ao PIB será de R\$ 600, correspondente à soma de todos os bens produzidos.
- (D) O PIB mede o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos em determinado período, sendo calculado com base nos preços pagos pelo consumidor final, inclusive com a incidência dos impostos sobre os produtos.
- (E) Ainda que um país não produza novos bens ou serviços durante um ano, seu PIB continuará refletindo a riqueza já acumulada na economia.

17

No contexto das mudanças climáticas, o conceito de injustiça climática refere-se à situação em que os impactos ambientais atingem de forma mais intensa as populações socialmente vulneráveis.

Assinale a opção que exemplifica corretamente esse conceito.

- (A) Uma pesquisa mostra que moradores de diferentes bairros apresentaram os mesmos índices de internação durante uma onda de calor.
- (B) Uma pessoa sofreu insolação durante uma onda de calor por não ter se hidratado adequadamente.
- (C) Um levantamento mostra que moradores de favelas, devido à pouca arborização e à infraestrutura precária, sofrem mais com ondas de calor e enchentes do que moradores de áreas mais favorecidas.
- (D) Uma prefeitura identifica ilhas de calor no centro da cidade e propõe arborização, tratando o fenômeno como problema de desenho urbano e ligado à questão do bem-estar.
- (E) Um estudo associa o calor extremo ao aumento de mortalidade e recomenda a ampliação do atendimento hospitalar como principal resposta.

18

Em maio de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório sobre determinantes sociais da equidade em saúde. Esses determinantes sociais dizem respeito às condições sociais, econômicas e ambientais que influenciam a saúde das populações. Considerando essa relação, assinale a afirmativa correta.

- (A) A expansão da proteção social tende a ampliar as desigualdades em saúde ao reduzir os incentivos ao trabalho nas populações vulneráveis.
- (B) As desigualdades em saúde entre países refletem sobretudo diferenças nos sistemas de saúde, sendo superadas à medida que a cobertura é ampliada.
- (C) O crescimento econômico, ao elevar a renda média dos países, tende a reduzir automaticamente as desigualdades em saúde entre os grupos sociais.
- (D) As desigualdades em saúde decorrem principalmente de diferenças genéticas entre as populações, sendo os fatores sociais de influência secundária.
- (E) A desvantagem social está diretamente associada à piora dos indicadores de saúde, padrão observado tanto em países ricos quanto em países pobres.

19

A economia brasileira ocupa uma posição relevante no cenário mundial devido ao fato de combinar um grande mercado consumidor, a abundância de recursos naturais e uma forte participação no comércio internacional de *commodities*. Em 2025, o país seguiu como parceiro comercial importante para diferentes regiões do mundo.

Com relação ao ano de 2025, assinale a opção correta.

- (A) A Argentina se mantém como principal destino das exportações brasileiras, enquanto os automóveis lideram a pauta exportadora nacional.
- (B) A União Europeia ocupa atualmente a posição de principal parceira comercial do Brasil, com destaque para as exportações de café.
- (C) Os Estados Unidos consolidaram-se como principal parceiro comercial do Brasil, impulsionados pelas importações de produtos industrializados brasileiros.
- (D) A pauta exportadora brasileira foi liderada principalmente por produtos industriais de alto valor agregado, destinados ao mercado europeu.
- (E) O petróleo bruto lidera a pauta exportadora brasileira, seguido pela soja e pelo minério de ferro, tendo a China como principal destino.

20

Um estudo sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) estimou que os gastos necessários para manter e ampliar os serviços de saúde pública deverão crescer, em média, 3,9% ao ano. No mesmo período, as regras fiscais federais limitam o crescimento das despesas públicas a 2,5% ao ano.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) as regras fiscais federais permitem crescimento superior ao necessário para financiar o SUS.
- (B) as despesas públicas com saúde permanecerão abaixo dos limites fiscais previstos.
- (C) os custos necessários para manutenção do SUS tendem a diminuir gradualmente ao longo do tempo.
- (D) os gastos estimados para o SUS superam o limite fiscal, indicando pressão estrutural sobre seu financiamento.
- (E) o financiamento da saúde pública deixará de enfrentar restrições orçamentárias.

**21**

A dengue tem representado um importante desafio para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em períodos de temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, condições que favorecem a proliferação do *Aedes aegypti*.

Com relação às medidas a serem adotadas no enfrentamento da dengue, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução dos casos de dengue ocorre principalmente por isolamento dos pacientes, já que a transmissão se dá pelo contato direto entre pessoas.
- (B) O enfrentamento da dengue articula ações da Secretaria Estadual com os municípios, incluindo capacitação de agentes e implantação de centros de hidratação.
- (C) A vacina contra dengue é indicada para toda a população, independentemente da faixa etária, sendo a principal medida preventiva adotada pelo Estado.
- (D) O enfrentamento da dengue deve priorizar a assistência hospitalar, pois as ações ambientais têm efeito limitado durante períodos de maior transmissão.
- (E) A eliminação de criadouros nas residências tem impacto limitado, pois a maioria dos focos do *Aedes aegypti* se encontra em espaços públicos.

**22**

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nos últimos anos, a pobreza recuou expressivamente no Brasil, enquanto a desigualdade de renda permaneceu entre as mais elevadas do mundo.

A pobreza diz respeito à insuficiência de renda para suprir necessidades básicas, enquanto a desigualdade se refere à forma como a renda se distribui relativamente entre os diferentes grupos sociais.

Considerando a relação entre pobreza e desigualdade, assinale a afirmativa correta.

- (A) A redução da pobreza leva à diminuição da desigualdade no médio prazo, pois o crescimento econômico beneficia progressivamente todos os grupos.
- (B) A pobreza e a desigualdade são fenômenos distintos, que podem evoluir em direções diferentes dentro de uma mesma sociedade, como demonstra o caso brasileiro.
- (C) A queda da pobreza indica que os rendimentos estão crescendo de forma mais equitativa entre os diferentes grupos sociais da população.
- (D) A desigualdade de renda é consequência direta da pobreza, de modo que combater uma equivale a combater a outra no contexto brasileiro.
- (E) A redução da pobreza é condição suficiente para a redução da desigualdade, desde que os programas sociais alcancem os mais vulneráveis da população.

**23**

O município de Macaé é reconhecido como a capital brasileira do petróleo, tendo seu desenvolvimento econômico historicamente vinculado à exploração da Bacia de Campos e aos repasses de *royalties*. O problema apontado por especialistas é que os *royalties* dependem da exploração de um recurso natural não renovável e que está sujeito às oscilações do mercado internacional.

Com relação a esse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A Bacia de Campos assegura décadas de produção petrolífera, tornando a diversificação econômica uma preocupação desnecessária no planejamento municipal.
- (B) O processamento de gás natural substitui progressivamente o petróleo como base econômica do Município, assegurando receitas equivalentes aos *royalties* no futuro.
- (C) A dependência dos *royalties* expõe o Município a riscos fiscais de longo prazo, justificando investimentos em turismo, agronegócio e atração de novas indústrias.
- (D) O crescimento da produção do pré-sal tende a ampliar os repasses de *royalties* a Macaé, reduzindo a necessidade de se investir na diversificação econômica.
- (E) A diversificação econômica do Município já está consolidada, com pesca, pecuária e comércio compensando eventual redução dos repasses de *royalties* petrolíferos.

**24**

A saúde pública no Estado do Rio de Janeiro enfrenta desafios históricos e estruturais, destacados pela **baixa cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS)**, severas desigualdades regionais e sobrecarga na média e alta complexidade, agravadas por limitações no repasse de verbas federais.

A respeito dos desafios da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) A baixa cobertura da APS no Estado do Rio de Janeiro, contribui para a sobrecarga das emergências hospitalares, especialmente em áreas metropolitanas e na Baixada Fluminense.
- ( ) A concentração de leitos de UTI, especialistas e recursos de saúde na capital faz com que diversos municípios do interior dependam da regulação para acessar procedimentos de maior complexidade.
- ( ) O sistema estadual de regulação tem reduzido significativamente os tempos de espera para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, eliminando grande parte das desigualdades de acesso entre as regiões.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

**25**

A conquista de uma maior expectativa de vida para a sociedade altera a ocorrência populacional das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs).

Com relação ao tema, analise os itens a seguir.

- I. O envelhecimento aumenta a ocorrência de DCNTs na população, dado que essas doenças são as principais causas de morte e incapacidade entre os idosos.
- II. O envelhecimento populacional reduz a prevalência de DCNTs, pois os idosos tendem a adotar hábitos de vida mais saudáveis do que os adultos jovens.
- III. O envelhecimento populacional, ao lado do sedentarismo e da obesidade, constitui um dos principais fatores para o aumento da ocorrência das DCNTs no Brasil.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

## Políticas de Saúde

**26**

No contexto da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde promoveu a transferência da gestão de dois hospitais federais para a administração de um Município.

Assinale a opção que indica o princípio a que essa medida está diretamente relacionada.

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Universalidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Descentralização.

**27**

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Secundária corresponde ao nível intermediário de cuidado, destinado a usuários que necessitam de intervenções clínicas mais específicas e direcionadas.

Nesse sentido, assinale a opção que indica um serviço compatível com esse nível de atenção.

- (A) Transplante.
- (B) Endoscopia.
- (C) Radioterapia.
- (D) Hemodiálise.
- (E) Hemodinâmica.

**28**

Um determinado Município elaborou um documento, com vigência de quatro anos, para a organização das ações e dos serviços de saúde. Ele definiu as diretrizes, os objetivos e as metas a serem atingidas e as articulações com o Plano Plurianual (PPA).

O documento descrito corresponde

- (A) ao Plano de Saúde.
- (B) ao Relatório Anual de Gestão.
- (C) à Programação Anual de Saúde.
- (D) à Pactuação Integrada de Saúde.
- (E) ao Plano Diretor de Regionalização.

**29**

Com base nas disposições sobre o acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, previstas na Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) Toda mulher tem o direito de ser acompanhada por pessoa maior de idade durante a realização de consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas.
- ( ) Em caso de atendimento com sedação, a eventual renúncia da paciente ao direito de acompanhante deve ser feita por escrito, após o esclarecimento dos seus direitos, com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
- ( ) No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

**30**

Acerca dos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em situações de transferências ou remoção para realização de exames externos, deve haver pactuação formal prévia entre os estabelecimentos envolvidos.
- (B) O Serviço de Saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente, de acordo com as atividades desenvolvidas.
- (C) O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é obrigatório para os serviços públicos de saúde e facultativo para os serviços privados.
- (D) Em serviços de saúde com mais de 15 trabalhadores, é obrigatória a instituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
- (E) Os protocolos assistenciais devem ser instituídos como instrumentos orientadores de boas práticas, devendo sua aplicação estar condicionada à avaliação específica.

**31**

Durante a assistência a um paciente adulto, internado na clínica médica de um hospital, o profissional de saúde cometeu um erro que ocasionou a incapacidade motora do paciente.

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, essa situação caracteriza a ocorrência de

- (A) *Near miss*.
- (B) Evento adverso.
- (C) Evento sentinela.
- (D) Quase incidente.
- (E) Incidente controlado.

**32**

Uma equipe de gestores de uma empresa pública de saúde criou um grupo de trabalho para discutir a implementação efetiva dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH). Um dos pontos discutidos foi a necessidade de integração entre gestores, trabalhadores e usuários para a tomada de decisão.

Assinale a opção que indica o pilar da PNH relacionado a esse ponto.

- (A) Ambiência.
- (B) Transversalidade.
- (C) Clínica ampliada.
- (D) Gestão compartilhada.
- (E) Valorização do trabalhador.

**33**

Com base na Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção que corresponde a uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde.

- (A) Coordenar os serviços de vigilância epidemiológica.
- (B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (C) Gerir os laboratórios públicos de saúde e os hemocentros.
- (D) Formular e implementar as políticas de saneamento básico.
- (E) Formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e de nutrição.

**34**

Com base nas disposições legais acerca dos direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O usuário tem direito a receber informações claras, completas e compreensíveis sobre seu estado de saúde, incluindo diagnóstico, prognóstico e alternativas de tratamento disponíveis.
- ( ) É dever do usuário colaborar com as equipes de saúde, fornecendo informações verdadeiras sobre seu estado de saúde e histórico, contribuindo para a qualidade do cuidado prestado.
- ( ) Deve ser garantido ao usuário o sigilo de suas informações de saúde, podendo o serviço compartilhá-las com familiares ou terceiros somente em caso de vínculo afetivo ou interesse no cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

**35**

Com base nas diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos representados.
- ( ) Os Conselhos de Saúde devem ser compostos por 50% de entidades e movimentos representativos de usuários e 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

## Normas Municipais

**36**

Dionísio, profissional da área de saúde, deseja atuar como membro do Conselho de Saúde do Município de Macaé, razão pela qual passou a analisar as normas constantes da Lei nº 3.233/2009 acerca da composição do mencionado Conselho.

Com base na referida Lei, assinale a opção que indica a correta conclusão a que Dionísio chegou.

- (A) O Secretário de Saúde é membro nato do Conselho de Saúde do Município de Macaé, de modo que, necessariamente, participa da eleição da Mesa Diretora.
- (B) O mandato inicial dos membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé é de 4 (quatro) anos, coincidente com o de Prefeito, admitindo-se a recondução por igual período.
- (C) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé terão o seu mandato extinto, caso falem, sem prévia justificação, a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas em um período de 12 (doze) meses.
- (D) O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal de Saúde do Município de Macaé será remunerado, de modo que há necessidade de compatibilidade de horário com o exercício da atividade de profissional da área de saúde.
- (E) Os membros do Conselho de Saúde do Município de Macaé serão indicados por seus respectivos segmentos, mas serão substituídos por outro segmento, na medida em que não há previsão de suplente para cada entidade participante.

**37**

Acerca da participação de instituições privadas nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, à luz dos dispositivos da respectiva Lei Orgânica relativos à saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) A participação de instituições privadas, tenham ou não fins lucrativos, nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, é absolutamente vedada, seja de forma primária ou de forma suplementar.
- (B) As instituições privadas, preferencialmente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, poderão participar de forma suplementar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, mediante convênio ou contrato.
- (C) Apenas instituições privadas filantrópicas e sem fins lucrativos poderão participar das ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé, as quais devem ser realizadas de forma complementar, por meio de contrato administrativo, sempre por meio de licitação.
- (D) As instituições privadas, independentemente de serem filantrópicas e sem fins lucrativos, poderão participar primariamente das ações de saúde do Município de Macaé, desde que formalizado o devido contrato administrativo, que não precisa ser precedido de licitação.
- (E) A participação de instituições privadas que tenham fins lucrativos nas ações de saúde desenvolvidas pelo Município de Macaé não é admitida, de modo que está proibida a formalização de convênios ou contratos com tais instituições em qualquer hipótese, incluindo situações de caso fortuito.

**38**

Patrícia, servidora estável do Município de Macaé, após anos de exercício regular, pela primeira vez, cometeu uma falta funcional, de modo que está preocupada com a aplicação da penalidade de demissão, após o devido processo administrativo disciplinar, razão pela qual passou a analisar quais condutas poderiam ensejar a referida penalidade, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 011/1998 e suas alterações).

Assinale a opção que indica a conduta que, sem reincidência, poderia ensejar a penalidade de demissão.

- (A) Proceder de forma escandalosa na repartição e manter uma conduta de incontinência pública.
- (B) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem a prévia autorização do chefe imediato.
- (C) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- (D) Promover manifestação de apreço ou despreço a qualquer título, inclusive de cunho político-partidário, no recinto da repartição.
- (E) Atribuir a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

**39**

A Lei Complementar nº 346/2025 dispõe sobre a reestruturação na Administração Pública do Município de Macaé. As normas constantes da Seção XIII delineiam os aspectos atinentes à Secretaria Municipal de Saúde.

À luz da mencionada disposição legal, é correto afirmar que o Serviço Municipal de Hemoterapia está vinculado à

- (A) Coordenadoria Especial de Odontologia.
- (B) Secretaria Executiva de Atenção Básica.
- (C) Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária.
- (D) Secretaria Executiva de Alta e Média Complexidade.
- (E) Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde.

**40**

Marcela, servidora estável, ocupante do cargo de médica do Município de Macaé, exerce atribuições perante a Junta Médica do Município.

No exercício de sua atividade profissional foi questionada sobre as peculiaridades da licença para tratamento de saúde, na forma do Regime Jurídico dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 11/98 e suas alterações).

Conforme o mencionado Diploma Legal, assinale a opção que indica, corretamente, a resposta dada por Marcela.

- (A) A remuneração dos servidores municipais estáveis em licença para tratamento de saúde será integralmente suportada pela Prefeitura do Município de Macaé, sem que haja necessidade de levar em conta o prazo deferido para tal finalidade.
- (B) O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 12 (doze) meses, salvo em casos considerados recuperáveis, nos quais, a critério da Junta Médica, tal benefício poderá ser excepcionalmente prorrogado pelo prazo de até 6 (seis) meses.
- (C) A licença para tratamento de saúde poderá cessar antes do final do prazo conferido, a requerimento do servidor que, julgando-se apto para o exercício das atividades, reassumirá o cargo imediatamente, independentemente da realização de inspeção médica, que não é exigida para tal fim.
- (D) O servidor licenciado para tratamento de saúde, se exercer, durante o período de licença, quaisquer atividades profissionais remuneradas, terá como interrompida a licença, com perda total da remuneração, a partir da data em que for verificada essa prática, até que reassuma o exercício do cargo.
- (E) O servidor que se encontrar em outro Município ou Estado da Federação não poderá realizar a inspeção médica para fins de licença para tratamento de saúde pelo respectivo médico oficial, devendo se locomover até a Junta Médica do Município de Macaé para tanto ou solicitar a efetivação à distância.

## Conhecimentos Específicos

### Clínica Geral

41

Com relação à evolução da pressão arterial sistêmica nas sociedades industrializadas, assinale a opção que indica o fenômeno hemodinâmico que é característico em indivíduos com idade superior a 60 anos.

- (A) Não há alterações no padrão de pressão arterial em pacientes de idade superior a 60 anos.
- (B) Queda progressiva da pressão arterial sistólica a partir da sexta década de vida, igualando-se aos níveis da diastólica.
- (C) Estabilização da pressão arterial sistólica e diastólica em patamares elevados, mantendo a pressão de pulso constante.
- (D) Aumento predominante da pressão arterial diastólica, resultando em um estreitamento significativo da pressão de pulso.
- (E) Aumento da amplitude da pressão de pulso devido ao decréscimo da pressão arterial diastólica, enquanto a sistólica continua a aumentar.

42

As *úlceras duodenais*, na maioria dos casos, ocorrem

- (A) igualmente por todo o duodeno.
- (B) na segunda porção do duodeno, próximo à Ampola de Vater.
- (C) na primeira porção do duodeno, localizadas a 3 cm do piloro.
- (D) na terceira porção do duodeno, distal ao ligamento de Treitz.
- (E) ao longo de toda a curvatura maior do bulbo duodenal, sem relação com o piloro.

43

Assinale a opção que apresenta a interpretação clínica correta de um paciente com Anti-HBs positivo isoladamente, na ausência de Anti-HBc e HBsAg.

- (A) Infecção ativa pelo vírus HBs.
- (B) Imunidade adquirida por meio de vacinação ativa.
- (C) Cura espontânea de uma infecção prévia por HBV.
- (D) Infecção crônica pelo vírus HBV com mutação de escape.
- (E) Falso-positivo resultante de reatividades cruzadas com o vírus da Hepatite A.

44

No que diz respeito às recomendações de atividade física para adultos (18 a 64 anos) visando à promoção da saúde e longevidade, assinale a opção que indica a orientação correta.

- (A) Focar apenas em exercícios aeróbicos, uma vez que o treinamento de força é indicado apenas para idosos com o objetivo de prevenir sarcopenia.
- (B) Praticar exclusivamente atividades de alta intensidade por 30 minutos diários, visto que atividades leves não trazem benefícios marginais para a saúde cardiovascular.
- (C) Substituir qualquer atividade moderada por treinos de resistência extrema, como maratonas, que comprovadamente zeram o risco de morte súbita cardíaca.
- (D) Realizar exercícios de baixo impacto exclusivamente, tais como caminhadas, pois exercícios mais vigorosos geram lesões osteomusculares além de não ocasionarem benefícios à saúde.
- (E) Realizar pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana, preferencialmente espalhados pelos dias, somados a exercícios de fortalecimento muscular em 2 ou mais dias.

45

Em relação ao manejo de uma encefalopatia hipertensiva, assinale a opção que indica, corretamente, a estratégia de redução da pressão arterial para evitar isquemia cerebral iatrogênica.

- (A) Reduzir a pressão arterial média em, no máximo, 25% nas primeiras horas, ou atingir uma faixa de 160/100–110 mmHg.
- (B) Reduzir a pressão arterial sistólica para níveis normais (< 120 mmHg) nos primeiros 15 minutos utilizando nifedipina sublingual.
- (C) Não procurar corrigir a hipertensão porque uma encefalopatia hipertensiva é sempre secundária a processos cerebrais.
- (D) Usar apenas agentes orais de longa ação, como o atenolol, para evitar quedas bruscas que ocorrem com medicações parenterais.
- (E) Manter a pressão arterial elevada (acima de 220/120 mmHg) por pelo menos 48 horas para garantir a perfusão tecidual.

46

A *hiperinsuflação pulmonar* é uma adaptação fisiopatológica na doença pulmonar obstrutiva crônica para preservar o fluxo expiratório máximo. No entanto, ela gera desvantagens mecânicas significativas para o diafragma.

Assinale a opção que apresenta, corretamente, um desses efeitos adversos.

- (A) A elevação da cúpula diafragmática causa uma compressão mecânica que resulta em menor força muscular.
- (B) O aumento da zona de aposição entre o diafragma e a parede abdominal facilita a expansão da caixa torácica.
- (C) O encurtamento das fibras musculares do diafragma achatado reduz sua capacidade de gerar pressão inspiratória eficaz.
- (D) O diafragma assume uma curvatura maior, exigindo menos tensão para produzir a pressão transpulmonar necessária para a respiração.
- (E) A caixa torácica é levada para abaixo de seu volume de repouso, facilitando os músculos inspiratórios através do recolhimento elástico.

47

Assinale a opção que indica o teste laboratorial mais importante para a avaliação da gravidade da necrose hepatocelular e do prognóstico na hepatite viral aguda.

- (A) Nível absoluto de Alanina Aminotransferase.
- (B) Título de anticorpos anti-músculo liso.
- (C) Concentração de Fosfatase Alcalina.
- (D) Tempo de Protrombina.
- (E) Título sérico de HBsAg.

48

Alterações eletrolíticas podem ser fatais e detectadas precocemente no ECG.

Assinale a opção que indica a sequência de alterações esperada na hipercalemia grave.

- (A) Inicia com alargamento de QRS, seguido de distúrbios de repolarização, inversão de ondas T seguido de fibrilação ventricular.
- (B) Inicia com o prolongamento do intervalo PR e o surgimento de ondas Delta, progredindo para taquicardia supraventricular persistente.
- (C) Inicia com encurtamento do intervalo QT e ondas U proeminentes, evoluindo para infradesnivelamento generalizado do segmento ST.
- (D) Inicia com inversão profunda de ondas T em derivações precordiais (V1-V4), evoluindo para supradesnivelamento ST simulando um infarto anterior.
- (E) Inicia com ondas T altas e pontiagudas (em tenda), seguido por distúrbios de condução AV, perda da onda P, alargamento do QRS e padrão sinusoidal.

49

Um paciente de 55 anos, sem antecedentes de doenças cardiovasculares, apresenta níveis pressóricos de 150/95 mmHg em consultas repetidas.

De acordo com as estratégias de prevenção e cuidados gerais com o paciente em medicina interna, o início do tratamento anti-hipertensivo para este paciente é classificado como prevenção

- (A) *primordial*, uma vez que o foco é evitar que o paciente desenvolva outros fatores de risco no futuro.
- (B) *primária*, pois visa reduzir o risco de um primeiro evento de doença (incidente) em um indivíduo que possui um fator de risco.
- (C) *secundária*, dado que o tratamento objetiva evitar a recorrência de complicações sistêmicas da hipertensão.
- (D) *terciária*, pois requer ação farmacológica imediata para evitar a morte iminente por crise hipertensiva.
- (E) *quaternária*, por se utilizar de medicamentos há muito estabelecidos nas diretrizes de tratamento.

50

A Doença de Parkinson é definida clinicamente por uma síndrome parkinsoniana.

Assinale a opção que apresenta as características cardinais da Doença de Parkinson associadas a uma acurácia diagnóstica superior a 90% na presença de assimetria motora e boa resposta à levodopa.

- (A) Tremor de repouso, rigidez e bradicinesia.
- (B) Coreia, demência de evolução crônica e ataxia.
- (C) Tremor essencial familiar, nistagmo e ataxia cerebelar.
- (D) Coreia, distonia focal e crises convulsivas generalizadas.
- (E) Instabilidade postural precoce, quedas frequentes e demência no primeiro ano.

## Médico Diarista Pediatra

51

Criança de 2 anos, sexo feminino, apresenta peso no percentil 75 e escore Z de +0,7 para peso/idade. Não há queixas, e o exame físico é normal, com desenvolvimento adequado para a idade.

Assinale a opção que interpreta, corretamente, os dados antropométricos.

- (A) O percentil 75 e o escore Z de +0,7 indicam apenas a posição do peso da criança em relação à média, sem considerar a dispersão ou variabilidade dos dados da população.
- (B) O percentil 75 indica que 75% do peso das crianças está abaixo desse valor, enquanto o escore Z de +0,7 afere que esse peso está 0,7 desvio padrão acima da média para idade e sexo.
- (C) O escore Z de +0,7 indica a proporção de crianças com peso abaixo ou acima dessa criança, enquanto o percentil 75 mede a distância do peso em relação à mediana em unidades de desvio padrão.
- (D) O percentil 75 indica a distância, em desvios padrão, que o peso da criança se encontra da média, enquanto o escore Z de +0,7 indicaria sua posição relativa em uma distribuição ordenada.
- (E) O percentil 75 e o escore Z de +0,7 representam exatamente a mesma medida, expressa apenas em escalas diferentes, sem diferença conceitual, considerando como ponto central a mediana.

52

Na definição preliminar de caso da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças (MIS-C), considerando os demais achados clínicos e laboratoriais, a febre deve ocorrer

- (A) há pelo menos três dias, com evidência de Covid-19, sendo mandatório acometimento cardíaco.
- (B) há menos de três dias, com necessidade de ocorrer coagulopatia, associada a sorologia positiva para Covid-19.
- (C) por, pelo menos, 24 horas, associada a um único sistema orgânico acometido e elevação de marcadores inflamatórios.
- (D) há três ou mais dias, associada a pelo menos dois dos critérios clínicos definidos e marcadores inflamatórios elevados, como a VHS.
- (E) associada obrigatoriamente a exantema, conjuntivite bilateral e sinais de inflamação mucocutânea, além de marcadores inflamatórios elevados.

53

Lactente de 18 meses apresenta episódio de crise convulsiva associada à febre (38,5°C), com duração de aproximadamente 20 minutos, seguida de recuperação completa. A mãe relata que a febre havia se iniciado cerca de 30 minutos antes do evento. A criança não possui atraso no desenvolvimento, porém há história familiar de epilepsia em um tio de primeiro grau.

Assinale a opção que indica, corretamente, o maior risco de epilepsia futura.

- (A) Recorrência em 24 horas.
- (B) História familiar de epilepsia.
- (C) Crises febris complexas focais.
- (D) Duração superior a 15 minutos.
- (E) Alterações no neurodesenvolvimento.

**54**

Lactente de 4 meses apresenta há 3 dias coriza, espirros e obstrução nasal, evoluindo com tosse, dificuldade respiratória e recusa alimentar.

Ao exame, observa-se taquipneia, uso de musculatura acessória e saturação de O<sub>2</sub> de 91% em ar ambiente. À ausculta, há sibilos difusos e estertores finos.

Quanto à conduta a ser assumida para o caso, assinale a afirmativa correta.

- (A) Suporte com oxigênio, hidratação e aspiração de vias aéreas superiores.
- (B) Iniciar ribavirina, antiviral específico para tratar vírus sincicial respiratório.
- (C) Iniciar antibioticoterapia empírica e solicitar radiografia de tórax de rotina.
- (D) Prescrever broncodilatadores e corticoide sistêmico como tratamento inicial.
- (E) Realizar fisioterapia respiratória intensiva sem necessidade de medicamentos.

**55**

Lactente, 50 dias, adotado, em uso de fórmula de partida, vem apresentando há uma semana recusa alimentar, episódios de irritabilidade com choro, inúmeras regurgitações ao dia e evacuações com fezes com raia de sangue na sua maioria, sem alteração na frequência e consistência. Mantém o ganho ponderal adequado e ótimo estado geral.

Baseado na principal hipótese diagnóstica, assinale a opção que indica a primeira escolha em relação à alimentação desse lactente.

- (A) Fórmula sem lactose e proteínas presentes no soro, intactas.
- (B) Fórmula sem lactose e com proteínas parcialmente hidrolisadas.
- (C) Fórmula com lactose e com proteínas extensamente hidrolisadas.
- (D) Fórmula sem lactose e com proteínas extensamente hidrolisadas.
- (E) Fórmula com lactose e com proteínas substituídas por aminoácidos.

**56**

Adolescente de 12 anos refere maior proximidade emocional com uma amiga da escola, com quem compartilha segredos e demonstra forte vínculo afetivo. Nega interesse sexual, mas relata curiosidade sobre as mudanças corporais recentes. Não apresenta queixas comportamentais ou sofrimento emocional.

Sobre essa fase do desenvolvimento da identidade sexual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fase autoerótica, descoberta do prazer relacionado ao próprio corpo.
- (B) Fase homoafetiva, onde há intimidade emocional com o mesmo sexo.
- (C) Fase de transição, com o surgimento de atração sexual pelo sexo oposto.
- (D) Fase de latência, caracterizada por ausência de interesse afetivo ou sexual.
- (E) Fase heterossexual, estabelecimento da identidade sexual no mundo interno.

**57**

Criança de 6 anos apresenta atraso ponderoestatural, faltas escolares recorrentes e vacinação incompleta. A família vive em extrema pobreza, com pais de baixa escolaridade e dificuldade de acesso aos serviços públicos.

Observa-se padrão semelhante de cuidado entre todos os membros da família, sem sinais de violência ou recusa deliberada de cuidados. Os responsáveis demonstram preocupação, porém baixa compreensão das orientações oferecidas.

Sobre o caso hipotético, assinale a afirmativa correta.

- (A) A presença de atraso ponderoestatural define a presença de violência física, independentemente do contexto familiar.
- (B) A notificação deve ser realizada apenas se houver confirmação de dano físico à criança, já que não existe intencionalidade.
- (C) A omissão do cuidar sociocultural obriga o pediatra a avaliar o contexto, propor a intervenção intersetorial e fazer uma notificação.
- (D) A situação hipotética caracteriza uma negligência intencional, devendo-se priorizar o afastamento imediato da criança do convívio familiar.
- (E) A ausência de intencionalidade exclui a necessidade de notificação, sendo suficiente a orientação familiar e o seguimento clínico.

**58**

Um pediatra, ao prescrever terapia medicamentosa complexa para um paciente oncológico em regime domiciliar, utilizou um plano terapêutico personalizado que integra pictogramas.

Considerando o âmbito da gestão de riscos e a segurança do paciente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Isentar a responsabilidade civil do prescritor perante eventuais eventos adversos, uma vez que a instrução visual padronizada possui fé pública.
- (B) Maximizar a biodisponibilidade dos quimioterápicos, assegurando que a precisão posológica elimine as flutuações terapêuticas indesejadas.
- (C) Eliminar a necessidade de verificação assistida (dupla checagem) no ambiente domiciliar, considerando o cuidador um agente autônomo e infalível.
- (D) Mitigar a variabilidade na interpretação de instruções posológicas complexas, atuando sobre os fatores humanos relacionados ao letramento em saúde.
- (E) Otimizar a farmacodinâmica das drogas prescritas, assegurando que o intervalo entre doses obedeça rigorosamente ao ritmo circadiano do paciente pediátrico.

59

Considerando o plano de cuidado e os processos de referência e contrarreferência para um lactente de 20 meses com diagnóstico de transtorno do espectro autista, que apresenta atrasos significativos em atenção compartilhada e comunicação recíproca, assinale a afirmativa correta.

- (A) O uso de sistemas de comunicação aumentativa deve ser restrito a pacientes sem prognóstico de linguagem verbal, visando evitar a inibição da aquisição da fala durante o período de escolarização.
- (B) A contrarreferência educacional deve focar no isolamento de estímulos rotineiros, substituindo o ensino estruturado por atividades puramente lúdicas para minimizar a severidade dos sintomas centrais.
- (C) A eficácia das intervenções comportamentais depende da alta fidelidade e intensidade, sendo prudente postergar o suporte educacional até que o paciente atinja estabilidade em ambiente clínico controlado.
- (D) O pediatra deve delegar o planejamento terapêutico exclusivamente à equipe especializada do CAPSi, limitando-se ao monitoramento farmacológico para controle de comorbidades e sintomas alvo.
- (E) A integração da rede deve priorizar modelos naturalistas e suportes visuais no ambiente escolar, dado que intervenções baseadas em habilidades fundamentais apresentam forte evidência de eficácia para esta faixa etária.

60

Lactente de 10 meses foi admitido com diarreia aguda e sinais de desidratação grave, sendo classificado inicialmente como Plano C e submetido à etapa rápida de reidratação venosa. Evolui com melhora do nível de consciência, pulso cheio, tempo de enchimento capilar de 2 segundos e diurese presente. Após reidratação, pesa 8 kg. Permanece com evacuações aquosas frequentes, sem aceitação adequada de líquidos por via oral.

Quanto à fase de manutenção/reposição, de acordo com o cartaz do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) 640 mL de soro glicosado a 5% + 16 mL de KCl a 10% em 24 horas.
- (B) 800 mL de soro glicosado a 5% + 16 mL de KCl a 10% em 24 horas.
- (C) 840 mL de soro glicosado a 5% + 12 mL de KCl a 10% em 24 horas.
- (D) 840 mL de soro glicosado a 5% + 16 mL de KCl a 10% em 24 horas.
- (E) 1040 mL de soro glicosado a 5% + 16 mL de KCl a 10% em 24 horas.

61

Sobre as características clínicas do exantema no sarampo e na rubéola, respectivamente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Descamação: lamelar; furfurácea.
- (B) Duração média: 10 a 14 dias; 7 a 10 dias.
- (C) Característica: urticariforme; morbiliforme.
- (D) Início: face e pescoço; próximo da linha do cabelo e retroauricular.
- (E) Desaparecimento: craniocaudal ao final da doença; segmentar durante a doença.

62

Sobre as medidas de controle em um escolar com diagnóstico de dermatite atópica, assinale a afirmativa correta.

- (A) A técnica de embeber e selar mostrou efetividade em diminuir o prurido, porém falha na diminuição do ressecamento da pele.
- (B) Sabonetes em barra são preferíveis aos líquidos por apresentarem pH mais ácido e maior preservação da barreira cutânea.
- (C) Os emolientes devem ser utilizados apenas durante as exacerbações, sendo menos eficazes na fase de manutenção da doença.
- (D) Banhos prolongados podem ser recomendados, ajudando a remover crostas e contaminantes bacterianos, desde que seguidos de hidratação adequada.
- (E) Os hidratantes devem ser utilizados em quantidades suficientes, em toda a pele diariamente, com aumento da frequência de aplicação nos meses de inverno.

63

Uma lactente saudável de 11 meses é levada à consulta de puericultura. Sua mãe relata que oferece suco natural de frutas diariamente.

Em relação ao uso de suco de frutas nessa idade, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fornece fibras importantes e melhora o trânsito intestinal, podendo substituir fruta *in natura*.
- (B) Deve ser oferecido sem adição de açúcar, desde que não interfira no apetite da criança.
- (C) Não é recomendado, pois o consumo excessivo se associa ao aumento do risco de excesso de peso.
- (D) Apresenta baixo valor nutricional, podendo ser usado para a manutenção da hidratação.
- (E) Se oferecido coado, melhora a digestibilidade, mantendo os valores nutricionais das frutas.

64

Escolar de 3 anos, previamente hígida, é levada à emergência por surgimento súbito de múltiplas petéquias e equimoses há 24 horas. Os responsáveis relatam quadro de infecção viral autolimitada há cerca de 2 semanas. Encontra-se em bom estado geral e o exame físico não apresenta outras alterações. Hemograma revela o número de plaquetas de 19.000, sem outras citopenias.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ausência de esplenomegalia ou linfadenopatia significativa no exame físico, sem outras citopenias, indica a possibilidade de acometimento crônico.
- (B) A presença de petéquias e equimoses associadas à plaquetopenia sugere doença infiltrativa medular, devendo ser realizado de imediato o mielograma.
- (C) A presença de equimoses com plaquetopenia como no caso dessa criança, chama atenção para o risco iminente da necessidade de transfusão de plaquetas.
- (D) A ausência de manifestações sistêmicas associadas à plaquetopenia isolada, juntamente com a história clínica, é compatível com acometimento autolimitado.
- (E) A presença de plaquetas tão reduzidas, independentemente de haver outras manifestações clínicas, sugere que, evolutivamente, o quadro deverá se agravar.

**65**

Durante uma consulta de puericultura, o pediatra encontrou uma maloclusão na dentição decídua de um escolar, chamada sobressaliência acentuada.

Assinale a opção que define corretamente essa alteração.

- (A) Observa-se um transpasse vertical excessivo (maior que 3 mm).
- (B) Ocorre uma alteração anteroposterior entre maxila e mandíbula.
- (C) Existe aumento do transpasse horizontal entre incisivos superiores e inferiores.
- (D) Há uma alteração transversal da maxila em um ou em vários elementos dentários.
- (E) Inexiste o transpasse vertical, não havendo contato entre os dentes superiores e inferiores.

**66**

Adolescente masculino de 14 anos foi levado à consulta por baixa estatura em relação aos colegas e ausência de sinais de puberdade. Ele apresenta histórico de crescimento mais lento desde a infância, com velocidade de crescimento atual adequada para a idade óssea. O pai refere que apresentou desenvolvimento puberal tardio. Ao exame, testículos com volume pré-puberal.

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ausência de puberdade aos 14 anos confirma a presença de hipogonadismo hipogonadotrófico.
- (B) Pode-se antecipar que esse paciente não atingirá uma estatura final compatível com o alvo genético.
- (C) A velocidade de crescimento reduzida na adolescência afasta o diagnóstico de retardo constitucional.
- (D) Testículos pré-puberais e idade óssea atrasada indicam comprometimento irreversível da estatura final.
- (E) A principal hipótese diagnóstica se relaciona a um atraso na reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal.

**67**

Uma lactente de 3 meses e 10 dias, é levado à emergência apresentando febre iniciada há dois dias sem outros sintomas ou queixas. Dentre os exames laboratoriais há presença de piúria e nitrito na urina.

Em relação à conduta a ser seguida, assinale a afirmativa correta.

- (A) Iniciar tratamento ambulatorial com sulfametoxazol-trimetoprim por via oral, considerando, faixa etária, o bom estado geral e o espectro adequado.
- (B) Optar por tratamento ambulatorial com fluoroquinolona por via oral, pois nessa idade, apesar do risco, há maior possibilidade de infecções por *P. aeruginosa*.
- (C) Internar e prescrever antibioticoterapia endovenosa com ampicilina juntamente com gentamicina, considerando a faixa etária e o risco nessa idade.
- (D) Postergar o início do antibiótico até confirmação por urocultura, uma vez que o quadro clínico nesse momento não apresenta sinais de gravidade.
- (E) Prescrever inicialmente uma cefalosporina de terceira geração, endovenosa, por oferecer melhor cobertura contra os germes nessa idade.

**68**

Puérpera no quinto dia pós-parto comparece à Unidade Básica de Saúde queixando-se de mamas endurecidas, dolorosas e edemaciadas bilateralmente. Relata febre não aferida e dificuldade do recém-nascido em abocanhar a região areolar, que se apresenta tensa e sem drenagem espontânea de leite.

Sobre o caso acima, assinale a opção que indica, corretamente, a conduta a ser adotada.

- (A) Recomendar o uso de compressas quentes mais demoradas e diminuição temporária da frequência das mamadas.
- (B) Orientar a aplicação de compressas frias por até 15 minutos e prescrever analgésico, de preferência o ibuprofeno.
- (C) Prescrever antibioticoterapia preventiva de amplo espectro orientando uso de compressas mornas várias vezes ao dia.
- (D) Usar analgésico regularmente, como o paracetamol, e evitar a ordenha manual da aréola ingurgitada antes das mamadas.
- (E) Indicar o uso de bicos de silicone para proteger o mamilo que, facilitando a mamada, provoca maior esvaziamento da mama.

**69**

Sobre o uso dos dispositivos inalatórios no tratamento da asma, assinale a afirmativa correta.

- (A) Crianças menores de 5 anos devem utilizar aerossóis de pó seco sem necessidade de adaptações.
- (B) O uso de espaçador com máscara facial é mais vantajoso do que o de peça bucal, em qualquer faixa etária.
- (C) A administração do aerossol durante o choro pode melhorar a deposição pulmonar do medicamento.
- (D) A lavagem do espaçador com detergente doméstico reduz a carga eletrostática e melhora a deposição pulmonar.
- (E) Os nebulizadores ultrassônicos são preferíveis por garantirem maior deposição pulmonar e controle da dose administrada.

**70**

Uma criança de 12 meses, com histórico vacinal incompleto e registros inconsistentes, recebeu a primeira dose da vacina tríplice viral e, 14 dias depois, foi novamente vacinada em outra unidade por erro de registro. Dois meses antes, também havia recebido duas doses da vacina hepatite B com intervalo de apenas 15 dias entre elas.

Considerando a última dose de cada uma das vacinas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A segunda dose da tríplice viral deve ser repetida; respeitar o intervalo mínimo de pelo menos quatro semanas, sendo a dose de hepatite B válida.
- (B) Tanto a segunda dose da tríplice viral quanto a segunda dose da hepatite B são válidas, não sendo necessária nenhuma revacinação.
- (C) As segundas doses da tríplice viral e da hepatite B devem ser consideradas inválidas e repetidas depois de, pelo menos, quatro semanas.
- (D) A segunda dose da tríplice viral é válida; a dose da hepatite B deve ser repetida, respeitando o intervalo mínimo de pelo menos quatro semanas.
- (E) A segunda dose da tríplice viral deve ser repetida, pois o intervalo foi inferior a quatro semanas; já a da hepatite B não, pois respeitou o intervalo mínimo de 15 dias.

**71**

Uma criança de 6 anos foi levada à Unidade de Pronto Atendimento após uma queda de bicicleta com impacto direto na cabeça, há cerca de 1 hora. Apresentou um episódio de vômito e breve relato de sonolência logo após o trauma, mas encontra-se desperta, orientada, com o restante do exame físico no momento normal.

Em relação à conduta a ser adotada, assinale a afirmativa correta.

- (A) Liberar alta, pois o exame físico está normal no momento.
- (B) Observar e considerar tomografia de crânio conforme a evolução clínica.
- (C) Solicitar tomografia de crânio por ter a criança apresentado episódio de vômito.
- (D) Realizar tomografia de crânio pois a criança apresentou sonolência pós-trauma.
- (E) Indicar tomografia e internação exclusivamente pelo risco do fenômeno *talk and die*.

**72**

Um adolescente de 15 anos compareceu à consulta de rotina acompanhado da mãe.

Durante a anamnese, a responsável relata preocupação com o aumento do contato do filho com colegas que utilizam cigarro eletrônico e maconha em festas. O paciente mostra-se retraído e evita responder diretamente quando o assunto é abordado na frente da mãe.

Em relação à abordagem preventiva do uso de tabaco e outras drogas, assinale a afirmativa correta.

- (A) Realizar aconselhamento breve com o adolescente e a mãe presentes, abordando riscos das drogas e registrando a conversa no prontuário, retomando o tema em consultas futuras.
- (B) Uma palestra única sobre prevenção do uso de drogas envolvendo os pais e o adolescente e encerrando o tema, evita repetição cansativa para o adolescente e o desgaste familiar.
- (C) Dispensar a presença dos pais durante a introdução do tema inicial para garantir que o adolescente se sinta à vontade para conversar abertamente sobre o uso de tabaco ou de álcool.
- (D) Orientar apenas a responsável, evitando abordar o tema com o adolescente, para não gerar resistência ou quebra de vínculo nesse momento, deixando essa abordagem para consulta futura.
- (E) Perguntar diretamente ao adolescente, na presença da mãe, se ele faz uso de cigarro, álcool ou outras drogas, buscando uma resposta objetiva e demonstrando estar aberto a conversar sobre esse tema.

**73**

Um lactente de 10 meses foi levado à emergência com história de perdas gastrointestinais volumosas.

Ao exame, apresenta-se irritável, com tempo de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos periféricos filiformes, pressão arterial sistólica dentro dos limites da normalidade, extremidades frias e livedo reticular em membros inferiores.

Sobre o caso apresentado, assinale a opção que apresenta, corretamente, o diagnóstico provável e a conduta a ser seguida.

- (A) Choque distributivo; a prioridade reside na estabilização da resistência vascular sistêmica com vasopressores precoces.
- (B) Choque hipovolêmico compensado; deve-se instituir expansão volêmica imediata com cristaloides isotônicos.
- (C) Choque cardiogênico secundário à desidratação grave; monitorização invasiva da pressão venosa central antes de qualquer oferta hídrica.
- (D) Choque descompensado; a ausência de hipotensão arterial é o critério definidor para o início de expansão com solução hipotônica.
- (E) Choque obstrutivo por depleção severa; a conduta imediata consiste na oferta de oxigênio sob alto fluxo e restrição hídrica até a estabilização da pré-carga.

**74**

Recém-nascido a termo, 18 dias de vida, apresenta icterícia persistente, sonolência excessiva e dificuldade para mamar. Ao exame, observa-se hipotonia, macroglossia, hérnia umbilical e fontanelas amplas, além de pele fria e seca. Frequência cardíaca de 90 bpm. A triagem neonatal não mostrou alterações.

Nesse caso, o hipotireoidismo congênito é

- (A) central, caracterizado por T4 baixo e TSH elevado.
- (B) primário, caracterizado por T4 baixo e TSH elevado.
- (C) central, caracterizado por T4 elevado e TSH elevado.
- (D) central, caracterizado por T4 baixo e TSH não elevado.
- (E) primário, caracterizado por T4 normal e TSH não elevado.

**75**

Sobre as indicações dos métodos de coleta de urina em crianças, assinale a afirmativa correta.

- (A) A coleta por saco coletor, trocado a cada 30 minutos, é o método de escolha devido à sua baixa taxa de contaminação.
- (B) A coleta por jato médio é o método preferencial em crianças com ou sem controle miccional, por sua menor invasividade.
- (C) A eliminação espontânea por estímulo suprapúbico é contraindicada em lactentes por baixa taxa de sucesso e dificuldade técnica.
- (D) O cateterismo vesical é indicado em casos de vulvovaginite ou balanopostite, por permitir coleta sem contaminação pela infecção da região.
- (E) A punção suprapúbica está indicada quando há suspeita de contaminação da amostra por condições locais, como dermatite perineal ou diarreia aguda.

**76**

Escolar de sete anos apresenta dor abdominal recorrente há cerca de quatro meses, com dois episódios por semana, que veio aumentando progressivamente a frequência, associado a períodos de evacuações dolorosas. Sua mãe refere fezes volumosas que ocasionalmente entopem o vaso sanitário, ocorrendo episódios semanais de restos de fezes na cueca.

Em relação aos sintomas apresentados por essa criança, com base nos Critérios de Roma IV, assinale a afirmativa correta.

- (A) A duração dos sintomas é superior ao mínimo exigido para o diagnóstico.
- (B) O número de episódios de incontinência deve ser superior a três semanais.
- (C) As evacuações dolorosas não constituem critério para esse diagnóstico.
- (D) A presença de massa palpável no reto é critério obrigatório para esse distúrbio.
- (E) O fato de entupir o sanitário é critério apenas se houver presença de hematoquezia.

**77**

Criança de 6 anos apresenta episódios diários de interrupção súbita da atividade, com olhar fixo e ausência de resposta por cerca de 10 segundos, com retorno imediato ao estado prévio. Os eventos ocorrem várias vezes ao dia e podem ser precipitados durante a consulta ao solicitar hiperventilação. Ao exame, observa-se mioclonia palpebral com fechamento ocular.

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tremor palpebral sugere ser crise focal onde há comprometimento da consciência.
- (B) Casos como esse podem apresentar maior dificuldade no controle das crises com medicamentos.
- (C) Esse acometimento raramente cursa com aura, porém quando ocorre, o prognóstico é reservado.
- (D) O eletroencefalograma é normal, o que facilita o diagnóstico e afasta outros tipos de doenças.
- (E) A presença de múltiplos episódios diários se associam a níveis baixos de glicose no líquido.

**78**

Uma criança de 9 anos apresenta febre baixa, cefaleia, mal-estar e dor de garganta há sete dias, evoluindo progressivamente com rouquidão e tosse seca persistente, que piorou nos últimos dias.

Ao exame, encontra-se em bom estado geral, com discreta sibilância e ausculta pulmonar pouco exuberante, apesar de radiografia de tórax mostrar infiltrado pulmonar bilateral difuso.

Com base na principal hipótese diagnóstica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em lactentes e pré-escolares, essa doença é incomum e evolui de forma mais grave que em crianças maiores.
- (B) O uso de antibiótico adequado pode erradicar completamente o agente do trato respiratório e impedir recorrências.
- (C) Caso surjam coriza, vômitos e diarreia após a segunda semana de doença, esses achados reforçam o diagnóstico.
- (D) A leucocitose importante com desvio à esquerda costuma ser um achado laboratorial marcante nesse quadro.
- (E) Nesses casos, a VHS e a PCR costumam estar elevadas, apesar do hemograma frequentemente permanecer normal.

**79**

Uma criança de 8 anos foi levada para uma consulta devido a episódios recorrentes de dor abdominal intensa, mal localizada na região periumbilical, com duração de cerca de 2 horas, ocorrendo a cada 3 a 4 semanas há mais de 6 meses.

Durante as crises, interrompe as atividades escolares e apresenta náuseas, palidez e fotofobia. Entre os episódios, permanece assintomática e com exame físico normal.

Sobre o caso hipotético narrado, assinale a afirmativa correta.

- (A) Durante os episódios, o repouso e o sono costumam contribuir para a melhora dos sintomas.
- (B) Situações estressoras podem ser detectadas nesses casos, porém seu enfrentamento pouco interfere nas crises.
- (C) Mesmo nos casos mais brandos e com menor impacto das crises, a profilaxia deve ser sempre estabelecida.
- (D) Diferentemente de outros distúrbios com gatilhos bem definidos, as viagens não costumam se relacionar às crises.
- (E) Caracteristicamente, trata-se de um distúrbio da infância, com pouca relação com manifestações semelhantes na vida adulta.

**80**

Escolar de 10 anos apresenta episódios recorrentes de tosse e dispneia aos esforços. Espirometria mostra relação  $VEF_1/CVF$  reduzida para idade, com  $VEF_1$  dentro da normalidade. Após uso de broncodilatador inalatório, observou-se aumento do  $VEF_1$  em 14%.

Sobre o caso acima, assinale a afirmativa correta.

- (A) A ausência de redução do  $VEF_1$  afasta a limitação ao fluxo aéreo.
- (B) O exame é normal, pois o  $VEF_1$  está dentro da faixa esperada para a idade.
- (C) O aumento do  $VEF_1$  após broncodilatador indica reversibilidade da obstrução.
- (D) A relação  $VEF_1/CVF$  reduzida, na ausência de sintomas, não tem qualquer significado clínico.
- (E) A resposta ao broncodilatador só é positiva se houver o aumento do  $VEF_1$  e a normalização da relação  $VEF_1/CVF$ .





Realização

