

# DERMATOLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2027**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

### Consoada

Quando a Indesejada das gentes chegar  
(Não sei se dura ou caroável),  
talvez eu tenha medo.  
Talvez sorria, ou diga:  
— Alô, iniludível!  
O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
(A noite com os seus sortilégios.)  
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
A mesa posta,  
Com cada coisa em seu lugar.  
(BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
  - composição por justaposição.
  - composição por aglutinação.
  - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
  - o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
  - a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
  - o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.
- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
  - A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.
- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) "mas ainda não pudera cercar", é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) "passou logo o prado verde do Costa", é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) "cujo velho sonho era a formatura do filho", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) "que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto", é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

#### **Polícia encontra livro roubado de Borges**

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão "de Borges", assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como "Polícia encontra livro de Borges roubado", a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo "de Borges" relacionar-se semanticamente ao substantivo "livro", e não ao particípio "roubado".
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado "de Borges" pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio "roubado".

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam \_\_\_\_\_ limpas, as normas eram \_\_\_\_\_ claras para todos, e as atas seguem \_\_\_\_\_ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram \_\_\_\_\_ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

### Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

**Expressões**

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

**Frases**

- ( ) Conversamos \_\_\_\_\_ uma melhor solução para o problema.
- ( ) \_\_\_\_\_ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- ( ) Disseram \_\_\_\_\_ cem mil telespectadores.
- ( ) \_\_\_\_\_ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

### Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

#### Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

#### Processo de formação

- ( ) Hibridismo.
- ( ) Abreviação.
- ( ) Derivação imprópria.
- ( ) Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.



30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- a) O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- b) No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- c) No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- d) O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** A psoríase é uma doença inflamatória crônica, multifatorial e imunomediada, cujo curso pode ser influenciado por fatores ambientais, infecciosos, farmacológicos e emocionais. O manejo adequado inclui a identificação e eliminação desses fatores agravantes sempre que possível. Sobre os fatores desencadeantes ou agravantes da psoríase, assinale a alternativa **incorreta**.
- Infecções estreptocócicas podem precipitar surtos de psoríase guttata, especialmente em crianças e adolescentes.
  - O uso de betabloqueadores, lítio e antimaláricos está associado à piora ou surgimento de lesões psoriáticas.
  - O estresse psicológico não apresenta relação comprovada com a exacerbação da psoríase em estudos clínicos controlados.
  - A retirada abrupta de corticosteroides sistêmicos pode induzir erupções pustulosas graves em pacientes predispostos.
- 32)** A erupção fixa por drogas (*Fixed Drug Eruption – FDE*) é uma reação adversa cutânea caracterizada por lesões eritematosas bem delimitadas, que reaparecem nos mesmos locais após reexposição ao fármaco desencadeante. Embora seu curso clínico geralmente seja benigno, variantes como a forma bolhosa generalizada podem simular quadros graves como a necrólise epidérmica tóxica (TEN), exigindo acurada diferenciação clínica e histopatológica. A respeito desta reação, analise as assertivas a seguir e informe (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
- As lesões de FDE surgem tipicamente dentro de 24 horas na primeira exposição ao fármaco, e demoram mais nas recidivas subsequentes.
  - A FDE apresenta predileção por mucosas, lábios, face, mãos, pés e genitália, podendo deixar hiperpigmentação residual após a resolução.
  - A histopatologia da FDE revela infiltrado liquenoide com neutrófilos e eosinófilos, necrose de queratinócitos e, em casos graves, necrose epidérmica indistinguível da observada na TEN.
  - A forma bolhosa generalizada de FDE acomete mais comumente pacientes idosos e deve ser diferenciada da TEN pela distribuição assimétrica e pela presença de áreas poupadas.
- (V); (F); (V); (F).
  - (F); (V); (F); (V).
  - (V); (F); (F); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
- 33)** O líquen plano é uma dermatose inflamatória mediada por linfócitos T, com destruição da camada basal da epiderme. Pode se apresentar em múltiplas variantes clínicas e ter etiologia idiopática ou induzida por fármacos. A histologia demonstra infiltrado inflamatório em faixa e apoptose de queratinócitos basais. O envolvimento mucoso, ungueal e piloso é frequente, e certas formas podem evoluir de maneira crônica e recalcitrante. Assinale a alternativa correta sobre os aspectos clínicos, histológicos e etiopatogênicos do líquen plano e suas variantes.
- No líquen plano induzido por drogas, a histologia sempre difere da forma idiopática, com ausência de apoptose de queratinócitos e infiltrado predominantemente neutrofílico.
  - O líquen planopilar é caracterizado pela inflamação dirigida ao infundíbulo e istmo folicular, podendo levar à alopecia cicatricial permanente.
  - O líquen plano oral geralmente apresenta remissão espontânea em poucos meses e não se associa a dor ou erosões significativas.
  - O líquen plano inverso ou invertido é a forma clínica que acomete áreas de extensão, poupando as dobras cutâneas e a mucosa genital.
- 34)** O pênfigo é um grupo de doenças bolhosas autoimunes caracterizadas pela perda da adesão entre queratinócitos e formação de bolhas intraepidérmicas, mediada por autoanticorpos contra componentes dos desmossomos. Considerando sua fisiopatologia, variantes clínicas e tratamento, assinale a alternativa **incorreta**.
- A formação das bolhas ocorre devido à ação de autoanticorpos IgG que inibem a função das desmogleínas, resultando na perda da adesão célula a célula entre os queratinócitos.
  - Na forma mucocutânea do pênfigo vulgar, há presença de autoanticorpos contra Dsg1 e Dsg3, explicando o acometimento simultâneo de pele e mucosas, conforme a teoria da compensação das desmogleínas.
  - A presença de autoanticorpos IgA, sem envolvimento de IgG, caracteriza o pênfigo IgA, que apresenta duas variantes principais: tipo intraepidérmico neutrofílico e tipo pustulose subcórnea.
  - No pênfigo foliáceo, o acometimento das mucosas é frequente, uma vez que o Dsg1 é expresso em maior concentração na camada basal das mucosas, enquanto o Dsg3 é restrito às camadas superficiais da epiderme.

- 35) O melanoma é um tumor maligno originado dos melanócitos, cuja ocorrência está associada a fatores genéticos, fenotípicos e ambientais. O reconhecimento dos fatores de risco é fundamental tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico precoce, permitindo melhor direcionamento de campanhas de saúde pública e vigilância clínica individualizada. Com base nos fatores genéticos relacionados ao risco de desenvolvimento do melanoma, informe (V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) Aproximadamente 5% a 10% dos melanomas ocorrem em indivíduos com história familiar da doença, podendo estar associados a mutações germinativas em genes de alta penetrância, como o CDKN2A.
  - ( ) O gene CDKN2A codifica as proteínas p16 e p14ARF, que atuam respectivamente nos mecanismos de controle dos sistemas Rb e p53, estando suas mutações presentes em até 70% dos casos de melanoma esporádico.
  - ( ) Variantes germinativas do gene MC1R aumentam o risco de melanoma independentemente do fototipo, estando também associadas a uma maior frequência de melanomas com mutação no gene BRAF.
  - ( ) Genes como CDK4, BAP1, TERT e POT1 podem estar envolvidos em síndromes genéticas nas quais o melanoma é considerado uma neoplasia-sentinela, associada a risco elevado de outros tumores internos.
- a) (F); (V); (F); (V).  
b) (V); (F); (F); (F).  
c) (V); (F); (F); (V).  
d) (V); (F); (V); (V).

- 36) Paciente masculino, 42 anos, residente em área endêmica, apresenta lesões eritematosas mal definidas e simétricas em face, nádegas e extremidades, além de infiltração dos lobos auriculares e madarose. Relata dormência em mãos e pés. Ao exame, observa-se espessamento dos nervos ulnar e fibular e perda de sensibilidade térmica em regiões distais. O exame de baciloscopia cutânea revelou numerosos bacilos álcool-ácido resistentes. Com base no quadro clínico e nas informações sobre a Doença de Hansen, analise as afirmativas.
- I. A forma lepromatosa da Hanseníase é caracterizada por resposta imune predominantemente Th2, com grande número de bacilos na derme.
  - II. A forma tuberculoide apresenta resposta celular Th1 predominante, com muitos bacilos e lesões bem delimitadas e anestésicas.
  - III. A forma borderline apresenta aspectos intermediários entre os polos tuberculoide e lepromatoso, podendo evoluir para qualquer um deles conforme a imunidade do paciente.
  - IV. O tratamento da forma multibacilar inclui dapsona e rifampicina, mas a clofazimina é utilizada apenas em casos de reação tipo 2.
  - V. A classificação operacional da OMS considera multibacilar quando há mais de cinco lesões cutâneas, presença de bacilos ou envolvimento neural.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I, II e V.  
b) III e IV.  
c) I, III e V.  
d) III, IV e V.

- 37) O lúpus eritematoso cutâneo compreende um espectro de manifestações clínicas e histológicas que podem se apresentar isoladamente ou associadas ao lúpus eritematoso sistêmico. Com base nas principais características clínicas, imunológicas e histopatológicas das variantes de lúpus cutâneo, analise as afirmativas a seguir.
- I. O lúpus cutâneo agudo (ACLE) caracteriza-se por lesões predominantemente epidérmicas, associadas frequentemente à doença sistêmica ativa, com eritema malar transitório e ausência de cicatriz residual.
  - II. O lúpus cutâneo subagudo (SCLE) está fortemente relacionado à positividade de anticorpos anti-SSA/Ro, sendo a maioria dos pacientes fotossensíveis, mas sem envolvimento renal ou neurológico.
  - III. O lúpus cutâneo discoide (DLE) acomete preferencialmente a epiderme e a derme superficial, sem atingir as estruturas anexiais, e raramente leva a cicatriz ou a alopecia cicatricial.
  - IV. O lúpus eritematoso túmido caracteriza-se por infiltrado inflamatório predominantemente dérmico, deposição de mucina e epiderme geralmente poupada, sem tendência a atrofia ou cicatriz.
  - V. O lúpus paniculite ou lúpus profundo envolve o tecido subcutâneo, podendo evoluir com lipoatrofia e áreas deprimidas permanentes.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I, II e IV.  
b) I, IV e V.  
c) II, III e IV.  
d) III, IV e V.

- 38) O parvovírus B19 é um DNA vírus com marcante tropismo por precursores eritroides, resultando em um espectro de manifestações clínicas que variam conforme a idade, estado imunológico e condições hematológicas prévias do hospedeiro. Além do quadro clássico de eritema infeccioso em crianças, adultos podem apresentar exantemas purpúricos, artrites intensas e, em grupos de risco, crises aplásticas e complicações fetais. O padrão temporal entre viremia, surgimento de anticorpos e aparecimento das manifestações clínicas é fundamental para o diagnóstico e interpretação dos testes laboratoriais. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.
- No eritema infeccioso, o exantema clássico coincide com o pico de viremia, justificando a alta transmissibilidade durante a fase de rash.
  - A síndrome papular-purpúrica de luvas e meias ocorre tipicamente após o desaparecimento da viremia, o que reduz de forma significativa o risco de transmissão viral durante essa manifestação.
  - A ausência do antígeno eritrocitário P (globosídeo) confere resistência natural ao parvovírus B19, impedindo a infecção mesmo em exposições de alta carga viral.
  - A artrite associada ao parvovírus B19 é mais comum em mulheres adultas, podendo ocorrer mesmo na ausência de exantema, e tende a ser autolimitada, embora possa persistir por meses.
- 39) Diversas síndromes genéticas cursam com risco aumentado de carcinoma basocelular (CBC) e/ou carcinoma espinocelular cutâneo (CEC). O entendimento das características clínicas, mutações envolvidas e padrões de herança destas condições é essencial para o diagnóstico precoce e estratificação de risco oncológico. Considerando isso, assinale a alternativa **incorreta**.
- Pacientes com albinismo oculocutâneo apresentam maior risco de CEC e melanoma cutâneo desde a juventude, e a adoção de fotoproteção rigorosa pode reduzir significativamente o surgimento tumoral, embora o risco de CEC metastático permaneça elevado em regiões de alta radiação UV.
  - Síndrome Bloom cursa com malformações craniofaciais, imunodeficiência severa e ausência de fotossensibilidade, sendo rara a associação com câncer cutâneo.
  - Indivíduos com Síndrome Bazex–Dupré–Christol apresentam múltiplos BCCs faciais desde a segunda década de vida, além de hipotricose, milia, folicular atrophoderma e herança frequentemente ligada ao X, decorrente de mutações em ACTRT1.
  - Síndrome KID está associada a mutações em genes de conexinas, manifestando-se com ceratoderma palmoplantar, eritroqueratodermia e risco aumentado de infecções cutâneas, além de predisposição a CEC mucocutâneo precoce.
- 40) Queratoacantomas (QAs) apresentam comportamento clínico peculiar e ainda possuem classificação nosológica controversa — alguns autores os consideram variantes de carcinoma espinocelular cutâneo (CEC), enquanto outros os classificam como tumores benignos de comportamento pseudomaligno. Sua evolução típica inclui crescimento rápido, morfologia crateriforme com tampão córneo, potencial de involução espontânea e cicatrização atrófica. Além das formas solitárias, existem apresentações múltiplas e sindrômicas, incluindo subtipos raros como *keratoacanthoma centrifugum marginatum* e variantes associadas a mutações genéticas ou imunossupressão. Com base nas características clínicas e variantes dos queratoacantomas (QAs), assinale a alternativa correta.
- O queratoacantoma marginado centrífugo apresenta crescimento inicial rápido, porém costuma regredir espontaneamente em poucas semanas, deixando mínima cicatriz.
  - A síndrome de Ferguson–Smith cursa com múltiplos QAs não regressivos, geralmente iniciando-se após a quinta década de vida e sem associação genética conhecida.
  - Os QAs múltiplos do tipo Grzybowski apresentam poucas lesões restritas ao tronco, evoluem lentamente e não estão associados a quadros eruptivos generalizados.
  - O queratoacantoma solitário é a forma mais comum, surge em áreas fotoexpostas, cresce rapidamente em semanas e pode regredir ao longo de meses, deixando cicatriz atrófica.
- 41) O SDRIFE (*Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema*), também conhecido como Síndrome do Babuíno, é uma reação cutânea bem delimitada que acomete regiões intertriginosas, particularmente a área anogenital. Sobre o SDRIFE, é correto afirmar:
- o SDRIFE caracteriza-se por erupção cutânea assimétrica e restrita ao tronco, frequentemente associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroides.
  - a erupção surge após a administração tópica de antibióticos, sendo a penicilina o agente mais relacionado à forma localizada da doença.
  - a reação é desencadeada por exposição sistêmica a medicamentos, especialmente  $\beta$ -lactâmicos como a amoxicilina, e apresenta como característica um eritema simétrico.
  - o SDRIFE ocorre tipicamente em pacientes submetidos à quimioterapia recente, distinguindo-se por eritema doloroso generalizado e presença de bolhas epidérmicas.

- 42) Os carcinomas basocelulares (CBC) apresentam subtipos clínico-patológicos distintos, cada um com características próprias de apresentação, comportamento e diagnóstico dermatoscópico. A correta diferenciação entre esses subtipos é fundamental para definição terapêutica e para a avaliação do risco de recorrência. Com base nesse tema, analise as afirmativas abaixo.
- I. O subtipo nodular apresenta vasos arboriformes bem focados à dermatoscopia e pode exibir estruturas em folha ou áreas em raios de roda, achados específicos que auxiliam na distinção deste subtipo de nevos melanocíticos amelanóticos.
  - II. O carcinoma basocelular superficial é mais comum em indivíduos jovens, tem padrão de crescimento predominantemente horizontal e pode apresentar áreas de regressão espontânea com atrofia e hipopigmentação.
  - III. Os padrões histológicos micronodulares, basoescamoso e mucinoso, embora possam ocorrer em qualquer subtipo de CBC, aparecem com maior frequência no subtipo superficial, especialmente em lesões do tronco.
  - IV. A ausência de rede pigmentar à dermatoscopia é um achado considerado sensível e relativamente específico para BCCs, sendo observada tanto em variantes pigmentadas quanto em amelanóticas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas:

- a) I e II.
  - b) II e IV.
  - c) I e III.
  - d) I, II e IV.
- 43) A psoríase é uma dermatose crônica, recidivante e imunomediada, cuja expressão clínica reflete a interação entre predisposição genética, resposta imune e fatores ambientais desencadeantes. O conhecimento dos mecanismos patogênicos é essencial para compreender as manifestações clínicas e orientar o tratamento. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- a) A deficiência de vitamina D3 é um fator etiológico direto na gênese da psoríase em indivíduos predispostos.
  - b) A psoríase resulta da ativação conjunta de componentes da imunidade inata e adaptativa, envolvendo células T, dendríticas e queratinócitos.
  - c) O uso de corticosteroides sistêmicos é considerado tratamento seguro e eficaz para o controle de formas extensas da doença.
  - d) A psoríase apresenta herança monogênica clássica e não depende de fatores ambientais para sua expressão clínica.
- 44) As púrpuras maculares incluem entidades que se originam de hemorragia simples, por extravasamento de hemácias com mínima inflamação, além de síndromes de hemorragia inflamatória e quadros de oclusão microvascular. Já as erupções purpúricas pigmentadas (capilarites) constituem um grupo de doenças benignas, recorrentes e sem manifestações sistêmicas, caracterizadas por inflamação mínima de vasos capilares da derme papilar e hemorragia puntiforme (petéquias), podendo simular trombocitopenia ou vasculite. Considerando a evolução clínica e histopatológica da púrpura macular e das erupções purpúricas pigmentadas, avalie as afirmativas abaixo.
- I. A evolução de uma lesão purpúrica por hemorragia simples envolve clareamento progressivo, podendo haver mudança de coloração para tons esverdeados, amarelados ou acastanhados, conforme a degradação da hemoglobina.
  - II. Nas lesões tardias de vasculite leucocitoclástica, é impossível que o quadro histológico simule microvasculopatia oclusiva, pois seus padrões evolutivos são completamente distintos.
  - III. As erupções purpúricas pigmentadas resultam de inflamação mínima em vasos da derme papilar, sem sintomas sistêmicos, sendo comum a investigação para descartar trombocitopenia ou vasculite.
  - IV. A púrpura anular telangiectásica de Majocchi é uma variante das dermatoses purpúricas crônicas, caracterizada por anéis telangiectásicos com pigmentação purpúrica periférica e centro variavelmente claro.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.

- 45) O método de Menzies é um sistema dermatoscópico que combina critérios negativos e positivos para diferenciar lesões melanocíticas benignas de melanoma. Sobre os critérios negativos do método de Menzies, assinale a alternativa correta.
- A simetria de padrão refere-se à necessidade de que a lesão apresente forma simétrica e distribuição homogênea do pigmento em todos os eixos.
  - A presença de uma única cor considera branco como cor válida, desde que apareça de forma difusa na superfície da lesão.
  - A simetria de padrão exige repetição do padrão dermatoscópico em todos os eixos a partir do centro, independentemente da simetria da forma.
  - A presença de uma única cor é definida pela presença predominante de até duas tonalidades melanocíticas, desde que não incluam azul ou cinza.
- 46) A dermatoscopia, ao permitir visualização de estruturas pigmentares e vasculares em nível submacroscópico, auxilia na detecção precoce de melanomas finos e na distinção de padrões associados ao comportamento tumoral. O véu azul-esbranquiçado é um dos achados com maior valor preditivo para melanoma, especialmente em lesões invasivas, pois reflete melanina densa na derme papilar associada à hiperqueratose ou acantose da epiderme. Com base na definição apresentada, assinale a alternativa correta.
- O véu azul-esbranquiçado deve ocupar toda a lesão para ser considerado válido e não deve apresentar área clínica elevada subjacente.
  - O véu azul-esbranquiçado consiste em pigmentação azul confluyente e irregular recoberta por aspecto esbranquiçado tipo vidro fosco, geralmente associado à área elevada.
  - O véu azul-esbranquiçado corresponde a áreas parcialmente azuladas, homogêneas, de limites bem definidos e geralmente não associadas a relevo.
  - O véu azul-esbranquiçado exige a presença obrigatória de pontos brancos estruturados que delimitam a área de vidro fosco da superfície.
- 47) Um paciente de 42 anos procura avaliação dermatológica devido ao histórico pessoal de dois melanomas invasivos diagnosticados nos últimos seis anos. Ele relata que sua mãe teve melanoma aos 55 anos e que um tio materno faleceu de carcinoma pancreático. Nenhum outro familiar apresenta histórico de câncer de pele. O paciente busca esclarecimento sobre a necessidade de testes genéticos. Com base nas recomendações atuais e nos critérios de seleção para investigação genética no melanoma familiar, assinale a alternativa correta.
- O teste genético é indicado apenas quando há três ou mais casos de melanoma em familiares de primeiro grau, independentemente da idade de início.
  - Como a maioria dos casos familiares está relacionada ao CDKN2A, a triagem genética isolada para esse gene é suficiente.
  - Este paciente preenche critérios para avaliação genética, e a identificação de mutações germinativas pode auxiliar na vigilância de outras neoplasias associadas, como carcinoma pancreático e renal, dependendo do gene envolvido.
  - O conhecimento do *status* mutacional de CDKN2A não interfere nas condutas preventivas, uma vez que o acompanhamento dermatológico não se altera após o teste.
- 48) Homem de 42 anos, residente de área endêmica, apresenta múltiplas pápulas e nódulos eritematosos simétricos em face, orelhas e membros, acompanhados de infiltração difusa da pele, madarose e infiltração dos lobos das orelhas. Relata episódios recorrentes de febre, dor e edema em lesões antigas, com surgimento de novos nódulos dolorosos e sensibilidade exacerbada dos nervos periféricos durante o tratamento poliquimioterápico. Baciloscopia: numerosos bacilos álcool-ácido resistentes. Considerando o quadro, assinale a alternativa correta.
- O quadro descrito é compatível com Hanseníase tuberculoide, caracterizada por intensa resposta celular mediada por linfócitos Th1 e predomínio de granulomas epitelioides bem formados, com poucos bacilos.
  - A reação hansênica observada neste paciente decorre de exacerbação da imunidade celular (Th1), sendo classificada como reação tipo 1.
  - A presença de nódulos dolorosos, febre e vasculite em paciente multibacilar indica reação tipo 2 (eritema nodoso hansênico), mediada por imunocomplexos e associada à resposta humoral exacerbada (Th2).
  - A principal droga utilizada para o controle das reações tipo 2 é a rifampicina, pela sua potente ação anti-inflamatória e imunorreguladora sobre o *M. leprae*.

- 49) A dermatoscopia é um método fundamental na avaliação inicial de lesões pigmentadas e não pigmentadas, permitindo a distinção entre padrões melanocíticos e não melanocíticos. A análise estrutural detalhada possibilita identificar elementos como redes pigmentares, glóbulos, estruturas azuladas homogêneas e padrões paralelos, que auxiliam na determinação da natureza histológica subjacente. Entender com precisão a morfologia, a cor e a disposição desses achados dermatoscópicos é essencial para evitar erros diagnósticos e para estabelecer a conduta adequada. Com base nos critérios dermatoscópicos apresentados, assinale a alternativa que representa corretamente a interpretação diagnóstica da estrutura descrita.
- Estruturas arredondadas de tamanhos variados, agregadas ou isoladas, com tonalidades entre marrom e cinza-preto, indicam geralmente uma lesão de origem melanocítica.
  - Pigmentação azul homogênea, sem rede pigmentada ou outras estruturas locais, costuma sugerir uma ceratose seborreica com padrão estruturado.
  - Presença de múltiplas estruturas branco-amareladas arredondadas, bem delimitadas, tende a indicar maior probabilidade de tratar-se de lesão melanocítica comum.
  - Estruturas castanhas claras em padrão semelhante à impressão digital, distribuídas de forma delicada, sugerem fortemente uma lesão melanocítica acral com padrão melânico típico.
- 50) Uma paciente adulta, com 55 anos, apresenta manchas eritematodescamativas crônicas em áreas foto-protégidas, com evolução lenta para placas infiltradas. A biópsia mostra epidermotropismo com linfócitos de núcleo cerebriforme e microcoleções intraepidérmicas. A imunofenotipagem revela população CD3+, CD4+, CD45RO+, com perda parcial de CD7. Assinale a alternativa que descreve corretamente o achado compatível com essa forma clínica e imunofenotípica.
- Progressão natural da doença, podendo evoluir para maior infiltração dérmica e redução do epidermotropismo nas fases avançadas.
  - Variante agressiva de início tumoral, geralmente CD8+, com rápida ulceração e mau prognóstico.
  - Achado inespecífico de dermatite eczematosa, sem relação com linfoma cutâneo de células T.
  - Variante hipopigmentada juvenil, caracteristicamente CD8+, com pouca infiltração dérmica.
- 51) A síndrome de Sézary é uma doença T cutânea agressiva cujo diagnóstico depende da correlação entre fenótipo das células circulantes, características clínicas profundas e documentação de um clone T patológico. Em um paciente com quadro de eritroderma persistente, linfonodomegalia difusa e prurido incapacitante, assinale a alternativa que descreve corretamente o conjunto mais compatível com essa entidade, considerando as manifestações clínicas e o padrão imunofenotípico típicos.
- Placas infiltradas de evolução lenta, linfócitos maduros CD3+, CD4+, CD45RO+ com CD7 preservado, ausência de clone sanguíneo e linfonodos apenas reacionais.
  - Eritroderma associado a linfócitos circulantes CD3+, CD4+, CD8- com perda de CD7 e CD26, expansão monoclonal demonstrada e infiltração ganglionar monótona.
  - Eritrodermia discreta com, áreas poupadas, predomínio de células CD3+, CD8+, TCR $\gamma/\delta$ +, citometria sem alterações e linfadenopatia atribuída à dermatopatia crônica.
  - Lesões nodulares ulceradas sem fases prévias, células CD3 +, CD4 + com expressão intensa de CD30, ausência de linfócitos atípicos no sangue e envolvimento visceral precoce.
- 52) Em um paciente adulto com lesões nodulares violáceas na região perianal, algumas erodidas, ovoides, dolorosas ao atrito e associadas a um quadro de irritação crônica por fezes líquidas e oclusão, assinale a alternativa correta que descreve o diagnóstico mais compatível, considerando a clínica, os desencadeantes e os achados observados nesses casos.
- Micose fungoide perianal, com nódulos ulcerados, história prolongada de placas prévias, predomínio de linfócitos CD4+ cerebriformes epidérmicos e ausência de relação com fezes líquidas ou oclusão.
  - Condiloma acuminado extenso, relacionado ao HPV de alto risco, com pápulas verrucosas coalescentes, ausência de erosões e histologia mostrando colicitose proeminente e acantose típica.
  - Doença de Crohn perianal, com placas eritematosas infiltradas e fissuras profundas, frequentemente acompanhada de fístulas, granulomas não caseosos e ausência de fatores irritativos externos.
  - Granuloma glúteo do adulto, caracterizado por nódulos eritematovioláceos em áreas ocluídas, associado à irritação química crônica, candidíase secundária e histologia com hiperplasia epidérmica e infiltrado dérmico misto.

- 53) Em uma região onde há crescente incidência de esporotricose transmitida por gatos infectados, uma paciente adulta imunocompetente apresenta, há oito semanas uma lesão ulcerada no dorso da mão, no ponto exato de uma arranhadura prévia. Nas últimas três semanas, desenvolveu nódulos subcutâneos ascendentes, alguns ulcerados, seguindo o trajeto linfático até o terço distal do antebraço. Os exames histológicos mostram reação granulomatosa e supurativa profunda, sem visualização clara de organismos, mesmo em colorações especiais. Considerando-se a epidemiologia local, os aspectos evolutivos e a fisiopatologia da doença, assinale a alternativa que descreve corretamente o cenário diagnóstico e fisiopatológico mais compatível.
- O quadro corresponde à esporotricose linfocutânea típica, decorrente de inoculação traumática, com resposta imunológica inicial que permite disseminação ao longo dos vasos linfáticos, sendo esperado predomínio de formas leveduriformes visíveis ao exame histopatológico em indivíduos imunocompetentes.
  - A evolução sugere esporotricose disseminada primária, favorecida por elevada carga fúngica adquirida por arranhadura de gato infectado, sendo característica a presença de múltiplos sítios de inoculação independentes acompanhados de sintomatologia sistêmica inicial.
  - O padrão clínico é compatível com esporotricose linfocutânea clássica, decorrente de um único ponto de inoculação e progressão centrífuga ao longo dos vasos linfáticos, sendo comum a dificuldade de demonstrar o fungo nas lâminas devido à escassez de organismos em hospedeiros imunocompetentes.
  - O conjunto clínico-histológico é mais sugestivo de esporotricose fixa, forma que surge tipicamente em indivíduos previamente expostos ao fungo, sem disseminação linfática, predominando lesões granulomatosas únicas e persistentes no local de inoculação.
- 54) Uma paciente de 32 anos, com história familiar positiva em primeiro grau, apresenta surtos recorrentes de pápulas hiperqueratóticas amareladas no tronco superior e áreas seborreicas, associadas a odor fétido e piora no verão. Ao exame dermatoscópico, observam-se áreas esbranquiçadas irregulares e pontos amarelos sobre fundo eritematoso. Biópsia revela acantólise suprabasal com presença de “corpos redondos” e “grãos”. Considerando o espectro clínico-genético da doença, assinale a alternativa correta que melhor descreve uma característica relacionada à patogênese e ao manejo.
- A mutação ocorre em gene responsável pela formação de desmoplaquina, levando à perda direta da adesão desmossomal, justificando a resposta rápida a corticosteroides sistêmicos em surtos inflamatórios extensos.
  - O defeito genético envolve ATP2A2, que codifica uma  $Ca^{2+}$ -ATPase do retículo sarcoplasmático/endoplasmático, resultando em disfunção da homeostase de cálcio; retinoides orais podem melhorar a diferenciação epidérmica, porém não reduzem recidivas.
  - A doença decorre de mutações em ATP2C1 — similar ao pêfigo familiar benigno — e, assim como ele, demonstra vesículas frágeis e erosões flácidas, sendo de primeira linha a dapsona em casos persistentes.
  - O processo de acantólise surge por autoanticorpos contra desmogleína 1, explicando a predileção por áreas seborreicas e a melhora significativa com imunossuppressores como ciclosporina em baixas doses.
- 55) Paciente de 32 anos, residente em área endêmica da América do Sul, relata lesão papulosa única no antebraço após viagem recente à zona rural. Após oito semanas, o quadro evolui para úlcera de bordas infiltradas e granulosas, sem dor significativa. Ele refere exposição intensa a insetos e relata que a lesão surgiu semanas após picadas. Considerando os mecanismos imunológicos envolvidos, a biologia do parasita e a diversidade clínica da doença, assinale a alternativa que descreve corretamente a interação entre parasita e hospedeiro na condição suspeitada.
- Trata-se de infecção por protozoário que permanece extracelular em todo o ciclo humano, replicando-se como promastigota no tecido cutâneo, sendo controlado principalmente por resposta Th2 com secreção predominante de IL-4 e IL-10, o que favorece rápida involução das lesões ulceradas.
  - A doença é causada por parasita intracelular obrigatório que se multiplica em fagolisossomos como amastigota, dependendo de resposta Th1 com produção de IL-2 e IFN- $\gamma$  para contenção, sendo que falha nesse eixo imunológico e predomínio de IL-4/IL-10 favorecem formas difusas e mucocutâneas.
  - O quadro é causado por protozoário que alterna entre forma extracelular no tecido humano e forma intracelular no inseto vetorial, apresentando fase amastigota apenas no trato digestivo do flebotômíneo, de modo que a imunidade humana se baseia principalmente em anticorpos neutralizantes humorais.
  - A condição decorre de protozoário de ciclo exclusivamente sistêmico em que o comprometimento cutâneo ocorre por reação inflamatória secundária, sendo o controle mediado por TNF e IL-32 independentes da resposta Th1, justificando a ausência de relação entre formas mucosas e desequilíbrio da resposta celular.

- 56) A poroqueratose é um grupo de desordens queratinizantes caracterizado pela formação de lesões anulares com borda hiperqueratósica típica e presença da lamela corneide ao exame histopatológico. Suas variantes clínicas apresentam comportamentos distintos, relação variável com exposição solar e diferentes padrões de distribuição. Com base nesses conhecimentos, avalie as assertivas a seguir.
- ( ) A lamela corneide é considerada o achado histopatológico essencial para o diagnóstico de poroqueratose, embora possa ocasionalmente ser observada em outras dermatoses.
  - ( ) A poroqueratose actínica superficial disseminada (DSAP) caracteriza-se por lesões predominantemente em áreas fotoexpostas, inclusive face e mucosas.
  - ( ) A poroqueratose de Mibelli surge tipicamente na infância ou adolescência e apresenta uma borda hiperqueratósica elevada e bem definida, podendo ocorrer de forma localizada e unilateral.
  - ( ) Na poroqueratose linear, as lesões seguem as linhas de Blaschko e costumam manifestar-se durante a infância ou adolescência.
- a) (V); (F); (V); (V).
  - b) (V); (F); (V); (F).
  - c) (F); (V); (V); (V).
  - d) (V); (V); (F); (F).
- 57) Durante o processo de remodelação cicatricial, múltiplos fatores estruturais e neuroquímicos participam do surgimento do prurido, que pode persistir por longos períodos, especialmente em cicatrizes imaturas ou anormais. Com relação aos mecanismos fisiopatológicos do prurido em cicatrizações e às abordagens terapêuticas possíveis, qual das alternativas descreve corretamente um aspecto fundamental que diferencia o prurido de cicatrizes imaturas ou anormais das outras formas de prurido cutâneo?
- a) O prurido em cicatrizes imaturas decorre principalmente da ativação exagerada de mastócitos e da liberação abundante de histamina, razão pela qual anti-histamínicos orais apresentam benefício clínico significativo e são considerados terapias de primeira linha.
  - b) A persistência do prurido em cicatrizes hipertróficas está relacionada à presença elevada de fibras A-delta espessas e mielinizadas que se tornam hiper-reativas durante a remodelação da cicatriz, originando hipersensibilidade mecânica sustentada.
  - c) A presença desproporcional de fibras C finamente mielinizadas ou amielínicas durante a regeneração neural contribui para a amplificação do prurido, que também pode resultar de estímulos mecânicos diretos e mediadores químicos como cininas e prostaglandinas.
  - d) Em cicatrizes queloidianas, o prurido tende a diminuir rapidamente devido à escassez de fibras nervosas regeneradas, e nesses casos a crioterapia costuma ter maior impacto na redução do prurido do que na regressão volumétrica da lesão.
- 58) A erupção polimórfica da gestação é uma dermatose inflamatória benigna característica do final da gestação ou do período pós-parto, marcada por prurido intenso e lesões inicialmente urticariformes dentro das estrias abdominais. Apesar do desconforto significativo, não há repercussões maternas ou fetais, e os achados histopatológicos e imunológicos são inespecíficos. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.
- a) Habitualmente, inicia-se no segundo trimestre, envolve precocemente a região periumbilical e exibe imunofluorescência direta positiva para depósitos lineares na junção dermoepidérmica.
  - b) Manifesta-se por pápulas e placas pruriginosas que surgem nas estrias, com imunofluorescência direta negativa e ausência de riscos obstétricos, sendo mais comum em primigestas.
  - c) Tem início predominante na face e membros superiores, evolui para bolhas tensas e apresenta padrão histológico compatível com doença autoimune ampollar específica.
  - d) Mostra-se ao exame histológico infiltrado eosinofílico denso com formação de bolhas periumbilicais e títulos elevados de autoanticorpos anti-BP180 na maioria das pacientes.

- 59) A urticária compreende um grupo de condições caracterizadas por episódios recorrentes de edema dérmico e subcutâneo, desencadeados por múltiplos mecanismos, incluindo alergia, autoimunidade, infecções, drogas e pseudoalérgenos dietéticos. As lesões típicas são fugazes, podendo manifestar-se como urticas superficiais ou angioedema profundo, cada uma com características clínicas distintas. O manejo adequado depende do reconhecimento do padrão clínico, dos gatilhos envolvidos e das situações de risco à vida. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- a) O angioedema hereditário e o angioedema associado ao uso de inibidores da ECA respondem rapidamente ao uso de epinefrina, sendo essa a terapia de escolha para o controle da maioria dos episódios agudos.
  - b) As urticas apresentam dor intensa e coloração invariavelmente eritematosa, enquanto o angioedema é sempre pruriginoso e nitidamente delimitado, com resolução lenta e recorrência frequente.
  - c) A investigação de casos persistentes pode incluir exames laboratoriais, desafios físicos e alimentares, testes cutâneos e biópsia, uma vez que grande parte das urticárias permanece sem causa definida mesmo após extensa avaliação.
  - d) O uso contínuo de corticosteroides sistêmicos é recomendado para o manejo prolongado da urticária crônica, pois reduz o risco de rebote e interfere positivamente na história natural da doença.
- 60) O lúpus eritematoso cutâneo (LEC) compreende um espectro de manifestações clínicas e histopatológicas que refletem diferentes padrões de resposta imune e níveis de envolvimento cutâneo. As formas mais reconhecidas incluem o lúpus cutâneo agudo (ACLE), o subagudo (SCLE) e o discoide (DLE), cada qual com características clínicas e laboratoriais distintas, variando desde lesões eritematosas transitórias até placas cicatriciais persistentes. Em relação às manifestações clínicas e características laboratoriais das diferentes formas de lúpus eritematoso cutâneo, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) O lúpus cutâneo agudo apresenta lesões eritematosas fotossensíveis, frequentemente em região malar, poupando o sulco nasolabial, e geralmente se associa à atividade sistêmica, como nefrite lúpica.
  - b) O lúpus cutâneo subagudo caracteriza-se por lesões anulares ou papuloescamosas, marcadamente fotossensíveis, geralmente associadas à presença de anticorpos anti-SSA/Ro, e tende a não evoluir com atrofia ou cicatriz.
  - c) O lúpus eritematoso discoide apresenta lesões atróficas e cicatriciais, frequentemente em áreas fotoexpostas, com envolvimento folicular proeminente e alopecia cicatricial, sendo comum o acometimento abaixo do pescoço sem lesões em face.
  - d) O lúpus eritematoso tímido manifesta-se por placas edematosas e infiltradas, sem alterações epidérmicas significativas, podendo regredir sem cicatriz, e exhibe acúmulo de mucina na derme.

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO



**EXAME DE ADMISSÃO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.