

# INFECTOLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2027**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

Considere o poema a seguir para responder às questões 01 e 02.

**Consoada**

Quando a Indesejada das gentes chegar  
 (Não sei se dura ou caroável),  
 talvez eu tenha medo.  
 Talvez sorria, ou diga:  
 — Alô, iniludível!  
 O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
 (A noite com os seus sortilégios.)  
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
 A mesa posta,  
 Com cada coisa em seu lugar.  
 (BANDEIRA, Manuel. *Libertinagem*, 1930)

- 01) No verso “— Alô, iniludível!”, do poema Consoada, a palavra “iniludível” resulta de um processo de formação que se caracteriza corretamente como:
- derivação parassintética.
  - composição por justaposição.
  - composição por aglutinação.
  - derivação por sufixação e prefixação.

- 02) O título do poema Consoada, de Manuel Bandeira, dialoga diretamente com seu conteúdo temático. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo “consoada” designa, entre outros sentidos, a refeição leve feita à noite, especialmente na véspera de Natal, associada à ideia de espera e preparação.

Considerando essa definição e a leitura integral do poema, a relação entre o título e o texto estabelece-se principalmente porque:

- o poema descreve literalmente uma refeição noturna, enfatizando hábitos alimentares tradicionais do eu lírico, e, com isso, hábitos inerentes ao monastério.
- o título funciona como ironia, pois a morte, apresentada no poema, rompe de forma abrupta e violenta a tranquilidade da cena doméstica.
- a consoada atua como símbolo de preparação serena para a chegada da morte, concebida como visita inevitável e acolhida com ordem e aceitação.
- o termo reforça a dimensão religiosa do poema, associando diretamente a morte ao nascimento de Cristo e à redenção cristã.

- 03) Considere a frase abaixo.

“O relatório técnico, **que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país**, apresentou conclusões divergentes das inicialmente esperadas.”

Com base na análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa correta.

- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do termo “relatório técnico”.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” exerce valor sintático de aposto explicativo, funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” é uma oração subordinada substantiva explicativa, pois acrescenta uma informação acessória ao período.
- A oração “que foi elaborado pela comissão responsável após meses de análise minuciosa dos dados coletados em diferentes regiões do país” estabelece relação de coordenação explicativa, introduzida pelo pronome relativo “que”.

- 04) Determinados verbos da Língua Portuguesa apresentam flexão defectiva, isto é, não são tradicionalmente conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Em geral, tais restrições decorrem de fatores fonéticos ou do uso consagrado pela tradição gramatical, motivo pelo qual algumas formas verbais são evitadas na norma-padrão.

Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa e o comportamento dos verbos defectivos, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente.

- É improvável que os artistas **coloram** o painel antes do prazo estabelecido.
- Caso a empresa **reaveja** os valores pagos indevidamente, poderá regularizar o balanço.
- Se os dois atletas **competirem** novamente amanhã, o público comparecerá em grande número.
- O professor solicitou que os alunos **demulam** o argumento apresentado no texto.

05) Analise os períodos a seguir.

- I. O discurso foi tão convincente **que** a assembleia aprovou o projeto por unanimidade.
- II. Ele continuou defendendo a proposta, **embora** soubesse da rejeição iminente.
- III. O relatório foi redigido **segundo** determinam as normas técnicas vigentes.
- IV. O atleta persistiu no treinamento, **ainda que** estivesse lesionado.

Considerando o valor semântico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação das conjunções destacadas.

- a) I – concessiva; II – consecutiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- b) I – consecutiva; II – concessiva; III – conformativa; IV – concessiva.
- c) I – conformativa; II – concessiva; III – consecutiva; IV – consecutiva.
- d) I – consecutiva; II – conformativa; III – concessiva; IV – conformativa.

06) A questão refere-se ao fragmento do conto *A nova Califórnia*, de Lima Barreto.

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]

Fonte: BARRETO, Lima. *A nova Califórnia*. In: MORICONI, Ítalo (Org.). *Os cem melhores contos brasileiros do século*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 40.

Com base na análise sintática do período, especialmente quanto à classificação das orações coordenadas e subordinadas presentes no fragmento, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) “mas ainda não pudera cercar”, é classificada como oração coordenada sindética adversativa.
- b) “passou logo o prado verde do Costa”, é classificada como oração coordenada sindética conclusiva.
- c) “cujo velho sonho era a formatura do filho”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) “que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto”, é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa.

07) Leia o texto abaixo.

#### **Polícia encontra livro roubado de Borges**

A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luis Borges publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US\$ 10 mil, e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal *Clarín*. O exemplar de *Luna de Enfrente* pertencia ao colecionador Horacio Porcel e foi roubada [*sic*] dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Güiraldes.

Fonte: Folha de São Paulo, 20 set. 2004. p. E8.

Considerando os aspectos sintáticos e semânticos da expressão “de Borges”, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Caso o título fosse reescrito como “Polícia encontra livro de Borges roubado”, a ambiguidade seria completamente eliminada.
- b) A ambiguidade decorre da possibilidade de o termo “de Borges” relacionar-se semanticamente ao substantivo “livro”, e não ao particípio “roubado”.
- c) A construção permite dupla interpretação, porque o sintagma preposicionado “de Borges” pode exercer função de adjunto adnominal tanto com valor de autoria quanto de posse.
- d) A interpretação de que o livro teria sido roubado do escritor Jorge Luis Borges decorre da leitura em que o sintagma preposicionado assume valor de complemento nominal associado ao particípio “roubado”.

08) Assinale a alternativa cujo enunciado apresenta corretamente a colocação do pronome em relação ao verbo, à luz da norma-padrão, considerando fatores de atração, tempos verbais e a estrutura sintática do período.

- a) Mal **me haviam informado** do ocorrido, resolvi intervir.
- b) Jamais **haver-me-ia perdoado** se não tentasse.
- c) Não **convencer-se-ão** facilmente os jurados.
- d) Quando **explicar-lhe-emos** os detalhes, tudo ficará claro.

09) Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada corretamente, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Só aceitarei a proposta se você **ver** todos os documentos antes.
- b) Quando eu **puser** o projeto em prática, avisarei a equipe.
- c) Caso ele **fazer** o pagamento hoje, liberaremos o material.
- d) Não sairemos enquanto você não **trazer** a autorização assinada.

- 10) As regras de concordância verbal admitem variações condicionadas por fatores sintáticos e semânticos, especialmente quando o núcleo do sujeito apresenta valor coletivo, partitivo ou expressões de quantidade. Em textos formais, o reconhecimento dessas estruturas é essencial para a adequação à norma-padrão.

Com base nessas considerações, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, segundo a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) A maioria dos participantes concordou com as propostas dos candidatos que ali residia.
- b) Fazem cinco anos que a instituição foi fundada, apesar das enchentes terem sido recentes.
- c) O eclipse lunar acontece todo ano, e existe muitos fatores que explicam o fenômeno.
- d) Mais de um pesquisador levantou a mesma hipótese a ser defendida pelos autores.

- 11) Analise o trecho a seguir, à luz das normas da gramática culta referentes à concordância nominal.

“Durante a inspeção, constatou-se que as salas estavam \_\_\_\_\_ limpas, as normas eram \_\_\_\_\_ claras para todos, e as atas seguem \_\_\_\_\_ ao processo administrativo. Os servidores permaneceram \_\_\_\_\_ após o expediente.”

Com base nas regras de concordância nominal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) meio – bastante – anexas – só
- b) meios – bastantes – anexas – só
- c) meios – bastante – anexos – só
- d) meio – bastantes – anexos – só

- 12) As normas de acentuação gráfica passaram por ajustes com o Acordo Ortográfico vigente. Essas alterações ainda geram dúvidas no uso formal da língua.

Com base nessas regras, analise as afirmativas a seguir.

- I. O público aprovou a estreia do novo herói da série.
- II. A assembleia discutiu a ideia apresentada pelo relator.
- III. O voo atrasou por causa do mau tempo.
- IV. A plateia reagiu com entusiasmo à apresentação.
- V. O pólo industrial da região cresceu rapidamente.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas em que a acentuação está de acordo com o atual padrão ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e V.

- 13) Observe os verbos destacados e, em seguida, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação correta, aplicada ao contexto da sentença.

Aquele homem **era** um visionário que **vivia** uma vida simples, pois acreditava que **devia** sua gratidão aos amigos antes de finalmente **morrer** em paz.

- a) Transitivo direto; transitivo direto; intransitivo e transitivo direto e indireto.
- b) Verbo de ligação; transitivo direto; transitivo direto e indireto e intransitivo.
- c) Intransitivo; transitivo direto e indireto; transitivo direto e verbo de ligação.
- d) Verbo de ligação; intransitivo; transitivo direto e indireto e transitivo direto.

- 14) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram que exames qualificatórios **têm** desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Em relação ao verbo “têm”, assinale a alternativa que classifica corretamente o seu sujeito, considerando a estrutura sintática do período e a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) Sujeito simples, expresso por um núcleo substantivo acompanhado de adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto, formado por núcleo e adjunto flexionados no plural.
- c) Sujeito oracional, representado por uma oração subordinada substantiva.
- d) Sujeito indeterminado, como próprio do verbo “ter” no sentido de denominar existência.

15) Considere o período abaixo:

“Os concorrentes demonstram **que** exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo.”

Conforme a análise sintática do período composto, assinale a alternativa correta.

- a) O período é composto por coordenação, sendo a oração introduzida por “que” classificada como coordenada sindética explicativa.
- b) A oração “que exames qualificatórios têm desdobramentos inevitáveis na qualidade de vida a curto prazo” é subordinada substantiva completiva nominal, exercendo função de complemento do termo “demonstram”.
- c) O período é composto por subordinação, e a oração introduzida por “que” exerce função de objeto direto do termo “demonstram”.
- d) A oração principal é estruturalmente incompleta, exigindo complemento preposicionado para a correção sintática do período.

16) Analise os versos de Luiz Gonzaga Jr. e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos pronomes destacados.

Começaria **tudo outra** vez

Se preciso fosse, **meu** amor.

Fonte: COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ. Gravadora: Odeon Catálogo: EMCB 7014. Ano: 1976. Artista(s): Gonzaguinha.

- a) Pronome adjetivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- b) Pronome substantivo; pronome adjetivo; pronome adjetivo.
- c) Pronome adjetivo; pronome substantivo; pronome substantivo.
- d) Pronome substantivo; pronome substantivo; pronome substantivo.

17) Leia o texto a seguir.

### Nossa língua brasileira

Fui dar um passeio por Rondônia. Lá pelas tantas, comecei a perceber que não estava entendendo a conversa do povo. Eu, que falo o português do centro-oeste mineiro, achei toada na fala da região. Cheguei numa beira de porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma coisa, que divido agora com o leitor.

[...] Eis meu relato:

O regatão saltou do alvarenga onde estava morcegando e berrou:

— Açáí, cajarana, cupuaçu e pupunha! Loção contra carapanã, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrão? [...]

Procurei um táxi, mas desanimei ao ouvir o informante dizer:

— Aqui, BK é só pra quem tá bamburrado. Tu tá?

E saiu rindo, apontando para mim e falando:

— Brabo aqui vai de catraia! [...]

Logo que pude, abri buraqueira (fugiu) para não ser forçado a fazer uso de uma assistência (ambulância) com destino a um hospício; nem para ser submetido a um baculejo (revista policial). Claro! Do jeito que fiquei, talvez pensassem que eu estava bodado (maluco) [...]. Logo eu, que sou tão virado (trabalhador)!

É uma faceta (epa!) da nossa língua... brasileira ou portuguesa?

Fonte: Wilson Liberato. O Pergaminho, 21 out. 2000.

Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta em relação aos elementos linguísticos que exemplificam a variação da língua brasileira.

- a) Termos como “alvarenga”, “catraia” e “regatão” estão associados ao universo da navegação fluvial e ao cotidiano ribeirinho. Assim, o texto evidencia uma variação linguística relacionada ao campo de atividade ou profissão dos falantes.
- b) Expressões como “bamburrado”, “bodado” e “virado” indicam formas de linguagem populares utilizadas em contextos informais. Nesse caso, o texto exemplifica uma variação linguística de natureza social, ligada ao nível de escolaridade ou ao grupo social dos falantes.
- c) Palavras como “carapanã”, “regatão” e “bamburrado” são típicas do vocabulário utilizado em regiões da Amazônia, como Rondônia. O estranhamento do narrador ao não compreender essas expressões evidencia uma variação linguística de natureza regional, relacionada ao espaço geográfico.
- d) O uso de palavras como “brabo”, “bamburrado” e “baculejo” demonstra marcas de informalidade próprias da linguagem cotidiana. Nesse sentido, o texto evidencia uma variação linguística de registro, relacionada ao grau de formalidade empregado pelos falantes em diferentes situações comunicativas.

18) Considerando a correspondência fonêmica na norma-padrão do português brasileiro, bem como os valores fonológicos assumidos por grafemas em diferentes contextos, determine o número total de fonemas presentes nas palavras “canhestro” e “ressabiado”. O número total de fonemas é, respectivamente:

- a) 7 e 9.
- b) 8 e 8.
- c) 8 e 9.
- d) 9 e 10.

19) Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta quanto à diferença de sentido provocada pelo uso da vírgula.

- I. O professor disse que, depois da aula, não gosta de conversar com os estudantes.
- II. O professor disse, depois da aula, que não gosta de conversar com os estudantes.

- a) Em I, o adjunto adverbial "depois da aula" modifica a oração principal, indicando o momento da fala do professor, enquanto em II ele modifica apenas o verbo "conversar", restringindo o hábito do docente.
- b) Em ambas as orações, a pontuação exerce uma função meramente estilística de realce, de modo que o deslocamento do adjunto adverbial não interfere na estrutura semântica, preservando o sentido de que a aversão do professor à conversa ocorre especificamente no período pós-aula.
- c) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula”, refere-se ao verbo “conversar”, ou seja, afirma-se que o professor não gosta de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” refere-se ao verbo “dizer”, indicando o momento em que ele disse que não gosta de conversar.
- d) Em I, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “dizer”, ou seja, afirma-se que o professor disse não gostar de conversar após o término da aula. Em II, a vírgula enfatiza o adjunto adverbial “depois da aula” e ele se refere ao verbo “conversar”, indicando o momento em que ele não gosta de conversar.

20) “A equipe técnica veio analisando os relatórios até que a auditoria externa pudesse aprovar o seu trabalho.”

Assinale a alternativa em que o período acima é integralmente transposto para a voz passiva, respeitando sua estrutura sintática.

- a) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que o seu trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.
- b) Os relatórios vieram sendo analisados pela equipe técnica até que pudesse ser aprovado os trabalhos pela auditoria externa.
- c) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho seja aprovado pela auditoria externa.
- d) Os relatórios foram sendo analisados pela equipe técnica até que o trabalho pudesse ser aprovado pela auditoria externa.

21) Associe as colunas, relacionando as expressões às respectivas frases, onde são empregadas corretamente.

**Expressões**

- (1) ACERCA DE
- (2) CERCA DE
- (3) HÁ CERCA DE
- (4) A CERCA DE

**Frases**

- ( ) Conversamos \_\_\_\_\_ uma melhor solução para o problema.
- ( ) \_\_\_\_\_ uma semana conversamos sobre uma melhor solução para o problema.
- ( ) Disseram \_\_\_\_\_ cem mil telespectadores.
- ( ) \_\_\_\_\_ cem mil veículos saíram de São Paulo neste feriado.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (2).
- b) (4); (1); (2); (3).
- c) (2); (3); (1); (4).
- d) (3); (2); (4); (1).

22) Leia a oração abaixo.

Os que aqui se deparam desejam ser selecionados.

O termo destacado é um:

- a) artigo definido.
- b) pronome indefinido.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome pessoal oblíquo.

23) Leia o texto abaixo.

### Aula de filosofia

Eu só te poderia dar uma noção do nada se não tivéssemos nascido. Agora é tarde, é muito tarde, minha filha... Ah, deliciosamente tarde!

Fonte: QUINTANA, Mário. *Caderno H*. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 68.

Considerando a estrutura sintática do texto acima e os conceitos de semântica e sintaxe, analise as assertivas a seguir.

- I. “Deliciosamente” é classificado como um advérbio de modo e está modificando o advérbio “tarde”.
- II. “Só” é classificada como uma palavra denotativa e indica exclusão e nesse contexto poderia ser substituída pelo termo “apenas”.
- III. “Muito” é classificado como um advérbio de intensidade e está modificando o advérbio “tarde”.
- IV. O termo “deliciosamente” expressa um julgamento e nesse caso, o advérbio é considerado um modalizador.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas I e II são verdadeiras.
- c) apenas III e IV são verdadeiras.
- d) apenas I, II e III são verdadeiras.

24) A vírgula é um sinal de pontuação que desempenha diversas funções na organização sintática do período, podendo indicar a separação de termos coordenados, o isolamento de elementos explicativos ou a marcação de deslocamentos dentro da oração. Entretanto, seu emprego inadequado pode provocar ambiguidade ou violar relações sintáticas fundamentais, como a ligação entre sujeito e predicado ou entre verbo e complemento.

Considerando essas normas da pontuação na Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a vírgula está empregada corretamente.

- a) Os candidatos que estudaram com antecedência obtiveram, nas avaliações mais recentes, desempenho superior à média geral.
- b) Os candidatos, que estudaram com antecedência obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.
- c) Os candidatos que estudaram, com antecedência nas avaliações mais recentes, obtiveram desempenho superior à média geral.
- d) Os candidatos que estudaram com antecedência, obtiveram desempenho superior à média geral nas avaliações mais recentes.

25) Associe as colunas relacionando a palavra ao seu respectivo processo de formação.

#### Palavras

- (1) Choro
- (2) Camelódromo
- (3) Boteco
- (4) Porquê

#### Processo de formação

- ( ) Hibridismo.
- ( ) Abreviação.
- ( ) Derivação imprópria.
- ( ) Derivação regressiva.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (3); (4); (1).
- c) (4); (2); (1); (3).
- d) (3); (1); (2); (4).

26) Marque a opção em que todos os verbos seguem a mesma conjugação de **colorir**, conforme norma-padrão da Língua Portuguesa.

- a) abolir, ruir, urgir, falir.
- b) agir, cair, sumir, demolir.
- c) fundir, traír, ressarcir, escandir.
- d) atribuir, retorquir, escandir, florir.

27) A questão refere-se ao fragmento da crônica de João Ubaldo Ribeiro.

Com mais de 50 anos de escrevinhação nas costas, descobri algumas ideias que muita gente faz da vida de um escritor. Por exemplo, tem quem ache que os escritores, notadamente entre eles mesmos, só falam difícil, uma proparoxítona para abrir, uma mesóclise para dar classe e um tetrassílabo para arrematar. “Em teu parecer, meu impertérrito amigo”, perguntaria eu ao Rubem Fonseca, durante nosso almoço periódico, “abater-se-á hoje, sobre a nossa urbe, uma formidanda intempérie?” Ao que o Zé Rubem reagiria com uma anástrofe, um mais-que-perfeito fazendo as vezes do imperfeito do subjuntivo e uma aliteração final *show* de bola, coisa de craque mesmo. “Augure do tempo fora eu, pressagiá-lo-ia libentíssimamente”, responderia ele. “Todavia, de tal não me trato.” E assim iríamos almoço afora, discutindo elevadíssimos assuntos, em linguagem só compreensível por indivíduos especiais.

Fonte: João Ubaldo Ribeiro. *Vida de escritor*. O Estado de S. Paulo, 3 jul. 2011. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vida-de-escritor.htm&authuser=2>. Acesso em: 14 mar. 2026.

Com base na leitura do fragmento apresentado, assinale a alternativa **incorreta** no que se refere aos recursos utilizados pelo autor para a construção do efeito de humor.

- a) O autor explora a variação linguística como recurso estilístico, gerando humor ao intercalar o registro coloquial e informal com uma linguagem arcaizante e de rigor gramatical extremo, visível no emprego de termos como "impertérrito" e "abater-se-á".
- b) O autor também utiliza metalinguagem, ao mencionar termos técnicos da gramática e da estilística (como proparoxítona, mesóclise e tetrassílabo) como se fossem recursos usados para dar sofisticação à fala. O humor surge porque esses elementos da língua são tratados de forma exagerada, como símbolos de erudição.
- c) As expressões “elevadíssimos assuntos” e “linguagem só compreensível por indivíduos especiais” reforçam o tom irônico do texto ao contrastar a banalidade do tema real da conversa (a previsão do tempo) com o vocabulário empolado utilizado, satirizando a pretensão de superioridade e o elitismo intelectual de certos círculos literários.
- d) O efeito de humor é construído pelo contraste entre o uso de termos técnicos da gramática (como "anástrofe" e "mais-que-perfeito") e a fluidez da linguagem cotidiana; no entanto, esse recurso corre o risco de tornar o texto excessivamente acadêmico, o que pode prejudicar o caráter literário e satírico da crônica ao distanciar o leitor comum que busca uma oralidade mais acessível.

28) Associe as colunas abaixo, preenchendo as lacunas das orações com a forma verbal correspondente da primeira coluna. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa associação.

**Formas Verbais**

**Orações**

- (1) detém                                    ( ) Piloto \_\_\_\_\_ na manobra do volante.
- (2) mantém                                ( ) Eles tentam fugir, mas não conseguem: uma estranha força os \_\_\_\_\_ imóveis.
- (3) intervém                               ( ) A FAB \_\_\_\_\_ a maior esquadrilha do Brasil.
- (4) mantém                                ( ) A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras \_\_\_\_\_ na frase.

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (4); (2); (3); (1).
- c) (1); (3); (2); (4).
- d) (3); (4); (1); (2).

29) Leia as sentenças abaixo.

I. “O ex-promotor tinha cerrados os olhos.” (Érico Veríssimo)

II. O ex-promotor tinha cerrado os olhos.

Assinale a alternativa que analisa corretamente as propriedades gramaticais e semânticas das sentenças acima.

- a) Na sentença I, "cerrados" exerce a função de adjunto adnominal do substantivo "olhos", indicando uma característica intrínseca ao objeto; na sentença II, "cerrado" é o núcleo de um predicado verbal onde o verbo "ter" mantém sua transitividade plena e sentido original de posse.
- b) Ambas as sentenças apresentam construções de voz passiva sintética, diferenciando-se apenas pela concordância atrativa. Na primeira, o adjetivo concorda com o núcleo do sujeito "ex-promotor" de forma indireta; na segunda, o verbo "ter" atua como auxiliar de um tempo composto do modo subjuntivo.
- c) Na sentença I, o termo "cerrados" é um adjetivo com função de predicativo do objeto direto, conferindo à sentença um aspecto de estado resultante; na sentença II, ocorre uma locução verbal de tempo composto (Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo), em que o particípio é invariável, priorizando o aspecto perfectivo da ação.
- d) A primeira construção é um exemplo de "particípio absoluto", onde a concordância em gênero e número com o objeto direto é facultativa por razões estilísticas da literatura modernista; a segunda construção é a única gramaticalmente correta segundo a norma culta para indicar ações passadas anteriores a outras também passadas.

30) Leia a tira humorística de Mort Walker.



Fonte: Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 out. 2004.

Após a leitura da tira humorística, assinale a alternativa **incorreta** quanto à adequação da linguagem à situação comunicativa, considerando os elementos que contribuem para a eficiência da comunicação entre os interlocutores.

- O falante estava indignado com a péssima qualidade da comida, mas, para evitar confusão, ele, intencionalmente, construiu a frase de modo que o cozinheiro não a entendesse mesmo. Nessa hipótese, ele teria usado a frase apenas para extravasar sua irritação.
- No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrão da língua, escolhendo palavras que seu ouvinte não conhecia; ou seja, esse falante não "ajustou", não adequou sua linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta.
- No terceiro quadrinho, o cozinheiro demonstra ter compreendido perfeitamente a pergunta feita pelo interlocutor e responde diretamente à crítica sobre a comida, explicando quem preparou o prato. Assim, não há problema de adequação linguística ou falha de comunicação entre os personagens.
- O falante foi incapaz de adequar a linguagem ao ouvinte; ele não percebe que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, deveria ter usado a variedade coloquial, popular da língua, falando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: "Quem foi o indivíduo nocivo que preparou essa massa podre e nojenta?", ou de uma forma mais simples ainda: "Quem foi o maluco que fez essa porcaria?".

- 31)** Um médico do trabalho é o responsável pelo acompanhamento de profissionais de um Parque Nacional. Em 12/12/2025, atende um paciente, sexo masculino, biólogo, que atua em atividades de conservação ambiental da fauna e da flora.

No mesmo dia, durante as atividades de campo, o paciente foi atacado por um gambá-de-orelha-preta. Sofreu três mordidas superficiais no braço esquerdo e uma mordida no braço direito. Não houve lesões na face, cabeça ou mãos. As demais áreas do corpo estavam protegidas por vestimentas adequadas.

O animal fugiu após o ataque, não sendo possível sua captura ou observação.

Ao revisar o prontuário ocupacional, o médico observou que o paciente havia realizado previamente profilaxia pré-exposição completa para raiva. Em 23/10/2025, foi realizada sorologia para avaliação da resposta vacinal, com resultado de 7,5 UI/mL de anticorpos neutralizantes contra o vírus da raiva.

Considerando o tipo de animal envolvido, o tipo de exposição, a profilaxia pré-exposição previamente realizada e o título sorológico apresentado, assinale a conduta correta em relação à profilaxia pós-exposição para raiva.

- a) Considerando a resposta imunológica inadequada à profilaxia pré-exposição, deve-se iniciar esquema completo para acidente grave, com lavagem do ferimento, administração de soro antirrábico e cinco doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
  - b) Não é necessário realizar profilaxia antirrábica, pois gambás são animais de baixo risco para transmissão da raiva e o paciente apresenta histórico de vacinação pré-exposição.
  - c) Como a resposta imunológica à profilaxia pré-exposição é adequada, não há indicação de soro antirrábico, devendo-se administrar cinco doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
  - d) Como a resposta imunológica à profilaxia pré-exposição é adequada, não há indicação de soro antirrábico; deve-se realizar lavagem do ferimento e administrar duas doses de vacina nos dias 0 e 3.
- 32)** A *Candida auris* é um fungo emergente de importância global, associado a surtos em serviços de saúde, elevada capacidade de persistência no ambiente e perfil frequente de resistência a múltiplos antifúngicos. Devido ao seu potencial de disseminação, a vigilância sanitária brasileira tem adotado medidas rigorosas de monitoramento e controle.

No Brasil, entre 2020 e novembro de 2025, foram identificados 22 surtos, totalizando 134 pacientes com colonização ou infecção, distribuídos em cinco estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Com base nas recomendações da ANVISA para vigilância, prevenção e controle de *Candida auris*, assinale a alternativa correta.

- a) Devem ser enviadas à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN) apenas amostras suspeitas provenientes de serviços que não disponham de métodos de identificação avançada, como MALDI-TOF ou sequenciamento molecular.
  - b) Protocolos institucionais, fluxos assistenciais e treinamentos sobre prevenção e controle de *C. auris* devem ser implementados apenas em hospitais localizados em estados onde já houve registro de surtos.
  - c) Recomenda-se o fechamento obrigatório de quartos ou unidades que tenham abrigado pacientes suspeitos ou confirmados de *C. auris*, mesmo quando os processos de limpeza e desinfecção tenham sido realizados adequadamente.
  - d) Após a identificação de uma amostra suspeita de *Candida auris*, deve-se realizar notificação imediata às autoridades sanitárias competentes, iniciar medidas de isolamento do paciente e implementar ações de prevenção, controle e investigação epidemiológica, mesmo antes da confirmação laboratorial definitiva.
- 33)** Experiências observadas após grandes enchentes ao redor do mundo demonstram o aumento da incidência de diversas doenças infecciosas, incluindo doenças diarreicas, infecções respiratórias, leptospirose, hepatite A e arboviroses. Nesse contexto, medidas de prevenção, vigilância e profilaxia tornam-se fundamentais, tanto para a população afetada quanto para profissionais e voluntários envolvidos nas ações de resgate.

Considerando as recomendações de saúde pública para prevenção e controle de infecções em cenários de desastres climáticos, assinale a alternativa correta.

- a) O tratamento empírico em massa para geohelmintíases pode ser considerado em populações expostas quando indivíduos em um mesmo abrigo ou comunidade abastecida pela mesma fonte de água apresentam dois casos diagnosticados em intervalo inferior a duas semanas.
- b) Familiares que convivem com uma criança diagnosticada com escabiose devem ser tratados empiricamente, sendo dispensável a avaliação clínica dos contactantes.
- c) Em situações de catástrofe, recomenda-se o sacrifício de animais diagnosticados com esporotricose para evitar a disseminação da doença.
- d) A vacina contra febre tifoide não está disponível no Brasil; entretanto, em cenários de grandes enchentes, recomenda-se a vacinação em massa de toda a população vulnerável.

- 34) Após fortes enchentes que atingiram uma cidade em Santa Catarina, um médico plantonista atendeu em uma UPA uma criança, menina, 9 anos, trazida pelo pai, que relatava que a menina apresenta quadro de diarreia há quatro dias, com 5 a 7 evacuações diárias de fezes amolecidas com presença de muco, associadas a cólicas abdominais e sem febre. Informou que procurou atendimento porque, no dia da consulta, a criança apresentou náuseas e três episódios de vômitos, porém há cerca de uma hora sem novos episódios após ingestão de líquidos, depois de ter utilizado ondansetrona 4 mg sublingual. O pai também informou que a casa da família não havia sido atingida pela enchente, mas ambos estão atuando como voluntários na cozinha do abrigo, inclusive na manipulação de alimentos para os desabrigados.

Ao exame físico, a paciente encontra-se: eutrófica, afebril, anictérica, inquieta, com olhos fundos, frequência cardíaca: 118 bpm, pulso periférico fraco, tempo de enchimento capilar: 2 segundos, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, abdome discretamente distendido, sem sinais de irritação peritoneal.

Considerando o quadro clínico apresentado e as recomendações para manejo de Doença Diarreica Aguda (DDA) em contextos de emergência sanitária, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- Iniciar antibioticoterapia com ceftriaxona 50–100 mg/kg, associada a zinco 20 mg/dia, prescrever soro de reidratação oral (SRO) 100–200 mL após cada evacuação, sintomáticos e reavaliação em 24 horas.
  - Iniciar terapia de reidratação oral na unidade (50–100 mL/kg), reavaliar a paciente após cerca de 6 horas e, havendo melhora do quadro de desidratação, orientar alta com SRO após cada evacuação, suplementação com zinco 20 mg/dia, antibioticoterapia com ciprofloxacino e reavaliação em 48 horas.
  - Iniciar hidratação venosa com solução fisiológica ou Ringer lactato (30 mL/kg) na unidade e providenciar transferência hospitalar para observação por 24 horas, com início de ceftriaxona.
  - Iniciar hidratação venosa com solução fisiológica ou Ringer lactato (30 mL/kg) na unidade, providenciar transferência hospitalar e iniciar ciprofloxacino e zinco.
- 35) Homem de 32 anos, previamente hígido, trabalhador e residente em área rural da região norte do Mato Grosso, procura atendimento com história de 9 dias de febre alta, mialgia difusa, cefaleia e dor abdominal. Evoluiu, há dois dias, com tosse seca e dispneia progressiva. Na admissão, apresentava pressão arterial de 96/60 mmHg, frequência cardíaca de 142 bpm, frequência respiratória de 32 irpm e saturação de oxigênio de 85% em ar ambiente. Encontrava-se diaforético, com extremidades frias. À ausculta pulmonar, havia estertores crepitantes bilaterais. Radiografia de tórax mostrava infiltrado intersticial difuso. Os exames laboratoriais evidenciaram alterações hematológicas importantes (conforme tabela abaixo), além de creatinina de 1,3 mg/dL e potássio sérico de 4,8 mmol/L. Evoluiu rapidamente com insuficiência respiratória hipoxêmica grave, necessitando de ventilação mecânica invasiva, e instabilidade hemodinâmica com necessidade de drogas vasoativas. A gasometria arterial revelou relação  $PaO_2/FiO_2 < 100$ , compatível com SARA grave. Teste rápido para HIV, sífilis e hepatites virais negativas. Painel viral para Influenza, Sars-Cov-2, VSR negativo.

Hemograma			
Exame	Resultado	Exame	Resultado
Leucócitos	57.800/mm <sup>3</sup>	Monócitos	4.100/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos totais	33.600/mm <sup>3</sup>	Hemoglobina	18,1 g/dL
Bastonetes/mielócitos	3.400/mm <sup>3</sup>	Hematócrito	56%
Linfócitos	18.200/mm <sup>3</sup>	Plaquetas	56.000/mm <sup>3</sup>
<b>Esfregaço de sangue periférico:</b> desvio à esquerda da série mieloide, sem granulação tóxica; presença de linfócitos atípicos (>10%); trombocitopenia e hemoconcentração.			

Com base no caso apresentado, e do diagnóstico provável, qual é a conduta terapêutica mais adequada?

- Início imediato de ribavirina intravenosa, associada à ventilação mecânica protetora e monitorização hemodinâmica contínua.
  - Iniciar meropenem e vancomicina, associados à corticoterapia sistêmica e monitorização intensiva em unidade de terapia intensiva.
  - Doxiciclina intravenosa, associada a suporte ventilatório invasivo e reposição volêmica intravenosa vigorosa.
  - Instituição de precauções de contato e aerossóis, associada à ventilação mecânica protetora e manejo hemodinâmico com controle rigoroso de fluidos.
- 36) De acordo com as recomendações do *guideline* europeu para diagnóstico de aspergilose invasiva pulmonar, qual é o exame de imagem preferencial em pacientes de risco com febre persistente ou suspeita de infecção pulmonar?
- Radiografia simples de tórax.
  - Tomografia computadorizada de tórax com cortes finos.
  - Ressonância magnética de tórax.
  - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT).

- 37) O fenômeno de Arthus é um evento adverso raro associado à administração de algumas vacinas, particularmente aquelas contendo toxoides, como difteria e tétano. Trata-se de uma reação de hipersensibilidade do tipo III, mediada por imunocomplexos, geralmente observada em indivíduos com altos títulos circulantes de anticorpos que recebem doses repetidas do antígeno.

Em relação às características clínicas e fisiopatológicas do fenômeno de Arthus, assinale a alternativa correta.

- a) Reação inflamatória local tardia no sítio da injeção, relacionada principalmente a componentes da vacina, como adjuvantes de alumínio, caracterizada por nodulação, prurido intenso e persistência por meses ou anos.
- b) Reação sistêmica mediada por imunocomplexos, com inflamação difusa de tecidos e articulações, manifestando-se classicamente por febre, exantema e poliartrite.
- c) Evento adverso caracterizado por início súbito de hipotonia, hiporresponsividade e alteração da coloração da pele, ocorrendo pouco após a vacinação, especialmente em lactentes vacinados contra coqueluche.
- d) Vasculite local causada pelo depósito de imunocomplexos nas paredes de pequenos vasos próximos ao sítio de administração, manifestando-se com edema, eritema, induração, dor local e, em casos mais graves, necrose tecidual.

- 38) A Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, definindo quais condições devem ser notificadas e os prazos para comunicação às autoridades sanitárias.

Alguns agravos são classificados como de notificação compulsória imediata (até 24 horas) a todas as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde — Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde — devido ao seu potencial de disseminação, gravidade ou impacto em saúde pública.

Com base nessa normativa, assinale a alternativa que apresenta apenas agravos de notificação compulsória imediata.

- a) Doença de *Creutzfeldt-Jakob*, botulismo, cólera, leishmaniose visceral e síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus.
- b) Tétano acidental, esquistossomose, tuberculose, síndrome da paralisia flácida aguda e botulismo.
- c) Rubéola, cólera, síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus, síndrome da paralisia flácida aguda e febre purpúrica brasileira.
- d) Rubéola, sífilis congênita, febre purpúrica brasileira, doença de *Creutzfeldt-Jakob* e leishmaniose visceral.

- 39) A resistência antimicrobiana constitui um dos principais desafios da medicina contemporânea. Entre os patógenos de maior preocupação estão as *Enterobacterales* resistentes a carbapenêmicos (CRE), associadas à elevada morbimortalidade e limitação das opções terapêuticas.

Os mecanismos de resistência incluem a produção de carbapenemases, enzimas capazes de hidrolisar antibióticos carbapenêmicos. Essas enzimas são classificadas em diferentes classes moleculares, incluindo KPC (classe A), metalo- $\beta$ -lactamases – MBL (classe B) e OXA-48-like (classe D). A identificação do mecanismo de resistência tem implicações importantes na escolha da terapia antimicrobiana.

Em relação ao tratamento das infecções causadas por *Enterobacterales* resistentes a carbapenêmicos (CRE), assinale a alternativa correta.

- a) O imipenem-cilastatina-relebactam apresenta maior atividade *in vitro* que a ceftazidima-avibactam contra *Enterobacterales* da família *Morganellaceae*, devendo ser preferido para o tratamento dessas infecções.
- b) Em infecções por *Enterobacterales* resistentes a carbapenêmicos não produtoras de carbapenemase, recomenda-se preferir polimixina B ou colistina, devido ao espectro mais restrito, em detrimento da ceftazidima-avibactam.
- c) A OXA-48, carbapenemase da classe D, representa motivo de preocupação pela dificuldade de detecção laboratorial e potencial associação com falha terapêutica, sendo a ceftazidima-avibactam uma das principais opções com atividade contra esses isolados.
- d) O imipenem-cilastatina-relebactam restaura a atividade do aztreonam contra produtores de carbapenemase de classe B, apresentando eficácia equivalente à ceftazidima-avibactam, sendo ambas recomendadas em associação ao aztreonam.

- 40) Paciente de 19 anos, com diagnóstico prévio de fibrose cística, encontra-se internada em unidade de terapia intensiva por pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), evoluindo com choque séptico em uso de noradrenalina em baixa dose (5 mcg/h).

Foram isolados *Enterobacter cloacae* em aspirado traqueal e hemoculturas periféricas, com o seguinte perfil de sensibilidade antimicrobiana:

Antimicrobiano	Resultado	Antimicrobiano	Resultado
Ampicilina	R	Ertapenem	S
Amoxicilina + Clavulanato	R	Imipenem	S
Ampicilina + Sulbactam	R	Meropenem	S
Piperacilina + Tazobactam	S	Ciprofloxacino	S
Cefazolina	R	Levofloxacino	S
Cefuroxima	R	Gentamicina	S
Ceftriaxona	S	Amicacina	S
Ceftazidima	S	Trimetoprim-sulfametoxazol	S
Cefepime	S	Tigeciclina	S
Aztreonam	S	Colistina	S

De acordo com as Diretrizes para o Tratamento Antimicrobiano de Infecções por Bactérias Gram-negativas Multirresistentes da Sociedade Brasileira de Infectologia, qual é a droga de escolha para o tratamento dessa paciente?

- a) Meropenem.  
b) Cefepime.  
c) Ceftriaxona.  
d) Piperacilina/tazobactam.
- 41) De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério da Saúde, a monorresistência à rifampicina é definida pela resistência isolada a esse fármaco, confirmada por Teste de Sensibilidade (TS) após exclusão de resistência a outros medicamentos testados.

O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) detecta especificamente resistência à rifampicina, sendo necessária a realização de cultura com teste de sensibilidade para caracterização completa do perfil de resistência e definição do esquema terapêutico adequado.

Durante o acompanhamento de um caso novo de tuberculose pulmonar em paciente de 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, sem comorbidades e sem história prévia de uso de rifampicina, o TRM-TB identificou resistência à rifampicina.

Posteriormente, a cultura para micobactéria com teste de sensibilidade confirmou resistência à rifampicina e à estreptomomicina, mantendo sensibilidade aos demais fármacos testados.


Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para o tratamento da resistência à rifampicina, assinale o esquema terapêutico inicial preferencial.

Legenda:

- Cm – Capreomicina
- H – Isoniazida
- Lfx – Levofloxacino
- E – Etambutol
- Z – Pirazinamida
- Trd – Terizidona

- a) 2 H Lfx Z E / 10 H Lfx E.  
b) 2 H Lfx Cm E / 7 H Lfx E.  
c) 2 H Lfx Cm Trd / 10 H Lfx Trd.  
d) 2 Cm H Lfx E Z / 10 H Lfx E Z.

- 42) A figura abaixo ilustra os principais alvos celulares dos antimicrobianos. Considerando os mecanismos de ação representados, assinale a alternativa que associa corretamente o alvo celular ao grupo de antimicrobianos que atua predominantemente nesse sítio.



#### Mecanismo de ação dos antimicrobianos

(Fonte: TAVARES, W. *Antibióticos e quimioterápicos para o clínico*. 4. ed. Adaptado.)

- a) A – Fluoroquinolonas; B – Glicopeptídeos; C – Polimixinas; D – Macrolídeos.  
b) A – Rifamicinas; B – Aminoglicosídeos; C – Lipopeptídeos; D – Tetraciclina.  
c) A – Sulfonamidas; B – Betalactâmicos; C – Azóis; D – Aminoglicosídeos.  
d) A – Metronidazol; B – Glicopeptídeos; C – Polimixinas; D – Fluoroquinolonas.
- 43) Indivíduos infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que não apresentam sinais ou sintomas de tuberculose ativa, são classificados como portadores de infecção latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB). O tratamento da ILTB é uma estratégia fundamental para reduzir o risco de progressão para tuberculose ativa, especialmente em grupos considerados de alto risco para adoecimento.
- De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que apresenta a indicação correta para o tratamento da ILTB e a escolha adequada do esquema terapêutico preferencial para o cenário descrito.
- a) Paciente de 57 anos, portador de silicose, com prova tuberculínica (PT) de 8 mm, deverá ser tratado com isoniazida.  
b) Paciente de 38 anos, com neoplasia de tireoide em tratamento com iodo radioativo, com PT de 7 mm, deverá ser tratado com isoniazida.  
c) Paciente de 12 anos, contactante domiciliar de caso bacilífero, com PT de 5 mm, deverá ser tratado com rifampicina.  
d) Paciente de 52 anos em avaliação para pré-transplante renal, HIV negativo, com PT de 6 mm, deverá ser tratado com rifampicina.
- 44) O tétano acidental permanece como um importante problema de saúde pública. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2014 e 2024 foram registrados 2.385 casos confirmados de tétano acidental no Brasil.
- O manejo desta doença envolve suporte intensivo, neutralização da toxina tetânica, erradicação do *Clostridium tetani* e tratamento adequado do foco infeccioso, além da atualização da imunização do paciente.
- Com base nas recomendações do Ministério da Saúde para o manejo do tétano acidental, assinale a alternativa correta.
- a) O relaxamento muscular é o principal objetivo do tratamento do tétano, sendo os bloqueadores neuromusculares os medicamentos de primeira linha. O uso desses fármacos requer, obrigatoriamente, internação em UTI, com intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva.  
b) A penicilina G cristalina ou o metronidazol são antibióticos recomendados para eliminação do *Clostridium tetani*. Não há evidência conclusiva de superioridade entre os esquemas, embora alguns estudos sugiram melhor evolução clínica com o uso do metronidazol.  
c) O tratamento do foco infeccioso inclui debridamento cirúrgico amplo, com remoção de tecido desvitalizado e corpos estranhos, seguido de limpeza local com soluções antissépticas. A penicilina benzatina pode ser utilizada como parte do tratamento antibiótico do tétano acidental.  
d) Indivíduos imunodeprimidos, nas indicações de imunoprevenção contra o tétano, devem receber soro antitetânico (SAT) em substituição à imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT), devido à maior meia-vida dos anticorpos presentes no soro heterólogo.

- 45) Em consulta ambulatorial, o infectologista e o pediatra local atendem um lactente de 4 meses, assintomático, que está acompanhado pela mãe.

A mãe apresentou sífilis durante a gestação, caracterizada por soroconversão de teste treponêmico, VDRL pré-tratamento de 1:32, tratada adequadamente como sífilis primária com dose única de penicilina benzatina 2.400.000 UI, com término do tratamento 45 dias antes do parto. Teste para HIV negativo.

São apresentados os seguintes resultados de VDRL materno e do lactente:

Paciente	Pós-parto imediato	30 dias pós parto	90 dias pós parto
Mãe	1:4	-	1:2
Lactente	1:8	1:8	1:4

Considerando o manejo da criança exposta à sífilis e os critérios para diagnóstico e seguimento da sífilis congênita, assinale a alternativa correta.

- A presença de títulos persistentemente superiores aos maternos indica sífilis congênita confirmada, sendo mandatória a coleta de líquido, tratamento com penicilina cristalina por 10 dias e notificação imediata.
  - O teste treponêmico deve ser realizado aos 6 meses de vida e, se reagente, confirma sífilis congênita, independentemente da evolução dos títulos não treponêmicos, devendo ser instituído tratamento específico.
  - A presença de título maior que o materno em apenas uma diluição no pós-parto imediato é compatível com baixo risco de sífilis congênita; o lactente deve ser acompanhado com VDRL seriado e, após dois testes não reagentes consecutivos, o seguimento laboratorial pode ser interrompido.
  - Como houve declínio do VDRL até os 3 meses de idade, a obtenção de um teste não reagente aos 6 meses é suficiente para caracterizar passagem passiva de anticorpos maternos, excluir sífilis congênita e encerrar o seguimento clínico-laboratorial.
- 46) As micoses correspondem a infecções causadas por fungos cujas formas infectantes e manifestações clínicas estão fortemente relacionadas a fatores ambientais, ecológicos e geoclimáticos, como tipo de solo, presença de matéria orgânica, vegetação, clima, umidade e altitude. Esses fatores influenciam tanto a distribuição geográfica dos agentes etiológicos quanto o risco de exposição humana.

Do ponto de vista clínico-epidemiológico, as micoses podem ser classificadas em superficiais, cutâneas, subcutâneas (ou de implantação), sistêmicas endêmicas e oportunistas, considerando-se principalmente o tecido acometido, a via de infecção e a interação entre o patógeno e o hospedeiro.

Com base nessas classificações, associe corretamente os agentes etiológicos às respectivas manifestações clínicas predominantes.

**Agentes etiológicos      Manifestações clínicas**

- |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> | ( ) Doença fúngica invasiva, com porta de entrada pulmonar, marcada neurotropia, sendo reconhecida como a principal causa de meningoencefalite fúngica em nível mundial.                                                                                                          |
| (2) <i>Cryptococcus neoformans</i>       | ( ) Na forma ocular, a manifestação mais frequente é conjuntivite granulomatosa, podendo ocorrer ainda dacriocistite, ceratite, uveíte, retinite granulomatosa, esclerite, coroidite, endoftalmite e síndrome oculoglandular de Parinaud.                                         |
| (3) <i>Histoplasma capsulatum</i>        | ( ) Infecção frequentemente subclínica em hospedeiros imunocompetentes, residentes em áreas endêmicas, podendo ser identificada tardiamente pela presença de calcificações pulmonares ou hilares.                                                                                 |
| (4) <i>Sporothrix brasiliensis</i>       | ( ) Forma clínica caracterizada por disseminação linfática e hematogênica, com acometimento de cadeias ganglionares regionais, hepatoesplenomegalia, invasão da medula óssea, comprometimento osteoarticular e envolvimento do trato gastrointestinal, incluindo placas de Peyer. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação:

- (2); (3); (1); (4).
- (3); (1); (4); (2).
- (2); (4); (3); (1).
- (1); (4); (3); (2).

- 47) O sarampo é uma doença viral aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea, por meio de aerossóis gerados durante tosse, espirro ou fala. Em ambientes com indivíduos suscetíveis, um único caso pode infectar até 90% das pessoas expostas.

Dessa forma, a vigilância epidemiológica e a vacinação constituem estratégias fundamentais para prevenção, controle e eliminação da doença.

No Brasil, entre janeiro e novembro de 2025, foram confirmados 37 casos de sarampo, todos classificados como importados, sem registro de transmissão autóctone no período.

De acordo com a definição de caso suspeito estabelecida pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- Paciente com febre e exantema maculopapular morbiliforme, de progressão céfalo caudal, associado a tosse, coriza ou conjuntivite, independentemente do estado vacinal.
  - Paciente com esquema vacinal incompleto, apresentando febre e exantema petequial em tronco, associado à artralgia e conjuntivite.
  - Paciente com esquema vacinal incompleto, procedente de área com surto, apresentando febre, tosse, dor torácica e dispneia, sem exantema.
  - Paciente com esquema vacinal completo, procedente de área com surto, com exantema maculopapular e artralgia, sem sintomas respiratórios associados.
- 48) Paciente de 58 anos, em quimioterapia intensiva de indução de remissão para leucemia mieloide aguda, evoluindo com neutropenia grave e persistente (neutrófilos < 100 células/mm<sup>3</sup> há 9 dias), em uso de profilaxia antifúngica com fluconazol, internado há 10 dias para tratamento quimioterápico em regime de internação, por meio de cateter venoso central em subclávia direita.

Durante a internação, apresentou cefaleia progressiva, febre (38,7 °C), visão turva, diplopia, náuseas e vômitos, com rápida evolução para rebaixamento do nível de consciência e instabilidade hemodinâmica, sendo encaminhado à UTI. Durante a intubação orotraqueal, observaram-se lesões compatíveis com candidíase orofaríngea extensa. A tomografia computadorizada de crânio com contraste evidenciou realce meníngeo, e a análise do líquido foi compatível com meningite.

O cateter venoso central foi retirado e coletadas panculturas. Iniciou-se tratamento empírico com vancomicina, meropenem, aciclovir e, após suspensão do fluconazol, anfotericina B lipossomal associada à flucitosina, considerando a hipótese de meningite fúngica em paciente imunossuprimido. O aciclovir foi suspenso no segundo dia após exclusão de etiologia viral. No quarto dia de internação em UTI, hemoculturas e cultura do líquido identificaram *Candida albicans*, sensível ao fluconazol, em ambas as amostras.

Com base no quadro clínico apresentado e nas Diretrizes Globais para o Diagnóstico e Manejo da Candidíase Invasiva (ECMM/ISHAM/ASM), assinale a alternativa **incorreta**.

- Após a identificação de *Candida albicans*, a terapia antifúngica deve ser ajustada para equinocandinas, consideradas a classe de escolha, devendo o tratamento ser mantido até desaparecimento dos sinais e sintomas, normalização do líquido e resolução das alterações de imagem.
  - Em pacientes com leucemia mieloide aguda submetidos à quimioterapia de indução, os azóis são recomendados para profilaxia antifúngica primária, sendo o posaconazol preferido em relação ao fluconazol.
  - Recomenda-se investigação sistemática de disseminação, incluindo ecocardiografia e tomografia computadorizada de abdome. Quando possível, exame de fundo de olho e ressonância magnética de encéfalo deverá ser realizada. Hemoculturas devem ser realizadas diariamente até sua negatificação.
  - A anfotericina B lipossomal associada à flucitosina constitui opção terapêutica adequada para o paciente em questão, na indisponibilidade da formulação lipossomal, a anfotericina B desoxicolato pode ser utilizada, com monitorização rigorosa de toxicidade.
- 49) No contexto da prevenção e controle de infecções em serviços de saúde, o uso adequado de respiradores particulados do tipo PFF2 ou N95 constitui uma medida fundamental para proteção do profissional contra aerossóis potencialmente contaminados. Sobre o uso, a adaptação ao rosto e a conservação desses respiradores, assinale a alternativa correta.
- Os respiradores N95 ou PFF2 devem ser descartados obrigatoriamente após dez utilizações, independentemente das recomendações do fabricante ou das condições de integridade do equipamento.
  - O uso de respiradores PFF2 ou N95 requer treinamento prévio do profissional, pois o equipamento precisa estar adequadamente ajustado ao rosto para garantir vedação e proteção efetiva.
  - A presença de barba ou pelos faciais não interfere na vedação do respirador, sendo a proteção oferecida equivalente à observada em indivíduos sem barba.
  - Caso ocorra retração (tendência ao colapso) da máscara durante a inspiração forçada, isso indica inadequação do respirador, sendo necessária sua substituição imediata.

- 50) A mucormicose (anteriormente denominada zigomicose) compreende um amplo espectro de infecções oportunistas graves causadas por fungos da ordem Mucorales. Embora descritas desde o final do século XIX, observa-se aumento progressivo da incidência nas últimas décadas, especialmente em pacientes imunocomprometidos, o que tem ampliado o interesse clínico e científico sobre essas infecções.

Com base nos conhecimentos atuais sobre epidemiologia, diagnóstico e manejo da mucormicose, analise as assertivas abaixo e informe verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em pacientes diabéticos, a principal via de infecção parece ser a inalação de esporangiósporos, resultando predominantemente em infecção pulmonar.
- ( ) Observa-se menor mortalidade nas formas localizadas da mucormicose, como aquelas restritas aos seios da face ou à pele.
- ( ) Em pacientes diabéticos com suspeita de mucormicose rinossinusal, o achado de destruição óssea à tomografia computadorizada de crânio é raro e tardio; o achado inicial mais comum é sinusite inespecífica, indistinguível da sinusite bacteriana.
- ( ) As diretrizes atuais recomendam terapia antifúngica combinada de rotina, devendo a associação de anfotericina B lipossomal com isavuconazol ser iniciada desde o começo do tratamento.
- ( ) Em pacientes com neutropenia grave e prolongada associada à febre de origem indeterminada, o tratamento da mucormicose deve ser iniciado mesmo quando a febre for a única evidência clínica de infecção.

- a) (V); (V); (V); (F); (F).
- b) (F); (V); (F); (V); (V).
- c) (F); (V); (V); (F); (F).
- d) (V); (F); (F); (V); (V).

- 51) Em um hospital geral, a equipe assistencial consulta o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) sobre a possibilidade de suspender o isolamento respiratório de um paciente internado. Trata-se de um paciente de 35 anos, portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), com diagnóstico de tuberculose pulmonar. O diagnóstico foi estabelecido com base em quadro clínico compatível, achados radiológicos sugestivos e teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) positivo na quarta amostra de escarro, com detecção de sensibilidade à rifampicina. Durante a internação, o paciente realizou cinco baciloscopias de escarro (BAAR) representativas, todas negativas, caracterizando tuberculose pulmonar não bacilífera. O tratamento antituberculose adequado foi iniciado há cinco dias.

De acordo com o Manual de Controle de Infecção por *Mycobacterium tuberculosis* em Serviços de Saúde (Brasil, 2023), assinale a alternativa correta quanto à conduta em relação ao isolamento respiratório desse paciente.

- a) A suspensão do isolamento respiratório deve ocorrer apenas após duas baciloscopias negativas obtidas a partir da segunda semana de tratamento, mesmo em pacientes não bacilíferos.
- b) Pelo fato de o paciente apresentar coinfeção pelo HIV e imunossupressão grave (SIDA), a suspensão do isolamento respiratório somente pode ocorrer após cultura de escarro negativa para *Mycobacterium tuberculosis*.
- c) Por se tratar de tuberculose diagnosticada apenas por teste rápido molecular positivo, sem confirmação por baciloscopia, o isolamento respiratório não está indicado, por se tratar de forma paucibacilar.
- d) A suspensão do isolamento respiratório deve ser avaliada de forma individualizada, considerando a evolução clínica e o contexto assistencial, porém apenas após, no mínimo, duas semanas de tratamento antituberculose adequado, independentemente dos resultados da baciloscopia.

- 52) As micobactérias não tuberculosas (MNT) constituem um grupo heterogêneo de microrganismos ambientais capazes de causar diversas doenças em humanos. Nas últimas décadas, observou-se um aumento do reconhecimento dessas infecções, particularmente das infecções cutâneas e das partes moles associadas a procedimentos estéticos, frequentemente relacionadas a micobactérias de crescimento rápido.

Do ponto de vista microbiológico, as micobactérias podem ser classificadas, entre outros critérios, de acordo com a velocidade de crescimento em cultura, sendo consideradas de crescimento rápido aquelas que formam colônias visíveis em até sete dias.

Assinale a alternativa que apresenta uma micobactéria não tuberculosa de crescimento rápido.

- a) *Mycobacterium marinum*.
- b) *Mycobacterium kansasii*.
- c) *Mycobacterium chelonae*.
- d) *Mycobacterium malmoense*.

- 53) Um paciente de 62 anos é admitido na UTI com choque séptico secundário, uma provável bacteremia associada ao cateter venoso central. Durante a avaliação inicial, observa-se instabilidade hemodinâmica, necessidade de vasopressores e sinais inflamatórios no sítio do cateter. A equipe discute a conduta em relação ao cateter potencialmente infectado.

De acordo com as recomendações da *Surviving Sepsis Campaign 2021*, qual é a conduta mais apropriada em relação ao dispositivo intravascular suspeito de ser o foco infeccioso?

- a) O cateter venoso central deve ser mantido até que o resultado das hemoculturas confirme infecção relacionada ao dispositivo.
  - b) O cateter suspeito deve ser removido prontamente, desde que outro acesso vascular seguro seja estabelecido para continuidade da ressuscitação.
  - c) A remoção do cateter só deve ocorrer após estabilização clínica completa do paciente e negatização das hemoculturas.
  - d) A troca do cateter sobre fio-guia é preferível a remoção completa do dispositivo suspeito de infecção.
- 54) Um paciente de 70 anos é admitido no pronto-socorro com hipotensão arterial, lactato sérico de 5,1 mmol/L, taquicardia e alteração do estado mental, sendo diagnosticado com choque séptico de provável origem pulmonar. Simultaneamente, em outro leito, encontra-se uma paciente de 55 anos, com febre, leucocitose e possível foco urinário, porém sem hipotensão, sem disfunção orgânica evidente e com diagnóstico de infecção ainda incerto.

A equipe discute o momento apropriado para início da antibioticoterapia em ambos os casos.

De acordo com as recomendações da *Surviving Sepsis Campaign 2021*, assinale a alternativa correta.

- a) Em pacientes com suspeita de sepse ou choque séptico, recomenda-se iniciar antibioticoterapia empírica imediatamente em todos os casos, independentemente da probabilidade de infecção ou da presença de disfunção orgânica.
  - b) Em pacientes com choque séptico, recomenda-se iniciar antibióticos o mais rapidamente possível, idealmente dentro da primeira hora após o reconhecimento, enquanto pacientes estáveis com possível infecção podem passar por investigação diagnóstica inicial breve antes da decisão terapêutica.
  - c) Em pacientes com suspeita de sepse ou choque séptico, recomenda-se aguardar confirmação microbiológica da infecção antes do início da antibioticoterapia, a fim de evitar tratamento desnecessário e facilitar a identificação do agente etiológico.
  - d) Em pacientes com suspeita de sepse sem choque ou disfunção orgânica, recomenda-se adiar sistematicamente o início da antibioticoterapia por períodos prolongados, até que o diagnóstico de infecção esteja plenamente estabelecido.
- 55) De acordo com a Instrução Normativa que instrui o Calendário Nacional de Vacinação 2025, a vacina BCG integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e tem como principal objetivo a prevenção das formas graves da tuberculose, especialmente a tuberculose meníngea e a tuberculose miliar em crianças.

Com base nas recomendações vigentes do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta em relação à indicação da vacina BCG no Brasil.

- a) Deve ser aplicada, exclusivamente, no período neonatal, não sendo indicada para crianças que não a receberam no primeiro mês de vida.
  - b) É recomendada apenas até 12 meses de idade, podendo ser administrada de forma excepcional em crianças maiores apenas em áreas endêmicas para tuberculose.
  - c) É indicada em dose única para crianças menores de cinco anos, que não tenham sido previamente vacinadas, com o objetivo de prevenir formas graves da tuberculose.
  - d) Deve ser reaplicada em idade pré-escolar como reforço da imunidade contra tuberculose, conforme orientação do Programa Nacional de Imunizações.
- 56) Um paciente de 41 anos, sem diagnóstico prévio de hepatite viral, realizou exames de rotina após elevação discreta de transaminases. A sorologia revela HBsAg positivo em duas amostras coletadas com intervalo de seis meses.

Considerando as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Hepatite B do Ministério da Saúde, qual interpretação diagnóstica é mais adequada para esse resultado?

- a) O paciente apresenta infecção aguda recente pelo vírus da hepatite B.
- b) O paciente apresenta infecção crônica pelo vírus da hepatite B.
- c) O resultado indica imunidade adquirida após a vacinação contra hepatite B.
- d) O resultado indica infecção passada resolvida pelo vírus da hepatite B.

- 57) Um paciente de 62 anos é admitido na UTI após traumatismo cranioencefálico grave, sendo submetido à intubação orotraqueal para proteção de vias aéreas, sem evidência inicial de infecção respiratória. Permanece em ventilação mecânica invasiva há 5 dias. Durante a evolução, passa a apresentar febre (38,5 °C), aumento de secreção traqueal purulenta e piora da oxigenação, além de novo infiltrado pulmonar em radiografia de tórax.

Considerando os critérios diagnósticos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) descritos na Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 03/2025, qual das alternativas abaixo representa corretamente um elemento necessário para a definição de PAV na vigilância epidemiológica?

- a) Presença de infiltrado pulmonar novo ou progressivo associado a sinais clínicos de infecção em paciente que permaneceu em ventilação mecânica por pelo menos 48 horas.
- b) Confirmação microbiológica obrigatória por cultura quantitativa de aspirado traqueal ou lavado broncoalveolar.
- c) Presença isolada de secreção traqueal purulenta em paciente sob ventilação mecânica invasiva.
- d) Confirmação tomográfica de pneumonia associada à ventilação mecânica antes da notificação epidemiológica.

- 58) Durante uma auditoria de práticas assistenciais em uma UTI, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar observou as seguintes situações envolvendo higienização das mãos por profissionais de saúde.

- I. O médico realiza higienização das mãos com preparação alcoólica imediatamente antes de inserir um cateter venoso periférico, após retirar as luvas utilizadas em outro procedimento.
- II. Enfermeiro utiliza preparação alcoólica após contato com secreção respiratória visível nas mãos durante aspiração traqueal.
- III. Fisioterapeuta realiza higienização das mãos com preparação alcoólica após contato com o paciente e antes de tocar o ventilador mecânico do leito ao lado.
- IV. Técnica de enfermagem realiza lavagem das mãos com água e sabonete líquido, após retirar luvas utilizadas para higiene íntima do paciente com presença de matéria orgânica.

De acordo com as recomendações do Caderno 4 – Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (ANVISA), estão corretas **apenas** as situações apresentadas nas assertivas

- a) I e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

- 59) Durante uma campanha de testagem para hepatites virais na atenção primária, um paciente de 38 anos realizou teste sorológico para anti-HCV, que resulta em reagente. O médico da unidade discute os próximos passos para confirmação diagnóstica da infecção pelo vírus da hepatite C.

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Hepatite C do Ministério da Saúde, qual é a conduta diagnóstica adequada após um resultado reagente para anti-HCV?

- a) Confirmar o diagnóstico de hepatite C, apenas com a presença de anticorpos anti-HCV positivos.
- b) Solicitar exame para detecção do HCV-RNA para confirmar infecção ativa pelo vírus.
- c) Repetir o exame anti-HCV após seis meses para confirmar o diagnóstico.
- d) Realizar genotipagem viral antes de confirmar a presença de infecção ativa.

- 60) Os acidentes por animais peçonhentos representam um importante problema de saúde pública no Brasil. O manejo clínico baseia-se na identificação do animal causador, na avaliação da gravidade clínica e na indicação adequada de soroterapia específica, quando indicada. O tratamento deve ser instituído precocemente, sendo disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta em relação ao manejo do acidente escorpiónico.

- a) A soroterapia com soro antiescorpiónico deve ser indicada em todos os casos, independentemente da gravidade clínica ou da presença de manifestações sistêmicas.
- b) Nos acidentes escorpiónicos leves, caracterizados por dor local sem manifestações sistêmicas, o tratamento consiste principalmente em medidas sintomáticas, não sendo indicada a soroterapia.
- c) O tratamento dos acidentes escorpiónicos deve incluir obrigatoriamente profilaxia antibiótica, devido ao risco elevado de infecção bacteriana secundária no local da picada.
- d) O uso de torniquetes e incisões locais é recomendado como medida inicial para reduzir a disseminação da peçonha antes da chegada ao serviço de saúde.

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO



**EXAME DE ADMISSÃO**  
**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.