

PROVA AZUL

MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

*Concurso Público para Professor do Magistério Superior
e Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
CP-PMS-PEBTT/2026*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

PROVA AZUL

QUESTÃO 1

De acordo com a Nota técnica da Anvisa nº 05/2023, a lesão por pressão e a sua prevenção são consideradas metas de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde. Dessa forma qual é a classificação correta das lesões por pressão?

- (A) Lesão por pressão estágio 1: pele íntegra com área localizada de eritema que embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura.
- (B) Lesão por pressão estágio 3: perda da pele em sua espessura parcial na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epibole não estão presentes.
- (C) Lesão por pressão estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial sem exposição da derme, com leito da ferida viável, de coloração rosa ou vermelha.
- (D) Lesão por pressão estágio 4: perda da pele em sua espessura total e perda tissular sem exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso.
- (E) Lesão por pressão tissular profunda: pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento.

QUESTÃO 2

De acordo com a Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, são atividades privativas do enfermeiro, EXCETO:

- (A) consulta de enfermagem.
- (B) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem.
- (C) prescrição de enfermagem.
- (D) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.
- (E) organização e direção dos serviços de enfermagem.

QUESTÃO 3

De acordo com Brunner e Suddarth (2023), coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo sobre a ausculta cardíaca, assinale a opção correta.

- () Primeira bulha cardíaca é produzida pelo fechamento das valvas semilunares (aórtica e pulmonar).
 - () Segunda bulha cardíaca é produzida pelo fechamento das valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide).
 - () Na terceira bulha cardíaca, o ruído protodiastólico é detectado quando há resistência à entrada de sangue em qualquer ventrículo; mais frequentemente decorre da sobrecarga do volume associada à insuficiência cardíaca.
 - () Na quarta bulha cardíaca, o ruído telediastólico é detectado quando há resistência à entrada de sangue em qualquer ventrículo durante a contração atrial; é mais frequentemente causada por hipertrofia do ventrículo.
- (A) (F) (V) (V) (V)
(B) (V) (V) (V) (V)
(C) (V) (V) (F) (F)
(D) (F) (F) (V) (V)
(E) (F) (V) (F) (V)

QUESTÃO 4

Sobre as Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: diabetes mellitus (DM) (2013), as complicações do DM podem ser classificadas em complicações agudas e crônicas. Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

- (A) As complicações agudas do DM incluem a descompensação hipoglicêmica aguda, com glicemia casual superior a 250 mg/dl.
- (B) A cetoacidose ocorre exclusivamente em pacientes com diabetes mellitus tipo 1.
- (C) A síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de hiperglicemia grave acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose.
- (D) A descompensação hiperglicêmica aguda pode evoluir para complicações mais graves, como cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica e hiperglicemia.
- (E) Síndrome hiperosmolar não cetótica ocorre apenas no diabetes tipo 1, em que um mínimo de ação insulínica preservada pode prevenir a cetogênese.

QUESTÃO 5

De acordo com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012 que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, assinale a opção correta.

- (A) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de nível intermediário, após a limpeza.
- (B) Os produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, a desinfecção de alto nível.
- (C) Os produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
- (D) Os produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária, ou por processo físico de termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente.
- (E) Os produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.

QUESTÃO 6

Com base em Almeida e Reis (2021) o dispositivo intrauterino (DIU) pode ser inserido em qualquer momento do ciclo, desde que haja a certeza de que a mulher não esteja grávida. Sendo assim, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo:

"Em situações de pós-parto, o dispositivo também pode ser inserido por profissionais capacitados, e o momento mais indicado para isso é logo após a expulsão da placenta. Porém, pode ser inserido também a qualquer momento em até _____ após o parto. Passado esse período, deve-se aguardar, pelo menos, _____ semanas."

- (A) 12h / 2 semanas.
- (B) 24h / 2 semanas.
- (C) 48h / 3 semanas.
- (D) 48h / 4 semanas.
- (E) 72h / 4 semanas.

QUESTÃO 7

De acordo com a RDC nº 15/2012, o Centro de Material e Esterilização (CME) Classe II é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. Com relação a essa classificação do CME, assinale a opção correta.

- (A) Deve haver, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos.
- (B) A área de recepção dos produtos não pode estar localizada dentro da sala de recepção e limpeza.
- (C) É obrigatória a separação física da área de recepção e limpeza dos produtos para as demais áreas.
- (D) O dimensionamento da área deve ser efetuado em função da demanda e dos métodos de processamento utilizados.
- (E) A temperatura ambiente da área de limpeza deve ser mantida entre 20° e 24°C.

QUESTÃO 8

Segundo Brunner e Suddarth (2023), a talassemia ocorre em todo o mundo, entretanto a mais alta prevalência é observada em pessoas de ascendência mediterrânea, africana e do sudeste asiático. Sendo assim, as talassemias são um grupo de anemias hereditárias caracterizadas por:

- (A) hipercromia.
- (B) microcitose.
- (C) hipotonia.
- (D) microcefalia.
- (E) hipertermia.

QUESTÃO 9

Conforme a RDC nº222/2018, os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) no estado sólido, quando não houver orientação específica, devem ser acondicionados em sacos impermeáveis e constituídos de material resistente a ruptura e vazamento. Além dessas especificações, com relação ao acondicionamento, assinale a opção correta.

- (A) Os sacos contendo Resíduos dos Serviços de Saúde do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 12 (doze) horas, independentemente do volume.
- (B) O saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o tratamento indiscriminado de todos os RSS do Grupo A, exceto para acondicionamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde do subgrupo A3.
- (C) Quando houver a obrigação do tratamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde do Grupo A, estes devem ser acondicionados em sacos pretos.
- (D) Os rejeitos, tratados ou não, acondicionados em sacos brancos leitosos devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.
- (E) Os Resíduos dos Serviços (RSS) de Saúde do Grupo B que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso.

QUESTÃO 10

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sifilis e Hepatites Virais (2022), o pré-natal do parceiro propõe-se a ampliar o acesso e o acolhimento dos homens nos serviços e programas de saúde e qualificar as práticas de cuidado com sua saúde de maneira geral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, qual teste deve ser ofertado na primeira consulta de pré-natal do homem?

- (A) Testagem para Estreptococo do grupo B.
- (B) Testagem para hepatite A.
- (C) Testagem para Gonorreia.
- (D) Testagem para hepatite C.
- (E) Testagem para Clamídia.

QUESTÃO 11

O manual Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica (HAS) (2014) afirma que a prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, e a consulta de enfermagem está ligada ao processo educativo e deve motivar a pessoa em relação aos cuidados necessários para a manutenção de saúde. Sobre a consulta de enfermagem em pessoas com hipertensão arterial, assinale a opção correta.

- (A) A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco e propõe intervenção educativa em indivíduos com valores de pressão arterial alterados, predispostos à hipertensão.
- (B) A partir da estratificação de risco, selecionam-se indivíduos com maior probabilidade de complicações, os quais se beneficiarão de intervenções mais básicas.
- (C) A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos cinco anos.
- (D) Nas consultas de enfermagem, o foco do processo educativo será para orientação daquelas medidas que comprovadamente reduzem a pressão arterial, entre elas: hábitos alimentares adequados e exercícios físicos irregulares.
- (E) Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham.

QUESTÃO 12

De acordo com a instrução normativa do calendário nacional de vacinação (2025), a vacina Covid-19 é indicada para a prevenção das formas graves e óbitos por Covid-19, infecção causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Sobre isso, assinale a opção que relaciona corretamente o fabricante e a dose de acordo com a idade.

- (A) Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) - 7 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade: dose de 0,3 ml.
- (B) Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) - 6 anos a 11 anos, 12 meses e 29 dias de idade: dose de 0,5 ml (frasco-ampola tampa cor azul/não diluir).
- (C) Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) - 6 meses a 11 anos, 12 meses e 29 dias de idade: dose de 0,5 ml.
- (D) Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) - 12 anos de idade e mais: dose de 0,3 ml (frasco-ampola tampa cor cinza/não diluir).
- (E) Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) - 13 anos, 11 meses e 29 dias de idade e mais: dose 0,3 ml.

QUESTÃO 13

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2022), a Profilaxia Pós-Exposição, quando indicada, é uma das estratégias de prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e deve ser realizada em até:

- (A) 120h
- (B) 96h.
- (C) 72h.
- (D) 48h.
- (E) 24h.

QUESTÃO 14

Sobre o monitoramento do processo de esterilização, com base na RDC nº 15, de 15 de março de 2012, assinale a opção correta.

- (A) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 4 ou 5), segundo rotina definida pelo próprio Centro de Material e Esterilização ou pela empresa processadora.
- (B) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada carga esterilizada.
- (C) O monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico, a cada ciclo de esterilização.
- (D) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito semanalmente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo Centro de Material e Esterilização ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de menor desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.
- (E) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo Centro de Material e Esterilização ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.

QUESTÃO 15

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (2005), que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, assinale a opção correta.

- (A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- (B) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.
- (C) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas não devem conter lavatório em seu interior.
- (D) Os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos não devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
- (E) O empregador deve permitir a guarda e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

QUESTÃO 16

Segundo as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), qual é a dose preconizada de Amiodarona em bólus na RCP em pediatria?

- (A) 6 mg/kg.
- (B) 7 mg/kg.
- (C) 5 mg/kg.
- (D) 8 mg/kg.
- (E) 9 mg/kg.

QUESTÃO 17

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (2022), a contracepção de emergência tem como objetivo evitar a ocorrência de gravidez não planejada logo após relação sexual desprotegida ou falha de um método contraceptivo. Esse método deve ser ofertado tanto nas relações consentidas quanto nas situações de violência sexual. Sendo assim, a contracepção de emergência pode ser administrada em até?

- (A) 124 horas após a relação sexual desprotegida.
- (B) 130 horas após a relação sexual desprotegida.
- (C) 126 horas após a relação sexual desprotegida.
- (D) 120 horas após a relação sexual desprotegida.
- (E) 133 horas após a relação sexual desprotegida.

QUESTÃO 18

De acordo com a Nota Técnica da ANVISA nº 05/2023, cabe aos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) dos serviços de saúde, EXCETO:

- (A) manter o sistema de vigilância, monitoramento, prevenção e mitigação de incidentes relacionados à assistência à saúde, especialmente das lesões por pressão.
- (B) conduzir um processo de investigação, em conjunto com outras instâncias do serviço de saúde, de forma a identificar os fatores contribuintes que levaram à ocorrência do evento, com objetivo de corrigir o processo e não culpabilizar as pessoas envolvidas no evento.
- (C) transferir para cada setor responsável a necessidade de notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) os incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo as lesões por pressão ocorridas na instituição, por meio do sistema Notivisa.
- (D) reforçar o sistema de vigilância, monitoramento e investigação de incidentes relacionados à assistência à saúde, além de Never events e óbitos ocorridos na instituição.
- (E) seguir as orientações para notificação de incidentes, disponíveis no manual da Anvisa intitulado "Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente".

QUESTÃO 19

Com base nas Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (2017), em relação às recomendações sobre sistemas de infusão, assinale a opção correta.

- (A) Deve-se realizar desinfecção dos conectores apenas ao final do plantão, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica, de 5 a 15 segundos.
- (B) Deve ser realizada somente a manutenção corretiva das bombas de infusão.
- (C) Os filtros de linha não devem ser utilizados com o propósito de prevenir infecção.
- (D) Os equipos de administração contínua devem ser trocados a cada 24 horas.
- (E) Os conectores não devem ser trocados imediatamente em caso de desconexão do cateter ou sistema de infusão, presença de sangue ou outra sujidade.

QUESTÃO 20

De acordo com o manual sobre a Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento (2010), cabe aos gestores em todos os níveis, de forma articulada e conforme suas competências específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito dessa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Nesse contexto, assinale a opção correta sobre a responsabilidade do Gestor Federal.

- (A) Exercer a vigilância sanitária no tocante à saúde da pessoa idosa e às ações decorrentes no seu âmbito.
- (B) Apresentar e aprovar proposta de inclusão da política nacional de saúde da pessoa idosa no conselho estadual de saúde.
- (C) Estimular pesquisas nas áreas de interesse do envelhecimento e da atenção à saúde da pessoa idosa, nos moldes do propósito e das diretrizes dessa política.
- (D) Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a serem alcançadas por essa política a cada ano.
- (E) Apresentar e aprovar proposta de inclusão da política de saúde da pessoa idosa no conselho municipal de saúde.

QUESTÃO 21

Segundo o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental (2013), os efeitos extrapiramidais (impregnação motora) são efeitos indesejados mais comuns em qual das principais classes de medicamentos?

- (A) Antidepressivos.
- (B) Estabilizadores de humor.
- (C) Estabilizadores do sono.
- (D) Benzodiazepínicos.
- (E) Neurolépticos.

QUESTÃO 22

Conforme Brunner e Suddarth (2023), existem alterações fisiológicas normais do sistema digestório que ocorrem com o envelhecimento. Sendo assim, assinale a opção que apresenta a alteração no sistema digestório relacionado com a idade.

- (A) Aumento da produção de saliva.
- (B) Fortalecimento do reflexo do vômito.
- (C) Aumento de ptialina e amilase na saliva.
- (D) Aumento da motilidade e esvaziamento.
- (E) Diminuição da pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior.

QUESTÃO 23

De acordo com o manual de gestação de alto risco (2022), as síndromes hipertensivas são a intercorrência clínica mais comum da gestação e representam a principal causa de morbimortalidade materna no mundo. Sobre a pré-eclâmpsia, analise as afirmativas e assinale a opção INCORRETA.

- (A) Identificação de hipertensão arterial, em gestante previamente normotensa, a partir da 20ª semana de gestação, associada à proteinúria significativa indica pré-eclâmpsia.
- (B) Presença de pelo menos 300 mg em urina de 24 horas indica pré-eclâmpsia.
- (C) O sulfato de magnésio é o anticonvulsivante de escolha a ser administrado.
- (D) No pós-parto imediato, deve-se manter o controle da pressão arterial, estar atento aos sinais/sintomas de iminência de eclâmpsia e às alterações laboratoriais que indiquem síndrome HELLP.
- (E) Todos os casos de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade merecem internação hospitalar para acompanhamento e redução de danos.

QUESTÃO 24

De acordo com a instrução normativa do calendário nacional de vacinação (2025), qual das opções abaixo é a recomendação correta da vacina BCG para crianças expostas ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) ?

- (A) A criança que chegar ao serviço até 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ainda não vacinada, deverá receber BCG.
- (B) Deve-se administrar ao nascimento ou o mais precocemente possível.
- (C) A partir dos 5 anos de idade, pessoa que vive com HIV deve ser vacinada, mesmo que assintomática e sem sinais de imunodeficiência.
- (D) A criança que chegar ao serviço até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ainda não vacinada, deverá receber BCG se estiver sintomática.
- (E) A criança que chegar ao serviço até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ainda não vacinada, deverá receber BCG se estiver com sinais de imunodepressão, mesmo sem prescrição médica.

QUESTÃO 25

Segundo Brunner e Suddarth (2023), a síndrome do túnel do carpo consiste em uma neuropatia por pinçamento que ocorre quando o nervo mediano no punho é comprimido por uma bainha de tendão flexor espessada, invasão esquelética, edema ou massa de tecido mole. Cabe ao enfermeiro instruir o paciente de que:

- (A) ao dormir, nunca deve apoiar o braço afetado sobre travesseiros para não se deitar sobre ele durante o sono.
- (B) deve realizar sempre movimentos e carregar peso com o braço acima da cabeça ou empurrar um objeto contra um ombro "bloqueado".
- (C) deve evitar totalmente o movimento e o uso da articulação, pode ser necessário ajuda para vestir-se e realizar outras atividades de vida diária.
- (D) deve repousar a articulação em uma posição que minimize o estresse sobre as estruturas articulares para evitar danos adicionais e o desenvolvimento de aderências.
- (E) não deve realizar diariamente os exercícios prescritos de amplitude de movimento e fortalecimento.

QUESTÃO 26

O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos, legais e técnicos-científicos. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), é um direito:

- (A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (B) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica
- (C) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional.
- (D) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (E) recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem assinatura e número do registro profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

QUESTÃO 27

Segundo Brunner e Suddarth (2023), o lúpus eritematoso sistêmico é um distúrbio autoimune inflamatório que afeta quase todos os órgãos do corpo. Acredita-se que o distúrbio imunorregulatório seja ocasionado por alguma combinação de quatro fatores distintos, são eles:

- (A) neurológicos, humorais, intrínsecos e esqueléticos.
- (B) naturais, físicos, neurológicos e musculares.
- (C) genéticos, imunológicos, hormonais e ambientais.
- (D) embrionários, químicos, fisiológicos e intrínsecos.
- (E) respiratórios, físicos, neurais e linfáticos .

QUESTÃO 28

O Herpes Zoster é uma doença vesicular, viral autolimitada, que apresenta diversas características clínicas conforme descrito no guia de bolso Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010). Sobre o assunto, assinale a opção correta.

- (A) Possui ciclo evolutivo de, aproximadamente, 15 dias, e acomete exclusivamente crianças e adolescentes.
- (B) O surgimento do Herpes Zoster não apresenta relação com a queda da imunidade.
- (C) O Herpes Zoster é decorrente de um vírus diferente da varicela.
- (D) Embora a dor melhore gradativamente, nos idosos pode permanecer por meses ou anos após o final do quadro cutâneo, caracterizando a neuralgia pós-herpética.
- (E) Alguns tratamentos podem reverter os danos causados pelo zoster.

QUESTÃO 29

Dentre as penalidades previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), assinale a opção correta.

- (A) Advertência por escrito.
- (B) Suspensão do exercício profissional por até 120 dias.
- (C) Multa de 1 a 12 vezes o valor da anuidade.
- (D) Censura.
- (E) Cassação do direito ao exercício profissional por até 20 anos.

QUESTÃO 30

De acordo com a Instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação (2025), a Vacina Tetraviral é indicada para prevenção de quais doenças?

- (A) Sarampo, caxumba, rubéola, difteria e varicela.
- (B) Caxumba, sarampo, rubéola, difteria e síndrome da rubéola congênita.
- (C) Sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita e varicela.
- (D) Sarampo, caxumba, difteria, síndrome da rubéola congênita e varicela.
- (E) Sarampo, rubéola, síndrome da rubéola congênita, difteria e varicela.

QUESTÃO 31

Conforme o Manual sobre atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento (2010), a caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta de identificação de situações de riscos potenciais para a saúde e traz ao profissional de saúde a possibilidade de:

- (A) planejar e organizar ações de prevenção, promoção e recuperação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde.
- (B) planejar e organizar ações de prevenção, educação e recuperação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde.
- (C) planejar e organizar ações de prevenção, promoção e reanimação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde.
- (D) planejar e organizar ações de preservação, promoção e recuperação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde.
- (E) planejar e organizar ações de prevenção, prorrogação e recuperação, objetivando a manutenção da capacidade funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde.

QUESTÃO 32

Segundo o Manual de gestação de alto risco (2022), o acrônimo HELLP significa hemólise, aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. A fisiopatologia dessa doença não está esclarecida, mas é considerada como o comprometimento hepato-hematológico da pré-eclâmpsia. Com relação a essa síndrome, assinale a opção correta.

- (A) A infusão de líquidos deve ser realizada de forma livre.
- (B) A interrupção da gestação é indicada dependendo da idade gestacional.
- (C) A diurese deverá ser controlada e mantida acima de 20 ml/h.
- (D) Dor em hipocôndrio esquerdo deve ser valorizado.
- (E) A trombocitopenia é a principal e mais precoce modificação laboratorial.

QUESTÃO 33

De acordo com a Resolução nº 36/2013 que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a opção correta.

- (A) Cultura da segurança: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- (B) Dano: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- (C) Incidente: circunstância que não resulta em dano grave à saúde.
- (D) Evento adverso: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- (E) Gestão de risco: ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.

QUESTÃO 34

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2024), com relação aos imunobiológicos disponíveis no Sistema Único de Saúde, suas características e especificidades, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis - DTP é composta pela combinação de toxoides purificados de difteria e tétano e suspensão celular inativada de Bordetella pertussis (células inteiras). O primeiro reforço deve ser administrado aos 15 meses de vida e o segundo, aos 4 anos de idade.
- (B) Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP é indicada para prevenir contra a poliomielite causada por vírus dos tipos 1, 2 e 3. Essa vacina é administrada em esquema de três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, por via oral.
- (C) Vacina meningocócica B é constituída por polissacarídeos capsulares purificados da Neisseria meningitidis do sorogrupo C. Deve-se administrar aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. O primeiro reforço é aos 12 meses de idade.
- (D) Vacina febre amarela é composta de polissacarídeos capsulares da febre amarela. Deve-se administrar uma dose aos 9 meses de vida, e uma dose de reforço aos 4 anos de idade.
- (E) Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) é composta por vírus ativo, indicada para a prevenção da infecção contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, a fim de prevenir contra os cânceres do colo do útero, além de doenças relacionadas ao HPV.

QUESTÃO 35

Segundo as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) (2020), assinale a opção com a recomendação correta.

- (A) A importância do início imediato da RCP por socorristas leigos não tem sido mais enfatizada.
- (B) O uso de dispositivos de feedback visual em tempo real não é recomendado como forma de manter a qualidade da RCP.
- (C) Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial é recomendado.
- (D) O acesso intraósseo (IO) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação. Acesso intravenoso (IV) é aceitável se o acesso IO não estiver disponível.
- (E) Como a reabilitação pós RCP continua muito tempo depois da hospitalização inicial, os pacientes devem ter avaliação e suporte formais para suas necessidades físicas, cognitivas e psicossociais.

QUESTÃO 36

De acordo com o manual de atenção ao pré-natal de baixo risco (2012), o oligodrâmnio caracteriza-se pela acentuada diminuição do volume do líquido amniótico. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A morbimortalidade perinatal torna-se ampliada em decorrência da associação do oligodrâmnio com anomalias congênitas.
- (B) O oligodrâmnio se relaciona, frequentemente, com resultado perinatal favorável.
- (C) Não haverá suspeita da patologia quando a altura uterina for inferior àquela esperada para a idade gestacional estimada.
- (D) É diagnosticado quando o volume se apresenta inferior a 250 ml, entre a 21ª e a 42ª semanas gestacionais.
- (E) Ocorre por erro no mecanismo de circulação, de produção, por dificuldade de absorção ou pela associação desses fatores.

QUESTÃO 37

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, sobre o aleitamento materno, segundo o manual de Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar (2015) e assinale a opção correta.

- () Estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo, por causas preveníveis.
- () A proteção do leite materno contra infecções respiratórias é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros seis meses.
- () Oferecer à criança amamentada água ou chás, é uma prática a ser considerada para prevenir o risco de diarreia nos primeiros seis meses.
- () O indivíduo que é amamentado adquire proteção contra diabetes, entretanto a mulher que amamenta não possui essa proteção.
- () Quanto maior o tempo em que o indivíduo for amamentado, menor será a chance de ele vir a apresentar sobrepeso/ obesidade.

- (A) (V) (F) (V) (F) (V)
- (B) (V) (V) (F) (F) (V)
- (C) (F) (V) (F) (V) (V)
- (D) (V) (V) (F) (V) (F)
- (E) (F) (F) (V) (F) (V)

QUESTÃO 38

De acordo com a Resolução COFEN n° 736/2024, assinale a opção que apresenta a etapa do processo de enfermagem que deverá envolver a priorização de Diagnósticos de Enfermagem, determinação de resultados e a prescrição de enfermagem.

- (A) Diagnóstico de Enfermagem.
- (B) Avaliação de Enfermagem.
- (C) Planejamento de Enfermagem.
- (D) Evolução de Enfermagem.
- (E) Implementação de Enfermagem.

QUESTÃO 39

A hipertermia maligna (HM) é uma complicação anestésica potencialmente fatal e caracteriza-se por um estado hipermetabólico das células musculoesqueléticas que é ativado pela anestesia. Segundo Potter e Perry (2024), assinale a opção que apresenta os sinais precoces da hipertermia maligna.

- (A) Taquipneia, taquicardia e hipotensão.
- (B) Arritmias cardíacas, hiporpotassemia e hipercapnia.
- (C) Arritmias cardíacas, taquicardia e rigidez muscular.
- (D) Rigidez muscular, arritmias cardíacas e hiporpotassemia.
- (E) Hipertermia, arritmias cardíacas e hiporpotassemia.

QUESTÃO 40

A Norma Regulamentadora n° 32 (2005) classifica os agentes biológicos em classes de risco. Os agentes biológicos com risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, que podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento, são classificados como classe de risco:

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

QUESTÃO 41

Dentre as complicações hemorrágicas potencialmente ameaçadoras da vida em uma gestação de alto risco descritas no manual de gestação de alto risco (2022), assinale a opção correta.

- (A) Descolamento prematuro de placenta, Placenta prévia/acreta/increta/percreta, Gravidez ectópica, Rotura uterina e Insuficiência respiratória aguda.
- (B) Edema pulmonar, Convulsões, Sepses grave, Pré-eclâmpsia grave, Eclâmpsia e Transfusão de hemoderivados.
- (C) Descolamento prematuro de placenta, Placenta prévia/acreta/increta/percreta, Gravidez ectópica, Convulsões e Sepses grave.
- (D) Hipertensão grave, Síndrome HELLP, Placenta prévia/acreta/increta/percreta, Hemorragia pós-parto e Insuficiência respiratória aguda.
- (E) Descolamento prematuro de placenta, Placenta prévia/acreta/increta/percreta, Gravidez ectópica, Rotura uterina, Hemorragia grave por aborto e Hemorragia pós-parto.

QUESTÃO 42

De acordo com o manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso (2010), a dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave. Qual é o fator determinante nos casos graves da Dengue?

- (A) Cefaleia.
- (B) Extravasamento plasmático.
- (C) Dor retro-orbitária.
- (D) Epistaxe.
- (E) Gengivorragia.

QUESTÃO 43

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação ao que deve-se priorizar durante a ressuscitação cardiopulmonar em pacientes gestantes, de acordo com as Diretrizes de 2020 da *American Heart Association* (AHA) e assinale a opção correta.

- () Monitorização fetal.
 - () Oxigenação e manejo da via aérea da gestante.
 - () Alívio da compressão aortocaval com deslocamento uterino lateral.
- (A) (F) (V) (V)
 - (B) (V) (V) (V)
 - (C) (V) (V) (F)
 - (D) (F) (F) (F)
 - (E) (F) (V) (F)

QUESTÃO 44

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2022), assinale a opção correta sobre a doença e o teste a ser realizado pela gestante para prevenir a transmissão vertical de infecções e outros agravos.

- (A) Realizar o teste para Sífilis somente início do terceiro trimestre (28ª semana) e no momento do parto ou aborto e independentemente de exames anteriores.
- (B) Realizar o teste para Hepatite B na primeira consulta do pré-natal. Se o resultado for reagente e se constar histórico de vacinação prévia, recomenda-se a vacinação.
- (C) Realizar o teste para Gonorreia e infecção por clamídia na primeira consulta do pré-natal em gestantes com idade menor ou igual a 30 anos.
- (D) Realizar o teste para Vaginose bacteriana no início do terceiro trimestre (28ª semana) em mulheres com alto risco de trabalho de parto pós-termo.
- (E) Realizar o teste para Estreptococo do grupo B da 32ª a 34ª semana gestacional. Realizar coleta de amostra sanguínea.

QUESTÃO 45

Conforme Nota técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 05/2024: Orientações gerais para higiene das mãos em serviços de saúde, recomenda-se o uso de luvas nos serviços de saúde por duas razões fundamentais. Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que apresenta pelo menos uma dessas razões.

- (A) Inibir o risco de disseminação de microrganismos no ambiente e de transmissão do profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro.
- (B) Reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais.
- (C) Reduzir a multiplicação da microbiota residente da pele das mãos da equipe cirúrgica, durante o procedimento, caso ocorra perfuração da luva cirúrgica, sem ser notada.
- (D) Eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente da pele das mãos e dos antebraços dos profissionais.
- (E) Inibir o crescimento da microbiota residente sob as mãos enluvadas, durante o procedimento cirúrgico, por meio da atividade persistente dos produtos antissépticos degermantes ou produto à base de álcool.

QUESTÃO 46

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, citada no manual de atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento (2010), estabelece diretrizes e objetivos voltados para a pessoa idosa. Assinale a opção correta sobre esse assunto.

- (A) É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 65 anos ou mais de idade.
- (B) Tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa.
- (C) O documento básico denominado Plano de Madri tem como um dos fundamentos desconsiderar a participação social dos idosos.
- (D) A PNSPI é voltada apenas para ações hospitalares de alta complexidade.
- (E) A finalidade principal é o tratamento de doenças crônicas da pessoa idosa.

QUESTÃO 47

Conforme Brunner e Suddarth (2023), assinale a opção que apresenta o fator que inibe a consolidação de uma fratura.

- (A) Idade maior que 40 anos.
- (B) Corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroides.
- (C) Necrose vascular.
- (D) Alcoolismo.
- (E) Intoxicação.

QUESTÃO 48

Segundo o Manual sobre estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus (DM) (2013), assinale a opção correta sobre valores da glicemia em jejum, preconizados para o diagnóstico de DM tipo 2.

- (A) Glicemia normal <112 .
- (B) Glicemia alterada >110 e <128.
- (C) Glicemia normal <130.
- (D) Glicemia normal <114 .
- (E) Glicemia alterada >110 e <126.

QUESTÃO 49

A vacina contra rubéola foi introduzida no final da década de 1960 e embora a incidência da doença tenha diminuído nos anos 1990, os surtos continuam a ocorrer em diversas partes do mundo, elevando a síndrome da rubéola congênita (SRC) a uma importante preocupação de saúde pública mundial. De acordo com o Manual de gestação de alto risco (2022), assinale a opção INCORRETA.

- (A) A SRC tem potencial altamente nocivo ao feto, elevando o risco de abortamentos espontâneos, infecção fetal, restrição de crescimento fetal e até óbito do concepto.
- (B) A transmissão materno-fetal ocorre pela via hematogênica e é influenciada pela idade gestacional.
- (C) Quanto mais precoce a idade gestacional, mais elevadas são as taxas de malformações congênitas.
- (D) O feto infectado é capaz de produzir anticorpos específicos da classe IgM e IgG para Rubéola, antes mesmo do nascimento.
- (E) A penicilina é a droga de escolha para tratamento.

QUESTÃO 50

De acordo com a Resolução COFEN nº 736/2024, assinale a opção que apresenta as cinco etapas do processo de enfermagem na ordem correta.


- (A) Coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de enfermagem.
- (B) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem.
- (C) Coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
- (D) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem, planejamento de enfermagem e evolução de enfermagem.
- (E) Avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas: o caderno é composto por uma prova escrita objetiva com **50 questões** de múltipla escolha.
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 6 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 7 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **120 minutos**.
- 8 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 9 - Escreva e assinie corretamente seu nome completo, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

 - a) use caneta esferográfica azul ou preta de material transparente;
 - b) escreva seu nome completo, sem abreviaturas, em letra legível no local indicado;
 - c) assinie seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

- * Não rasure esta folha.
- * Não rabisque nas áreas de respostas.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO					DV	P	Q
5	7	0	2	7	0	2	4

12 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	

T
A
R
J
A

- 11 - Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 - O modelo de gabarito somente poderá ser destacado **PELO FISCAL** e após a entrega definitiva da prova pelo candidato. Caso o modelo de gabarito seja destacado pelo candidato, este será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50