



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

003. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: CIRURGIA DE MÃO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____ Inscrição _____ Prédio _____ Sala _____ Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofrera um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.
 - (B) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
 - (C) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - (D) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
 - (E) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.
02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
 - (B) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
 - (C) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
 - (D) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
 - (E) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.
03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.
- (A) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.
 - (B) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
 - (C) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.
 - (D) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.
 - (E) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.

- 04.** A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
 - (B) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
 - (C) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
 - (D) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
 - (E) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.
- 05.** Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).
- (A) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.
 - (B) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
 - (C) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
 - (D) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.
 - (E) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
- 06.** A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.
- (A) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
 - (B) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
 - (C) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.
 - (D) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
 - (E) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
- 07.** Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.
- (A) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.
 - (B) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
 - (C) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
 - (D) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.
 - (E) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.

- 08.** Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
 - (B) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
 - (C) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
 - (D) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
 - (E) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
- 09.** Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
 - (B) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
 - (C) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
 - (D) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
 - (E) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
- 10.** Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) grave e de alta letalidade.
 - (B) sem gravidade e com tendência à cronificação.
 - (C) de transmissão sexual e de alta letalidade.
 - (D) altamente transmissível e de curta duração.
 - (E) de média transmissibilidade e de longa duração.
- 11.** Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
 - (B) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
 - (C) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.
 - (D) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.
 - (E) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.

- 12.** Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (B) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
- (C) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (D) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
- (E) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- 13.** Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
- (B) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (C) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
- (D) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
- (E) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- 14.** Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.
- (B) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.
- (C) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.
- (D) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.
- (E) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.

- 15.** Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.
- (A) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
 - (B) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
 - (C) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
 - (D) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.
 - (E) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.
- (A) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
 - (B) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
 - (C) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
 - (D) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.
 - (E) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
- 17.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
 - (B) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.
 - (C) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.
 - (D) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.
 - (E) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
 - (B) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
 - (C) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
 - (D) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
 - (E) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (B) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
 - (C) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
 - (D) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
 - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) pessoas entre 18 e 60 anos.
 - (B) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
 - (C) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.
 - (D) mulheres com doenças crônicas.
 - (E) crianças com doenças congênitas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21.** Na aplicação do torniquete no membro superior, qual o valor que deve ser utilizado?
- (A) 100 mm Hg acima da pressão sistólica do paciente.
 - (B) Deve ser igual a pressão sistólica do paciente.
 - (C) 200 mm Hg acima da pressão diastólica do paciente.
 - (D) Deve ser igual a pressão diastólica do paciente.
 - (E) 150 mm Hg acima da pressão sistólica do paciente.
- 22.** Assinale a alternativa que apresenta uma deformidade que é consequência de uma contratura estabelecida de Volkmann.
- (A) Supinação do antebraço.
 - (B) Extensão do punho.
 - (C) Abdução do polegar.
 - (D) Extensão do cotovelo.
 - (E) Pronação do antebraço.
- 23.** Na mão reumatoide, a síndrome de Vaughan-Jackson refere-se à
- (A) rotura do tendão extensor longo do polegar no tubérculo de Lister.
 - (B) deformidade de ambos os polegares do tipo II.
 - (C) deformidade ulnar do punho com abdução do polegar.
 - (D) rotura do tendão extensor do quinto dedo e, na sequência, a rotura do tendão extensor do quarto dedo.
 - (E) rotura do tendão flexor do polegar e extensor do segundo dedo.
- 24.** Assinale a alternativa correta com relação ao sarcoma de Ewing quando acomete a mão.
- (A) O dedo em gatilho ocorre comumente.
 - (B) Há leucopenia e aumento do valor do VHS.
 - (C) É frequente a confusão com quadro infeccioso.
 - (D) Incide com maior frequência em pacientes na quarta e quinta décadas de vida.
 - (E) É mais frequente em mulheres.
- 25.** Os músculos lumbricais da mão, laterais e mediais, são inervados respectivamente pelos nervos
- (A) interósseo posterior e ulnar.
 - (B) interósseo posterior e mediano.
 - (C) radial e ulnar.
 - (D) radial e mediano.
 - (E) mediano e ulnar.
- 26.** Após a redução incruenta de uma fratura de rádio distal fechada, realizada em um paciente de 62 anos de idade, que apresenta inclinação radial de 15 graus no raio-X, é correto afirmar que, considerando esse valor, a redução está
- (A) adequada e o paciente deve ser tratado com gesso axilo palmar.
 - (B) adequada e o paciente deve ser tratado com tala gessada antebraquio palmar para evitar a síndrome compartimental.
 - (C) inadequada e o paciente deve ser tratado com cirurgia com fixador externo.
 - (D) inadequada e o paciente deve ser tratado com cirurgia e fixação com placa e parafusos.
 - (E) adequada e o paciente deve ser tratado com gesso antebraquio palmar.
- 27.** Sobre o reimplante do dedo, qual a ordem correta de reparo das estruturas?
- (A) Tendões flexores, tendões extensores e veias.
 - (B) Artérias, nervos e veias.
 - (C) Artérias, veias e nervos.
 - (D) Veias, nervos e artérias.
 - (E) Tendões extensores, tendões flexores e nervos.
- 28.** No tratamento da tríade terrível do cotovelo, qual a lesão ligamentar que sempre acompanha essa tríade e que deve ser obrigatoriamente reparada para uma maior chance de um resultado funcional satisfatório?
- (A) Lesão do ligamento de Panner.
 - (B) Lesão do ligamento colateral ulnar.
 - (C) Lesão do ligamento anular.
 - (D) Lesão do ligamento colateral lateral.
 - (E) Lesão do ligamento colateral acessório.

29. Em uma instabilidade do carpo devido a uma dissociação lunato-piramidal, qual o tipo de instabilidade esperado no raio-X do punho?
- (A) *Proximal translation* (PT).
 - (B) *Axial ulnar instability*.
 - (C) *Radial translation* (RT).
 - (D) *Volar intercalated segment instability* (VISI).
 - (E) *Dorsal intercalated segment instability* (DISI).
30. No paciente portador de paralisia cerebral, uma deformidade em flexão do tipo 1 do punho e dedos é uma deformidade
- (A) na qual o punho apresenta menos de 20 graus de deformidade em flexo, com extensão ativa dos dedos.
 - (B) na qual o punho apresenta mais de 20 graus de deformidade em flexo, com extensão ativa dos dedos.
 - (C) em que o punho é normal, porém os dedos possuem deformidade em flexão.
 - (D) que apresenta extensão ativa dos dedos com o punho em flexão máxima.
 - (E) na qual o punho apresenta mais de 20 graus de deformidade em flexo, com os dedos sem extensão ativa.
31. Na fratura de Bennett o desvio ocorre pela ação de dois músculos que são o
- (A) abdutor curto do polegar e adutor do polegar.
 - (B) flexor longo do polegar e abdutor longo do polegar.
 - (C) abdutor longo do polegar e adutor do polegar.
 - (D) abdutor curto do polegar e flexor curto do polegar.
 - (E) oponente do polegar e abdutor longo do polegar.
32. Um paciente que sofreu um acidente caindo da moto apresenta uma lesão fechada do plexo braquial. Nesse contexto, qual a conduta correta?
- (A) Havendo uma fratura na região do ombro que necessite de cirurgia, o plexo deve ser abordado no mesmo tempo cirúrgico.
 - (B) A mielografia é um exame a ser solicitado logo após a lesão.
 - (C) Havendo, na eletroneuromiografia (ENMG), evidência de lesão das raízes de C5 e C6 a chance de retorno de função é mínima e deve ser informada ao paciente.
 - (D) Explorar a lesão cirurgicamente, com 2 meses, não havendo retorno total da função.
 - (E) Realizar ENMG no período de 3 a 4 semanas após a lesão.
33. Ao realizar a artrodese do punho em um paciente que não é portador de artrite reumatoide, a posição desejável é
- (A) em neutro, com desvio ulnar moderado.
 - (B) de 10 a 15 graus de extensão e leve desvio ulnar.
 - (C) de 10 a 25 graus de flexão e leve desvio ulnar.
 - (D) de 40 a 45 graus de extensão para facilitar a preensão.
 - (E) de 20 a 30 graus de flexão e leve desvio radial.
34. A deformidade de Kirner é uma anomalia congênita da mão. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.
- (A) É mais frequente em indivíduos do sexo masculino.
 - (B) É normalmente unilateral.
 - (C) Trata-se de uma deformidade radial da falange proximal do quinto dedo.
 - (D) É comum em crianças de 8 a 10 anos de idade.
 - (E) Trata-se de uma deformidade que acomete a falange média do quarto dedo.
35. Na classificação da osteomielite subaguda, o tipo 3 corresponde à
- (A) lesão cortical diafisária.
 - (B) lesão metafisária excêntrica.
 - (C) lesão diafisária com formação de osso, porém sem lesão definida.
 - (D) lesão metafisária central.
 - (E) osteomielite primária epifiseal.
36. Um paciente do sexo feminino, sem patologias prévias, portador da doença de Dupuytren, apresenta uma deformidade de contratatura de 30 graus da interfalangeana proximal (IFP) do quinto dedo e de 10 graus na metacarpo falangeana (MTC-F). Com base nos dados relatados, como proceder no tocante ao seu tratamento?
- (A) O valor da deformidade na MTC-F já indica a necessidade de cirurgia.
 - (B) Normalmente o paciente tolera bem essa deformidade, devendo ser observado.
 - (C) Deve ser recomendada a amputação, preservando a base da falange média.
 - (D) Cirurgia, nesse caso, produz resultados melhores e mais consistentes pelo sexo da paciente.
 - (E) Deve ser recomendada a desarticulação no nível da IFP.

37. Sobre o quiasma de Camper, qual a alternativa correta?
- (A) Vital para a função do tendão flexor superficial dos dedos.
 - (B) Localiza-se na zona I dos flexores.
 - (C) Localiza-se na zona II dos flexores.
 - (D) Age como uma polia anular, estabilizando o tendão flexor superficial.
 - (E) É o local onde o tendão flexor profundo divide-se em dois.
38. Ao realizar a artrodese da interfalangeana proximal do terceiro e do quinto dedos da mão, quais os ângulos ideais de posicionamento, respectivamente?
- (A) 40 e 40 graus.
 - (B) 30 e 70 graus.
 - (C) 30 e 30 graus.
 - (D) 25 e 50 graus.
 - (E) 40 e 60 graus.
39. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma indicação para artrodese escafo-capitato.
- (A) Sequela de fratura de Galeazzi com instabilidade crônica da articulação rádio ulnar distal.
 - (B) Artrose severa da articulação do trapézio com a base do primeiro metacarpo.
 - (C) Colapso avançado não-união do escafoide (SNAC).
 - (D) Doença de Kienböck.
 - (E) Artrite reumatoide.
40. Na classificação de Palmer para as lesões do complexo da fibrocartilagem triangular, qual o tipo que apresenta uma lesão com avulsão da ulna?
- (A) Traumática do tipo C.
 - (B) Traumática do tipo D.
 - (C) Degenerativa do tipo E.
 - (D) Degenerativa do tipo A.
 - (E) Traumática do tipo B.
41. Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para a não-união de fraturas do escafoide.
- (A) Fraturas com desvio igual ou maior a 4 mm.
 - (B) Ângulo escafolunato maior ou igual a 40 graus.
 - (C) Ângulo intraescafoide maior que 45 graus.
 - (D) Fraturas da cintura e pólo proximal.
 - (E) *Diabetes mellitus* com uso de insulina.
42. Durante a artroscopia do punho, o teste do gancho pode ser realizado. Quando esse teste é positivo, indica a lesão de qual estrutura?
- (A) Lesão do tipo colapso avançado escafossemilunar (SLAC).
 - (B) Lesão proximal do complexo da fibrocartilagem triangular.
 - (C) Lesão do ligamento rádio escafossemilunar.
 - (D) Osteonecrose do osso semilunar.
 - (E) Instabilidade do carpo em DISI.
43. Sobre a artrose pós-traumática do cotovelo, assinale a alternativa correta.
- (A) Na categoria moderada, há frequentemente ossificação heterotópica, tanto anterior como posterior.
 - (B) Na artrose severa, a instabilidade do cotovelo é franca.
 - (C) O resultado esperado na artrose moderada, após o tratamento cirúrgico, é excelente, especialmente quando o tratamento é artroscópico.
 - (D) Na artrose severa ou grave, o paciente já apresenta sinais de compressão do nervo radial com fraqueza na região tenar.
 - (E) Na categoria leve ou mínima, o arco de movimentação é de 40 graus de flexão e 100 graus de extensão.
44. Em um paciente do sexo masculino, de 65 anos de idade, que apresenta uma síndrome do túnel do carpo bilateral, orienta-se a realização de tenossinovectomia para biópsia. Esta orientação decorre do fato que aquela síndrome pode ser o sintoma inicial da seguinte patologia:
- (A) pseudoxantoma elástico.
 - (B) mastocitose.
 - (C) hiperparatireoidismo ("tumor marrom").
 - (D) amiloidose.
 - (E) tumor de células gigantes.
45. Na abordagem da deformidade do cotovelo, em um paciente com paralisia cerebral, a neurectomia de qual nervo deve ser realizada?
- (A) Nervo supraescapular.
 - (B) Nervo radial.
 - (C) Nervo ulnar.
 - (D) Nervo mediano.
 - (E) Nervo musculocutâneo.

- 46.** Assinale a alternativa que apresenta o nervo derivado do fascículo posterior do plexo braquial.
- (A) Nervo dorsal da escápula.
 - (B) Nervo ulnar.
 - (C) Nervo toracodorsal.
 - (D) Nervo subclávio.
 - (E) Nervo torácico longo.
- 47.** Uma criança recém-nascida apresenta uma sindactilia entre o polegar e o dedo indicador. Frente a esse quadro, qual a idade correta para que essa criança trate a deformidade cirurgicamente?
- (A) 12 a 18 meses.
 - (B) 9 a 12 meses.
 - (C) 18 a 24 meses.
 - (D) 3 a 6 meses.
 - (E) 12 a 24 meses.
- 48.** A fratura de Seymour é uma lesão que ocorre na mão de crianças. Assinale a alternativa que apresenta uma característica dessa lesão.
- (A) O tratamento conservador, com tala metálica, produz bom resultados.
 - (B) Além da fratura, que acomete a fise, há lesão do leito ungueal.
 - (C) Pode apresentar uma deformidade em extensão se não tratada corretamente.
 - (D) Ocorre por uma hiperextensão da interfalangeana distal.
 - (E) É uma lesão do tipo 3 de Salter-Harris.
- 49.** O dedo em gatilho é decorrente de uma alteração patológica na polia
- (A) A4.
 - (B) A1.
 - (C) C1.
 - (D) C2.
 - (E) A3.
- 50.** Pacientes portadores de hipoplasia do polegar, manchas *café-au-lait* e baixa altura para a idade apresentam risco alto para qual patologia?
- (A) Anemia do Mediterrâneo.
 - (B) Anemia de Diamond-Blackfan.
 - (C) Anemia falciforme.
 - (D) Anemia hemolítica.
 - (E) Anemia de Fanconi.

