



432421

MODELO DE
PROVA
(VERSÃO)**A**

EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

012. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofrera um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
- (B) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
- (C) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.
- (D) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.
- (E) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).

02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
- (B) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
- (C) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- (D) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
- (E) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.

03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.

- (A) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
- (B) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.
- (C) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.
- (D) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.
- (E) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.

- 04.** A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
 - (B) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
 - (C) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.
 - (D) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
 - (E) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
- 05.** Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).
- (A) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.
 - (B) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
 - (C) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
 - (D) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
 - (E) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.
- 06.** A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.
- (A) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
 - (B) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.
 - (C) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
 - (D) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
 - (E) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
- 07.** Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.
- (A) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.
 - (B) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
 - (C) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
 - (D) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.
 - (E) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.

- 08.** Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
 - (B) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
 - (C) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
 - (D) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
 - (E) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
- 09.** Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
 - (B) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
 - (C) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
 - (D) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
 - (E) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
- 10.** Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) de média transmissibilidade e de longa duração.
 - (B) grave e de alta letalidade.
 - (C) de transmissão sexual e de alta letalidade.
 - (D) altamente transmissível e de curta duração.
 - (E) sem gravidade e com tendência à cronificação.
- 11.** Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.
 - (B) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.
 - (C) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
 - (D) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
 - (E) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.

12. Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
- (B) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (C) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- (D) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (E) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
13. Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- (B) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
- (C) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (D) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
- (E) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
14. Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.
- (B) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.
- (C) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.
- (D) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.
- (E) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.

15. Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.

- (A) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
- (B) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
- (C) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
- (D) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
- (E) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.

16. Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
- (B) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
- (C) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
- (D) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
- (E) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.

17. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.
- (B) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
- (C) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.
- (D) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.
- (E) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
 - (B) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
 - (C) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
 - (D) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
 - (E) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (B) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
 - (C) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
 - (D) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
 - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.
 - (B) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
 - (C) pessoas entre 18 e 60 anos.
 - (D) mulheres com doenças crônicas.
 - (E) crianças com doenças congênitas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Profissional da saúde, de 35 anos, sofreu acidente perfurocortante durante um procedimento cirúrgico de urgência em paciente fonte, com diagnóstico de hepatite B crônica, sem uso de terapia. O profissional tem registro de dois esquemas de vacina contra hepatite B e não apresenta soroconversão no teste realizado após 40 dias nem no teste realizado após 6 meses, no qual o resultado foi de anti-HBs < 10 UI/mL. Nesse contexto, é correto afirmar que a conduta adequada para esse profissional é aplicar
- (A) mais uma dose de vacina contra hepatite B associada à imunoglobulina humana anti-hepatite B.
 - (B) outro esquema com 3 doses de vacina contra hepatite B (0, 30 e 60 dias) associado à imunoglobulina humana anti-hepatite B.
 - (C) outro esquema com 3 doses de vacina contra hepatite B (0, 30 e 60 dias).
 - (D) duas doses de imunoglobulina humana anti-hepatite B, com intervalo de um mês entre as doses.
 - (E) mais uma dose de vacina contra hepatite B.
22. Com relação à Infecção do Trato Urinário (ITU) recorrente na mulher, é correto afirmar que é definida por
- (A) dois ou mais episódios em um período de até três anos.
 - (B) dois ou mais episódios, no período de seis meses, ou três ou mais, no período de um ano.
 - (C) dois episódios no período de um ano.
 - (D) dois episódios no período de 60 dias.
 - (E) dois episódios, no período de 90 dias, com o isolamento da mesma bactéria.
23. O principal agente etiológico responsável pela osteomielite hematogênica no adulto é:
- (A) *Staphylococcus epidermidis*.
 - (B) *Streptococcus sp.*
 - (C) *Staphylococcus aureus*.
 - (D) *Streptococcus agalactiae*.
 - (E) *Salmonella sp.*
24. A diarreia acompanhada de artrite reativa e eritema nodosum é causada por:
- (A) *Isospora belli*.
 - (B) *Entamoeba histolytica*.
 - (C) *Giardia lamblia*.
 - (D) *Rotavírus*.
 - (E) *Yersinia enterocolitica*.
25. Mulher de 32 anos, com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, em uso de droga anti-TNF, adalimumabe durante a gestação, última dose 4 semanas antes do parto. Foi submetida a parto cesariano por indicação obstétrica. A criança nasceu a termo, com 2.500 gramas. Em relação à vacinação do recém-nascido, podemos afirmar que
- (A) as vacinas vivas estão contraindicadas, por doze meses, a contar da última dose de medicação durante a gestação.
 - (B) a vacina BCG e da hepatite B devem ser aplicadas na maternidade.
 - (C) deve seguir o calendário vacinal, para idade, do Programa Nacional de Imunizações, sem restrições.
 - (D) as vacinas atenuadas estão indicadas a partir dos três meses de idade.
 - (E) as vacinas inativadas devem ser indicadas somente a partir dos três meses.
26. Adolescente de 16 anos, com o diagnóstico de doença falciforme, esplenectomizado, em uso de hidroxiuréia e contagem de neutrófilos menor de 1.500 céls/mm³, comparece ao posto de saúde para atualizar a carteira vacinal para viajar para a Amazônia. A mãe refere que não tem a carteira vacinal da infância. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta em relação à vacinação desse paciente.
- (A) Indicar a vacinação com a tetraviral e com a de febre amarela no mesmo dia.
 - (B) A vacina da febre amarela está contraindicada.
 - (C) As vacinas inativadas estão contraindicadas.
 - (D) Iniciar a vacinação com a BCG e com a de hepatite B.
 - (E) Realizar as vacinas com intervalo de 7 dias entre todas do calendário vacinal para a idade.
27. Na classificação e critérios definidores de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em pacientes internados e ambulatoriais, a osteomielite do esterno, após cirurgia cardíaca ou endoftalmite, é considerada uma infecção
- (A) incisional superficial.
 - (B) incisional profunda primária.
 - (C) incisional profunda secundária.
 - (D) não relacionada a sítio cirúrgico.
 - (E) órgão/cavidade.

- 28.** A recomendação do *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) americano para profissionais de saúde que vivem com hepatite B crônica e realizam procedimentos na categoria das cirurgias abdominais, cardiotorácicas e ortopédicas maiores; reparo de lesões traumáticas maiores; histerectomia abdominal ou vaginal; parto cesariano ou vaginal; cirurgias orais e maxilofaciais amplas, é de que eles precisam conhecer e respeitar as medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, para minimizar o risco de transmissão, e
- seguir a contraindicação para realizar esses procedimentos.
 - manter carga viral HBV-DNA abaixo de 400 UI/mL.
 - usar duas luvas cirúrgicas.
 - seguir o tratamento com análogo de nucleotídeo.
 - permanecer em campo cirúrgico por, no máximo, 60 minutos.
- 29.** O uso do tenofovir alafenamida (TAF), no tratamento da hepatite B crônica e HIV,
- está recomendado para uso durante a gestação ou amamentação.
 - não apresentou associação com aumento de peso e piora dos perfis lipídico e glicêmico.
 - é indicado na dose diária de 25 mg/dia.
 - está indicado no concomitante com rifampicina.
 - está contraindicado na obesidade grave.
- 30.** Em relação à leptospirose, é correto afirmar que à
- insuficiência renal aguda está associada à hipocalcemia moderada a grave.
 - leptospirose icterica está associada a aumentos séricos de bilirrubina indireta.
 - elevação de aminotransferases é maior do que 1.000 U/L.
 - plaquetopenia e hemorragia pulmonar ocorrem em 90% dos casos.
 - droga de escolha para tratamento é o ciprofloxacina.
- 31.** Assinale a alternativa correta com relação à conduta adequada frente a caso suspeito e/ou confirmado de sarampo.
- Investigar em até 96 horas da notificação do caso.
 - Notificar imediatamente todo caso suspeito de sarampo em até 7 dias.
 - Realizar busca retrospectiva de casos suspeitos, nos últimos 60 dias, a partir da data do exantema do primeiro caso confirmado.
 - Realizar bloqueio vacinal seletivo, em até 72 horas, após a notificação do caso.
 - Acompanhar os contatos de casos suspeitos ou confirmados por 90 dias.
- 32.** Paciente de 18 anos, apresenta febre alta, cefaleia holocraniana, vômitos e rigidez da nuca acompanhados, de petéquias e sufusões hemorrágicas disseminadas, com diagnóstico de meningococemia. O tratamento indicado foi penicilina cristalina por 7 dias. Assinale a alternativa correta em relação à quimioprofilaxia dos contactantes íntimos desse caso.
- A rifampicina está contraindicada para as gestantes.
 - O antibiótico de escolha para a quimioprofilaxia deve ser administrado, preferencialmente, em até 7 dias da exposição a fonte de infecção.
 - A quimioprofilaxia também está indicada para o paciente no momento da alta.
 - O antibiótico de escolha para a quimioprofilaxia é o ciprofloxacino nas crianças.
 - Todos os profissionais da saúde envolvidos no atendimento do caso devem receber a quimioprofilaxia.
- 33.** Indivíduo com quadro discreto de febre moderada, de início súbito, que dura de dois a três dias, e sintomas generalizados inespecíficos (mal-estar, adinamia, anorexia, cefaleia e outros) e erupção cutânea pápulo-vesicular, que se inicia na face, no couro cabeludo ou no tronco, com distribuição centrípeta da cabeça e tronco, trata-se de caso suspeito de
- mpox.
 - sarampo.
 - eritema infeccioso.
 - exantema súbito.
 - varicela.
- 34.** Menino de 18 meses sofreu mordedura na mão esquerda de um quati durante uma viagem com a família para Foz do Iguaçu. Considerando esse contexto, indique a conduta adequada.
- Vacina antirrábica, 4 doses (0, 3, 7 e 14 dias), associada à imunoglobulina humana antirrábica intralesional e o restante da dose calculada pelo peso intramuscular.
 - Observação do animal por 10 dias.
 - Vacina antirrábica, 4 doses (0, 3, 14 e 21 dias), via intramuscular, na região glútea, associada a soro heterólogo antirrábico intralesional e o restante da dose calculada pelo peso via intramuscular.
 - Vacina antirrábica, 5 doses (0, 3, 7, 14 e 21 dias).
 - Vacina antirrábica, 5 doses (0, 3, 7, 14 e 21 dias), associada a soro heterólogo antirrábico intralesional e o restante da dose calculada pelo peso intramuscular no músculo deltóide.

35. Em relação ao botulismo, é correto afirmar que
- (A) é uma doença neuromuscular leve e autolimitada.
 - (B) a fraqueza muscular pode se propagar de forma descendente.
 - (C) é uma doença altamente contagiosa.
 - (D) se apresenta exclusivamente com manifestações gastrointestinais.
 - (E) o *Clostridium botulinum* é um bacilo Gram-negativo, aeróbio e não esporulado.
36. No caso suspeito de criança, menor de 5 anos, atendida em unidade sentinela, com doenças diarreicas agudas sem sangue, independentemente do estado vacinal contra *rotavírus*, é correto afirmar:
- (A) a vacina está contraindicada para crianças, mesmo que esteja na faixa etária preconizada e que tenha doença gastrointestinal crônica ou má-formação congênita do trato digestivo não corrigida.
 - (B) para a caracterização de surtos de doença diarreica aguda, a amostra de fezes para a pesquisa de *rotavírus* deve ser realizada em adultos, idosos e gestantes para análise laboratorial.
 - (C) a ficha individual de notificação de *rotavírus* deve ser preenchida para cada criança menor de 5 anos envolvida no surto, independentemente da amostra de fezes coletada para análise laboratorial.
 - (D) a vacina contra *rotavírus* humano está indicada para bloqueio de casos para todas as faixas etárias.
 - (E) o esquema vacinal recomendado para os contactantes é com 3 doses de vacina, via oral, a cada 30 dias, a partir dos 2 meses de idade.
37. Gestante de 32 semanas apresenta síndrome gripal há 2 dias, com frequência respiratória de 22 respirações por minuto, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto e saturação parcial de oxigênio de 95%. Refere ter se vacinado contra a influenza há 15 dias. Frente ao caso relatado, é correto afirmar:
- (A) está afastada clinicamente a hipótese de influenza dessa paciente.
 - (B) durante a gestação o tratamento somente deve ser introduzido após a confirmação laboratorial.
 - (C) o tratamento com fosfato de oseltamivir é contraindicado durante a gestação.
 - (D) deve-se iniciar imediatamente o tratamento com o fosfato de oseltamivir após a suspeita clínica, independentemente da coleta de material para exame laboratorial.
 - (E) está contraindicado o tratamento com fosfato de oseltamivir, pois a paciente está vacinada.
38. Paciente de 26 anos, estudante, apresentou febre de início súbito, cefaleia e mialgia, seguidos de aparecimento de exantema maculopapular, no segundo dia de evolução, associados a manifestações hemorrágicas. Refere ter viajado para chácara de amigos na região de Campinas, há 7 dias, onde fez uma trilha na natureza. Com base nesse contexto, é correto afirmar que a principal hipótese diagnóstica é
- (A) Febre amarela.
 - (B) Chikungunya.
 - (C) Zika.
 - (D) Toxoplasmose.
 - (E) Febre maculosa.
39. Em relação a hanseníase pelo *Mycobacterium leprae*, é correto afirmar que
- (A) a hanseníase multibacilar caracteriza-se pela presença de duas ou mais lesões cutâneas.
 - (B) o período de incubação é de 60 dias.
 - (C) a transmissão ocorre por gotículas emitidas pelas vias aéreas superiores.
 - (D) a disseminação para a pele não ocorre por via hematogênica.
 - (E) é uma doença de baixa infectividade.
40. Assinale a alternativa correta com relação ao caso de um acidente com escorpião-amarelo (*Tityus serrulatus*) envolvendo uma criança de 5 anos e sua mãe em sua residência.
- (A) O diagnóstico pode ser feito pelas alterações do coagulograma.
 - (B) O principal diagnóstico diferencial é com acidente crotálico.
 - (C) O soro antiescorpiônico está indicado nos casos leves, moderados e graves.
 - (D) Os testes de sensibilidade cutânea são recomendados antes da aplicação soro antiescorpiônico.
 - (E) A criança apresenta maior risco de complicações e óbito.

41. Esquema terapêutico de primeira escolha para a criptococose pulmonar leve a moderada é:
- (A) Voriconazol, via oral, 200 mg/dia, 6 a 12 semanas.
 - (B) Itraconazol, via oral, 400 mg/dia, 8 a 12 semanas.
 - (C) Fluconazol, via oral, 400 mg/dia, 6 a 12 meses.
 - (D) Itraconazol, via oral, 200 mg/dia, 6 a 12 meses.
 - (E) Fluconazol, via oral, 800 mg/dia, 6 a 12 semanas.
42. O retratamento de corrimento uretral masculino por infecção gonocócica deve ser realizado com
- (A) ceftriaxona 500 mg, IM, dose única, associada à azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
 - (B) ceftriaxona 1g, IM ou intravenoso (IV), ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento, associado à azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
 - (C) azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
 - (D) ceftriaxona 1 g, IM, dose única.
 - (E) ceftriaxona 500 mg, intramuscular (IM), dose única, associada à azitromicina 500 mg, 4 comprimidos, via oral (VO), dose única.
43. A droga de escolha para o tratamento da Doença de Chagas aguda é
- (A) Albendazol.
 - (B) Benznidazol.
 - (C) Nifurtimox.
 - (D) Praziquantel.
 - (E) Oxamniquina.
44. Em relação ao tratamento da leishmaniose visceral, é correto afirmar que
- (A) a anfotericina B lipossomal é a única opção no tratamento para gestantes.
 - (B) o antimoniato de meglumina é a droga de escolha para maiores de 50 anos.
 - (C) a anfotericina B lipossomal está contraindicada na infecção pelo HIV.
 - (D) o antimoniato de meglumina não pode ser administrado no nível ambulatorial.
 - (E) o tempo de infusão da anfotericina B lipossomal e do antimoniato de meglumina é de 15 a 20 minutos.
45. O tratamento de escolha da malária por *Plasmodium falciparum* não complicado é
- (A) cloroquina e primaquina.
 - (B) cloroquina.
 - (C) artesunato por via endovenosa ou intramuscular.
 - (D) terapia combinada com artemeter-lumefantrina.
 - (E) clindamicina associada a artesunato.
46. Homem de 28 anos, com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, está em tratamento quimioterápico associado à rituximabe, droga anti-CD20, há 3 meses. Está em programação para realizar transplante de células tronco hematopoiética (TCTH). Assinale a alternativa correta em relação à indicação das vacinas para esse paciente.
- (A) As vacinas inativadas estão indicadas de 3 a 6 meses após o TCTH.
 - (B) Estão indicadas as vacinas inativadas nesse momento.
 - (C) A vacina da influenza nasal está indicada antes do transplante.
 - (D) As vacinas atenuadas estão indicadas após 6 meses do TCTH.
 - (E) A vacina da febre amarela está indicada 12 meses após o TCTH.
47. Mulher de 42 anos, com artrite reumatoide, em uso prévio de cloroquina, metotrexato e prednisona, mantém quadro de poliartrite de mãos e punhos e irá iniciar terapia imunobiológica com droga anti-TNF. Nega queixas respiratórias e não tem história de contato próximo com pessoa com tuberculose. Realiza teste tuberculínico com o resultado de PPD de 6 mm. Segundo as recomendações atuais do manejo do tratamento de tuberculose latente em pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas, assinale a alternativa correta.
- (A) O teste de liberação de interferon-gama, o *Interferon Gamma Release Assay* (IGRA), deve ser realizado a cada 6 meses nessa paciente.
 - (B) Está indicado o uso de rifapentina, 900 mg por semana, associada à isoniazida, 900 mg por semana, por 12 semanas.
 - (C) Está indicado, como terapia alternativa, o uso de rifampicina em monoterapia com 180 doses.
 - (D) Para a utilização das drogas anti-TNF, não é necessário rastreio para tuberculose latente previamente ao início do tratamento.
 - (E) Iniciar tratamento para tuberculose latente e, após 15 dias, iniciar o uso do imunobiológico.

48. Em relação à peste, é correto afirmar que é
- (A) a ceftriaxona a droga de escolha para tratamento.
 - (B) indicada a notificação, em até 7 dias, sujeita ao Regulamento Sanitário Internacional (2005).
 - (C) transmitida por picadas de pulgas infectadas e transmissão de pessoa a pessoa.
 - (D) causada pela *Yersinia pestis*, bactéria Gram-positiva.
 - (E) uma doença infecciosa crônica.
49. No caso de intolerância a macrolídeos na quimioprevenção da coqueluche, está indicado:
- (A) ciprofloxacina.
 - (B) amoxicilina.
 - (C) sulfametoxazol-trimetoprima.
 - (D) doxiciclina.
 - (E) cefuroxima.
50. Em relação às geo-helmintíases, é correto afirmar que
- (A) está contraindicada a administração de medicamentos de amplo espectro.
 - (B) o *Strongyloides stercoralis* é o principal agente encontrado.
 - (C) *Trichuris trichiura* é o geo-helminto de maior tamanho.
 - (D) uma das estratégias de controle é a utilização de medicação como albendazol.
 - (E) são doenças de notificação compulsória nacional.

