



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

020. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofrera um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
- (B) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.
- (C) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
- (D) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.

02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
- (B) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
- (C) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- (D) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
- (E) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.

03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.

- (A) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.
- (B) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
- (C) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.
- (D) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.
- (E) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.

04. A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
- (B) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
- (C) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
- (D) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
- (E) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.

05. Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).

- (A) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
- (B) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.
- (C) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
- (D) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
- (E) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.

06. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.

- (A) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
- (B) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
- (C) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
- (D) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
- (E) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.

07. Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.

- (A) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
- (B) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
- (C) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.
- (D) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.
- (E) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.

- 08.** Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
 - (B) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
 - (C) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
 - (D) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
 - (E) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
- 09.** Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
 - (B) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
 - (C) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
 - (D) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
 - (E) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
- 10.** Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) de transmissão sexual e de alta letalidade.
 - (B) de média transmissibilidade e de longa duração.
 - (C) altamente transmissível e de curta duração.
 - (D) grave e de alta letalidade.
 - (E) sem gravidade e com tendência à cronificação.
- 11.** Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
 - (B) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.
 - (C) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
 - (D) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.
 - (E) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.

12. Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
- (B) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (C) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (D) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- (E) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
13. Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
- (B) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (C) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- (D) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
- (E) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
14. Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.
- (B) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.
- (C) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.
- (D) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.
- (E) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.

- 15.** Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.
- (A) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
 - (B) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
 - (C) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
 - (D) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.
 - (E) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.
- (A) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
 - (B) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
 - (C) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
 - (D) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
 - (E) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.
- 17.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.
 - (B) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.
 - (C) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.
 - (D) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
 - (E) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
 - (B) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
 - (C) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
 - (D) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
 - (E) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
 - (B) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
 - (C) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (D) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
 - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) mulheres com doenças crônicas.
 - (B) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.
 - (C) crianças com doenças congênitas.
 - (D) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
 - (E) pessoas entre 18 e 60 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O principal antagonista do músculo tibial anterior é o músculo
- (A) fibular terceiro.
 - (B) flexor curto do hálux.
 - (C) fibular curto.
 - (D) flexor longo do hálux.
 - (E) fibular longo.
22. A osteomielite esclerosante de Garré é uma doença
- (A) que, com grande frequência, apresenta-se como complicação da sífilis congênita.
 - (B) comum em pacientes adultos e idosos.
 - (C) crônica com ausência de abscesso.
 - (D) que é causa frequente de amputação de membros superiores em crianças.
 - (E) frequente em adultos jovens imunossuprimidos.
23. Em qual dos estágios da classificação de Gächter, referente a artrite infecciosa, observam-se alterações radiológicas na articulação?
- (A) II
 - (B) IV
 - (C) III
 - (D) I
 - (E) V
24. Ao solicitar uma ressonância magnética (RM) para uma paciente com suspeita de tuberculose acometendo o tornozelo e retropé, qual patologia indicaria um diagnóstico diferencial para essa doença?
- (A) Doença de Charcot-Marie-Tooth.
 - (B) Deformidade residual pé torto congênito.
 - (C) Síndrome de Muller-Weiss.
 - (D) Acometimento neuropático articular.
 - (E) Doença de Freiberg.
25. Na classificação de Langenskiöld para a doença de Blount, em qual tipo se observa a fusão e consequente parada de crescimento da fise medial?
- (A) III
 - (B) I
 - (C) V
 - (D) VI
 - (E) IV
26. Paciente portador de *diabetes mellitus* e insuficiência renal apresenta, no raio-X, uma imagem sugestiva de tumor de células gigantes. Dado seu quadro clínico, assinale a alternativa que indica, corretamente, outro diagnóstico provável.
- (A) Fibroma desmoide.
 - (B) Osteoma osteoide.
 - (C) Condrossarcoma.
 - (D) Condrofibroma.
 - (E) Tumor marrom.
27. Qual o tratamento para uma lesão do flexor longo do polegar, ocorrida na zona IV, que apresenta perda de substância do tendão?
- (A) Enxerto tendíneo em dois estágios.
 - (B) Tenodese com o flexor curto do polegar.
 - (C) Enxerto tendíneo livre.
 - (D) Reparo direto.
 - (E) Alongamento e avanço.
28. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os dois tumores malignos primários que acometem a coluna vertebral.
- (A) Mieloma e cordoma.
 - (B) Sarcoma de Ewing e adamantinoma.
 - (C) Fibrossarcoma e condrossarcoma.
 - (D) Cordoma e sarcoma de Ewing.
 - (E) Osteossarcoma parostal e condrossarcoma.
29. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um achado do exame físico que, com maior precisão, indica que o quadril está luxado ao examinar uma criança de 14 meses com suspeita de displasia de desenvolvimento do quadril.
- (A) A criança não engatinha.
 - (B) Diminuição da abdução passiva do quadril por contração muscular.
 - (C) Dor durante a mobilização passiva do quadril.
 - (D) Teste de Barlow positivo.
 - (E) Teste de Ortolani positivo.

30. O período de convalescença, após a infecção pelo vírus da poliomielite, tem início após
- (A) dez dias sem febre e continua por um ano.
 - (B) dois dias sem febre e continua por seis meses.
 - (C) cinco dias sem febre e continua por dois meses.
 - (D) dois dias sem febre e continua por dois anos.
 - (E) duas semanas sem febre e continua por seis meses.
31. Para um paciente com fratura tipo compressão de T6, que apresenta cifose de 25 graus no raio-X, deve-se solicitar uma
- (A) tomografia computadorizada para planejar a cirurgia.
 - (B) ressonância magnética para planejar a cirurgia.
 - (C) ressonância magnética e, se essa não mostrar lesão ligamentar posterior, indicar a artrodese de um nível acima e outro abaixo da fratura.
 - (D) tomografia computadorizada, que deve ser realizada com o paciente em extensão e flexão da coluna, para avaliar estabilidade da lesão.
 - (E) ressonância magnética e, se essa não mostrar lesão ligamentar posterior, indicar o uso de colete por doze semanas.
32. Na classificação de Wiltse, para a espondilolistese, o tipo 6 corresponde ao tipo
- (A) iatrogênico.
 - (B) displásico.
 - (C) ístmico.
 - (D) patológico.
 - (E) degenerativo.
33. Sobre o ligamento cruzado anterior do joelho, qual a alternativa correta?
- (A) Sua inserção femoral é maior que a tibial.
 - (B) É um ligamento intra-sinovial.
 - (C) Insere-se lateral a inserção do corno anterior do menisco medial.
 - (D) Sua porção anteromedial em extensão está tensionada.
 - (E) Sua vascularização ocorre pela artéria genicular média.
34. Um paciente com 14 anos de idade, com alto grau de suspeita clínica para epifisiólise proximal do fêmur, apresenta um raio-X em AP e frog-leg sem alterações. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o exame a ser solicitado e o resultado esperado se esse paciente possuir a patologia.
- (A) Tomografia computadorizada com o achatamento da cabeça do fêmur em sua região medial.
 - (B) Cintilografia óssea com hipercaptação de Índio no fêmur proximal.
 - (C) Ressonância Magnética com edema na metáfise e alargamento da placa de crescimento.
 - (D) Ultrassonografia com distensão da cápsula articular.
 - (E) Ressonância Magnética com edema na cabeça do fêmur e sinais inflamatórios abundantes.
35. Assina a alternativa correta com relação à exostose de Turret.
- (A) É bastante comum em pacientes idosos e diabéticos.
 - (B) Pela localização da lesão, ela limita a extensão das interfalangeanas sem afetar sua flexão.
 - (C) O tratamento não cirúrgico normalmente restaura a função do dedo.
 - (D) Caso seja optado pela cirurgia, ela deve ser feita em até três meses após o trauma que gerou a lesão.
 - (E) Ocorre no dorso da falange média ou da falange proximal na mão.
36. Considerando um paciente com uma fratura em três partes do úmero proximal, com acometimento da tuberosidade menor e colo cirúrgico, ocorrida há seis meses e em consolidação viciosa, a maior limitação observada é para realizar
- (A) extensão.
 - (B) rotação interna.
 - (C) adução.
 - (D) rotação externa.
 - (E) abdução.

37. Assinale a alternativa que indica, segundo a classificação do grupo AO para as fraturas transtrocanterianas, a classificação que representa uma fratura com obliquidade reversa.
- (A) 32A3
- (B) 31A1
- (C) 31A2
- (D) 31A3
- (E) 32A2
38. Uma senhora de 64 anos de idade relata uma queda da própria altura após tropeçar em um tapete, no raio-X do pé observa-se um desalinhamento de 4 mm entre a base do segundo metatarso e o cuneiforme intermédio. Não há sinal de outras lesões e a relação entre os outros metatarsos e suas respectivas cunhas está mantida. Considerando os dados apresentados, qual o próximo exame a ser solicitado e qual o tratamento indicado para essa lesão?
- (A) Raio-X com carga do pé para avaliar estabilidade e cirurgia com redução cruenta e fixação interna.
- (B) Raio-X com carga do pé para avaliar a estabilidade, não havendo outras subluxações, usar gesso suro podálico, sem carga, por seis semanas.
- (C) Ressonância magnética para avaliar a lesão do ligamento de Lisfranc e, se este estiver íntegro, iniciar tratamento com órtese tipo robofoot.
- (D) Tomografia computadorizada para pesquisa de lesões associadas, não havendo outras lesões, iniciar tratamento com uso de gesso suro podálico, sem carga, por duas semanas.
- (E) Ultrassom com doppler para excluir lesão vascular e cirurgia com redução cruenta e fixação interna.
39. Na classificação de Catterall para a doença de Legg-Calvé-Perthes, qual tipo apresenta o sinal de Gage no raio-X?
- (A) III
- (B) II
- (C) IV
- (D) V
- (E) I
40. Na fratura de Tillaux, o ligamento que, por mecanismo avulsivo, leva à fratura é o ligamento
- (A) tibiofibular anterior.
- (B) interósseo.
- (C) calcaneofibular.
- (D) fibulotalar anterior.
- (E) tibiofibular posterior.
41. O músculo esternocleidomastoídeo é innervado por ramos diretos do plexo cervical (C1-C2) e pelo par craniano
- (A) VIII.
- (B) IX.
- (C) VI.
- (D) XI.
- (E) III.
42. A síndrome de Klippel-Feil é uma anomalia congênita que apresenta como parte de seu quadro clínico a fusão de um ou múltiplos segmentos cervicais. Qual a patologia ortopédica que, com maior frequência, é diagnosticada junto a essa síndrome?
- (A) Doença de Blount.
- (B) Coxa vara.
- (C) Lordose.
- (D) Cifose.
- (E) Escoliose.
43. Sobre a fratura de calcâneo em crianças, assinale a alternativa correta.
- (A) Em sua maioria são fraturas intra-articulares.
- (B) O desvio, em sua maioria, é mínimo e, por isso, sequelas são raras.
- (C) Apresenta padrões de fraturas semelhantes aos padrões de fraturas da população adulta.
- (D) A luxação subtalar é frequente, porém facilmente redutível por manipulação sob anestesia.
- (E) Tem como possível sequela a formação da barra óssea entre o processo antero superior do calcâneo e o navicular.
44. Paciente de 65 anos de idade apresenta, após queda da própria altura, fratura com desvio do colo do fêmur. É portador de demência frontotemporal, já em estado avançado, contudo sem outras patologias associadas. Considerando o exposto, qual o tratamento para essa fratura?
- (A) ATQ cimentada.
- (B) Fixação interna com haste intramedular travada.
- (C) ATQ não cimentada.
- (D) Fixação interna com três parafusos canulados.
- (E) Hemiartróplastia.

45. Na classificação de Cavendish para a deformidade de Sprengel, em qual grau o ângulo superior da escápula encontra-se próximo ao occipício?
- (A) 1
 - (B) 5
 - (C) 4
 - (D) 2
 - (E) 3A
46. Assinale a alternativa correta com relação à síndrome do cone medular.
- (A) O reflexo bulbocavernoso normalmente está presente após 24 horas do trauma.
 - (B) Há um quadro de paralisia espástica dos membros inferiores.
 - (C) A recuperação dessa lesão traumática é, na maioria das vezes, completa.
 - (D) A maioria das lesões que resulta nesse quadro, localiza-se entre T11 e L2.
 - (E) A função vesical está preservada com frequência.
47. Ao planejar uma abordagem em dois tempos para uma fratura fechada de pilão tibial intra-articular em um indivíduo previamente hígido e com um envelope de partes moles lateral em bom estado, sem flictenas na fíbula, como proceder?
- (A) Usar tração esquelética no calcâneo para alinhar as fraturas e fixar a fíbula com um fio de Kirschner.
 - (B) Fixar a fíbula com placa e parafusos, planejando que haja, pelo menos, 7 cm de pele saudável entre esta incisão e a incisão em segundo tempo medial.
 - (C) Fixar a fíbula com placa e parafusos, planejando que haja pelo menos 12 cm de pele saudável entre esta incisão e a incisão em segundo tempo medial.
 - (D) Usar tração esquelética no calcâneo para alinhar as fraturas e só abordar a tíbia e a fíbula 15 dias após o trauma inicial.
 - (E) Fixar a fíbula com placa e parafusos, planejando que haja, pelo menos, 4 cm de pele saudável entre esta incisão e a incisão em segundo tempo medial.
48. O cordoma é um tumor maligno que pode acometer de modo primário a coluna vertebral. Quando isso ocorre, é correto afirmar que
- (A) sua maior incidência é entre a quinta e sétima décadas de vida.
 - (B) é um tumor agressivo com um quadro clínico de bastante dor.
 - (C) são frequentes as metástases cerebrais.
 - (D) sua recorrência, após a cirurgia, é rara, em torno de 5%.
 - (E) acomete a região anterior da coluna vertebral.
49. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma função do músculo sartório.
- (A) Aduz o quadril.
 - (B) Auxilia na rotação interna da coxa.
 - (C) Flete o quadril.
 - (D) Realiza a extensão do joelho.
 - (E) Com o joelho fletido, realiza a rotação lateral da perna.
50. A classificação de Jonhston para a pseudartrose congênita da tíbia é mais simples que a classificação de Boyd e considera como importante
- (A) se a pseudartrose apresenta um neurofibroma intraósseo.
 - (B) a diferença de comprimento dos membros.
 - (C) se a sensibilidade plantar está mantida.
 - (D) se a fíbula é displásica.
 - (E) a idade de ocorrência da primeira fratura, antes ou após 4 anos de idade.

