



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO**

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025  
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

**019. PROVA OBJETIVA**

**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS**

**ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CIRURGIA DE OMBRO)**

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofrera um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - (B) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
  - (C) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.
  - (D) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
  - (E) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.
02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
  - (B) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
  - (C) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
  - (D) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.
  - (E) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.
- (A) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
  - (B) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.
  - (C) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.
  - (D) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.
  - (E) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.

- 04.** A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
  - (B) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
  - (C) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.
  - (D) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
  - (E) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
- 05.** Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).
- (A) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
  - (B) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.
  - (C) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
  - (D) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
  - (E) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.
- 06.** A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.
- (A) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
  - (B) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.
  - (C) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
  - (D) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
  - (E) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
- 07.** Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.
- (A) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.
  - (B) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
  - (C) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.
  - (D) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
  - (E) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.

- 08.** Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
  - (B) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
  - (C) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
  - (D) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
  - (E) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
- 09.** Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
  - (B) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
  - (C) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
  - (D) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
  - (E) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
- 10.** Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) de média transmissibilidade e de longa duração.
  - (B) altamente transmissível e de curta duração.
  - (C) grave e de alta letalidade.
  - (D) de transmissão sexual e de alta letalidade.
  - (E) sem gravidade e com tendência à cronificação.
- 11.** Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.
  - (B) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.
  - (C) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
  - (D) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
  - (E) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.

- 12.** Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (B) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (C) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
- (D) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- (E) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
- 13.** Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
- (B) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (C) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- (D) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
- (E) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
- 14.** Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.
- (B) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.
- (C) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.
- (D) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.
- (E) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.

- 15.** Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.
- (A) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
  - (B) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
  - (C) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
  - (D) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
  - (E) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.
- (A) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
  - (B) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
  - (C) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.
  - (D) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
  - (E) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
- 17.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.
  - (B) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
  - (C) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.
  - (D) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.
  - (E) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
  - (B) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
  - (C) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
  - (D) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
  - (E) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
  - (B) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
  - (C) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
  - (D) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
  - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.
  - (B) crianças com doenças congênitas.
  - (C) mulheres com doenças crônicas.
  - (D) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
  - (E) pessoas entre 18 e 60 anos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. É uma indicação para a realização da hemiartroplastia do ombro:

- (A) artrose avançada da articulação glenoumeral em um paciente com contraindicação para realização de *resurfacing* da glenoide.
- (B) artrose avançada glenoumeral com o manguito rotador intacto.
- (C) artrose glenoumeral associada à patologia prévia como artrite reumatoide.
- (D) fratura do úmero proximal com consolidação viciosa, limitando o arco de movimentação.
- (E) lesão maciça do manguito rotador em um paciente de baixa demanda.

22. Sobre o sinal de Patte, assinale a alternativa correta.

- (A) É realizado com o paciente em pé e testa a função do redondo menor.
- (B) É realizado com o paciente deitado e testa a função do redondo maior.
- (C) É realizado com o paciente deitado e testa a função do subescapular.
- (D) É realizado com o paciente deitado e testa a função do deltoide.
- (E) É realizado com o paciente em pé e testa a função do supraespinal.

23. A capsulite adesiva do ombro pode ser primária ou secundária.

Quanto a essas formas, assinale a alternativa correta.

- (A) O prognóstico é mais reservado na capsulite adesiva secundária, especialmente em pacientes idosos.
- (B) Ambas as formas requerem intervenção precoce com manipulação sob anestesia para o retorno à função prévia.
- (C) A capsulite adesiva primária tem tratamento diferente da forma secundária.
- (D) Em pacientes diabéticos com HbA1c abaixo de 8,0%, os resultados do tratamento são mais consistentes.
- (E) Enquanto a forma primária apresenta três fases, a secundária pode não apresentá-las de maneira distinta.

24. Um paciente de 30 anos de idade vem ao pronto-socorro com queixa de dor na região do esterno após queda de bicicleta há 05 dias. No raio-x, apresenta uma luxação esternoclavicular posterior.

Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A luxação posterior em indivíduos dessa idade pode apresentar também uma lesão a fise medial clavicular.
- (B) A luxação posterior é menos frequente que a anterior, e o seu tratamento deve ser a tentativa de redução incruenta imediata.
- (C) A luxação posterior é mais frequente que a anterior, e o seu tratamento deve ser a redução cruenta imediata dessa lesão.
- (D) A luxação posterior é mais frequente que a anterior, e se o paciente estiver sem outros sintomas além da dor, deve-se evitar a redução pelo risco de lesão às estruturas posteriores.
- (E) A luxação posterior é menos frequente que a anterior, e o seu tratamento deve ser a redução cruenta imediata dessa lesão.

25. De acordo com a classificação de Rockwood para as luxações acromioclaviculares, em qual dos tipos a clavícula distal encontra-se atrás do tendão conjunto do bíceps braquial e do coracobraquial?

- (A) IV.
- (B) V.
- (C) VI.
- (D) I.
- (E) III.

26. Um paciente jovem com fratura fechada da clavícula distal do tipo IIb apresenta lesão do(s) ligamento(s):

- (A) conoide e trapezoide.
- (B) trapezoide.
- (C) coracoclaviculares.
- (D) conoide.
- (E) coracoclavicular e trapezoide.

27. Uma complicação comum na artroplastia total do ombro é a instabilidade, que com frequência é anterior.

A causa mais frequente dessa instabilidade é:

- (A) uma cabeça umeral pequena em relação ao volume articular.
- (B) infecção.
- (C) desgaste do polietileno da glenoide.
- (D) perda de função do músculo supraespinal.
- (E) uma cabeça umeral muito grande em relação ao volume articular.

28. Qual a desvantagem que pode ocorrer quando escolhe-se a hemiartroplastia como opção de tratamento para uma fratura fechada e com desvio no úmero proximal?
- (A) Risco de lesão do nervo axilar.
  - (B) Disfunção do manguito rotador.
  - (C) Aumento de risco de osteonecrose.
  - (D) Rigidez articular.
  - (E) Resultado funcional pobre.
29. Na luxação crônica acromioclavicular, em um paciente sintomático, o procedimento de Mumford está indicado no caso de uma luxação do tipo
- (A) IV.
  - (B) VI.
  - (C) V.
  - (D) III.
  - (E) II.
30. Em relação à suspeita de lesão distal completa da cabeça longa do bíceps, assinale a alternativa correta.
- (A) Quando possível, o bíceps deve ser reinserido na tuberosidade da ulna, sua inserção original.
  - (B) Pode ocorrer lesão por compressão do nervo ulnar.
  - (C) Esse tipo de lesão é frequente em idosos sedentários.
  - (D) O teste mais sensível e específico no exame físico é o teste do gancho.
  - (E) Se o *lacertus fibrosus* estiver rompido, o prognóstico é mais reservado.
31. Ao planejar o tratamento de um quadro de instabilidade anterior do ombro, na Tomografia Computadorizada (TC), nota-se uma perda óssea na cavidade glenoide de 35%. Qual dos procedimentos é o correto para abordar essa lesão?
- (A) Procedimento de Mclaughlin.
  - (B) Procedimento de Laterjet.
  - (C) Procedimento de Eden-Hybinette.
  - (D) Procedimento de Remplissage.
  - (E) Procedimento com aloenxerto de Aquiles para reforço da cápsula.
32. O tratamento adequado para paciente portador de síndrome de Marfan com recorrentes episódios de luxação atraumática do ombro direito é:
- (A) indicação de cirurgia o mais breve possível para evitar a perda óssea da cabeça do úmero.
  - (B) tratamento fisioterápico de curto prazo; não havendo melhora, cirurgia aberta.
  - (C) tratamento fisioterápico de curto prazo; não havendo melhora, tratamento cirúrgico artroscópico.
  - (D) indicação de cirurgia o mais breve possível para evitar a perda óssea da glenoide.
  - (E) tratamento fisioterápico extenso e supervisionado.
33. O Os acromiale pode ser a causa de uma síndrome do impacto no ombro. Qual o tipo mais comum de Os acromiale?
- (A) Basoacromio, origem do ligamento conoide.
  - (B) Metacromio, origem da porção média do deltoide.
  - (C) Mesacromio, origem da porção média do deltoide.
  - (D) Preacromio, origem dos ligamentos coracoclaviculares.
  - (E) Mesacromio, origem da porção posterior do deltoide.
34. Paciente de 55 anos de idade, diabético, possui uma lesão no manguito rotador de 4,0 cm. Qual resultado é esperado de um reparo artroscópico dessa lesão?
- (A) Sucesso no reparo, pois o paciente é jovem, e a lesão não é maciça.
  - (B) Falha no reparo pela idade superior a 50 anos e pelo diagnóstico do diabetes.
  - (C) Falha no reparo pelo tamanho da lesão e pelo diagnóstico de diabetes.
  - (D) Falha no reparo pela idade superior a 50 anos e pelo tamanho da lesão.
  - (E) Sucesso no reparo a despeito da presença do diabetes, único fator a impactar negativamente a chance de sucesso.
35. A artrodese do ombro é um procedimento ainda utilizado na prática clínica para tratar algumas patologias. Qual a posição que o ombro deve ser artrodesado para que esta seja funcional?
- (A) Abdução de 20 graus e rotação interna de 40 graus.
  - (B) Flexão de 30 graus e rotação interna de 20 graus.
  - (C) Abdução de 40 graus e rotação interna de 10 graus.
  - (D) Abdução de 15 graus e rotação externa de 25 graus.
  - (E) Flexão de 45 graus e abdução de 40 graus.

- 36.** São características ideais de um indivíduo que realizará uma prótese total reversa do ombro:
- (A) função do manguito rotador preservado e ausência de quadro infeccioso.
  - (B) doença de Parkinson e ausência de quadro infeccioso.
  - (C) doença de Charcot e ausência de demandas excessivas para o ombro.
  - (D) adequado estoque ósseo na glenoide e deltoide intacto.
  - (E) deltoide intacto e função do manguito rotador preservado.
- 37.** Em relação à tendinite calcárea, assinale a alternativa correta.
- (A) O tendão mais acometido é o do músculo redondo maior.
  - (B) A fase de maior dor é a terceira fase.
  - (C) Na fase de pré-calcificação, os pacientes normalmente relatam dor intensa para a realização das atividades da vida diária.
  - (D) O tratamento cirúrgico dessa lesão, embora raro, deve incluir a acromioplastia.
  - (E) Mulheres entre 30 e 60 anos de idade são mais frequentemente afetadas.
- 38.** É uma indicação da necessidade de tratamento cirúrgico da fratura da escápula:
- (A) ângulo glenopolar de 40 graus ou menos.
  - (B) 45 graus de angulação do corpo da escápula no raio-x em perfil escapular.
  - (C) associação com fratura do terço médio da clavícula contralateral.
  - (D) associação com lesão parcial do plexo braquial.
  - (E) associação com fratura de, pelo menos, dois arcos costais.
- 39.** Os critérios radiográficos de Hertel são utilizados para fornecer ao cirurgião a chance de ocorrência de uma osteonecrose da cabeça do úmero após a fratura do úmero proximal.
- Assinale a alternativa que apresenta uma característica de fratura com risco para essa ocorrência.
- (A) Desvio em relação a cortical medial maior que 02 mm.
  - (B) Extensão metafisária da fratura para a cabeça do úmero maior que 05 mm.
  - (C) Fratura da glenoide associada.
  - (D) Associação com fratura acrômio.
  - (E) Angulação entre os fragmentos maior que 30 graus.
- 40.** Uma indicação relativa para a fixação de uma fratura de terço médio da clavícula é:
- (A) encurtamento de 1,5 cm.
  - (B) idade entre 25 e 40 anos.
  - (C) fratura exposta.
  - (D) atleta recreativo, porém altamente motivado.
  - (E) desvio maior ou igual a 05 mm.
- 41.** Qual o tratamento correto para uma luxação esternoclavicular anterior crônica, segundo Rockwood?
- (A) Uso do tendão do músculo subclávio para reconstrução dos ligamentos costoclaviculares.
  - (B) Ressecção de 01 cm da clavícula medial.
  - (C) Abandono perito.
  - (D) Redução e fixação com pinos de Steinmann rosqueados.
  - (E) Reconstrução dos ligamentos com o enxerto do tendão do palmar longo.
- 42.** Após queda da cama elástica, criança de 07 anos de idade apresenta uma luxação acromioclavicular do tipo III.
- Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O tratamento para essa lesão, pelo desvio superior da clavícula, é cirúrgico.
  - (B) Dos 06 tipos desse tipo de lesão que ocorre em crianças, o tipo III é o mais comum.
  - (C) O terço distal da clavícula encontra-se entre as fibras do músculo trapézio.
  - (D) Os ligamentos coracoclaviculares estão íntegros.
  - (E) É comum a lesão do plexo braquial nesse tipo de lesão.
- 43.** No tratamento cirúrgico de uma lesão transfixante de 1,5 cm do manguito rotador, deve-se optar pelo reparo
- (A) artroscópico, com 03 âncoras em fileira simples.
  - (B) artroscópico, utilizando 01 âncora e 03 passagens de sutura.
  - (C) aberto, com âncoras em fileira simples.
  - (D) aberto, com âncoras em fileira dupla.
  - (E) aberto, com 03 âncoras e 02 passagens de sutura.
- 44.** Qual nervo é comprimido comumente em uma rotura maciça sem tratamento do manguito rotador?
- (A) Nervo supraescapular.
  - (B) Nervo dorsal da escápula.
  - (C) Nervo peitoral medial.
  - (D) Nervo subescapular.
  - (E) Nervo axilar.

45. O sinal de Yergason diagnóstica
- (A) integridade do músculo infraespal.
  - (B) impacto subacromial.
  - (C) integridade do músculo redondo menor.
  - (D) lesão do músculo supraespal.
  - (E) inflamação da cabeça longa do bíceps.
46. O sinal da *sourcil* (sobrancelha em francês) é visto no raio-x da condição patológica:
- (A) tendinite calcárea.
  - (B) instabilidade posterior do ombro.
  - (C) artropatia por lesão do manguito rotador.
  - (D) capsulite adesiva.
  - (E) instabilidade anterior do ombro.
47. É uma contraindicação à realização da artroplastia total do ombro:
- (A) artrite reumatoide.
  - (B) paralisia com perda de função completa do músculo deltoide.
  - (C) osteonecrose da cabeça umeral.
  - (D) artrose severa pós-trauma.
  - (E) cirurgia prévia para reparo do manguito rotador.
48. Uma lesão transfixante de 06 cm no manguito rotador, de acordo com Cofield, é uma lesão
- (A) irreparável.
  - (B) média.
  - (C) pequena.
  - (D) grande.
  - (E) massiva.
49. Considerando uma fratura da diáfise do úmero instável ocorrida abaixo do componente umeral de uma artroplastia total do úmero, cujo componente não apresenta sinais de soltura, assinale a alternativa que apresenta o tratamento correto para essa lesão.
- (A) Troca da haste por uma longa o suficiente para estabilização da lesão e cerclagem da fratura.
  - (B) Uso de parafusos canulados e cerclagem com fios de 2,0 mm.
  - (C) Uso de placa de grandes fragmentos com, pelo menos, 03 parafusos proximais e 03 distais.
  - (D) Uso de placa de grandes fragmentos e cerclagem com fios de 2,0 mm.
  - (E) Cerclagem com fios de 1,6 mm.
50. No tratamento cirúrgico de uma luxação acromioclavicular aguda é obrigatório:
- (A) reparo ou reconstrução dos ligamentos coracoclaviculares.
  - (B) estabilização acromioclavicular com placa e parafusos.
  - (C) um desalinhamento superior entre a clavícula e o acrômio de, no máximo, 1,0 cm.
  - (D) reparo ou reconstrução somente do ligamento conoide.
  - (E) ressecção de 1,0 a 1,5 cm da clavícula distal para adequada redução da lesão.

