



432421

MODELO DE
PROVA
(VERSÃO)**A**

EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2025
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2026

021. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/SAÚDE COLETIVA

01. Eliza comparece a uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Do ponto de vista clínico, no seu sétimo mês de gestação, a usuária está bem, mas chora ao relatar que seu marido, que trabalha em uma serralheria, sofreu um acidente de trabalho que resultou em lesão grave em sua mão direita. Foi atendido por um convênio privado de saúde, mas está sem tratamento. Não consegue trabalhar pela dor e limitação funcional. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A equipe de saúde deve informar Eliza de que seu marido deve procurar a auditoria fiscal do trabalho que, como única instância de fiscalização em ambientes de trabalho, tomará providências para prevenir novos casos.
- (B) A usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é Eliza e não seu marido, que está sob cuidados de um serviço de saúde conveniado, e a equipe de saúde da UBS deve se abster de intervir no caso.
- (C) A equipe de saúde deve solicitar à Eliza que oriente o marido a procurar a UBS, para que se verifique sua situação, haja encaminhamento clínico e para que se desencadeiem ações de vigilância por parte do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Eliza deve ser orientada a aconselhar o marido a retornar ao trabalho o mais rápido possível para que não corra o risco de ser demitido pela empresa.
- (E) Como a consulta na UBS foi de pré-natal e a conclusão foi de que está tudo bem com a mãe e o bebê, as atribuições da equipe se encerram, pois a questão que afeta o marido da usuária é de caráter trabalhista.

02. Vitor, de 28 anos, atua como motorista de uma empresa de transporte por aplicativo. Enquanto realizava uma corrida, sofreu um acidente de trânsito que lhe resultou em traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por um serviço de urgência e emergência, sendo que o passageiro sofreu apenas escoriações leves. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O serviço deve aguardar Vitor estar em condições de informar se ele tem vínculo formal com a empresa e, apenas neste caso, deve realizar a notificação no SINAN.
- (B) O acidente de Vitor deve ser considerado decorrente do trabalho para, efeito de notificação no SINAN, apenas se ele for microempreendedor individual.
- (C) O serviço de saúde deve notificar o acidente como decorrente do trabalho no prazo de 24 horas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- (D) Apenas se a lesão que Vitor sofreu for considerada grave pela equipe médica, seu caso deve ser notificado no SINAN como acidente de trabalho.
- (E) O acidente de trânsito deixou de ser considerado acidente de trabalho e, portanto, não há necessidade de notificação no SINAN.

03. O direito constitucional de proteção à maternidade e à infância tem concretude no SUS por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa Política se estrutura em 7 eixos estratégicos e um deles é o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Assinale a alternativa correta sobre esse eixo estratégico.

- (A) É previsto que mãe e bebê sejam acolhidos, pela equipe da Atenção Básica, entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, para atendimento a ambos, com a presença do pai sempre que possível, com observação da mamada e orientação em relação à amamentação e aos cuidados com a mulher e com a criança.
- (B) Os bancos de leite humano têm cumprido papel fundamental para a promoção, a proteção e o apoio à amamentação e são alimentados principalmente pela doação de leite de mulheres que perderam seus filhos.
- (C) Todas as empresas devem criar salas de apoio à amamentação em seus espaços para manutenção da amamentação entre mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade.
- (D) O contato pele a pele, no Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido com imunodeficiência, começa com o toque evoluindo até a posição canguru, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados com o recém-nascido, o que aumenta a sua adesão ao leite materno.
- (E) No Brasil, para estimular o aleitamento materno, existe possibilidade de ampliação da licença-maternidade por 12 meses, sem diminuição do salário, e por 24 meses, com desconto de 20% do salário.

04. A revelação diagnóstica é um momento de especial importância no cuidado de crianças e adolescentes vivendo com HIV e requer o envolvimento de todos, cuidadores e profissionais, que participam de seu cuidado. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Sabe-se que quanto menos as crianças e adolescentes que convivem com HIV sabem de sua condição, a adesão ao tratamento medicamentoso maior é.
- (B) As explicações dadas à criança que convive com HIV devem ser feitas de forma que ela não compreenda bem, para que não se exponha à possibilidade de ser vítima de discriminação por parte de amigos.
- (C) O processo de revelação diagnóstica deve ser iniciado o mais precocemente possível e guiado a partir das primeiras manifestações de curiosidade da criança e cada pergunta deve ser respondida de forma simples e objetiva.
- (D) A comunicação diagnóstica deve ser feita sempre na presença dos pais no caso de crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
- (E) O nome HIV deve ser sempre evitado para crianças e adolescentes que convivem com o vírus até que sejam capazes de traçar estratégias para ocultar a sua condição.

05. Assinale a alternativa correta em relação ao aumento do antígeno prostático específico (PSA).

- (A) Deve-se realizar prostatectomia preventiva.
- (B) Deve-se continuar o monitoramento do PSA por 5 anos para ver a evolução.
- (C) Trata-se de diagnóstico de câncer de próstata.
- (D) Deve-se continuar investigando para descartar câncer de próstata.
- (E) O PSA não é um indicador valorizado na saúde do homem.

06. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), entre outras atribuições do SUS, pressupõe “capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde”. Assinale a alternativa que sintetize o significado desse enunciado.

- (A) Espera-se que cada município do país seja auto-suficiente para diagnosticar doenças relacionadas ao trabalho, sem depender de serviços de outros municípios.
- (B) Espera-se que o SUS, em seus diferentes níveis de atenção, seja capaz de identificar os agravos relacionados ao trabalho e traçar linhas de cuidados, além de desenvolver ações de vigilância.
- (C) Espera-se que em todos os níveis de atenção do SUS haja pessoas capazes de atuarem como inspetores em saúde do trabalhador com atribuição de exercerem a função de fiscalização de ambientes de trabalho.
- (D) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador e que essa seja uma condição para que sejam instituídos.
- (E) Espera-se que em todas as regiões de saúde haja ações e serviços de saúde do trabalhador, além de equipes de médicos do trabalho capacitados para realizarem o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.

07. Sobre doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.

- (A) O botulismo por ferimentos é a forma mais frequente e é ocasionado pela contaminação de ferimentos com *C. botulinum*, que, em condições de anaerobiose, assume a forma vegetativa e produz toxina *in vivo*.
- (B) Doenças diarreicas causadas por *Staphylococcus aureus* e *E. coli* enterotoxigênica têm o período de incubação de 3 a 7 dias.
- (C) As doenças diarreicas causadas por rotavírus costumam ter manifestações clínicas exuberantes com duração de 1 a 2 dias.
- (D) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar; daí a elevada contagiosidade da doença.
- (E) A rubéola se dissemina principalmente por meio de contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.

08. Em uma quarta-feira, um serviço de urgência e emergência atende mais de 100 pessoas, a maioria crianças e adolescentes com queixas de náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, irritação de pele e até convulsões. Todas são de uma escola municipal localizada na zona rural, onde uma empresa fez pulverização aérea de agrotóxicos no mesmo dia. Dez dias depois, algumas crianças ainda apresentavam sintomas importantes. Essa situação gerou protestos de movimentos de trabalhadores da agricultura contra a empresa responsável. Acerca desse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) O enunciado não dá elementos suficientes para uma conclusão, pois não informa quantas pessoas estavam na escola no momento da pulverização, para se calcular o coeficiente de incidência dos sintomas.
 - (B) O governo Estadual deve ser imediatamente acionado, pois a Prefeitura não tem competência legal para atuar nesse caso, sendo que eventos graves de saúde são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
 - (C) A empresa responsável deve prestar atendimento e esclarecimento às pessoas atingidas e realizar estudos, sendo que a Prefeitura não tem atribuições específicas no caso.
 - (D) Entre outras providências, apenas os casos em que houver comprovação de intoxicação por agrotóxicos devem ser notificados no SINAN.
 - (E) A Prefeitura tem obrigação de realizar uma investigação para apurar o acontecido, com o envolvimento, no mínimo, das áreas da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.
09. Um estudo foi realizado por meio de entrevistas de duas dezenas de informantes, peregrinos, de uma cidade-santuário no Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que tiveram ou esperavam curas de doenças que a medicina ocidental tradicional não havia dado ou não dava resposta satisfatória. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) Esse tipo de crença religiosa, sem fundamentação científica, não encontra acolhimento entre os que se autodenominam católicos.
 - (B) A cidade-santuário citada deve ser um grande centro, pujante do ponto de vista econômico.
 - (C) Situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e/ou iminência de morte frequentemente motivam a busca pela religião dos milagres.
 - (D) Como não há fundamentação científica, a crença das pessoas em milagres de cura deve ser ignorada pelos profissionais de saúde.
 - (E) Os devotos citados certamente são pessoas de extração socioeconômica popular, sem escolaridade.
10. Uma doença infecciosa tem alto coeficiente de incidência e baixo coeficiente de prevalência. Trata-se de uma doença
- (A) grave e de alta letalidade.
 - (B) sem gravidade e com tendência à cronificação.
 - (C) de transmissão sexual e de alta letalidade.
 - (D) de média transmissibilidade e de longa duração.
 - (E) altamente transmissível e de curta duração.
11. Com base nos conhecimentos sobre a crise climática e seus impactos na saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) As mudanças climáticas e o aquecimento global têm efeito positivo sobre a saúde nos países do hemisfério norte, pois as pessoas sofrem menos com o rigor do inverno, e as mortes pelo frio sofrerão um declínio.
 - (B) Todos os estudos mostram que o clima da Terra passou a sofrer mudanças há 30 anos e se devem exclusivamente à ação humana, tendo profundas repercussões sobre a saúde.
 - (C) As mudanças climáticas que resultam em aquecimento global têm influência sobre a saúde, mas o organismo humano tem grande capacidade de adaptação e é capaz de amenizar de forma significativa esses efeitos, não sendo um problema de saúde coletiva neste momento.
 - (D) Não há estudos que associem altas temperaturas e elevadas concentrações de poluentes atmosféricos com o aumento de hospitalizações.
 - (E) A ocorrência do processo de mudanças climáticas, principalmente aquelas devidas ao aquecimento global induzido pela ação humana, foi pela primeira vez alertada na década de 1950 e tem influência sobre a saúde das pessoas.

12. Uma trabalhadora doméstica, Elza, de 63 anos de idade, vive na residência de uma família, que mora em zona rural, desde os 12 anos de idade. Moram na casa um casal de meia idade e a mãe da dona da casa, de 88 anos de idade. Os filhos do casal viveram lá até a juventude e atualmente moram na cidade. Elza é analfabeta e cuida da casa, incluindo limpeza, refeições e roupas, além de cuidar da idosa, sem ajuda de outra pessoa. Sua jornada de trabalho começa por volta das 6h30 e vai até a hora de servir o jantar, quando, então, pode-se retirar para descansar. Não sai para nenhum lugar e nem tem carteira de trabalho assinada. Quando comete um erro, como deixar a comida queimar ou quebrar alguma louça, é proibida de comer à noite. Apresenta dor lombar desde os 50 anos de idade, mas nunca reclamou, até que um dia, ao arrastar um móvel pesado, fica com a “coluna travada”, sendo levada a um serviço de pronto atendimento do SUS. O médico que a atende fica estarecido com a situação de vida de Elza e sente que teria que fazer alguma coisa. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) Analisando a situação de Elza, pode-se suspeitar de uma condição análoga à escravidão, e o médico deve denunciar, pois pode-se considerar que ela sofre há décadas procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis.
- (B) O médico deve limitar-se a intervir no quadro clínico, sem invadir sua privacidade, receitando medicamento para aliviar a dor na região lombar, e encaminhá-la a uma UBS para que tenha acompanhamento de sua saúde.
- (C) Somente se Elza vivesse sob tortura física por parte dos patrões, o médico teria a obrigação de denunciar a situação, pois assim manda o Código de Ética Médica.
- (D) O médico nada tem a ver com a situação de vida de Elza, pois o motivo da procura de um serviço de saúde foi o quadro clínico agudo desencadeado por um esforço físico.
- (E) O médico deve considerar que Elza poderia estar em uma situação pior, sendo analfabeta, e que ter um teto para morar já é uma vantagem social.
13. Um senhor de 88 anos de idade apresenta quadro de câncer terminal e prefere passar seus últimos dias em casa, com sua filha e seus netos, com quem mora desde que ficou viúvo. É acompanhado por um médico há mais de 30 anos. Passa a maior parte do tempo dormindo e, em uma manhã, a cuidadora percebe que ele não está respirando. A família chama imediatamente o médico, que constata o óbito. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta de seu médico, segundo o Código de Ética Médica.
- (A) O corpo deve ser levado ao Serviço de Verificação de Óbito para que se tenha certeza da causa da morte.
- (B) O médico deve atestar o óbito, pois o acompanha na doença terminal e sabe que o desfecho seria o óbito.
- (C) O médico pode atestar o óbito apenas se houver uma declaração de familiares relatando o ocorrido.
- (D) Como o médico não presenciou o óbito, ele não pode preencher o atestado de óbito.
- (E) É temerário que o médico ateste o óbito, pois este pode ter sido provocado por maus-tratos por parte da cuidadora.
14. Luci é uma usuária de uma UBS e começa a ter quadro de náuseas, vômito e diarreia. É trabalhadora doméstica e não consegue ir trabalhar nesse dia. Está em bom estado clínico, mas procura a UBS em busca de orientação. Recebe a informação de que deve procurar o serviço de urgência e emergência, que fica a 3 quilômetros de distância, e não se conforma com o descaso do serviço de saúde. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
- (A) A UBS é um serviço que atende apenas usuários com doenças crônicas.
- (B) Luci deve voltar para casa e se hidratar, pois em geral esse quadro clínico é autolimitado.
- (C) A UBS poderia atender Luci somente em caso de mau estado geral.
- (D) Luci deveria ser acolhida na sua demanda espontânea.
- (E) A informação está correta, pois a UBS não deve atender demanda espontânea.

- 15.** Leni tem 45 anos de idade e é usuária de uma UBS. Trabalha em uma livraria realizando vendas e, desde que teve covid-19 em 2022, apresenta quadro de lapsos de memória que às vezes atrapalha a sua atividade de trabalho. Assinale a alternativa correta quanto a procedimentos da equipe de saúde da UBS.
- (A) O quadro agudo de covid-19 já passou há muitos anos, de forma que a equipe de saúde já cumpriu o seu papel, e Leni deve buscar outro emprego se não estiver dando conta do atual.
 - (B) Com a ajuda da equipe de saúde, Leni deve tentar se afastar do trabalho até a completa recuperação de sua capacidade laboral.
 - (C) A equipe de saúde deve estudar a situação juntamente com Leni para melhorar a sua condição clínica e para pensar em alterar o modo de trabalhar, de forma a minimizar a influência do quadro clínico no seu desempenho laboral.
 - (D) Como equipe de saúde da Atenção Primária da Saúde (APS), não há o que se fazer a não ser encaminhar Leni a um centro de reabilitação para que recupere a capacidade de trabalho plena.
 - (E) O SUS já cumpriu o seu papel no caso, pois propiciou assistência na fase aguda da covid-19, e Leni deve buscar ajuda em outros órgãos que não os do setor Saúde.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta alguns dos fundamentos da Política Nacional de Humanização do SUS.
- (A) Valores cristãos de solidariedade e caridade e autonomia; protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde.
 - (B) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde; participação coletiva no processo de gestão.
 - (C) Responsabilidade compartilhada entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde na administração dos serviços; respeito ao princípio da caridade.
 - (D) Respeito à hierarquia com atribuições legais delimitadas dos profissionais dentro dos serviços do SUS; informação selecionada aos usuários.
 - (E) Estabelecimento de vínculos afetivos que extrapolem o âmbito profissional entre gestores e trabalhadores da saúde e usuários; respeito à hierarquia administrativa dos serviços.
- 17.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições frequentes dos usuários da APS. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
- (A) A medida de pressão arterial deve ser feita preferencialmente pelo médico, pois os estudos mostram que a aferição feita por esse profissional é mais fidedigna do que a realizada pela enfermagem.
 - (B) Além do diagnóstico precoce da HAS, o acompanhamento efetivo dos casos por médico de ambulatório especializado é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares.
 - (C) Em geral, a HAS pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS.
 - (D) O diagnóstico de HAS atualmente requer tecnologia sofisticada, cabendo à APS parte dos procedimentos para tal.
 - (E) A automedida da pressão arterial (Ampa) é realizada por pacientes ou familiares, não profissionais de Saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, e não deve ser valorizada no diagnóstico de HAS.

- 18.** As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras. Assinale a alternativa correta sobre a questão colocada.
- (A) A crise climática é fruto de falta de informação das populações, em especial as mais carentes, que acabam gastando muitos recursos naturais para suprir suas necessidades básicas.
 - (B) Falta produção científica para que as grandes corporações e tomadores de decisões governamentais se convençam sobre a existência da crise climática.
 - (C) Pela primeira vez, o controle das doenças, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, depende do empenho do setor Saúde, ficando as mudanças sistêmicas em segundo plano.
 - (D) Devido à impossibilidade de alteração do modelo de desenvolvimento e da própria produção de energia, a saída estratégica é o maciço investimento nas vacinas contra o leque mais amplo de doenças infecciosas.
 - (E) É preciso investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres.
- 19.** Antonio é médico de uma UBS e recebe uma carta de um colega, representante de uma seguradora privada, solicitando informações clínicas sobre um empregado de uma empresa, que foi acompanhado por Antonio por vários anos devido a transtorno ansioso-depressivo. O empregado foi encontrado morto recentemente. A esse respeito, é correto afirmar que
- (A) é vedado a Antonio revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (B) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois este já é falecido.
 - (C) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente se houver consentimento da empresa onde ele trabalhava.
 - (D) Antonio só pode atender à solicitação do colega se houver autorização por parte da chefia do serviço de saúde.
 - (E) Antonio está liberado para prestar informações sobre seu paciente, pois o colega tem o compromisso do sigilo médico.
- 20.** Há contraindicação das vacinas contra a dengue, aprovadas para uso no Brasil, para
- (A) crianças a partir de 9 anos de idade que já tiveram a doença.
 - (B) gestantes, mulheres que amamentam e portadores de imunodeficiências.
 - (C) crianças com doenças congênitas.
 - (D) mulheres com doenças crônicas.
 - (E) pessoas entre 18 e 60 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente, 35 anos, com quadro de rinorreia amarelada e obstrução nasal à esquerda, tosse e cacosmia há 6 meses, sem melhora após vários tratamentos com antibióticos. Tem nasofibroscopia com secreção purulenta em meato médio à esquerda e tomografia de seios paranasais com velamento e hiperostose de seio maxilar esquerdo sem erosão óssea, além de presença de conteúdo heterogêneo (calcificação) em seio maxilar esquerdo. Nega tabagismo, etilismo, quadro de atopia, doenças sistêmicas ou imunodeficiências.

Frente ao quadro clínico apresentado, qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Rinossinusite fúngica alérgica.
- (B) Rinossinusite crônica com polipose nasal.
- (C) Rinossinusite fúngica invasiva.
- (D) Bola fúngica.
- (E) Carcinoma espinocelular de seio maxilar.

22. Paciente, 28 anos, sexo feminino, refere perda auditiva unilateral progressiva à direita há 2 anos, iniciada após ter ficado grávida de seu 2º filho. Tem audição normal à esquerda. Sua tia tem o mesmo quadro clínico e já precisou de tratamento cirúrgico para resolução da queixa auditiva.

Frente à principal hipótese diagnóstica para o caso, a imitanciometria da paciente apresentará quais resultados?

- (A) Curva Ar e ausência de reflexo estapediano ipsilateral à direita.
- (B) Curva B e ausência de reflexo estapediano bilateral.
- (C) Curva Ad e presença de reflexo estapediano contralateral à direita.
- (D) Curva C e presença de reflexo estapediano ipsilateral à esquerda.
- (E) Curva As e ausência de reflexo estapediano ipsilateral à esquerda.

23. Qual o agente causador mais comum em casos de otite externa necrotizante?

- (A) *Streptococcus pyogenes*.
- (B) *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (D) *Klebsiella sp.*
- (E) *Staphylococcus epidermidis*.

24. Em tomografia computadorizada de seios paranasais de paciente com tumor nasossinusal e epistaxe, foi observado o sinal de Hollman-Miller.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Estesioneuroblastoma.
- (B) Nasoangiofibroma.
- (C) Hemangiopericitoma.
- (D) Papiloma invertido.
- (E) Hemangioma.

25. Em paciente com episódios de aftas orais recorrentes, com 4 ou 5 aftas concomitantes em lábio e palato mole, com diâmetro de 1 a 2 cm, duração de 6 semanas e muito dolorosas, qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Aftas herpetiformes.
- (B) Pênfigo vulgar.
- (C) Doença de Sutton.
- (D) Doença de Mikulicz.
- (E) Penfigoide bolhoso.

26. Qual o tratamento para a glossite mediana rômbica?

- (A) Exérese cirúrgica da lesão.
- (B) Clindamicina oral por 10 dias.
- (C) Crioterapia.
- (D) Neomicina tópica por 7 dias.
- (E) Nistatina tópica por 14 dias.

27. Qual a lesão de prega vocal mais associada com microweb de comissura glótica anterior?

- (A) Pólipo vocal.
- (B) Sulco vocal.
- (C) Vasculodisgenesia.
- (D) Nódulo vocal.
- (E) Cisto vocal.

28. Sobre a epiglote aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização de nasofibrolaringoscopia não pode ser realizada para confirmação do diagnóstico.
- (B) O tratamento inicial deve ser realizado com amoxicilina com clavulanato de potássio e prednisolona por via oral, com reavaliação ambulatorial em 7 dias.
- (C) Leva a quadro de dor de garganta leve, com resolução entre 2 a 3 dias.
- (D) A vacinação para *Haemophilus influenzae* tipo B é eficaz para diminuir a incidência dessa doença.
- (E) A radiografia lateral do pescoço apresenta o “sinal da torre”.

- 29.** Na polissonografia, a hipopneia é definida como uma diminuição da linha base de pressão nasal em
- (A) 30%, com duração mínima de 10 segundos, associada à dessaturação de 3%.
 - (B) 30%, com duração mínima de 10 segundos, sem necessidade de microdespertar ou dessaturação.
 - (C) 30%, com duração mínima de 30 segundos, associada à dessaturação de 1%.
 - (D) 10%, com duração mínima de 10 segundos, associada a microdespertar.
 - (E) 20%, com duração mínima de 20 segundos, associada à dessaturação de 2%.
- 30.** Na avaliação de pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono, a classificação de Friedman considera o índice de Mallampati modificado (MM), o tamanho das amígdalas pela classificação de Brodsky e o índice de massa corpórea (IMC).
- Dessa maneira, qual alternativa corresponde ao estadió II de Friedman?
- (A) MM tipo 1; Brodsky grau 2 e IMC < 40 kg/m².
 - (B) MM tipo 2; Brodsky grau 3 e IMC < 40 kg/m².
 - (C) MM tipo 3; Brodsky grau 1 e IMC > 40 kg/m².
 - (D) MM tipo 3; Brodsky grau 1 e IMC < 40 kg/m².
 - (E) MM tipo 3; Brodsky grau 4 e IMC > 40 kg/m².
- 31.** Sobre a polissonografia, assinale a alternativa correta.
- (A) A do tipo II não necessita da presença do técnico em medicina do sono para colocação e retirada do aparelho.
 - (B) A do tipo IV identifica os tipos de apneia e as dessaturações de oxigênio.
 - (C) A do tipo III não permite a avaliação de movimentos de membros inferiores.
 - (D) A do tipo II não permite a identificação das fases do sono.
 - (E) A do tipo III diferencia se os eventos ocorreram na vigília ou durante o sono.
- 32.** Na avaliação anatômica do paciente a ser submetido à rinosseptoplastia, qual o ângulo nasolabial ideal para o homem e para a mulher, respectivamente?
- (A) 90°; entre 100° e 115°.
 - (B) 90°; entre 110° e 120°.
 - (C) Entre 90° e 100°; entre 110° e 115°.
 - (D) 100°; entre 90° e 110°.
 - (E) 100°; entre 90° e 100°.
- 33.** Sobre os tumores malignos de nasofaringe, assinale a alternativa correta.
- (A) O sintoma inicial mais comum é a obstrução nasal associada à epistaxe.
 - (B) Tem incidência aumentada no sudoeste asiático.
 - (C) O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma.
 - (D) É mais prevalente em mulheres.
 - (E) Não têm relação com história pregressa de mononucleose infecciosa.
- 34.** Na avaliação de massa cervical com suspeita de metástase cervical de tumor de cavidade oral, a classificação das cadeias cervicais é um parâmetro importante para a realização dos esvaziamentos cervicais.
- O nível II é subdividido em IIa e IIb por qual estrutura?
- (A) Músculo esterno-hiideo.
 - (B) Músculo digástrico.
 - (C) Músculo milo-hiideo.
 - (D) Nervo submandibular.
 - (E) Nervo espinal acessório.
- 35.** Sobre os nódulos vocais, assinale a alternativa correta.
- (A) A proporção glótica das mulheres adultas as protege do desenvolvimento dos nódulos vocais.
 - (B) Nas crianças, os nódulos vocais são mais comuns no sexo feminino.
 - (C) Não há associação da presença de nódulos vocais com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
 - (D) Uma concentração elevada de fibronectinas na prega vocal aumenta a chance do desenvolvimento de nódulos vocais.
 - (E) Levam ao aparecimento de voz rugosa, soprosa e tensa, mas sem tensão cervical evidente.
- 36.** Em paciente com paralisia de prega vocal e anquilose da articulação cricoaritenóidea, quais exames devem ser solicitados para investigação diagnóstica?
- (A) VDRL e FTA-Abs.
 - (B) Ressonância magnética de crânio e de tórax.
 - (C) Fator reumatoide e anti-Sm.
 - (D) Hemograma e tomografia computadorizada de pescoço.
 - (E) Eletroencefalografia laríngea e tomografia computadorizada de crânio.

37. Quanto às alterações observadas na fisiopatologia da atresia coanal, assinale a alternativa correta.
- (A) Ocorreu fusão dos processos palatinos com o septo nasal e com a base do osso esfenóide.
 - (B) Não ocorreu o rompimento da proeminência nasal lateral.
 - (C) Ocorreu falha na fusão do planoide nasal e da proeminência nasal lateral.
 - (D) Ocorreu falha do rompimento das membranas buco-faríngea e nasofaríngea.
 - (E) Há aumento da pneumatização do seio esfenoidal.
38. Considerando-se o hemangiopericitoma, assinale a alternativa correta.
- (A) Nos seios paranasais, é mais comum no seio etmoidal e maxilar.
 - (B) É um tumor vascular, em geral com comportamento benigno.
 - (C) Tem pico de incidência entre os 50 e 70 anos.
 - (D) É mais frequente nos seios paranasais do que na cavidade nasal.
 - (E) A radioterapia adjuvante ao tratamento cirúrgico é contraindicada.
39. Sobre as granulomatoses nasossinusais, assinale a alternativa correta.
- (A) A actinomicose é uma infecção fúngica, mais frequente em homens entre 40 e 60 anos, com má higiene oral ou história de cirurgia na cavidade oral e acometimento frequente de seios paranasais.
 - (B) O rinoscleroma é uma doença infecciosa crônica causada pela *Klebsiella rhinoscleromatis*, tendo como tratamento a exérese cirúrgica e administração de ciprofloxacina.
 - (C) A sífilis apresenta acometimento nasal e nasossinusal, principalmente no seio maxilar, e não cursa com perfuração septal e deformidade estética.
 - (D) A rinosporidiose nasal é a segunda doença granulomatosa mais comum dos seios paranasais, caracterizada por acometimento nasossinusal sem presença de lesões polipoides nasais, e o tratamento deve ser feito com antifúngico sistêmico.
 - (E) A granulomatose com poliangiite pode revelar granulomas necrosantes e vasculite, é rara na cavidade nasal e nos seios paranasais e apresenta C-ANCA (anticorpo anticitoplasma de neutrófilos) frequentemente positivo.
40. Paciente, 40 anos, sexo feminino, refere boca seca e gosto ruim na boca há 6 meses. Pouca melhora da queixa apesar de tomar líquidos várias vezes ao dia. Não usa nenhuma medicação regular. Nega quaisquer outras queixas otorrinolaringológicas. Ao exame físico, apresenta mucosa oral seca, sem brilho, sem nenhuma lesão clinicamente evidente. O fluxo salivar não estimulado foi de 1 mL em 15 minutos.
- Qual a conduta mais adequada para essa paciente?
- (A) Prescrever clonazepam e encaminhar para avaliação psiquiátrica.
 - (B) Orientar que essa queixa faz parte do envelhecimento normal e aumentar hidratação.
 - (C) Solicitar endoscopia digestiva alta e nasofibrolaringoscopia.
 - (D) Solicitar anti-Ro e anti-La e realizar biópsia da mucosa jugal.
 - (E) Prescrever bochechos com nistatina tópica por 14 dias.
41. Quais doenças são diagnósticos diferenciais do líquen plano reticular?
- (A) Leucoplasia pilosa e penfigoide cicatricial.
 - (B) Candidíase pseudomembranosa e nevo branco esponjoso.
 - (C) Candidíase eritematosa e leucoedema.
 - (D) Leucoplasia e pênfigo vulgar.
 - (E) Penfigoide bolhoso e pênfigo vulgar.
42. Paciente, 72 anos, apresenta schwannoma do nervo vestibular à direita.
- Qual é o resultado esperado do PEATE nesse paciente?
- (A) Latência das ondas I, III e V com amplitude aumentada, atraso de latência das ondas I e III e intervalos interpicos I-III, III-V e I-V dentro dos critérios de referência.
 - (B) Latência das ondas I, III e V dentro dos critérios de referência e intervalos interpicos I-III, III-V e I-V dentro dos critérios de referência.
 - (C) Atraso das latências das ondas I, III e V e intervalos interpicos I-III, III-V e I-V dentro dos critérios de referência.
 - (D) Latência da onda I dentro dos critérios de referência, atraso de latência das ondas III e V e intervalos interpicos I-III, III-V e I-V dentro dos critérios de referência.
 - (E) Latência da onda I dentro dos critérios de referência, atraso de latência das ondas III e V, aumento dos intervalos interpicos I-III e I-V.

43. Em paciente com diagnóstico de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) de canal semicircular posterior direito, foi realizada manobra de Epley. Imediatamente após o término da manobra, ele iniciou quadro de vertigem persistente com náuseas e vômitos.
- Qual é a conduta mais adequada nessa situação clínica?
- (A) Prescrever betaistina e reavaliar o paciente em 30 dias.
 - (B) Prescrever meclizina, repouso e reavaliar o paciente em 7 dias.
 - (C) Solicitar ressonância magnética de ossos temporais.
 - (D) Realizar manobra reversa de Epley.
 - (E) Realizar novo teste de Dix-Hallpike para verificar a persistência da VPPB de canal posterior.
44. Sobre as perdas auditivas hereditárias, assinale a alternativa correta.
- (A) A maioria das perdas auditivas pré-linguais não sindrômicas têm transmissão autossômica recessiva.
 - (B) As perdas auditivas com transmissão autossômica dominante e com surdez ao nascimento têm associação com malformações cocleares.
 - (C) As perdas auditivas sindrômicas representam a maioria dos casos das perdas genéticas, sendo a principal a promovida pela mutação do gene GJB2.
 - (D) Nas perdas genéticas com transmissão mitocondriais, o DNA mitocondrial é transmitido pelo pai e pela mãe e causa perda auditiva em todas as gerações.
 - (E) As formas sindrômicas causam apenas perda auditiva neurossensorial, pois estão associadas exclusivamente a cocleopatias.
45. Paciente, 25 anos, sem comorbidades, apresenta paralisia facial periférica súbita unilateral há 2 dias.
- Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.
- (A) O teste de Hilger avalia a resposta neural e tem valor prognóstico importante na paralisia aguda.
 - (B) A eletroneurografia é indicada até a sexta semana de evolução da doença.
 - (C) A eletromiografia avalia indiretamente a resposta do nervo, analisando a atividade elétrica da musculatura facial, sendo útil, portanto, em fases mais tardias da paralisia.
 - (D) A presença de potenciais polifásicos na eletromiografia é sinal de mal prognóstico, sendo dado evidente de degeneração neural.
 - (E) Na evolução de uma paralisia facial periférica do caso em questão, a maioria dos pacientes passam a apresentar sinais de contratura muscular e/ou sincinesias.
46. Na ressonância magnética de ossos temporais,
- (A) o schwannoma tem sinal hiperintenso em T1 e em T2, sem realce com gadolínio.
 - (B) o meningioma tem sinal isointenso em T1 e hipointenso em T2, com realce com gadolínio.
 - (C) o granuloma de colesterol tem sinal hiperintenso em T1 e T2, com realce ao gadolínio.
 - (D) o colesteatoma tem sinal hiperintenso em T1 e hipointenso em T2, sem realce com gadolínio.
 - (E) a mucocèle tem sinal isointenso em T1 e hipointenso em T2, sem realce com gadolínio.
47. Paciente, 4 anos, tem episódios frequentes de vertigem súbita nos últimos 6 meses, sem desencadeantes, com resolução em 2 horas, associados a náuseas, palidez cutânea e sensação de medo. Tem exame físico otorrinolaringológico, neurológico e otoneurológico normais. Realizou audiometria e exame otoneurológico que vieram normais.
- Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.
- (A) Não tem relação com antecedente familiar de migrânea.
 - (B) É mais prevalente no sexo feminino.
 - (C) O quadro pode se estender até a idade adulta.
 - (D) Pode progredir para epilepsia temporal.
 - (E) A videonistagmografia pode mostrar hiperatividade vestibular.
48. A fibrose cística causa rinossinusite crônica e sintomas pulmonares e é decorrente da mutação no gene regulador CFTR.
- Qual a mutação mais comum nessa doença?
- (A) Deleção da fenilalanina na posição 508.
 - (B) Deleção da adenosina na posição 308.
 - (C) Deleção da fenilalanina na posição 308.
 - (D) Deleção da citosina na posição 408.
 - (E) Deleção da adenosina na posição 508.
49. Em exame anatomopatológico de biópsia de lesão da cavidade oral, foi encontrada fenda acantolítica suprabasal.
- A principal hipótese diagnóstica é:
- (A) Líquen plano.
 - (B) herpes simples.
 - (C) necrólise epidérmica tóxica.
 - (D) pênfigo vulgar.
 - (E) penfigoide bolhoso.
50. A crista falciforme separa o nervo
- (A) facial do nervo trigêmeo.
 - (B) coclear do nervo trigêmeo.
 - (C) vestibular inferior do nervo coclear.
 - (D) vestibular inferior do nervo vestibular superior.
 - (E) facial do nervo vestibular superior.

