



**Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná - CISCOPAR**
Concurso Público 01/2026

CADERNO DE PROVA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA



3 horas



50 questões



4 alternativas



Saída permitida somente após 1 hora de prova



O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

- ⌚ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ⌚ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ⌚ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ⌚ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ⌚ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26		31		36		41		46	
02		07		12		17		22		27		32		37		42		47	
03		08		13		18		23		28		33		38		43		48	
04		09		14		19		24		29		34		39		44		49	
05		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

Para responder às questões 01 a 10, leia o texto abaixo.

Telemedicina: avanços e desafios na integração da tecnologia à prática médica

A telemedicina, definida como o uso de tecnologias de comunicação e informação para fornecer cuidados de saúde à distância, tem se tornado uma ferramenta essencial na modernização dos sistemas de saúde globais. Desde sua implementação inicial, que remonta ao uso do telégrafo e do rádio para transmitir informações médicas, a telemedicina evoluiu significativamente, sendo potencializada pelo advento da internet e de tecnologias digitais avançadas. Essa prática ganhou relevância particular durante a pandemia de COVID-19, em que a necessidade de manter o distanciamento social impulsionou sua adoção em uma escala sem precedentes.

A pandemia de COVID-19, em particular, acelerou o processo de adoção da telemedicina em todo o mundo. As restrições impostas pela necessidade de isolamento social e o aumento da demanda por serviços de saúde forçaram muitos países a implementar rapidamente sistemas de telemedicina, mesmo onde anteriormente havia resistência ou regulamentações limitantes. No Brasil, a telemedicina foi regulamentada de forma emergencial em 2020, com a finalidade de garantir o atendimento a pacientes sem expô-los ao risco de contágio.

O conceito de telemedicina abrange uma ampla gama de aplicações, desde consultas simples por videoconferência até o monitoramento remoto de pacientes crônicos e intervenções cirúrgicas robóticas. A sua importância reside em sua capacidade de transformar a prática médica tradicional. Ela tem se tornado cada vez mais essencial no contexto global de saúde, especialmente diante das demandas crescentes por acessibilidade, qualidade e eficiência nos serviços médicos e pode proporcionar conveniência e acessibilidade para pacientes que precisam receber cuidados médicos sem a necessidade de deslocamento físico, economizando tempo e custos associados ao transporte e ao tempo de espera. Além disso, o uso de plataformas digitais reduz a sobrecarga de hospitais e clínicas, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em casos mais graves, o que melhora a eficiência do sistema como um todo.

A telemedicina está redesenhando o panorama da saúde global. Seu futuro depende de como os desafios atuais serão enfrentados e de como as novas tecnologias serão integradas de maneira ética e inclusiva.

Fonte: LUZ, M. R. M. *et al.* Telemedicina: avanços e desafios na integração da tecnologia à prática médica. **Revista Contemporânea**, vol. 4, n°. 10, 2024 (com adaptações).

Questão 01. A compreensão de um texto dissertativo exige a identificação de como o autor estrutura seus argumentos e articula fatos ao longo da exposição para fundamentar seu ponto de vista. Diante dos mecanismos de fundamentação mobilizados na composição do texto, e considerando a progressão lógica das ideias e os pressupostos implícitos e explícitos, é CORRETO inferir que a trajetória histórica da telemedicina:

- (A) Apresenta uma dinâmica de desenvolvimento incremental, cuja evolução se confunde com a própria história dos meios de telecomunicação.
- (B) Desenvolveu-se de maneira intermitente, carecendo de relevância prática e social antes da eclosão de crises sanitárias contemporâneas.
- (C) Teve suas diretrizes fundamentais delineadas no cenário nacional para mitigar assimetrias geográficas na distribuição de profissionais.
- (D) Inaugurou-se de forma imediata na modernidade, impulsionada estritamente pela universalização do acesso às redes de internet.

Questão 02. No texto, os autores estabelecem um nexo causal entre a eclosão da crise sanitária global de 2020 e as transformações institucionais que viabilizaram a expansão da telemedicina, sugerindo que cenários de excepcionalidade alteram os ritmos de aceitação de novas práticas. Diante do quadro argumentativo apresentado, depreende-se que o fator determinante para a superação das barreiras burocráticas e das resistências regulatórias foi:

- (A) A necessidade imperativa de isolamento social somada à sobrecarga da demanda por assistência médica.
- (B) A obsolescência estrutural e tecnológica diagnosticada nos modelos tradicionais de atendimento clínico.
- (C) O consenso unânime alcançado pela comunidade médica global quanto à infalibilidade e à segurança jurídica imediata dos atendimentos remotos.
- (D) O alinhamento estratégico e a pressão econômica exercidos por conglomerados transnacionais da tecnologia digital avançada.

Questão 03. Ao examinar as potencialidades e as repercussões da telemedicina no ecossistema de saúde global, depreende-se que a relevância dessa modalidade para a eficácia do sistema reside primariamente na:

- (A) Sub-rogação irrestrita da prática clínica presencial, conferindo às plataformas digitais a exclusividade no manejo de qualquer natureza de quadro patológico.
- (B) Unificação dos processos de alta complexidade em ambientes virtuais, mediante a aplicação de protocolos automatizados e operados por inteligência artificial.
- (C) Dinamização da estrutura de atendimento, ao proporcionar ganhos logísticos aos pacientes e promover uma gestão mais racional dos leitos.
- (D) Mitigação das despesas fixas com infraestrutura física, viabilizando o encerramento de postos de triagem e de atendimento de urgência local.

Questão 04. No final do texto, os autores constroem uma projeção prospectiva acerca do desenvolvimento da telemedicina. Tendo em vista a estratégia de fechamento argumentativo adotada e os sentidos decorrentes desse fragmento, analise as três partes que seguem:

(1ª parte): Depreende-se do trecho que a mera sofisticação instrumental das plataformas digitais, por si só, é insuficiente para garantir o sucesso da telemedicina.

(2ª parte): A conclusão do texto projeta um cenário de interdependência entre o desenvolvimento técnico e o vetor social, sugerindo que o avanço da telemedicina deve ser acompanhado pela democratização do acesso.

(3ª parte): Atribui-se à telemedicina um papel ativo e transformador na contemporaneidade, caracterizando-a como um vetor de reconfiguração estrutural da saúde em escala mundial.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a 1ª e a 2ª partes estão corretas.
- (B) Apenas a 2ª e a 3ª partes estão corretas.
- (C) Apenas a 1ª e a 3ª partes estão corretas.
- (D) Todas as partes estão corretas.

Questão 05. Analise o emprego das vírgulas no seguinte fragmento do segundo parágrafo do texto: **No Brasil, a telemedicina foi regulamentada de forma emergencial em 2020, com a finalidade de garantir o atendimento...**

A respeito da justificativa gramatical e do efeito de sentido decorrente da marcação por vírgulas nesse trecho, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A segunda vírgula é obrigatória por separar uma oração coordenada adversativa, evidenciando uma quebra de expectativa em relação à regulamentação.
- (B) A segunda vírgula isola uma estrutura condicional, funcionando como uma pausa que organiza as justificativas socio-humanitárias do ato normativo.
- (C) A retirada de ambas as vírgulas comprometeria irremediavelmente a correção sintática do período, gerando um erro de concordância nominal.
- (D) A primeira vírgula isola um adjunto adverbial de lugar que, por estar deslocado para o início do período e possuir curta extensão, é facultativa.

Questão 06. O vocábulo **ferramenta** apresenta uma assimetria entre a sua representação gráfica e a sua realidade fonética, sendo constituído formalmente por 10 letras e 8 fonemas. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta um vocábulo extraído do texto que possui o mesmo número de fonemas que a palavra mencionada.

- (A) processo.
- (B) pandemia.
- (C) consultas.
- (D) contexto.

Questão 07. Considere o trecho do primeiro parágrafo e, com base em aspectos morfofssintáticos e ortográficos da norma-padrão, analise as assertivas que seguem:

Essa prática ganhou relevância particular durante a pandemia de COVID-19...

- I. No contexto gramatical em que se insere, o vocábulo **particular** classifica-se morfológicamente como um adjetivo que especifica o substantivo **relevância**.
- II. Os vocábulos **prática** e **relevância** são acentuados graficamente com base na mesma regra gramatical, que determina a acentuação de vogais abertas.
- III. No contexto oracional, o vocábulo **Essa** classifica-se morfológicamente como um pronome demonstrativo e desempenha a função sintática de adjunto adnominal do substantivo a que acompanha.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 08. No terceiro parágrafo, afirma-se que a triagem realizada pelas plataformas digitais de atendimento médico **reduz a sobrecarga de hospitais e clínicas**. A expressão **sobrecarga**, no ambiente semântico da gestão em saúde global abordado pelo texto, traduz-se fielmente como:

- (A) A deterioração física estrutural e o sucateamento dos equipamentos tecnológicos das unidades.
- (B) O colapso financeiro decorrente da inadimplência dos usuários de planos de saúde privados.
- (C) A saturação da capacidade operacional e o esgotamento do fluxo de atendimento.
- (D) A hipertrofia burocrática dos sistemas de regulação que atrasa a liberação de procedimentos cirúrgicos complexos.

Questão 09. Com base na compreensão global do texto e na hierarquia das ideias estruturadas pelos autores ao longo do seu desenvolvimento argumentativo, analise as assertivas que seguem:

- I. O assunto principal do texto restringe-se à análise do impacto da pandemia de COVID-19 na infraestrutura tecnológica dos hospitais públicos brasileiros.
- II. A menção histórica ao uso do telégrafo e do rádio atua como a ideia principal do texto, da qual derivam as discussões sobre a legislação de 2020.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está incorreta.
- (B) Apenas II está incorreta.
- (C) I e II estão incorretas.
- (D) I e II estão corretas.

Questão 10. Analise a estrutura sintática da seguinte oração extraída do terceiro parágrafo do texto:

Ela tem se tornado cada vez mais essencial no contexto global de saúde...

A respeito do termo sublinhado e da correta classificação do seu sujeito segundo a gramática normativa, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A presença do pronome átono **se** atua como índice de indeterminação do sujeito, tornando a oração um exemplo de sujeito indeterminado de terceira pessoa.
- (B) Trata-se de um caso de sujeito oculto, visto que o verdadeiro núcleo substantivo do termo se encontra formalmente fora dos limites dessa oração.
- (C) Configura um sujeito simples, cujo núcleo é o pronome **Ela**, o qual se encontra expresso e realiza a concordância com a locução verbal.
- (D) Trata-se de uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo **tornar-se** assume caráter impessoal ao indicar uma transição de estado contínua.

MATEMÁTICA/INFORMÁTICA/NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL

Questão 11. A farmácia central do consórcio distribuiu em um dia um total de 160 caixas de dois medicamentos específicos, Alfa e Beta, para atender à demanda dos municípios integrados. O estoque do medicamento Alfa é armazenado em caixas que contêm 20 frascos cada, enquanto as caixas do medicamento Beta contêm 50 frascos cada.

Sabendo que o número total de frascos distribuídos somou exatamente 5.000 unidades, qual foi a quantidade de caixas entregues especificamente do medicamento do tipo Alfa?

- (A) 80 caixas.
- (B) 110 caixas.
- (C) 90 caixas.
- (D) 100 caixas.

Questão 12. A diretoria de um consórcio de saúde decidiu pavimentar uma área retangular interna de sua sede, cujas dimensões são de 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. No centro desse espaço, haverá um canteiro verde circular com diâmetro correspondente à metade da largura total do terreno pavimentado.

Considerando a aproximação de π igual a 3, calcule a medida da área que receberá efetivamente o piso, excluindo a região que será destinada ao canteiro de plantas, e assinale a alternativa com a resposta CORRETA.

- (A) 90 m².
- (B) 84 m².
- (C) 72 m².
- (D) 48 m².

Questão 13. Um reservatório de água em formato de cilindro circular reto foi instalado na sede do consórcio para garantir o abastecimento em períodos de manutenção. Esse tanque possui um diâmetro interno de 4 metros e uma altura total de 6 metros. Sabendo que no momento o nível da água atinge exatamente dois terços da capacidade máxima de armazenamento do cilindro, qual é o volume de água presente no reservatório? Considere a aproximação de π igual a 3 para a realização do cálculo.

- (A) 48 m³.
- (B) 72 m³.
- (C) 36 m³.
- (D) 96 m³.

Questão 14. Muitos usuários confundem a **Central de Notificações** com o menu de **Configurações Rápidas** do Windows 11, uma vez que ambos os recursos estão posicionados no canto inferior direito da Barra de Tarefas. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve uma ação que pode ser executada exclusivamente por meio do menu de **Configurações Rápidas** (Windows + A) e não pela **Central de Notificações** (Windows + N).

- (A) Visualizar o calendário mensal com a data atual e consultar os compromissos agendados no sistema.
- (B) Limpar o histórico e gerenciar o agrupamento de alertas emitidos por aplicativos de segurança ou antivírus.
- (C) Ativar o recurso de Luz Noturna ou gerenciar conexões de dispositivos sem fio via Bluetooth.
- (D) Visualizar e interagir com o resumo de uma mensagem ou menção recebida no Microsoft Teams.

Questão 15. Durante uma auditoria de segurança da informação nos computadores do CISCOPAR, os técnicos de suporte orientaram os servidores a revisarem as configurações de privacidade dos navegadores de internet para evitar o rastreamento excessivo de dados e o vazamento de informações institucionais. No Google Chrome, a seção **Privacidade e segurança** centraliza os principais comandos para controle de dados, navegação e permissões de hardware. Com base nas ferramentas disponíveis nessa seção, analise as partes que seguem:

(1ª parte): Na seção **Guia de Privacidade**, o usuário pode gerenciar globalmente ou por domínio individual as permissões de acesso a componentes de hardware instalados na máquina, como a **Câmera** e o **Microfone**.

(2ª parte): Na seção **Excluir dados**, o usuário pode excluir imagens e arquivos em cache, o histórico de downloads e desinstalar drivers do sistema operacional.

(3ª parte): Na seção **Cookies de terceiros**, o usuário pode selecionar a opção **Bloquear cookies de terceiros** para impedir que redes de anúncios monitorem seus hábitos de navegação em múltiplos sites.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a 3ª parte está correta.
- (B) Apenas a 2ª e a 3ª partes estão corretas.
- (C) Apenas a 1ª e a 3ª partes estão corretas.
- (D) Todas as partes estão incorretas.

Questão 16. No cotidiano administrativo do CISCOPAR, os servidores manipulam constantemente uma grande quantidade de documentos digitais, como editais de licitação, contratos de rateio e prontuários médicos. Para otimizar a localização e a triagem rápida desses documentos sem a necessidade de abrir múltiplos arquivos simultaneamente, os funcionários utilizam os recursos avançados de interface, atalhos e modos de exibição do **Explorador de Arquivos** do Windows 11. Considerando as funcionalidades da barra de ferramentas superior e os comandos de navegação desse gerenciador de arquivos, analise as assertivas que seguem:

- I. O modo de visualização **Lista** é o único que exibe o tamanho exato de arquivos de texto e planilhas em kilobytes (KB) logo ao lado do nome do arquivo.
- II. Na barra de ferramentas superior, o botão **Visualizar** permite ativar o **Painel de Visualização**, que mostra o conteúdo de um arquivo (como um PDF ou imagem) à direita da tela, antes mesmo de abri-lo.
- III. Para fechar rapidamente uma aba/guia específica que esteja ativa no **Explorador de Arquivos** sem fechar a janela inteira, o usuário pode utilizar a combinação de teclas **Ctrl + W**.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 17. A Constituição Federal traz que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos Municípios, por exemplo, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

- I. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, sem ressalvas.
- II. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) Apenas I está incorreta.
- (D) I e II estão incorretas.

Questão 18. De acordo com o texto constitucional, a soberania popular deve ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, tal soberania popular se dá mediante as formas presentes em quantos dos seguintes itens? **I.** Iniciativa popular; **II.** Comissão Parlamentar de Inquérito; **III.** Mandado de segurança.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

Questão 19. À luz da atual legislação de licitações e contratos administrativos, o que se entende como qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato?

- (A) Notória especialização.
- (B) Serviço de engenharia.
- (C) Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.
- (D) Serviços não contínuos ou contratados por escopo.

Questão 20. Conforme a Lei nº 14.133/2021, nas alterações unilaterais possíveis em contratos, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até _____ do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) vinte por cento; trinta e cinco por cento.
- (B) cinquenta por cento; setenta e cinco por cento.
- (C) setenta e cinco por cento; cem por cento.
- (D) vinte e cinco por cento; cinquenta por cento.

LEGISLAÇÃO SUS

Questão 21. Analise as partes que seguem, com base no Decreto nº 1.232/1994:

A descentralização dos serviços de saúde para os Municípios e a regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e concretizadas com a cooperação técnica da União (1ª parte), tendo em vista o direito de acesso da população aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e à igualdade do atendimento (2ª parte).

Acerca das partes, pode-se afirmar que:

- (A) Assim como a 1ª parte está incorreta, tem-se que a 2ª parte também está.
- (B) Assim como a 1ª parte está correta, tem-se que a 2ª parte também está.
- (C) Enquanto a 1ª parte está correta, sabe-se que a 2ª parte não está.
- (D) Enquanto a 1ª parte está incorreta, sabe-se que a 2ª parte não está.

Questão 22. A Lei nº 8.142/1990 traz que o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com algumas instâncias colegiadas. Qual dessas instâncias reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada, por exemplo, pelo Poder Executivo?

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Colegiado de Atenção Básica.
- (C) Centro de Atenção Básica.
- (D) Conferência de Saúde.

Questão 23. A Lei Orgânica da Saúde traz que o processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde é _____, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos _____, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) ascendente; fiscalizadores.
- (B) descendente; fiscalizadores.
- (C) ascendente; deliberativos.
- (D) descendente; deliberativos.

Questão 24. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios. Esses recursos devem ser repassados de forma regular e automática para os Municípios, de acordo com os critérios previstos na Lei Orgânica da Saúde. Para receberem esses recursos, os Municípios devem contar com o previsto, por exemplo, em quantos dos seguintes itens, conforme a Lei nº 8.142/1990? **I.** Plano de saúde; **II.** Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; **III.** Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, previsto o prazo de dois anos para sua implantação.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

Questão 25. Pode-se afirmar, com base na Lei Orgânica da Saúde, que o orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas em qual dos seguintes dispositivos legais?

- (A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- (B) Lei do Orçamento Anual.
- (C) Plano Plurianual.
- (D) Plano Diretor.

Questão 26. Analise o texto que segue, conforme o Decreto nº 7.508/2011:

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério geracional, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

Acerca do texto, pode-se afirmar que ele está:

- (A) Parcialmente adequado, visto que o critério citado é cronológico.
- (B) Parcialmente adequado, visto que o acesso não é igualitário, mas equânime.
- (C) Plenamente adequado, visto que observa a legislação vigente.
- (D) Plenamente inadequado, visto que em nada observa a legislação vigente.

Questão 27. Acerca do planejamento de saúde, com base no que traz o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas que seguem:

- I.** No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma suplementar ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- II.** O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas, salvo para a iniciativa privada.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) Apenas I está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I e II estão incorretas.
- (D) Apenas I está incorreta.

Questão 28. Considerando a Lei Orgânica da Saúde, acerca dos serviços privados de assistência à saúde, analise o que está sendo afirmado nas alternativas que seguem e assinale a que apresenta informação que pode ser considerada INCORRETA.

- (A) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em quaisquer casos.
- (B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.

Questão 29. Para fins da Lei Orgânica da Saúde, considera-se _____ a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Preenche CORRETAMENTE a lacuna:

- (A) saúde assistida.
- (B) telessaúde.
- (C) prática integrativa.
- (D) polissaúde.

Questão 30. O Decreto nº 7.508/2011 afirma que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente, o previsto em quantos dos seguintes itens? **I.** Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS; **II.** Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; **III.** Ter o medicamento sido prescrito por qualquer profissional de saúde.

- (A) Nenhum deles.
- (B) Apenas 1 deles.
- (C) Apenas 2 deles.
- (D) Todos os 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31. A entrevista é um dos principais métodos utilizados na avaliação, permitindo ao avaliador compreender aspectos do desempenho ocupacional, da história de vida e do contexto do indivíduo. Sobre a entrevista como método de avaliação na área da terapia ocupacional, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A entrevista tem como principal finalidade levantar informações objetivas sobre a condição clínica do indivíduo, sendo os aspectos subjetivos da experiência ocupacional explorados prioritariamente por meio da observação do desempenho.
- (B) A entrevista semiestruturada combina perguntas previamente definidas com a possibilidade de aprofundamento durante a conversa, permitindo maior flexibilidade e garantindo a uniformidade das perguntas aplicadas a todos os indivíduos avaliados.
- (C) A entrevista constitui um método de avaliação centrado no paciente, no qual o profissional busca confirmar as hipóteses clínicas formuladas previamente, direcionando a investigação para os aspectos considerados mais relevantes do caso.
- (D) Embora possibilite avaliar aspectos relacionados ao desempenho ocupacional, a entrevista é considerada um método indireto de avaliação por fundamentar-se, prioritariamente, nas informações fornecidas pelo indivíduo ou por terceiros, e não na observação da realização das ocupações.

Questão 32. Um homem de 62 anos, destro, foi encaminhado para avaliação após sofrer um Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico há três meses. Durante a avaliação, o Terapeuta Ocupacional observou dificuldade para elevar o membro superior direito acima da cabeça e para realizar atividades como pentear os cabelos e alcançar objetos em prateleiras. O paciente apresenta compreensão preservada e consegue seguir comandos simples. O Terapeuta decide avaliar, de forma padronizada, a força muscular dos principais grupos musculares do ombro e a amplitude de movimento da articulação glenoumeral. Com base nos métodos e técnicas de avaliação da força muscular e da amplitude articular, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Durante o Teste Muscular Manual, um músculo recebe grau 3 quando completa toda a amplitude de movimento contra a gravidade e suporta resistência moderada aplicada pelo examinador.
- (B) Diferenças entre a amplitude ativa e a passiva podem fornecer informações relevantes sobre a integridade muscular, o controle motor e a presença de restrições mecânicas ao movimento.
- (C) Na avaliação goniométrica, recomenda-se mensurar prioritariamente a amplitude de movimento passiva, uma vez que ela representa a capacidade funcional da articulação independentemente do desempenho muscular do paciente.
- (D) A utilização do goniômetro universal permite mensurar a amplitude de movimento das articulações, sendo recomendável posicionar seu eixo no centro anatômico da articulação e alinhar ambos os braços do instrumento com o segmento distal durante a mensuração.

Questão 33. Durante o processo de avaliação, a escolha dos métodos e instrumentos deve possibilitar a identificação das alterações das funções mentais e sua repercussão sobre o desempenho ocupacional, subsidiando o planejamento terapêutico. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A entrevista clínica deve ser utilizada para coleta de dados sociodemográficos, enquanto a avaliação das funções mentais depende de instrumentos psicométricos validados.
- (B) Os instrumentos padronizados de rastreio cognitivo constituem método suficiente para determinar a capacidade funcional do indivíduo quando apresentam adequada sensibilidade e especificidade.
- (C) A avaliação das funções executivas é particularmente recomendada em indivíduos com suspeita de doenças neurodegenerativas, sendo prescindida quando não há evidências clínicas dessas condições.
- (D) A observação do desempenho ocupacional possibilita identificar a repercussão funcional das alterações cognitivas, porém deve ser interpretada em conjunto com a entrevista clínica, aplicação de instrumentos padronizados e análise das demandas ocupacionais e ambientais.

Questão 34. Uma Terapeuta Ocupacional realiza a avaliação de um paciente de 42 anos, vítima de um acidente com lesão do nervo mediano há quatro meses. Durante a consulta, o paciente relata dificuldade em manipular pequenos objetos, abotoar camisas e identificar objetos dentro do bolso sem recorrer à visão. Ao exame físico, apresenta cicatriz na região palmar, preservação da força muscular para os movimentos básicos da mão, porém refere diminuição da percepção ao toque e dificuldade para diferenciar estímulos táteis. Considerando os métodos e técnicas de avaliação da sensibilidade, analise as afirmativas abaixo:

- I. O teste dos monofilamentos de Semmes-Weinstein é amplamente utilizado para quantificar o limiar de percepção ao toque por meio da aplicação de monofilamentos calibrados de diferentes espessuras.
- II. A discriminação de dois pontos avalia a capacidade do paciente de distinguir dois estímulos táteis simultâneos, sendo um teste relacionado à sensibilidade discriminativa.
- III. A estereognosia pode ser avaliada solicitando-se ao paciente que identifique objetos familiares apenas pelo tato, desde que apresente integridade da sensibilidade tátil primária.

Estão CORRETAS:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 35. Um homem de 62 anos, hipertenso e diabético, foi admitido após episódio súbito de fraqueza em hemicorpo direito, dificuldade de fala e desorientação temporal. A ressonância magnética evidenciou isquemia na região da artéria cerebral média esquerda. Após estabilização clínica, ele foi encaminhado à terapia ocupacional para reabilitação funcional. Na avaliação, observa-se hemiparesia direita, apraxia ideomotora, dificuldade de planejamento motor e prejuízo em atividades de autocuidado, especialmente vestir-se e realizar a higiene pessoal. Com base na neuroanatomia funcional e nas implicações clínicas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A lesão na artéria cerebral média esquerda pode comprometer áreas relacionadas à linguagem (como áreas de Broca e/ou Wernicke), justificando possíveis alterações de comunicação verbal.
- (B) O comprometimento funcional observado pode ser explicado principalmente por alterações musculares periféricas secundárias ao imobilismo prolongado, sem participação significativa das vias córtico-espinhais ou de outras estruturas do sistema nervoso central.
- (C) A apraxia ideomotora decorre primariamente de lesões nos gânglios da base, responsáveis pela integração sensório-motora e pelo planejamento de gestos voluntários.
- (D) A hemiparesia observada decorre principalmente de lesão do neurônio motor inferior no lado ipsilateral ao acometimento cerebral, justificando a perda de força no hemicorpo direito.

Questão 36. Um Terapeuta Ocupacional atende um paciente de 68 anos, com diagnóstico de doença de Parkinson há cinco anos. Durante a avaliação, o paciente relata dificuldade para abotoar camisas, utilizar talheres, escrever, levantar-se da cadeira e caminhar em ambientes movimentados. Também refere episódios de perda de equilíbrio ao mudar rapidamente de direção e medo de sofrer novas quedas. Durante a observação clínica, o Terapeuta identifica bradicinesia, redução do balanço dos membros superiores durante a marcha e diminuição da velocidade na execução de movimentos finos. Considerando os métodos e técnicas de avaliação da coordenação motora e do equilíbrio utilizados na terapia ocupacional, analise as afirmativas a seguir:

- I. Embora seja frequentemente empregado para estimar o risco de quedas, o Timed Up and Go (TUG) não se restringe à avaliação desse desfecho, pois também fornece informações sobre aspectos da mobilidade funcional e do equilíbrio dinâmico durante uma tarefa motora composta.
- II. O Nine Hole Peg Test avalia predominantemente a velocidade e a precisão dos movimentos finos das mãos, sendo amplamente utilizado para mensurar a destreza manual e a coordenação motora fina.
- III. O Teste de Romberg é indicado para avaliar o equilíbrio estático, permitindo também mensurar a coordenação motora dos membros inferiores durante a manutenção da postura.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.

Questão 37. Um Terapeuta Ocupacional é chamado para avaliação de um recém-nascido prematuro de 30 semanas de idade gestacional, internado em UTI neonatal há 10 dias. O bebê apresenta instabilidade dos sinais vitais durante manipulações, episódios frequentes de dessaturação, sobressaltos aos estímulos ambientais, choro fraco e dificuldade em manter a postura flexora. A equipe de enfermagem relata que o recém-nascido parece "hiperreativo" à luz e ao ruído da unidade. A mãe demonstra insegurança em realizar o contato pele a pele e evita segurar o bebê por medo de piorar o quadro clínico. Com base na atuação na assistência ao bebê de alto risco, assinale a alternativa que representa a conduta MAIS adequada na fase inicial da intervenção.

- (A) Estimular precocemente movimentos ativos dos membros superiores e inferiores com o objetivo de acelerar o desenvolvimento motor global e prevenir atrasos neuropsicomotores.
- (B) Implementar estratégias de regulação sensorial e organizacional, como controle de estímulos ambientais, contenção postural, facilitação de flexão e orientação para manejo do bebê baseada em sinais de estresse e autorregulação.
- (C) Orientar a família a suspender o contato físico até que o bebê atinja estabilidade clínica completa, priorizando apenas intervenções médicas intensivas.
- (D) Introduzir imediatamente estímulos vestibulares (balanço e mudanças frequentes de posição) para favorecer a maturação do sistema vestibular e reduzir a hipotonia.

Questão 38. Uma criança de 7 anos, com diagnóstico de Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP) do tipo espástica diparética, é encaminhada ao serviço de terapia ocupacional para avaliação da capacidade funcional e planejamento terapêutico. A mãe relata dificuldades importantes nas atividades de autocuidado, principalmente na alimentação e no vestir-se, além de dependência parcial para locomoção em ambientes externos. O serviço decide utilizar instrumentos padronizados para mensurar a funcionalidade e o nível de independência. Com base nesse caso e nos instrumentos de avaliação funcional (PEDI e MIF), analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A MIF (Medida de Independência Funcional) tende a ser indicada como instrumento de escolha para esse caso específico, visto que foi desenvolvida com foco em populações pediátricas com condições neurológicas, incluindo ECNP, sendo amplamente utilizada para mensuração do desempenho funcional infantil.
- () O PEDI pode ser considerado uma alternativa possível para essa avaliação em população pediátrica, uma vez que contempla domínios como autocuidado, mobilidade e função social, embora sua aplicabilidade dependa da adequação do perfil clínico e do objetivo avaliativo.
- () O PEDI, em sua aplicação clínica, pode envolver tanto entrevista com cuidadores quanto observação estruturada do desempenho, possibilitando estimar não apenas a capacidade funcional, mas também o nível de dependência em atividades cotidianas.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – V.

Questão 39. Durante um grupo terapêutico, dois participantes discordam sobre a forma de realizar determinada atividade, iniciando um conflito verbal. Nessa situação, o Terapeuta Ocupacional deve:

- (A) Interromper temporariamente a atividade grupal para garantir a contenção do ambiente e reorganizar o grupo antes da retomada da tarefa.
- (B) Assumir a função de mediador, favorecendo o diálogo e o alcance dos objetivos terapêuticos.
- (C) Adotar postura de observação clínica, evitando intervenções diretas para não reforçar padrões de dependência do Terapeuta.
- (D) Estimular que o próprio grupo construa estratégias de resolução do conflito, minimizando a intervenção direta do Terapeuta Ocupacional.

Questão 40. Uma criança de 7 meses de idade, nascida a termo, foi encaminhada ao ambulatório de estimulação precoce para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor após o pediatra observar atraso na aquisição de marcos motores. Durante a entrevista, a mãe relata que a criança rola apenas para um dos lados, permanece sentada somente com apoio e apresenta pouca iniciativa para explorar brinquedos. O Terapeuta Ocupacional decide realizar uma avaliação padronizada para identificar o perfil do desenvolvimento e subsidiar o planejamento terapêutico. Com base no caso clínico e nos instrumentos de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Alberta Infant Motor Scale (AIMS) é uma escala observacional utilizada para avaliar o desenvolvimento motor de lactentes, sendo a sua aplicação dependente da execução de tarefas previamente solicitadas pelo avaliador.
- (B) O Movement Assessment of Infants (MAI) é indicado principalmente para identificar precocemente alterações motoras em lactentes com risco de distúrbios neurológicos, avaliando a motricidade grossa e prescindindo da análise de reflexos primitivos e do tônus muscular.
- (C) A Ficha de David Werner consiste em um instrumento de triagem baseado na observação de marcos do desenvolvimento organizados por faixa etária, sendo amplamente utilizada em contextos de atenção primária e serviços com poucos recursos.
- (D) O Movement Assessment of Infants (MAI) é indicado para identificar precocemente alterações motoras em lactentes com risco neurológico, sendo recomendado prioritariamente para crianças entre 18 e 36 meses de idade.

Questão 41. Uma mulher de 38 anos, com diagnóstico de esclerose múltipla na forma remitente-recorrente, é encaminhada para avaliação devido à dificuldade para realizar atividades de vida diária que exigem deslocamentos prolongados. A paciente relata fadiga intensa após pequenas caminhadas e sensação de instabilidade ao andar. Durante a avaliação clínica, o Terapeuta Ocupacional observa aumento da base de sustentação, oscilação do tronco, redução da velocidade da marcha e dificuldade para realizar mudanças rápidas de direção. Considerando os métodos e as técnicas de avaliação da postura e da marcha, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A marcha apresentada pela paciente é compatível com um padrão atáxico, devendo sua avaliação incluir observação clínica sistematizada da marcha, análise do equilíbrio e aplicação de testes funcionais destinados à investigação da mobilidade e do risco de quedas.
- (B) A observação clínica da marcha constitui um importante método de triagem, sendo indicada principalmente para identificar alterações quantitativas da marcha, enquanto os aspectos qualitativos são obtidos preferencialmente por avaliações instrumentais.
- (C) A avaliação postural deve iniciar pela análise do alinhamento corporal em posição ortostática estática, uma vez que essa etapa fornece os principais elementos necessários para a interpretação das alterações funcionais.
- (D) Como a fadiga apresenta caráter flutuante, sua investigação é mais relevante durante o acompanhamento terapêutico do que na avaliação inicial da marcha.

Questão 42. O conhecimento sobre níveis de amputação e dispositivos ortopédicos utilizados na reabilitação de membros inferiores é fundamental para a prática clínica, especialmente no que se refere à prescrição, adaptação e treinamento funcional com próteses e órteses. Nesse contexto, relacione corretamente os termos da Coluna A com suas respectivas descrições, dispostas na Coluna B:

Coluna A:

1. Amputação de Lisfranc.
2. Amputação de Syme.
3. Amputação de Chopart.
4. Palmilha 3/4 (três quartos).
5. Prótese transtibial.

Coluna B:

- () Amputação realizada por desarticulação da articulação tibiotársica, com preservação do coxim plantar do calcâneo, permitindo apoio distal do coto e adaptação protética funcional.
- () Ressecção do pé ao nível da articulação tarsometatarsal, com preservação parcial do mediopé e necessidade frequente de órtese para controle de deformidades em equino.
- () Dispositivo de descarga plantar que se estende até aproximadamente 2/3 do comprimento do pé, utilizado para redistribuição de carga e suporte biomecânico em alterações do antepé e mediopé.
- () Dispositivo protético que permite substituição funcional do segmento amputado por meio de encaixe, componentes estruturais e pé protético.
- () Amputação que preserva o calcâneo, permitindo apoio plantar parcial, mas com tendência à deformidade em equino-varo devido ao desequilíbrio muscular.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- (B) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (C) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- (D) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.

Questão 43. Uma Terapeuta Ocupacional atua em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e atende uma mulher de 28 anos com diagnóstico de transtorno bipolar tipo I. A paciente encontra-se em fase de estabilidade clínica, mas relata dificuldades para retomar sua rotina ocupacional, especialmente no gerenciamento do tempo, organização de tarefas domésticas e manutenção de atividades de estudo e lazer. Durante o processo terapêutico, a profissional utiliza a análise de atividades para compreender a estrutura de uma rotina diária típica da paciente, identificando demandas cognitivas, emocionais e contextuais envolvidas. A intervenção é planejada com base em um modelo teórico centrado na ocupação, articulando recursos terapêuticos como treino de habilidades de vida diária, construção de rotina estruturada e uso de estratégias de compensação e adaptação ambiental. Considerando os fundamentos históricos e epistemológicos da terapia ocupacional, os modelos teóricos e o uso da análise de atividades como recurso terapêutico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os modelos teóricos podem ser compreendidos como referenciais que organizam e descrevem a prática profissional, auxiliando na articulação entre pessoa, ocupação e ambiente, além de servirem como base para a análise de atividades e para a seleção e adaptação de recursos terapêuticos.
- (B) No desenvolvimento, observa-se que a consolidação dos modelos teóricos ocorreu de forma independente da prática clínica, sendo posteriormente incorporados como referenciais explicativos sem impacto na organização dos processos terapêuticos.
- (C) Em contextos de saúde mental, a análise de atividades é frequentemente substituída por abordagens centradas no discurso subjetivo do paciente, uma vez que a decomposição da atividade pode interferir na compreensão global do sofrimento psíquico.
- (D) A escolha de recursos terapêuticos é orientada principalmente pela disponibilidade institucional e pela experiência prática do profissional, sendo a fundamentação teórica um elemento complementar.

Questão 44. Uma Terapeuta Ocupacional atua em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e acompanha um homem de 42 anos com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, histórico de múltiplas internações psiquiátricas e abandono do tratamento. Nos últimos meses, ele tem participado de oficinas de geração de renda, porém apresenta forte resistência às atividades coletivas, interpreta as falas dos outros usuários como críticas direcionadas a ele e alterna períodos de isolamento com momentos de intensa dependência da equipe. Durante as atividades, a profissional observa que o paciente tende a reproduzir com ela padrões relacionais de desconfiança e idealização, exigindo atenção exclusiva e, em outros momentos, recusando qualquer vínculo. A equipe relata dificuldades em manter sua adesão ao projeto terapêutico, apesar de ele demonstrar interesse em retomar atividades de costura, que realizava antes do adoecimento. Nesse contexto, assinale a alternativa MAIS adequada para a condução do caso.

- (A) Priorizar intervenções voltadas ao desenvolvimento de habilidades ocupacionais instrumentais relacionadas ao trabalho, com ênfase na estruturação individual das tarefas, utilizando o espaço grupal quando houver maior estabilidade do quadro relacional do usuário.
- (B) Manter o vínculo terapêutico em uma configuração mais delimitada e técnica, com foco na organização de atividades previamente estruturadas, de modo a evitar que fenômenos transferenciais comprometam a adesão ao plano terapêutico.
- (C) Favorecer inicialmente intervenções individuais com foco na reestruturação cognitiva das interpretações disfuncionais, utilizando atividades ocupacionais grupais após maior estabilização das crenças delirantes e melhora da crítica da realidade.
- (D) Utilizar as oficinas e atividades coletivas como dispositivo socioterápico central, articulando o fazer ocupacional à reconstrução de pertencimento social e ao manejo de movimentos transferenciais emergentes no campo relacional.

Questão 45. Uma mulher de 55 anos procura atendimento após diagnóstico recente de Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP). Ela apresenta quedas frequentes, especialmente para trás, rigidez axial, dificuldade de controle ocular (principalmente movimentos verticais), além de lentificação para iniciar e executar tarefas. A família relata que ela "trava" ao começar atividades simples, como levantar da cadeira ou iniciar o preparo de refeições, e tem evitado sair de casa devido ao medo de quedas. Na avaliação ocupacional, observa-se comprometimento importante da mobilidade funcional, alterações de equilíbrio postural e dificuldade de sequenciamento motor, com preservação relativa da força distal. Considerando a atuação em neurologia, julgue abaixo as alternativas para a intervenção inicial:

- I. Priorizar treino de marcha em terrenos irregulares para estimular a adaptação vestibular e reduzir o risco de quedas futuras em ambientes externos.
- II. Implementar estratégias de segurança ambiental, treino de transferências com técnicas de facilitação, uso de pistas visuais e auditivas para iniciar movimentos e adaptação das atividades de vida diária com foco na prevenção de quedas.
- III. Indicar restrição temporária de atividades fora do ambiente domiciliar, mantendo repouso relativo até a estabilização do quadro clínico, em função do elevado risco de quedas e da rápida progressão da condição neurológica.

Está(ão) INCORRETA(S):

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.

Questão 46. Uma mulher de 46 anos sofreu uma fratura distal de rádio há quatro meses, tratada cirurgicamente. Apesar da consolidação óssea adequada, evoluiu com dor intensa e desproporcional ao estímulo, edema persistente, alterações de coloração e temperatura da mão, hipersensibilidade ao toque e limitação importante dos movimentos. Relata evitar utilizar o membro acometido nas atividades de vida diária por medo da dor. Durante a avaliação terapêutica ocupacional, observa-se redução da funcionalidade manual e importante impacto no desempenho ocupacional. Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS adequada de intervenção.

- (A) Priorizar a redução da dor e do edema antes do início do treino funcional, introduzindo atividades ocupacionais apenas após melhora significativa dos sinais inflamatórios.
- (B) Realizar exercícios ativos para ganho de amplitude de movimento, evitando atividades que envolvam manipulação de objetos até que a mobilidade articular esteja completamente restabelecida.
- (C) Empregar estratégias de dessensibilização, educação sobre dor, exposição gradual ao movimento e atividades significativas, favorecendo a reintegração progressiva do membro afetado às ocupações cotidianas.
- (D) Associar técnicas de dessensibilização e mobilização funcional, orientando o paciente a interromper imediatamente qualquer atividade ao primeiro sinal de dor, como forma de prevenir sensibilização adicional.

Questão 47. Uma mulher de 84 anos reside em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) há dois anos. Apesar de não apresentar comprometimento cognitivo importante, a equipe observa redução progressiva da participação nas atividades cotidianas, permanência prolongada no leito durante o dia, diminuição do interesse pelas atividades oferecidas e perda de força muscular. Na avaliação terapêutico-ocupacional, identifica-se independência parcial nas atividades básicas de vida diária, porém importante restrição na participação social, redução do repertório ocupacional e risco aumentado de síndrome do desuso. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa MAIS adequada sobre como se deve proceder nesse caso.

- (A) Desenvolver um plano terapêutico centrado na pessoa, promovendo oportunidades de engajamento em ocupações significativas, prevenção da síndrome do desuso, manutenção da autonomia e ampliação da participação social.
- (B) Estruturar inicialmente um programa voltado ao ganho de força muscular e resistência física, utilizando atividades ocupacionais após a recuperação funcional, uma vez que o desempenho ocupacional depende da melhora dos componentes motores.
- (C) Priorizar atividades individuais compatíveis com o nível funcional da idosa, limitando sua participação em atividades coletivas, como estratégia para reduzir riscos durante a intervenção.
- (D) Realizar adaptações ambientais e prescrever tecnologias assistivas para compensar as limitações funcionais existentes, priorizando estratégias compensatórias em razão das alterações decorrentes do envelhecimento avançado.

Questão 48. A atuação em equipe constitui um dos pilares da organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo articulação entre diferentes profissionais para o planejamento e a execução das ações de cuidado. Com base nesse contexto, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é elaborado coletivamente pela equipe; entretanto, a definição das metas terapêuticas deve ser realizada pelo profissional responsável pelo diagnóstico principal do usuário, cabendo aos demais membros adequar suas intervenções a essas metas.
- () Na atuação multiprofissional, os diferentes profissionais compartilham informações sobre o usuário, porém cada categoria elabora e executa seu plano de cuidado de forma independente.
- () O Terapeuta Ocupacional contribui para a equipe por meio da avaliação do desempenho ocupacional, da promoção da autonomia, da independência funcional e da participação nas atividades de vida diária, instrumentais, trabalho, educação, lazer e participação social.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – V.

Questão 49. Um Terapeuta Ocupacional integra uma equipe de atenção domiciliar que acompanha um adolescente de 15 anos com diagnóstico de Ataxia de Friedreich, em estágio moderado da doença. O paciente apresenta disartria progressiva, perda de coordenação motora global, fadiga intensa e uso de cadeira de rodas para deslocamentos externos. Reside com os pais e uma irmã de 10 anos. A família relata dificuldade crescente para lidar com a progressão da doença, especialmente em relação à antecipação de perdas funcionais, adaptação do ambiente doméstico e manutenção da participação do adolescente nas atividades escolares e sociais. Os pais também demonstram sinais de sofrimento emocional e evitam discutir prognóstico com o filho. Durante a visita domiciliar, o profissional observa que o quarto do adolescente foi reorganizado para facilitar os cuidados, porém, com a redução da autonomia nas atividades simples, e que a irmã mais nova foi informalmente "incluída" como auxiliar nos cuidados diários, sem orientação adequada. Considerando a atuação na atenção à família e na assistência domiciliar, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A atuação deve incluir intervenção centrada na família, com reorganização ambiental orientada pela manutenção de desempenho ocupacional significativo, suporte à distribuição adequada de funções de cuidado e apoio à comunicação progressiva.
- (B) A participação da irmã mais nova nas tarefas de cuidado pode ser considerada uma estratégia adaptativa positiva, desde que inserida de forma espontânea no contexto familiar, pois contribui para a redistribuição de funções e fortalecimento do suporte intrafamiliar.
- (C) A assistência domiciliar em casos de alta complexidade neurodegenerativa deve ser progressivamente substituída por acompanhamento institucionalizado, pois o ambiente domiciliar tende a limitar intervenções estruturadas de reabilitação e a sobrecarga familiar contínua reduz a efetividade terapêutica.
- (D) Em contextos de doenças neurológicas progressivas em adolescentes, a abordagem domiciliar deve priorizar o manejo funcional direto do paciente, sendo a discussão sobre prognóstico e adaptação familiar conduzida quando houver solicitação explícita da família ou piora funcional importante.

Questão 50. Uma Terapeuta Ocupacional foi contratada para integrar a equipe de saúde do trabalhador de um consórcio público após o aumento de afastamentos relacionados à fadiga mental, erros operacionais e queixas de exaustão entre trabalhadores do setor de embalagem. Durante a observação das atividades, verificou-se que o posto de trabalho possuía mobiliário adequado e boas condições ambientais, porém os trabalhadores realizavam tarefas altamente repetitivas, sob rígido controle de produtividade, com poucas possibilidades de autonomia, interrupções frequentes para atender demandas simultâneas e escassos momentos de recuperação durante a jornada. Após discussão com a equipe multiprofissional, concluiu-se que a principal intervenção deveria priorizar fatores relacionados à organização do trabalho, conforme os princípios da ergonomia contemporânea. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Terapeuta Ocupacional pode integrar ações voltadas à reorganização do processo de trabalho, subsidiando modificações na organização das tarefas, no ritmo das atividades, na distribuição das demandas e nos períodos de pausa, a partir da análise da atividade real e em articulação com as ações de vigilância em saúde do trabalhador.
- (B) A adoção de mobiliário ergonomicamente adequado constitui a principal medida para prevenção dos agravos relacionados ao trabalho, sendo as modificações na organização das tarefas indicadas apenas quando persistirem queixas dos trabalhadores.
- (C) As intervenções ergonômicas são mais indicadas quando já existem evidências de adoecimento ocupacional no local de trabalho, permitindo direcionar as adaptações aos trabalhadores acometidos e otimizar os recursos disponíveis.
- (D) A implementação de pausas programadas constitui medida suficiente para atender às recomendações ergonômicas quando o ambiente físico apresenta condições adequadas de iluminação, temperatura e mobiliário.