

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60

2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina em crianças e adolescentes: implicações clínicas e nutricionais

Nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Contexto atual e relevância para a pediatria

Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na categoria de suplementos alimentares, sendo compostos, respectivamente, por proteína do soro do leite e creatina. O whey protein apresenta-se em diferentes formas (concentrada, isolada ou hidrolisada) e é divulgado com alegações relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico. A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos (arginina, glicina e metionina), produzido pelo organismo e também obtido pela alimentação, especialmente por meio de carnes e peixes, e desempenha papel no metabolismo energético celular, especialmente em tecidos de alta demanda, como o músculo esquelético. Esses suplementos estão amplamente difundidos no contexto da prática de atividade física e esportiva entre adultos e caracterizam-se, em sua maioria, como produtos ultraprocessados, por incorporarem ingredientes como aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes. Diferentemente dos alimentos, que fornecem proteínas associadas a vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, esses produtos promovem uma oferta concentrada e descontextualizada de nutrientes, em desacordo com as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. O whey protein e a creatina têm sido introduzidos, de forma inadvertida, na alimentação de crianças e adolescentes, impulsionados por estratégias de marketing e pela influência das mídias digitais, frequentemente sem indicação clínica e sem orientação profissional. Esse cenário é agravado pela crescente oferta desses suplementos com apelo direcionado ao público infantil, por meio de rotulagem atrativa, sabores adocicados e formatos lúdicos, como balas, gomas e bebidas saborizadas. Tais características favorecem a percepção equivocada de que se trata de produtos habituais para a faixa etária pediátrica.

Necessidades proteicas na infância e adolescência: o papel dos alimentos

A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada. Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos que, em média, variam entre 0,85 e 0,95 g/kg/dia, facilmente atingidos por meio de uma alimentação variada e equilibrada. Na prática, observa-se que muitas crianças já apresentam ingestão proteica superior às necessidades fisiológicas, de modo que a adição de suplementos — mesmo em pequenas quantidades — não traz benefício comprovado e não é isenta de riscos. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados — como carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas, cereais, tubérculos, frutas e hortaliças — assegura não apenas a adequada oferta proteica (quantidade e qualidade), mas também a ingestão de todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. O uso de suplementos proteicos na pediatria é restrito a condições clínicas específicas, como desnutrição, doenças crônicas, síndromes de má absorção ou aumento da demanda metabólica, entre outras, sempre sob prescrição e acompanhamento profissional. Esse contexto não é extrapolável ao uso de

suplementos de whey protein ou de creatina em crianças e adolescentes com ou sem doenças associadas. Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. No rim, pode-se observar aumento da produção de ureia e hiperfiltração glomerular, com potencial de lesão intraglomerular em indivíduos suscetíveis. No fígado, intensificam-se a desaminação e o ciclo da ureia, elevando a produção de amônia, especialmente em contextos de imaturidade. Do ponto de vista metabólico, o excesso proteico pode estimular a secreção de insulina e de Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1), interferir no balanço energético e favorecer a lipogênese. Diante das evidências científicas atuais, não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. Nessa fase, deve-se priorizar a construção do comportamento alimentar e a oferta de uma alimentação diversificada, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada etapa do desenvolvimento. O uso indiscriminado desses suplementos, além de favorecer a ingestão excessiva de nutrientes com potencial de sobrecarga de órgãos e sistemas, também expõe as crianças e adolescentes a aditivos alimentares (corantes, conservantes, emulsificantes) e pode determinar a substituição de refeições, contribuindo para práticas alimentares inadequadas e para o desenvolvimento de uma relação disfuncional com a alimentação, cenário frequentemente agravado pela influência das redes sociais e por padrões corporais idealizados. O ato de se alimentar não se limita ao consumo de nutrientes, mas integra um processo relacional, cultural e identitário, construído no convívio familiar e social e marcado por escolhas, preparo e modos de consumo que expressam valores, tradições e vínculos afetivos.

Considerações finais

O uso de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina não é indicado para crianças saudáveis e não deve ser adotado de forma rotineira na adolescência. Uma alimentação saudável, variada e baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, em preparações culinárias, é suficiente para atender às necessidades nutricionais e promover a formação de hábitos alimentares adequados. A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas, com avaliação individualizada e acompanhamento profissional. O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados. A abordagem deve contemplar a educação nutricional, a valorização de práticas alimentares saudáveis e a discussão crítica sobre influências externas, como o marketing e as mídias sociais. Além disso, é essencial reconhecer precocemente o uso inadequado desses produtos e intervir de forma oportuna. O cuidado com a alimentação na infância e na adolescência constitui uma estratégia fundamental para a promoção da saúde ao longo da vida.

Disponível em <https://www.sbp.com.br/pediatras-alertam-sobre-perigos-do-uso-de-suplementos-proteicos-de-whey-protein-e-creatina-por-criancas-e-adolescentes/>

1. **Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal da nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.**
 - a) Incentivar o uso de creatina para melhora do desempenho escolar.
 - b) Alertar sobre o uso indiscriminado e sem orientação de whey protein e creatina em crianças e adolescentes.
 - c) Promover marcas de suplementos ultraprocessados com sabores adocicados.
 - d) Substituir a ingestão de carnes e peixes por suplementos nitrogenados.
 - e) Criticar a atuação da ANVISA na fiscalização de alimentos in natura.
2. **Análise: “A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada”, e assinale a alternativa que apresenta a importância do uso do advérbio em destaque neste contexto.**
 - a) Por ser um advérbio de negação, evidencia que os pais insistem em oferecer os produtos industrializados e os pediatras negam o uso com frequência.
 - b) Por ser um advérbio de frequência, mostra que diariamente crianças estão ingerindo produtos com calorias aumentadas.
 - c) Por ser um advérbio de dúvida, articula que muitos pais ainda se sentem inseguros sobre oferecer ou não produtos com proteína isolada.
 - d) Por ser um advérbio de tempo, enfatiza que o fato está acontecendo com certa recorrência.
 - e) Por ser um advérbio de funcionalidade, torna a oração com função de instigar o pensamento crítico de pessoas que fazem o uso das proteínas isoladas.
3. **Na oração: “Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela ANVISA...”, o sujeito é classificado como**
 - a) oculto.
 - b) indeterminado.
 - c) simples.
 - d) composto.
 - e) inexistente.
4. **Os vocábulos “clínicas”, “fisiológicas” e “metabólico”, presentes no texto, são acentuadas seguindo qual regra de acentuação?**
 - a) São todas oxítonas terminadas em “as” ou “o”.
 - b) São paroxítonas terminadas em ditongo.
 - c) Possuem hiatos tônicos.
 - d) São monossílabos tônicos.
 - e) São proparoxítonas, e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
5. **Análise o trecho: “A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado...”, sobre o uso das vírgulas, assinale a alternativa correta em relação ao seu uso.**
 - a) Isolar uma expressão explicativa ou de transição.
 - b) Separar elementos de uma enumeração.
 - c) Indicar a omissão de um verbo.
 - d) Separar o sujeito do predicado.
 - e) Marcar um vocativo.
6. **No segmento “Tais características favorecem a percepção equivocada...”, o termo destacado classifica-se como**
 - a) pronome relativo.
 - b) pronome demonstrativo.
 - c) pronome pessoal do caso reto.
 - d) pronome indefinido.
 - e) pronome possessivo.
7. **Em “...relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico”, sobre o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.**
 - a) A crase é obrigatória por conta da regência nominal da palavra “relacionadas” que exige a preposição “a”, somada ao artigo feminino que antecede “melhora”.
 - b) A crase é opcional, por ser uma locução adverbial de tempo feminina.
 - c) A crase é obrigatória por estar diante de um verbo substantivado feminino.
 - d) A crase é opcional antes de substantivos abstratos.
 - e) A crase é obrigatória por conta da regência do verbo “ganhar”, que exige preposição.
8. **Análise: “Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos...”, e assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o adjetivo destacado está no plural.**
 - a) Para concordar com o substantivo “adolescentes”.
 - b) Para concordar com o termo “requerimentos proteicos”.
 - c) Para concordar com o advérbio “frequentemente”.
 - d) Para concordar com a forma verbal “apresentam”.
 - e) Para concordar com “crianças e adolescentes”.
9. **De acordo com o texto, por que o uso de suplementos é considerado “descontextualizado” em comparação aos alimentos?**
 - a) Porque suplementos são mais baratos que comida.
 - b) Porque os suplementos oferecem nutrientes isolados sem as fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos alimentos íntegros.
 - c) Porque crianças não conseguem digerir proteínas de fontes animais.
 - d) Porque o marketing digital foca apenas em idosos.
 - e) Porque a ANVISA proibiu a venda de alimentos minimamente processados.
10. **No trecho “Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais...”, o verbo está flexionado no**
 - a) pretérito perfeito do indicativo.
 - b) futuro do presente do indicativo.
 - c) presente do subjuntivo.
 - d) presente do indicativo, indicando um fato ou estado atual das evidências científicas.
 - e) imperativo afirmativo.
11. **A oração “A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas...” encontra-se na**
 - a) voz ativa.
 - b) voz passiva analítica.
 - c) voz reflexiva.
 - d) voz reflexiva recíproca.
 - e) voz ativa com sujeito indeterminado.

12. No início do segundo parágrafo, o termo “Esse cenário” refere-se
- à introdução inadvertida de suplementos na alimentação infantil por marketing e influência digital.
 - ao sucesso das dietas baseadas em carnes e peixes.
 - à facilidade de atingir as necessidades proteicas com alimentos in natura.
 - às funções biológicas da creatina no músculo esquelético.
 - à correta orientação dos pediatras sobre suplementação.
13. Na expressão “produtos ultraprocessados”, a palavra destacada tem a função de
- indicar uma ação concluída pelo sujeito.
 - substituir o nome “produtos”.
 - caracterizar o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade ou estado.
 - conectar duas orações coordenadas.
 - modificar o sentido do verbo “enquadrados”.
14. Quais são os potenciais efeitos adversos do consumo excessivo e crônico de proteínas mencionados no texto?
- Melhora da visão e audição.
 - Redução imediata da gordura corporal e aumento de altura.
 - Fortalecimento do sistema imunológico contra vírus.
 - Apenas efeitos psicológicos relacionados às redes sociais.
 - Sobrecarga renal (hiperfiltração) e hepática (aumento da produção de amônia).
15. Analise o período: “O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados.” e assinale a alternativa que apresenta sua classificação.
- Período simples.
 - Período composto apenas por coordenação.
 - Período composto por coordenação e subordinação.
 - Período composto apenas por subordinação.
 - Frase nominal, sem coordenação ou subordinação.

Matemática

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O valor de $5!$ é 120.
 - $P(7, 3) = 210$.
 - $C(6, 2) = 12$.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. Uma gráfica imprime 1.200 folhetos em 4 horas. Quantos folhetos imprimirá em 7 horas, mantendo a mesma produtividade?
- 1800.
 - 2000.
 - 2100.
 - 2400.
 - 2700.

18. Um ângulo que mede 135° é classificado como
- agudo.
 - reto.
 - obtusos.
 - raso.
 - completo.
19. A média de idade de 8 pessoas é 25 anos. Se uma nona pessoa de 34 anos ingressar no grupo, a nova média será de
- 25 anos.
 - 26 anos.
 - 27 anos.
 - 28 anos.
 - 29 anos.
20. Considere a proposição: “O MMC de dois números naturais é sempre múltiplo do MDC desses números.” A respeito dessa proposição, assinale a alternativa correta.
- É falsa para números primos.
 - É falsa para números coprimos.
 - É verdadeira apenas quando os números são pares.
 - É verdadeira para quaisquer números naturais não nulos.
 - É verdadeira apenas quando o MDC é maior que 1.

Informática Básica

21. Considere o seguinte cenário: durante a elaboração de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), Juliana precisou padronizar rapidamente a aparência de vários trechos do documento. Para isso, ela selecionou um parágrafo já formatado e utilizou o pincel de formatação que permite copiar essa formatação e aplicá-la em outros trechos do texto sem alterar o conteúdo escrito. Com base no cenário apresentado, assinale a alternativa que representa corretamente o ícone correspondente ao recurso Pincel de Formatação.

-
-
-
-
-

22. O Microsoft Excel 365 (versão português) possui diferentes tipos de referências de células que influenciam o comportamento das fórmulas quando elas são copiadas para outras posições da planilha. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de referência da primeira coluna com suas respectivas ações da coluna seguinte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Referência relativa.
 2. Referência absoluta.
 3. Referência mista.
- () Utiliza o símbolo \$ para fixar linha e coluna, como em \$A\$1.
- () É ajustada automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células.
- () Permite fixar apenas a linha ou apenas a coluna, como A\$1 ou \$A1.
- () Mantém parte da referência fixa e outra parte variável durante a cópia da fórmula.
- a) 1 – 2 – 3 – 2.
 - b) 2 – 1 – 1 – 3.
 - c) 2 – 1 – 3 – 3.
 - d) 3 – 2 – 1 – 1.
 - e) 2 – 3 – 1 – 3.

23. O Windows 11 apresenta recursos voltados à produtividade, organização da área de trabalho e integração com aplicativos e serviços do sistema operacional. Entre esses recursos estão melhorias na interface, gerenciamento de janelas e personalização do ambiente de trabalho. Considerando as funcionalidades do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O Menu Iniciar do Windows 11 pode ser utilizado para acessar aplicativos instalados, arquivos recentes e opções de desligamento do computador.
 - II. O recurso Snap Layouts (Layouts de Ajuste), nativo do Windows 11, permite organizar janelas abertas em diferentes formatos de divisão da tela, facilitando a multitarefa.
 - III. A Barra de Tarefas do Windows 11 possibilita fixar aplicativos para acesso rápido durante a utilização do sistema.
 - IV. O Windows 11 permite personalizar elementos da interface, como plano de fundo, temas e cores do sistema operacional.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Google é considerado um _____, pois permite localizar conteúdos e informações disponíveis na _____ por meio de pesquisas realizadas pelos usuários. Entre os recursos disponíveis, destaca-se a pesquisa por _____, que possibilita localizar conteúdos semelhantes a partir do envio de fotografias, figuras ou arquivos visuais.

- a) navegador / internet / imagem
- b) buscador / internet / imagem
- c) diretório / rede local / voz
- d) provedor / intranet / áudio
- e) navegador / nuvem / favoritos

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor financeiro implantou autenticação de dois fatores (2FA) no acesso aos sistemas corporativos após identificar tentativas indevidas de acesso às contas de colaboradores. Após a implementação, houve redução de acessos não autorizados e aumento da segurança no ambiente computacional da organização. Com base no cenário apresentado e nos conceitos de segurança da informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O segundo fator de autenticação substitui os mecanismos de criptografia utilizados nos sistemas corporativos.
- () A autenticação de dois fatores aumenta a segurança da conta, pois adiciona uma camada extra de verificação no processo de acesso.
- () Aplicativos autenticadores e códigos enviados por SMS podem ser utilizados como mecanismos de autenticação em duas etapas.
- () Mesmo com autenticação de dois fatores, práticas como uso de senhas fortes e atenção a golpes de *phishing* continuam sendo necessárias.
- a) V – V – F – V.
 - b) F – F – V – F.
 - c) V – V – V – V.
 - d) F – V – V – V.
 - e) F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

26. De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das formas de provimento de cargo público.

- a) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
- b) São formas de provimento de cargo público a nomeação, contratação, promoção, reversão, redistribuição e recondução.
- c) São formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, aproveitamento e redistribuição.
- d) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, remoção, readaptação, reversão e reintegração.
- e) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e redistribuição.

27. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta.

- a) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
- b) A duração da jornada de trabalho não será superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
- c) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a jornada de 12x36 horas, regulamentada por legislação específica.
- d) A duração da jornada de trabalho será fixada exclusivamente em regulamento interno de cada secretaria municipal.
- e) A duração da jornada de trabalho não será superior a 12 (doze) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais para todos os servidores públicos municipais.

28. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por _____ instituída para essa finalidade.

- a) autoridade competente
- b) comissão
- c) junta médica oficial
- d) secretaria responsável
- e) chefia imediata

29. De acordo com o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O servidor perderá a remuneração do domingo caso falte _____.

- a) 01 dia na semana
- b) 02 dias na semana
- c) mais de 02 dias na semana
- d) 03 dias consecutivos
- e) 05 dias alternados no mês

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que o concurso poderá ser realizado em duas etapas, como dispuser o edital que regulamentar o mesmo, bem como ser utilizadas provas práticas.
 - () O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
 - () Poderá ser nomeado candidato de concurso novo enquanto houver candidato aprovado no mesmo cargo em concurso anterior com prazo de validade não expirado, em caráter excepcional, desde que se trate condição emergencial que atenda o interesse público.
 - () A aprovação em concurso gera direito à nomeação, esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
 - () Quando houver servidor público municipal em disponibilidade não será permitida a realização de concurso público, para preenchimento de cargo de igual categoria devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível.
- a) F – V – F – V – F.
 - b) V – F – V – F – V.
 - c) V – V – V – F – F.
 - d) V – V – F – F – V.
 - e) F – V – F – F – F.

31. Gestante de 32 semanas e 2 dias iniciou o pré-natal tardiamente e apresentou teste de sífilis reagente, assintomática. Não apresenta exames prévios para comparação. Foram prescritas três doses de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, 1 vez por semana, por 3 semanas. Sobre o controle de cura e os critérios para retratamento da sífilis na gestação, assinale a alternativa correta.

- a) O seguimento e o controle de cura são realizados com a coleta de teste não treponêmico mensal durante a gestação.
- b) O tratamento é considerado adequado quando o tratamento for iniciado em até 7 dias do parto.
- c) Nos casos de tratamento de fase latente tardia com títulos baixos nos testes não treponêmicos ($< 1/8$), a estabilidade da titulação sem ocorrência de queda é considerada resposta inadequada ao tratamento.
- d) Indica-se o retratamento se o intervalo entre as doses ultrapassou 7 dias.
- e) Indica-se o retratamento se não houver queda de duas diluições em 3 meses para a sífilis recente ou de duas diluições em 6 meses para a sífilis tardia.

32. Gestante de 33 semanas e 4 dias relata perda súbita de líquido claro em grande quantidade. Ao exame especular, observa-se saída de líquido pelo orifício externo do colo. Sobre a rotura prematura de membranas ovulares (RPMO), assinale a alternativa incorreta.
- O teste de Nitrazina baseia-se na alcalinização do pH vaginal pelo líquido amniótico, que torna o papel azul.
 - Em gestações entre 24 e 34 semanas com RPMO e sem infecção, a conduta expectante com corticoterapia para maturação pulmonar é recomendada.
 - A conduta em gestações a termo com RPMO deve ser expectante por 72 horas para aguardar o trabalho de parto espontâneo.
 - O Índice de Líquido Amniótico normal na ultrassonografia não exclui o diagnóstico de RPMO.
 - A tocólise na RPMO é controversa e, quando usada, deve ser restrita ao período de 48 horas para ação do corticoide.
33. O exame recomendado para o diagnóstico de diabetes gestacional, entre 24 e 28 semanas, é
- a hemoglobina glicada.
 - a glicemia capilar em jejum.
 - a dosagem de insulina basal.
 - a dosagem do lactogênio placentário humano.
 - o teste oral de tolerância à glicose.
34. O antídoto utilizado na intoxicação por sulfato de magnésio é o gluconato de
- magnésio.
 - sódio.
 - potássio.
 - cálcio.
 - ferro.
35. Puérpera em aleitamento materno exclusivo deseja iniciar método contraceptivo. Sobre as possibilidades no período puerperal, assinale a alternativa correta.
- O uso de preservativo feminino é contraindicado no puerpério.
 - O diafragma pode ser inserido na primeira semana pós-parto.
 - O uso de progestagênios isolados reduz a produção de leite materno.
 - O DIU de cobre é categoria 1 da OMS para início imediato após o parto (até 48h).
 - A injeção trimestral de medroxiprogesterona é categoria 1 da OMS para uso com menos de 6 semanas pós-parto.
36. Mulher de 26 anos, na 10ª semana de gestação, queixa-se de cansaço fácil, palpitações leves e episódios de tontura ao se levantar rapidamente. Ao exame, apresenta leve sopro sistólico funcional e mucosas coradas. Sobre as modificações do organismo materno na gestação, assinale a alternativa incorreta.
- O débito cardíaco aumenta precocemente na gestação, manifestando-se já na 5ª semana, devido à redução da resistência vascular sistêmica e aumento da frequência cardíaca.
 - A pressão arterial sistólica e diastólica diminuem significativamente entre a 6ª e 7ª semana após a última menstruação.
 - A “leucorreia da gestação” é um achado normal, resultante do acréscimo na transudação vaginal e estimulação do epitélio sob efeito hormonal.
 - A taxa de filtração glomerular aumenta na gestação, resultando em níveis séricos de creatinina e ureia menores do que em mulheres não gestantes.
 - A gestação é um estado de imunossupressão generalizada para evitar a rejeição do feto.
37. Gestante de 30 semanas procura o pronto-atendimento com contrações uterinas rítmicas (2 em 10 minutos). O exame físico revela colo com 2 cm de dilatação e esvaecimento de 50%. Sobre as medidas para prevenção da prematuridade e no trabalho de parto prematuro, assinale a alternativa correta.
- O repouso absoluto no leito é uma medida eficaz comprovada para evitar o parto prematuro espontâneo.
 - A medida do colo uterino por ultrassom transvaginal deve ser feita rotineiramente no 1º trimestre.
 - A cerclagem uterina é indicada para todas as gestações gemelares.
 - O uso de progesterona natural via vaginal é indicado para gestantes assintomáticas em gestação única e antecedente de parto prematuro.
 - A tocólise (inibição do parto) deve ser mantida até as 37 semanas.
38. Paciente de 33 semanas relata perda abrupta de líquido claro em grande quantidade. Ao exame especular, visualiza-se saída de líquido pelo orifício externo do colo. Sobre a rotura prematura de membranas ovulares (RPMO) e a condução do caso descrito, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O teste da cristalização mostra um padrão em folhas de samambaia devido à presença de eletrólitos no líquido amniótico.
 - A principal complicação da RPMO pré-termo é a corioamnionite.
 - Um Índice de Líquido Amniótico normal exclui o diagnóstico de RPMO.
 - O uso de corticosteroides é contraindicado na RPMO, pelo risco de mascarar infecção.
- Apenas II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.

39. Gestante de 26 semanas realiza teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75g de dextrosol. Resultados: Jejum 94 mg/dL; após 1 hora 185 mg/dL; após 2 horas 155 mg/dL. Sobre o diabetes gestacional (DMG), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A gestação induz um estado de resistência à insulina para priorizar a oferta de glicose ao feto por difusão facilitada.
- II. Gestantes com glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL no início da gravidez são diagnosticadas com diabetes mellitus pré-gestacional (overt diabetes).
- III. O teste de rastreamento para diabetes (TOTG) deve ser realizado rotineiramente na 12ª semana.
- IV. O DMG está associado à diminuição do tamanho da placenta.
- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II e IV estão corretas.
- e) Apenas I, II e IV estão corretas.
40. Gestante no primeiro trimestre apresenta sorologia para toxoplasmose: IgG não reagente e IgM reagente. Sobre o diagnóstico e tratamento da toxoplasmose aguda congênita, assinale a alternativa incorreta.
- a) Deve-se iniciar espiramicina imediatamente e repetir sorologia em 2 semanas.
- b) Se uma nova sorologia mostrar aparecimento de IgG (soroconversão), confirma-se infecção aguda.
- c) Achados sonográficos de infecção fetal por toxoplasmose incluem calcificações intracranianas, hidrocefalia e ascite.
- d) A espiramicina não atravessa a placenta de forma eficaz; ela serve apenas para prevenir a transmissão vertical.
- e) A transmissão vertical é mais frequente no primeiro trimestre do que no terceiro.
41. Gestante atendida na 1ª consulta de pré-natal com teste rápido para HIV reagente. Sobre o diagnóstico e seguimento do HIV na gestação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A carga viral no terceiro trimestre é o principal determinante para a escolha da via de parto.
- () O parto cesáreo é obrigatório para todas as gestantes com HIV.
- () Procedimentos invasivos (amniocentese) podem ser realizados se a gestante estiver com carga viral indetectável.
- () O uso de zidovudina intravenoso durante o trabalho de parto é mandatório se a carga viral for desconhecida ou > 1.000 cópias/mL próximo ao parto.
- () O HIV contraindica o uso de qualquer vacina na gestação.
- a) V – V – F – V – V.
- b) F – F – F – V – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) V – F – V – F – V.
- e) F – V – V – F – F.
42. Ultrassonografia de 12 semanas revela gestação com dois sacos gestacionais e uma única placenta. Com relação à assistência obstétrica das gestações múltiplas, assinale a alternativa correta.
- a) A frequência de anomalias congênitas é maior em gestações múltiplas do que em únicas.
- b) Na ultrassonografia morfológica de 1º trimestre, o cálculo de risco de aneuploidias em monocoriônicos deve ser individualizado para cada feto.
- c) Gêmeos dizigóticos podem ser monocoriônicos.
- d) Cerclagem profilática é recomendada para todas as gestações trigemelares.
- e) O seguimento de gêmeos dicoriônicos exige ultrassonografia semanal.
43. Gestante Rh negativo, parceiro Rh positivo, coombs indireto negativo na 28ª semana. Sobre a doença hemolítica perinatal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A profilaxia com imunoglobulina deve ser repetida após o parto se o recém-nascido for Rh positivo.
- () A anemia fetal causa diminuição do débito cardíaco fetal.
- () O aumento da velocidade sistólica máxima na artéria cerebral média ao Doppler é o principal sinal de anemia fetal.
- () O coombs indireto positivo com título 1:2 indica necessidade de transfusão intrauterina imediata.
- () O edema placentário e o polidrâmnio são achados ultrassonográficos tardios na isoimunização grave.
- a) V – V – F – V – V.
- b) F – F – F – V – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) V – F – V – F – V.
- e) F – V – V – F – F.
44. Gestante com 38 anos, rastreamento de 1º trimestre com risco de 1:10 para trissomia do cromossomo 21, opta por diagnóstico definitivo. Sobre os procedimentos invasivos em medicina fetal, assinale a alternativa correta.
- a) A biópsia de vilos coriais é realizada preferencialmente entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação.
- b) O risco de óbito fetal associado à cordocentese está entre 10 a 15%.
- c) Antes do procedimento, deve-se conferir a tipagem sanguínea materna para administrar imunoglobulina se Rh positivo.
- d) A cordocentese é realizada rotineiramente na 10ª semana.
- e) A anestesia geral materna é necessária para realizar a biópsia de vilos coriais.

45. Gestante de 34 semanas, com suspeita de restrição de crescimento fetal intrauterino, apresenta Doppler da artéria umbilical com índice de pulsatilidade no percentil 98 e artéria cerebral média com índice de pulsatilidade no percentil 3. Sobre as noções básicas em Dopplerfluxometria obstétrica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A “centralização fetal” é caracterizada pela vasodilatação da artéria umbilical, visando proteger órgãos nobres como o cérebro.
 - O Doppler do ducto venoso é um indicador de acidemia fetal e falência cardíaca em fetos com restrição de crescimento fetal intrauterino grave.
 - A persistência da incisura protodiastólica nas artérias uterinas após 24-26 semanas indica falha na invasão trofoblástica e risco de pré-eclâmpsia.
 - A Dopplervelocimetria é recomendada rotineiramente para todas as gestações de baixo risco.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
46. Há quatro tipos fundamentais de bacia. Sobre as características dos tipos pélvicos fundamentais, assinale a alternativa correta.
- No tipo androide, o risco de distocia é maior na insinuação, amenizando posteriormente.
 - No tipo platipeloide, o risco de distocia é crescente com a progressão da apresentação.
 - A bacia antropoide é o tipo menos comum de bacia.
 - A bacia ginecoide possui o ângulo subpúbico com maior amplitude.
 - A bacia antropoide possui o menor diâmetro biisquiático.
47. Mulher de 45 anos é submetida a uma histerectomia total abdominal por miomatose uterina volumosa. Durante a dissecação do ligamento largo e identificação da artéria uterina, o cirurgião deve estar atento à localização do ureter. Sobre a anatomia cirúrgica do aparelho reprodutor feminino, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A irrigação do útero provém principalmente da artéria uterina, ramo da artéria ilíaca interna.
 - O ureter cruza a artéria uterina anteriormente, facilitando sua identificação durante a ligadura do pedículo uterino.
 - O suporte central do útero e da vagina é determinado pela associação da cintura pélvica óssea e do diafragma pélvico, composto principalmente pelo músculo levantador do ânus.
 - O ligamento redondo é o principal responsável pela suspensão apical do útero e da cúpula vaginal.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
48. Mulher de 28 anos, com ciclos regulares de 28 dias, deseja engravidar e busca entender seus períodos férteis e as mudanças hormonais que ocorrem em seu corpo. Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, assinale a alternativa incorreta.
- O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é secretado pelo hipotálamo de maneira pulsátil, sendo que pulsos de baixa frequência favorecem o hormônio folículo estimulante (FSH) e de alta frequência favorecem o hormônio luteinizante (LH).
 - A ovulação ocorre aproximadamente 36 horas após o início do pico de LH e cerca de 10 a 12 horas após o seu valor máximo.
 - A duração da fase lútea é relativamente constante, durando entre 12 e 14 dias em ciclos saudáveis.
 - O FSH estimula as células da teca a converterem androgênios em estrogênios.
 - A segunda divisão meiótica do oócito é completada apenas após a fertilização pelo espermatozoide.
49. Sobre a origem embriológica das estruturas genitais internas femininas, assinale a alternativa correta.
- Os ductos mesonéfricos dão origem ao corpo e colo do útero.
 - Os ligamentos redondos e ovarianos derivam do seio urogenital.
 - A vagina tem origem dupla: o terço superior deriva dos ductos paramesonéfricos e os dois terços inferiores do seio urogenital.
 - A diferenciação dos ovários depende da presença do gene SRY.
 - A vagina completa sua canalização apenas no terceiro trimestre.
50. Adolescente de 15 anos procura atendimento por nunca ter menstruado. Apresenta desenvolvimento de mamas (Tanner M3) e pelos pubianos (P3). Sobre as causas de amenorreia primária, assinale a alternativa correta.
- O atraso constitucional da puberdade é classificado como hipogonadismo hipergonadotrófico.
 - A disgenesia gonadal pura (46,XX) apresenta níveis baixos de FSH.
 - A agenesia mülleriana cursa com cariótipo 46,XX e caracteres sexuais normais.
 - Na insensibilidade androgênica completa, o útero é normal.
 - A Síndrome de Savage caracteriza-se por útero ausente.
51. Paciente de 40 anos, com útero aumentado de volume, refere sangramento uterino aumentado (menorragia) e anemia ferropriva. Sobre os leiomiomas uterinos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O tratamento com tamoxifeno reduz o tamanho dos miomas.
 - O uso de análogos do GnRH pode reduzir o volume dos miomas antes de uma cirurgia.
 - Miomas uterinos têm alta taxa de transformação para sarcomas malignos.
 - A embolização das artérias uterinas é o tratamento de escolha para mulheres que desejam engravidar.
- Apenas II está correta.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.

52. Mulher relata relação sexual desprotegida há 48 horas e solicita anticoncepção de emergência (AE). Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O levonorgestrel 1,5 mg em dose única é o método farmacológico de primeira escolha para AE.
- () O levonorgestrel na AE causa malformações fetais se houver falha.
- () É obrigatório realizar teste de gravidez antes de prescrever AE.
- () O uso repetido de AE aumenta sua eficácia contraceptiva a longo prazo.
- () Mulheres em aleitamento materno podem usar a AE.
- () O método pode ser utilizado em até 5 dias (120 horas) após a relação, embora a eficácia diminua com o tempo.
- () A AE atua retardando ou inibindo a ovulação, mas não tem efeito após a nidação.
- a) V – F – F – F – V – V – V.
- b) F – V – F – F – F – F – V.
- c) V – V – F – V – V – V – F.
- d) V – F – V – V – V – F – V.
- e) F – F – V – F – F – V – F.
53. Paciente queixa-se de corrimento vaginal branco-acinzentado, com odor fétido que piora após o coito. Sobre o provável diagnóstico, assinale a alternativa correta.
- a) Lactobacilos aumentados predispõem a ocorrência dessa condição.
- b) É caracterizada pelo desequilíbrio da flora, com aumento de anaeróbios.
- c) Duchas vaginais frequentes auxiliam na prevenção de corrimentos.
- d) Causa intensa resposta inflamatória com disúria e dispareunia.
- e) O tratamento do parceiro é obrigatório.
54. Paciente apresenta úlcera genital única, indolor, com bordas endurecidas e fundo limpo. Sobre as úlceras genitais e seus diagnósticos diferenciais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O cancro mole caracteriza-se por úlceras múltiplas, dolorosas e friáveis.
- II. O tratamento da sífilis primária é realizado com Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI, dose única.
- III. A donovanose caracteriza-se por úlceras que regredem espontaneamente em 1 semana.
- IV. O cancro mole é indolor como a sífilis.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas II e IV estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas I e III estão corretas.
- e) Apenas III e IV estão corretas.
55. Mulher de 62 anos, G4P4 (partos vaginais), queixa-se de sensação de “bola na vagina” que piora ao final do dia e ao carregar peso. Ao exame físico em posição ginecológica e manobra de Valsalva, nota-se protrusão da parede vaginal anterior e do colo uterino ultrapassando o plano himenal em 2 cm. Sobre o prolapso de órgãos genitais, assinale a alternativa correta.
- a) O sistema de estadiamento POP-Q é a ferramenta recomendada para descrever o prolapso de órgãos genitais, mas não o quantifica.
- b) A rotura perineal de terceiro grau envolve a lesão do esfíncter anal, devendo ser avaliada durante a inspeção dos genitais externos.
- c) O músculo levantador do ânus faz parte do aparelho de suspensão do útero.
- d) A uretrocele é classificada como uma distopia do compartimento posterior da vagina.
- e) O sinal de Hegar é um achado comum no exame físico de pacientes com prolapso genital.
56. Paciente de 54 anos relata perda involuntária de urina ao tossir e espirrar. Nega urgência miccional ou noctúria. Relata que os sintomas iniciaram após a menopausa. Sobre a incontinência urinária de esforço, assinale a alternativa correta.
- a) A fisiologia da micção depende da coordenação entre o músculo detrusor e o esfíncter uretral.
- b) O estudo urodinâmico é obrigatório antes de qualquer intervenção clínica inicial na incontinência urinária.
- c) A terapêutica hormonal sistêmica é o tratamento de primeira escolha para a incontinência urinária de esforço.
- d) A polaciúria é um sintoma específico de incontinência urinária de esforço.
- e) A cistocele é sempre acompanhada de incontinência urinária de esforço.
57. Mulher de 40 anos apresenta dor pélvica crônica há 8 meses, com piora progressiva. Refere que a dor melhora significativamente após urinar. Uroculturas repetidas foram negativas. Com isso, assinale a alternativa que apresenta o resultado de exame que direciona corretamente ao diagnóstico provável.
- a) Cistoscopia com hidrodistensão evidenciando “úlceras de Hunner”.
- b) Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal demonstrando espessamento de 6 mm no septo retovaginal.
- c) Dosagem sérica de CA-125 elevada associada a imagem ovariana de conteúdo espesso em “vidro fosco” ao ultrassom.
- d) Ressonância magnética de pelve evidenciando útero com volume de 250 cm³ e presença de múltiplos nódulos intramurais.
- e) Urina tipo I demonstrando presença de nitrito positivo, leucocitúria maciça e cilindros leucocitários no sedimento.

58. Mulher de 52 anos, com útero presente, apresenta fogachos intensos que impedem o sono e prejudicam o desempenho profissional. Nega antecedentes pessoais de doenças graves. Solicita tratamento hormonal. Sobre a terapêutica hormonal (TH) na menopausa, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A “janela de oportunidade” para início da TH compreende mulheres com menos de 60 anos ou menos de 10 anos de menopausa.
 - II. A via transdérmica de estradiol é preferível em mulheres com hipertensão, hipertrigliceridemia ou risco elevado de tromboembolismo venoso.
 - III. A TH combinada aumenta o risco de câncer colorretal.
 - IV. A associação de estrogênio com bazedoxifeno requer o uso adicional de progesterona para proteger o útero.
- a) Apenas III está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Apenas I e IV estão corretas.
 - e) Apenas II e IV estão corretas.
59. Paciente de 22 anos nota nodulação na mama direita durante o banho. Ao exame: nódulo de 2 cm, bem delimitado, móvel, de consistência fibroelástica, indolor. Ausência de linfonodomegalias axilares. Sobre as doenças da mama, assinale a alternativa incorreta.
- a) Cerca de 80% das lesões palpáveis na mama, especialmente em mulheres jovens, são de natureza benigna.
 - b) O fibroadenoma é o tumor benigno mais comum em adolescentes e mulheres jovens, caracterizando-se por ser móvel e bem delimitado.
 - c) A ultrassonografia é superior à mamografia para o rastreamento populacional de rotina.
 - d) Descarga hemática ou serossanguinolenta deve ser investigada, podendo indicar papiloma intraductal ou neoplasia.
 - e) A esteatonecrose é uma lesão benigna decorrente de trauma mamário, sem relação direta com risco aumentado de câncer.
60. Mulher de 58 anos apresenta aumento do volume abdominal, saciedade precoce e dor pélvica vaga há 2 meses. Ultrassom transvaginal revela massa anexial sólida-cística complexa de 8 cm à direita e presença de líquido livre na pelve. Sobre os tumores malignos dos ovários, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O teratoma cístico maduro (cisto dermoide) é a neoplasia maligna ovariana mais frequente.
 - II. O marcador CA-125 é frequentemente utilizado no acompanhamento de tumores epiteliais, embora possa elevar-se em condições benignas como a endometriose.
 - III. A alfafetoproteína é o marcador específico para o coriocarcinoma gestacional.
 - IV. O disgerminoma é o tumor maligno de células germinativas mais comum em crianças e adolescentes.
- a) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I e II estão corretas.
 - e) Apenas II, III e IV estão corretas.

