

CARGO: MÉDICO PSF

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60

- A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina em crianças e adolescentes: implicações clínicas e nutricionais

Nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria

Contexto atual e relevância para a pediatria

Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na categoria de suplementos alimentares, sendo compostos, respectivamente, por proteína do soro do leite e creatina. O whey protein apresenta-se em diferentes formas (concentrada, isolada ou hidrolisada) e é divulgado com alegações relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico. A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado derivado de aminoácidos (arginina, glicina e metionina), produzido pelo organismo e também obtido pela alimentação, especialmente por meio de carnes e peixes, e desempenha papel no metabolismo energético celular, especialmente em tecidos de alta demanda, como o músculo esquelético. Esses suplementos estão amplamente difundidos no contexto da prática de atividade física e esportiva entre adultos e caracterizam-se, em sua maioria, como produtos ultraprocessados, por incorporarem ingredientes como aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes. Diferentemente dos alimentos, que fornecem proteínas associadas a vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, esses produtos promovem uma oferta concentrada e descontextualizada de nutrientes, em desacordo com as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. O whey protein e a creatina têm sido introduzidos, de forma inadvertida, na alimentação de crianças e adolescentes, impulsionados por estratégias de marketing e pela influência das mídias digitais, frequentemente sem indicação clínica e sem orientação profissional. Esse cenário é agravado pela crescente oferta desses suplementos com apelo direcionado ao público infantil, por meio de rotulagem atrativa, sabores adocicados e formatos lúdicos, como balas, gomas e bebidas saborizadas. Tais características favorecem a percepção equivocada de que se trata de produtos habituais para a faixa etária pediátrica.

Necessidades proteicas na infância e adolescência: o papel dos alimentos

A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada. Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos que, em média, variam entre 0,85 e 0,95 g/kg/dia, facilmente atingidos por meio de uma alimentação variada e equilibrada. Na prática, observa-se que muitas crianças já apresentam ingestão proteica superior às necessidades fisiológicas, de modo que a adição de suplementos — mesmo em pequenas quantidades — não traz benefício comprovado e não é isenta de riscos. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados — como carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas, cereais, tubérculos, frutas e hortaliças — assegura não apenas a adequada oferta proteica (quantidade e qualidade), mas também a ingestão de todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. O uso de suplementos proteicos na pediatria é restrito a condições clínicas específicas, como desnutrição, doenças crônicas, síndromes de má absorção ou aumento da demanda metabólica, entre outras, sempre sob prescrição e acompanhamento profissional. Esse contexto não é extrapolável ao uso de

suplementos de whey protein ou de creatina em crianças e adolescentes com ou sem doenças associadas. Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. No rim, pode-se observar aumento da produção de ureia e hiperfiltração glomerular, com potencial de lesão intraglomerular em indivíduos suscetíveis. No fígado, intensificam-se a desaminação e o ciclo da ureia, elevando a produção de amônia, especialmente em contextos de imaturidade. Do ponto de vista metabólico, o excesso proteico pode estimular a secreção de insulina e de Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1), interferir no balanço energético e favorecer a lipogênese. Diante das evidências científicas atuais, não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. Nessa fase, deve-se priorizar a construção do comportamento alimentar e a oferta de uma alimentação diversificada, capaz de atender às necessidades nutricionais de cada etapa do desenvolvimento. O uso indiscriminado desses suplementos, além de favorecer a ingestão excessiva de nutrientes com potencial de sobrecarga de órgãos e sistemas, também expõe as crianças e adolescentes a aditivos alimentares (corantes, conservantes, emulsificantes) e pode determinar a substituição de refeições, contribuindo para práticas alimentares inadequadas e para o desenvolvimento de uma relação disfuncional com a alimentação, cenário frequentemente agravado pela influência das redes sociais e por padrões corporais idealizados. O ato de se alimentar não se limita ao consumo de nutrientes, mas integra um processo relacional, cultural e identitário, construído no convívio familiar e social e marcado por escolhas, preparo e modos de consumo que expressam valores, tradições e vínculos afetivos.

Considerações finais

O uso de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina não é indicado para crianças saudáveis e não deve ser adotado de forma rotineira na adolescência. Uma alimentação saudável, variada e baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, em preparações culinárias, é suficiente para atender às necessidades nutricionais e promover a formação de hábitos alimentares adequados. A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas, com avaliação individualizada e acompanhamento profissional. O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados. A abordagem deve contemplar a educação nutricional, a valorização de práticas alimentares saudáveis e a discussão crítica sobre influências externas, como o marketing e as mídias sociais. Além disso, é essencial reconhecer precocemente o uso inadequado desses produtos e intervir de forma oportuna. O cuidado com a alimentação na infância e na adolescência constitui uma estratégia fundamental para a promoção da saúde ao longo da vida.

Disponível em <https://www.sbp.com.br/pediatras-alertam-sobre-perigos-do-uso-de-suplementos-proteicos-de-whey-protein-e-creatina-para-criancas-e-adolescentes/>

1. **Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal da nota emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.**
 - a) Incentivar o uso de creatina para melhora do desempenho escolar.
 - b) Alertar sobre o uso indiscriminado e sem orientação de whey protein e creatina em crianças e adolescentes.
 - c) Promover marcas de suplementos ultraprocessados com sabores adocicados.
 - d) Substituir a ingestão de carnes e peixes por suplementos nitrogenados.
 - e) Criticar a atuação da ANVISA na fiscalização de alimentos in natura.
2. **Análise: “A proteína é essencial para o crescimento e o desenvolvimento, mas sua necessidade é frequentemente superestimada”, e assinale a alternativa que apresenta a importância do uso do advérbio em destaque neste contexto.**
 - a) Por ser um advérbio de negação, evidencia que os pais insistem em oferecer os produtos industrializados e os pediatras negam o uso com frequência.
 - b) Por ser um advérbio de frequência, mostra que diariamente crianças estão ingerindo produtos com calorias aumentadas.
 - c) Por ser um advérbio de dúvida, articula que muitos pais ainda se sentem inseguros sobre oferecer ou não produtos com proteína isolada.
 - d) Por ser um advérbio de tempo, enfatiza que o fato está acontecendo com certa recorrência.
 - e) Por ser um advérbio de funcionalidade, torna a oração com função de instigar o pensamento crítico de pessoas que fazem o uso das proteínas isoladas.
3. **Na oração: “Os produtos comercialmente conhecidos como whey protein e creatina são enquadrados pela ANVISA...”, o sujeito é classificado como**
 - a) oculto.
 - b) indeterminado.
 - c) simples.
 - d) composto.
 - e) inexistente.
4. **Os vocábulos “clínicas”, “fisiológicas” e “metabólico”, presentes no texto, são acentuadas seguindo qual regra de acentuação?**
 - a) São todas oxítonas terminadas em “as” ou “o”.
 - b) São paroxítonas terminadas em ditongo.
 - c) Possuem hiatos tônicos.
 - d) São monossílabos tônicos.
 - e) São proparoxítonas, e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
5. **Análise o trecho: “A creatina, por sua vez, é um composto nitrogenado...”, sobre o uso das vírgulas, assinale a alternativa correta em relação ao seu uso.**
 - a) Isolar uma expressão explicativa ou de transição.
 - b) Separar elementos de uma enumeração.
 - c) Indicar a omissão de um verbo.
 - d) Separar o sujeito do predicado.
 - e) Marcar um vocativo.
6. **No segmento “Tais características favorecem a percepção equivocada...”, o termo destacado classifica-se como**
 - a) pronome relativo.
 - b) pronome demonstrativo.
 - c) pronome pessoal do caso reto.
 - d) pronome indefinido.
 - e) pronome possessivo.
7. **Em “...relacionadas ao ganho de massa muscular e à melhora do desempenho físico”, sobre o uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta.**
 - a) A crase é obrigatória por conta da regência nominal da palavra “relacionadas” que exige a preposição “a”, somada ao artigo feminino que antecede “melhora”.
 - b) A crase é opcional, por ser uma locução adverbial de tempo feminina.
 - c) A crase é obrigatória por estar diante de um verbo substantivado feminino.
 - d) A crase é opcional antes de substantivos abstratos.
 - e) A crase é obrigatória por conta da regência do verbo “ganhar”, que exige preposição.
8. **Análise: “Crianças e adolescentes saudáveis apresentam requerimentos proteicos...”, e assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o adjetivo destacado está no plural.**
 - a) Para concordar com o substantivo “adolescentes”.
 - b) Para concordar com o termo “requerimentos proteicos”.
 - c) Para concordar com o advérbio “frequentemente”.
 - d) Para concordar com a forma verbal “apresentam”.
 - e) Para concordar com “crianças e adolescentes”.
9. **De acordo com o texto, por que o uso de suplementos é considerado “descontextualizado” em comparação aos alimentos?**
 - a) Porque suplementos são mais baratos que comida.
 - b) Porque os suplementos oferecem nutrientes isolados sem as fibras, vitaminas e compostos bioativos presentes nos alimentos íntegros.
 - c) Porque crianças não conseguem digerir proteínas de fontes animais.
 - d) Porque o marketing digital foca apenas em idosos.
 - e) Porque a ANVISA proibiu a venda de alimentos minimamente processados.
10. **No trecho “Estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais...”, o verbo está flexionado no**
 - a) pretérito perfeito do indicativo.
 - b) futuro do presente do indicativo.
 - c) presente do subjuntivo.
 - d) presente do indicativo, indicando um fato ou estado atual das evidências científicas.
 - e) imperativo afirmativo.
11. **A oração “A suplementação deve ser reservada a situações clínicas específicas...” encontra-se na**
 - a) voz ativa.
 - b) voz passiva analítica.
 - c) voz reflexiva.
 - d) voz reflexiva recíproca.
 - e) voz ativa com sujeito indeterminado.

12. No início do segundo parágrafo, o termo “Esse cenário” refere-se
- à introdução inadvertida de suplementos na alimentação infantil por marketing e influência digital.
 - ao sucesso das dietas baseadas em carnes e peixes.
 - à facilidade de atingir as necessidades proteicas com alimentos in natura.
 - às funções biológicas da creatina no músculo esquelético.
 - à correta orientação dos pediatras sobre suplementação.
13. Na expressão “produtos ultraprocessados”, a palavra destacada tem a função de
- indicar uma ação concluída pelo sujeito.
 - substituir o nome “produtos”.
 - caracterizar o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade ou estado.
 - conectar duas orações coordenadas.
 - modificar o sentido do verbo “enquadrados”.
14. Quais são os potenciais efeitos adversos do consumo excessivo e crônico de proteínas mencionados no texto?
- Melhora da visão e audição.
 - Redução imediata da gordura corporal e aumento de altura.
 - Fortalecimento do sistema imunológico contra vírus.
 - Apenas efeitos psicológicos relacionados às redes sociais.
 - Sobrecarga renal (hiperfiltração) e hepática (aumento da produção de amônia).
15. Analise o período: “O pediatra desempenha papel central na orientação de famílias, crianças e adolescentes, sendo fundamental esclarecer que esses suplementos não são necessários para o crescimento e desenvolvimento adequados.” e assinale a alternativa que apresenta sua classificação.
- Período simples.
 - Período composto apenas por coordenação.
 - Período composto por coordenação e subordinação.
 - Período composto apenas por subordinação.
 - Frase nominal, sem coordenação ou subordinação.

Matemática

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O valor de $5!$ é 120.
- II. $P(7, 3) = 210$.
- III. $C(6, 2) = 12$.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. Uma gráfica imprime 1.200 folhetos em 4 horas. Quantos folhetos imprimirá em 7 horas, mantendo a mesma produtividade?
- 1800.
 - 2000.
 - 2100.
 - 2400.
 - 2700.

18. Um ângulo que mede 135° é classificado como
- agudo.
 - reto.
 - obtusos.
 - raso.
 - completo.
19. A média de idade de 8 pessoas é 25 anos. Se uma nona pessoa de 34 anos ingressar no grupo, a nova média será de
- 25 anos.
 - 26 anos.
 - 27 anos.
 - 28 anos.
 - 29 anos.
20. Considere a proposição: “O MMC de dois números naturais é sempre múltiplo do MDC desses números.” A respeito dessa proposição, assinale a alternativa correta.
- É falsa para números primos.
 - É falsa para números coprimos.
 - É verdadeira apenas quando os números são pares.
 - É verdadeira para quaisquer números naturais não nulos.
 - É verdadeira apenas quando o MDC é maior que 1.

Informática Básica

21. Considere o seguinte cenário: durante a elaboração de um documento no Microsoft Word 365 (versão português), Juliana precisou padronizar rapidamente a aparência de vários trechos do documento. Para isso, ela selecionou um parágrafo já formatado e utilizou o pincel de formatação que permite copiar essa formatação e aplicá-la em outros trechos do texto sem alterar o conteúdo escrito. Com base no cenário apresentado, assinale a alternativa que representa corretamente o ícone correspondente ao recurso Pincel de Formatação.

- 
- 
- 
- 
- 

22. O Microsoft Excel 365 (versão português) possui diferentes tipos de referências de células que influenciam o comportamento das fórmulas quando elas são copiadas para outras posições da planilha. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de referência da primeira coluna com suas respectivas ações da coluna seguinte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Referência relativa.
 2. Referência absoluta.
 3. Referência mista.
- () Utiliza o símbolo \$ para fixar linha e coluna, como em \$A\$1.
- () É ajustada automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células.
- () Permite fixar apenas a linha ou apenas a coluna, como A\$1 ou \$A1.
- () Mantém parte da referência fixa e outra parte variável durante a cópia da fórmula.
- a) 1 – 2 – 3 – 2.
 - b) 2 – 1 – 1 – 3.
 - c) 2 – 1 – 3 – 3.
 - d) 3 – 2 – 1 – 1.
 - e) 2 – 3 – 1 – 3.

23. O Windows 11 apresenta recursos voltados à produtividade, organização da área de trabalho e integração com aplicativos e serviços do sistema operacional. Entre esses recursos estão melhorias na interface, gerenciamento de janelas e personalização do ambiente de trabalho. Considerando as funcionalidades do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O Menu Iniciar do Windows 11 pode ser utilizado para acessar aplicativos instalados, arquivos recentes e opções de desligamento do computador.
 - II. O recurso Snap Layouts (Layouts de Ajuste), nativo do Windows 11, permite organizar janelas abertas em diferentes formatos de divisão da tela, facilitando a multitarefa.
 - III. A Barra de Tarefas do Windows 11 possibilita fixar aplicativos para acesso rápido durante a utilização do sistema.
 - IV. O Windows 11 permite personalizar elementos da interface, como plano de fundo, temas e cores do sistema operacional.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Google é considerado um _____, pois permite localizar conteúdos e informações disponíveis na _____ por meio de pesquisas realizadas pelos usuários. Entre os recursos disponíveis, destaca-se a pesquisa por _____, que possibilita localizar conteúdos semelhantes a partir do envio de fotografias, figuras ou arquivos visuais.

- a) navegador / internet / imagem
- b) buscador / internet / imagem
- c) diretório / rede local / voz
- d) provedor / intranet / áudio
- e) navegador / nuvem / favoritos

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor financeiro implantou autenticação de dois fatores (2FA) no acesso aos sistemas corporativos após identificar tentativas indevidas de acesso às contas de colaboradores. Após a implementação, houve redução de acessos não autorizados e aumento da segurança no ambiente computacional da organização. Com base no cenário apresentado e nos conceitos de segurança da informação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O segundo fator de autenticação substitui os mecanismos de criptografia utilizados nos sistemas corporativos.
- () A autenticação de dois fatores aumenta a segurança da conta, pois adiciona uma camada extra de verificação no processo de acesso.
- () Aplicativos autenticadores e códigos enviados por SMS podem ser utilizados como mecanismos de autenticação em duas etapas.
- () Mesmo com autenticação de dois fatores, práticas como uso de senhas fortes e atenção a golpes de *phishing* continuam sendo necessárias.
- a) V – V – F – V.
 - b) F – F – V – F.
 - c) V – V – V – V.
 - d) F – V – V – V.
 - e) F – V – V – F.

Conhecimentos Específicos

26. De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das formas de provimento de cargo público.

- a) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
- b) São formas de provimento de cargo público a nomeação, contratação, promoção, reversão, redistribuição e recondução.
- c) São formas de provimento de cargo público a nomeação, ascensão, transferência, aproveitamento e redistribuição.
- d) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, remoção, readaptação, reversão e reintegração.
- e) São formas de provimento de cargo público a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e redistribuição.

27. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta.

- a) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
- b) A duração da jornada de trabalho não será superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
- c) A duração da jornada de trabalho não será superior a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a jornada de 12x36 horas, regulamentada por legislação específica.
- d) A duração da jornada de trabalho será fixada exclusivamente em regulamento interno de cada secretaria municipal.
- e) A duração da jornada de trabalho não será superior a 12 (doze) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais para todos os servidores públicos municipais.

28. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por _____ instituída para essa finalidade.

- a) autoridade competente
- b) comissão
- c) junta médica oficial
- d) secretaria responsável
- e) chefia imediata

29. De acordo com o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O servidor perderá a remuneração do domingo caso falte _____.

- a) 01 dia na semana
- b) 02 dias na semana
- c) mais de 02 dias na semana
- d) 03 dias consecutivos
- e) 05 dias alternados no mês

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que o concurso poderá ser realizado em duas etapas, como dispuser o edital que regulamentar o mesmo, bem como ser utilizadas provas práticas.
 - () O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
 - () Poderá ser nomeado candidato de concurso novo enquanto houver candidato aprovado no mesmo cargo em concurso anterior com prazo de validade não expirado, em caráter excepcional, desde que se trate condição emergencial que atenda o interesse público.
 - () A aprovação em concurso gera direito à nomeação, esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
 - () Quando houver servidor público municipal em disponibilidade não será permitida a realização de concurso público, para preenchimento de cargo de igual categoria devendo, se necessário, ser convocado o servidor disponível.
- a) F – V – F – V – F.
 - b) V – F – V – F – V.
 - c) V – V – V – F – F.
 - d) V – V – F – F – V.
 - e) F – V – F – F – F.

31. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB — Portaria GM/MS nº 2.436/2017), a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como atribuições prioritárias, exceto:

- a) acompanhamento longitudinal de pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus no território adscrito.
- b) realização de visitas domiciliares com foco em promoção da saúde e prevenção de agravos.
- c) desenvolvimento de ações de vigilância em saúde no território de abrangência da equipe.
- d) composição por equipes multiprofissionais, incluindo o Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- e) realização de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade na própria unidade.

32. A Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Com base nesse dispositivo, assinale a alternativa correta.
- A Constituição de 1988 determina que o financiamento da saúde pública deve ser integralmente custeado por doações da iniciativa privada e organismos internacionais.
 - Para a Constituição de 1988, a saúde depende exclusivamente da assistência médica individual prestada em hospitais e consultórios.
 - O modelo de atenção à saúde centrado exclusivamente no hospital e na medicalização é o mais eficaz para reduzir doenças na população, segundo a Constituição.
 - A Constituição de 1988 reconhece que a saúde é influenciada por múltiplos fatores, como trabalho, moradia, educação, lazer e acesso a serviços públicos.
 - O texto constitucional autoriza que o sistema de saúde se organize com base em crenças religiosas e práticas místicas, sobrepondo-as às evidências científicas.
33. Sobre a hanseníase, segundo as Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase do Ministério da Saúde (2022) e as recomendações da OMS, assinale a alternativa incorreta.
- O período de incubação da hanseníase é, em média, de 2 a 4 semanas, semelhante ao da maioria das micobacterioses agudas.
 - A classificação operacional da OMS define como paucibacilar o paciente com até 5 lesões cutâneas e baciloscopia negativa, e como multibacilar aquele com mais de 5 lesões ou qualquer baciloscopia positiva.
 - O tratamento de escolha é a poliquimioterapia única (PQT-U), com rifampicina, clofazimina e dapsona, ofertada gratuitamente pelo SUS.
 - A reação hansênica tipo 1 (reação reversa) cursa com agudização de lesões cutâneas e neurite, sendo tratada com prednisona em doses imunossupressoras.
 - O agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, transmitido por contato prolongado e próximo com pacientes multibacilares não tratados, por meio de vias aéreas superiores.
34. A Política Nacional de Humanização (PNH/HumanizaSUS), instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, propõe princípios, diretrizes e dispositivos para qualificar a atenção e a gestão no SUS. Com isso, assinale a alternativa que não corresponde a uma diretriz ou dispositivo da PNH.
- Acolhimento com classificação de risco nas portas de entrada dos serviços de saúde.
 - Qualificação do vínculo terapêutico entre profissionais de saúde e usuários.
 - Ampliação da autonomia e do protagonismo dos usuários no cuidado em saúde.
 - Cogestão dos processos de trabalho com participação de trabalhadores e usuários.
 - Padronização rígida do atendimento, com fluxo único e sem participação do usuário nas decisões clínicas.
35. Sobre o Calendário Nacional de Vacinação do Adulto, segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS — 2024), assinale a alternativa incorreta.
- A vacina dupla adulto (dT — difteria e tétano) é recomendada como reforço a cada 10 anos para toda a população adulta.
 - A vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular) é recomendada como reforço decenal universal para todos os adultos, em substituição à dT.
 - A vacina tríplice viral (SCR) é indicada em duas doses para adultos não vacinados até 29 anos e em dose única entre 30 e 59 anos.
 - A vacina febre amarela, em adultos residentes ou viajantes para áreas com recomendação, é preconizada em dose única, sem necessidade de reforços para a maioria da população.
 - A vacina influenza é ofertada anualmente em campanha para grupos prioritários, incluindo pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e indivíduos com comorbidades.
36. Sobre a promoção da saúde, assinale a alternativa incorreta.
- A educação em saúde é considerada uma das intervenções mais custo-efetivas, visando informar e incentivar a adoção de práticas preventivas pela população.
 - Modificações ambientais, como o fornecimento de água potável e saneamento básico, são exemplos clássicos de intervenções em promoção da saúde que reduzem significativamente a ocorrência de doenças.
 - A mudança de comportamentos e estilos de vida é responsabilidade exclusiva do profissional médico, cabendo aos demais profissionais de saúde apenas o suporte secundário.
 - Intervenções nutricionais incluem a distribuição de alimentos e programas de fortificação alimentar, sendo voltadas especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade social.
 - O planejamento em promoção da saúde requer a identificação de grupos-alvo e a formulação de estratégias baseadas em objetivos claros para orientar mudanças ambientais e comportamentais.
37. Sobre a Leishmaniose visceral, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Alterações como poliúria e polidipsia não costumam ocorrer em cães doentes.
 - Após a inoculação, os parasitos são fagocitados por macrófagos, que transportam os parasitos para diferentes tecidos do organismo.
 - Os principais locais de disseminação incluem órgãos linfoides, fígado e rins, e a evolução clínica depende de mecanismos patogênicos e da resposta imune do hospedeiro.
 - A diversidade de órgãos afetados contribui para a variabilidade clínica da doença.
 - Entre as lesões cutâneas estão dermatite esfoliativa, ulcerativa e proliferativa.
 - O diagnóstico laboratorial é complementar e independe de fatores como resposta imunológica, fase da doença e tempo de exposição ao parasito.
- Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, III, V e VI estão corretas.
 - Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
 - Apenas II, IV e V estão corretas.
 - Todas estão corretas.

38. Em criança de 8 anos com diagnóstico de asma e necessidade de tratamento de manutenção (GINA 2024 – Step 2), assinale a alternativa correta.
- A primeira linha de tratamento controlador é corticosteroide inalatório em dose baixa (ex.: budesonida 100–200 mcg/dia), associado a β 2-agonista de curta duração (SABA) por demanda como medicação de resgate.
 - O uso isolado e contínuo de salbutamol (SABA) como monoterapia é a estratégia recomendada para manutenção, dispensando o corticosteroide inalatório.
 - O controle da asma, segundo a GINA 2024, é definido exclusivamente pelos valores de $FEV_1 > 80\%$ do previsto e escore ACT ≥ 20 , independentemente da frequência de sintomas.
 - Os antagonistas dos receptores de leucotrienos (ex.: montelucaste) são considerados a primeira escolha terapêutica em crianças maiores de 6 anos, em detrimento dos corticosteroides inalatórios.
 - Toda crise asmática de intensidade moderada exige internação hospitalar de rotina, independentemente da resposta ao tratamento inicial com broncodilatador.
39. Analise as assertivas sobre a necrose tubular aguda e assinale a alternativa correta.
- A necrose tubular aguda é caracterizada pela presença de cilindros epiteliais granulares de cor marrom-acinzentada na urina, resultantes do desprendimento de células epiteliais que obstruem os túbulos renais distais.
 - A fase oligúrica da necrose tubular aguda é causada pela obstrução dos túbulos renais pelos cilindros, impedindo a passagem adequada de fluidos e resultando em redução significativa da produção de urina.
 - Durante a fase oligúrica da necrose tubular aguda, ocorre hipotensão arterial como consequência da perda de fluidos e sódio devido ao aumento da filtração glomerular.
 - A hipercalemia (elevação de potássio sérico) é uma complicação característica da fase oligúrica da necrose tubular aguda, decorrente da incapacidade renal de excretar potássio.
 - A fase não-oligúrica (tardia) da necrose tubular aguda é marcada pela regeneração das células epiteliais tubulares, embora essas células ainda não funcionem adequadamente no início dessa fase.
 - Na fase tardia da necrose tubular aguda, ocorre poliúria (aumento da produção de urina), porque os túbulos, por não se regenerar, apresentam permeabilidade diminuída.
- Apenas I, III, IV e VI estão corretas.
 - Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - Apenas II, III e VI estão corretas.
 - Apenas I, II, III e VI estão corretas.
 - Todas estão corretas.
40. Um paciente de 65 anos refere dor precordial. Na anamnese, observa-se que a dor surge exclusivamente em repouso e tem duração superior a 10 minutos. Considerando as características clínicas de angina estável e angina instável, assinale a alternativa que melhor descreve a diferenciação entre essas condições.
- A angina estável ocorre exclusivamente em repouso, enquanto a angina instável é sempre desencadeada por esforço físico.
 - A angina estável é desencadeada por esforço físico ou estresse emocional e é aliviada pelo repouso em 2 a 5 minutos, enquanto a angina instável apresenta mudança no padrão habitual (novo início, aumento de frequência/intensidade ou ocorrência em repouso) e pode durar mais de 10 minutos.
 - Ambas as condições têm duração típica de 2 a 5 minutos e são igualmente aliviadas pelo repouso.
 - A angina instável é uma forma menos grave de angina estável, com sintomas mais leves e curta duração.
 - Não é possível diferenciar as duas condições apenas pela relação com o repouso e pela duração da dor, sendo necessária avaliação eletrocardiográfica e de biomarcadores.
41. Na avaliação de tontura e vertigem na atenção primária, assinale a alternativa que melhor caracteriza a vertigem de origem periférica.
- Nistagmo tipicamente horizontal ou horizonte-rotatório, unidirecional, suprimível pela fixação visual e frequentemente acompanhado de náuseas e vômitos.
 - Nistagmo vertical puro ou multidirecional, persistente e não suprimível pela fixação, característico de vertigem periférica.
 - Episódios sempre prolongados (horas à dias), sem sintomas neurovegetativos associados.
 - Exame neurológico focal invariavelmente alterado, com sinais cerebelares evidentes.
 - Tratamento inicial padronizado com corticoides intravenosos em todos os casos, independentemente da etiologia.
42. Paciente de 25 anos, sem fatores de risco cardiovascular, apresenta-se na atenção primária com dor torácica de características não anginosas (pontiforme, reprodutível à palpação, sem irradiação, sem sintomas neurovegetativos). Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
- A dor descrita é tipicamente irradiada para mandíbula e acompanhada de sudorese profusa, sugerindo origem isquêmica.
 - A conduta inicial obrigatória inclui angiotomografia de coronárias independentemente do quadro clínico.
 - As causas musculoesqueléticas e gastrointestinais (ex.: costochondrite, refluxo gastroesofágico) são as etiologias mais frequentes nesse perfil de paciente, embora a avaliação clínica e o ECG de 12 derivações sejam recomendados na abordagem inicial.
 - A ausência de fatores de risco cardiovascular tradicionais exclui a possibilidade de síndrome coronariana aguda.
 - A ausência de irradiação para os membros superiores exclui definitivamente a origem cardíaca da dor.

43. **Quais são os atributos da Atenção Primária à Saúde contemplados em Medicina de Família e Comunidade?**
- Vigilância, regulação, auditoria, financiamento e gestão.
 - Prevenção, cura, reabilitação, humanização e biossegurança.
 - Diagnóstico, prognóstico, tratamento, alta e referência.
 - Acesso, integralidade, longitudinalidade, coordenação do cuidado, orientação familiar e comunitária e competência cultural.
 - Promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação e reabilitação.
44. **O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) é instrumento de triagem multidimensional validado para idosos na Atenção Primária à Saúde. Um idoso de 78 anos obtém escore de 12 pontos no IVCF-20. Considerando os critérios de classificação do instrumento, assinale a alternativa correta.**
- O idoso é classificado como robusto e não necessita de qualquer intervenção específica.
 - O idoso é considerado frágil (escore ≥ 15) e deve ser encaminhado para avaliação geriátrica especializada com possível intensificação do acompanhamento.
 - O idoso apresenta vulnerabilidade moderada (escore 8-14) e deve receber acompanhamento próximo com intervenções preventivas na Atenção Primária à Saúde, incluindo avaliação de fragilidade e planejamento de cuidados.
 - O IVCF-20 não diferencia vulnerabilidade de fragilidade, sendo ambas as condições tratadas de forma idêntica.
 - O instrumento é contraindicado para idosos menores de 80 anos, devendo ser utilizado apenas em idosos muito longevos.
45. **Sobre o diagnóstico, tratamento e transmissão da tuberculose pulmonar em adultos, segundo as diretrizes da OMS (2024) e do Ministério da Saúde do Brasil (2024), assinale a alternativa correta.**
- O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB / GeneXpert MTB/RIF) é o exame inicial recomendado para o diagnóstico, podendo ser complementado pela baciloscopia e cultura com teste de sensibilidade.
 - O esquema básico de tratamento da tuberculose pulmonar sensível em adultos no Brasil é composto exclusivamente por rifampicina e isoniazida durante 6 meses, sem fase intensiva.
 - A radiografia de tórax apresenta-se normal em aproximadamente 50% dos pacientes bacilíferos sintomáticos, tornando-a um exame de baixa utilidade.
 - O tratamento da infecção latente pela tuberculose (ILT) está indicado exclusivamente em crianças menores de 5 anos, independentemente de outros fatores de risco.
 - A principal via de transmissão do *Mycobacterium tuberculosis* é a fecal-oral, por meio de água e alimentos contaminados.
46. **Um estudo comparou a eficácia de exercício sem supervisão, exercício supervisionado, sertralina e placebo no tratamento de depressão. Todos os tratamentos ativos mostraram eficácia superior ao placebo, sem diferenças significativas entre eles. Considerando as evidências atuais e o contexto de atenção primária, qual deve ser a primeira medida recomendada a pacientes com depressão leve a moderada?**
- Prescrever imediatamente sertralina como tratamento de escolha universal para todos os pacientes com depressão, independentemente de preferências ou características clínicas.
 - Indicar exercício supervisionado como única intervenção de primeira linha.
 - Realizar avaliação inicial da gravidade da depressão e risco de suicídio; em seguida, informar ao paciente que exercício supervisionado e sertralina apresentam eficácia semelhante, permitindo que a escolha considere preferências do paciente, acesso a recursos e fatores clínicos individuais.
 - Aguardar novos estudos antes de implementar qualquer tratamento, a fim de confirmar os resultados encontrados.
 - Prescrever placebo inicialmente por 4 semanas para avaliar resposta antes de indicar tratamentos ativos.
47. **Uma mulher de 38 anos é diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior. Durante a anamnese, relata humor deprimido, anedonia, grave insônia inicial e perda de 6 kg no último mês devido à completa falta de apetite. Seu Índice de Massa Corporal (IMC) atual é de 18,5 kg/m². Considerando o perfil de efeitos colaterais e o mecanismo de ação dos antidepressivos, qual dos fármacos a seguir oferece o maior benefício sintomático para esta paciente em monoterapia?**
- Fluoxetina.
 - Venlafaxina.
 - Bupropiona.
 - Mirtazapina.
 - Sertralina.
48. **Qual das alternativas descreve corretamente a fase de atuação e o objetivo principal da prevenção secundária, segundo o modelo de Leavell & Clark?**
- Atua na fase pré-clínica ou sintomática inicial da doença, com o objetivo de reduzir a gravidade e as complicações por meio de detecção precoce e tratamento imediato.
 - Atua antes da instalação da doença, com o objetivo de reduzir sua incidência por meio de proteção específica, como imunizações e saneamento ambiental.
 - Atua na fase avançada ou de sequelas da doença, com o objetivo de minimizar incapacidades e promover a reabilitação do indivíduo.
 - Atua na redução de riscos populacionais antes do surgimento de fatores de risco biológicos, com o objetivo de modificar determinantes sociais e econômicos da saúde.
 - Atua na erradicação global de agentes causadores de doenças, com o objetivo de eliminar permanentemente a ocorrência da enfermidade na população.

49. **Sobre a dengue sem sinais de alarme, assinale a alternativa incorreta.**
- Cursa tipicamente com febre alta de início abrupto, com duração de 2 a 7 dias.
 - Manifesta-se com cefaleia, dor retro-orbital, mialgia e artralgia intensas.
 - Pode apresentar leucopenia e plaquetopenia discreta nos exames laboratoriais.
 - Hemorragia digestiva alta é manifestação habitual nesta forma clínica.
 - O manejo, conforme o Ministério da Saúde (grupo A), consiste em hidratação oral ambulatorial, sintomáticos e reavaliação clínica.
50. **No manejo da lombalgia inespecífica aguda (duração inferior a 6 semanas) em paciente sem sinais de alarme (*red flags*), assinale a conduta mais adequada conforme as diretrizes mais atuais.**
- Prescrição de repouso absoluto no leito por 7–10 dias, evitando qualquer atividade física até a remissão completa da dor.
 - Solicitação de ressonância magnética ou tomografia computadorizada de coluna lombar em todos os casos, para confirmação diagnóstica.
 - Manutenção das atividades habituais conforme tolerância, orientação sobre o prognóstico favorável da condição, educação do paciente e, se necessário, uso de AINEs por curto período como primeira linha farmacológica.
 - Uso de opioides fortes (ex.: morfina, oxicodona) como primeira escolha farmacológica, devido à intensidade algica.
 - Encaminhamento imediato para infiltração epidural com corticoide como tratamento ambulatorial de primeira linha.
51. **Sobre as ações de prevenção e promoção da saúde recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa incorreta.**
- O calendário nacional de imunização do PNI/MS preconiza a aplicação das vacinas BCG e hepatite B ainda na maternidade, preferencialmente nas primeiras 24 horas de vida.
 - A estratificação de risco cardiovascular na APS, conforme orientação do MS e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, utiliza o Escore de Risco Global (baseado em Framingham).
 - O manejo do tabagismo no SUS, segundo o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (INCA), baseia-se em abordagem cognitivo-comportamental estruturada, podendo ser associada a terapia farmacológica.
 - O cuidado da pessoa com obesidade na APS deve ser multiprofissional, contemplando orientação nutricional, prática de atividade física, suporte psicossocial e, quando indicado, tratamento farmacológico ou cirúrgico.
 - O INCA recomenda o rastreamento populacional de câncer colorretal por colonoscopia em todos os indivíduos a partir dos 50 anos no Brasil.
52. **Lactente de 10 meses é levado ao pronto-atendimento com diarreia aquosa há 48 horas, apresentando letargia, olhos muito fundos, mucosas secas, sinal da prega cutânea > 2 segundos, pulso fraco e tempo de enchimento capilar prolongado. Conforme os protocolos da OMS/UNICEF e do Ministério da Saúde do Brasil (AIDPI), assinale a alternativa correta.**
- Os sinais clássicos de desidratação grave incluem letargia, olhos encovados e fontanela abaulada, com turgor cutâneo aumentado.
 - O quadro é compatível com desidratação grave, devendo o paciente ser tratado pelo Plano C, que prevê hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% ou Ringer Lactato na dose de 100 mL/kg, fracionada conforme a faixa etária (30 mL/kg em 1h + 70 mL/kg em 5h em <12 meses).
 - O Plano B consiste obrigatoriamente na associação de SRO via oral com infusão venosa simultânea, mesmo quando o paciente aceita a via oral.
 - A terapia de reidratação oral com SRO deve ser utilizada como primeira linha em todos os casos, inclusive na desidratação grave com choque hipovolêmico.
 - A diarreia aguda pediátrica, independentemente da etiologia, sempre requer antibioticoterapia empírica desde a admissão.
53. **Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- O climatério, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (1998; 2010), é uma fase biológica da vida da mulher — e não uma condição patológica.**
 - Marca a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo e abrange mulheres entre 40 e 65 anos.**
 - O sistema de classificação dos estágios reprodutivos e não reprodutivos da mulher, é baseado no estadiamento clínico, nas mudanças do ciclo menstrual, nos padrões anatômicos e na identificação do envelhecimento ovariano.**
 - O cuidado não pode ser reduzido a atos técnicos isolados, mas deve ser concebido como uma prática relacional, contextual e ética, capaz de considerar os determinantes sociais da saúde.**
 - O uso do método clínico centrado na pessoa (MCCP) contorna a simplificação excessiva dos problemas da condição de estar doente, além de não tratar como doença todo e qualquer desvio da norma, de forma impessoal e analítica e descolada do meio social.**
 - Além de mulheres cis, homens trans, pessoas transmasculinas, pessoas não-binárias e intersexo também podem vivenciar a menopausa e é responsabilidade de profissionais de saúde o acolhimento e acompanhamento dessas populações.**
- Apenas I, II, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - Todas estão corretas.
 - Apenas II, III, IV, V e VI estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.

54. Analise as assertivas sobre diabetes mellitus e assinale a alternativa correta.
- Diabetes mellitus é definido fundamentalmente pela presença de hiperglicemia, que pode resultar de diferentes mecanismos fisiopatológicos dependendo do tipo de diabetes.
 - O diabetes mellitus tipo I é caracterizado pela destruição autoimune das células beta pancreáticas, resultando em deficiência absoluta de insulina e consequente hiperglicemia.
 - O diabetes mellitus tipo II é causado exclusivamente por resistência insulínica, sem envolvimento de disfunção das células beta pancreáticas.
 - Na fase inicial do diabetes mellitus tipo II, os pacientes produzem MENOS insulina do que indivíduos normais, como resposta compensatória à resistência insulínica.
 - A fisiopatologia do diabetes mellitus tipo II envolve um ciclo progressivo: resistência insulínica → aumento da produção de insulina → produção de amiloide via amilina → disfunção/destruição das células beta → deficiência relativa de insulina → hiperglicemia.
 - Pacientes com diabetes mellitus tipo II em fase inicial apresentam níveis de insulina plasmática elevados em comparação com indivíduos normais, devido ao aumento compensatório da produção insulínica em resposta à resistência periférica.
- Apenas I, II e V estão corretas.
 - Apenas I, II, V e VI estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
55. Uma adolescente de 16 anos apresenta-se com acne moderada a severa. Considerando as possíveis intervenções terapêuticas e de suporte baseadas em evidências atuais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Higiene adequada com limpador suave e água morna, embora insuficiente como tratamento isolado para acne moderada a severa.
 - Uso tópico de peróxido de benzoíla associado ao uso de antibióticos sistêmicos da classe das tetraciclina.
 - Clindamicina tópica, frequentemente combinada com peróxido de benzoíla para melhor eficácia.
 - Isotretinoína com monitoramento rigoroso devido ao potencial teratogênico.
 - Antibióticos sistêmicos como fluoroquinolonas (ciprofloxacino).
 - Limpeza com água oxigenada que, apesar de causar irritação, destrói a microbiota patogênica.
- Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II, III e VI estão corretas.
 - Apenas I, III, IV e VI estão corretas.
 - Apenas I, II e VI estão corretas.
 - Apenas I, II, III e IV estão corretas.
56. Uma adolescente de 17 anos, dançarina, apresenta-se com amenorreia há 3 meses. É sexualmente ativa com um parceiro. Qual conjunto de diagnósticos diferenciais é mais apropriado para investigação inicial?
- Menopausa precoce, síndrome do ovário policístico, disfunção hipotalâmica e síndrome de Cushing.
 - Agnesia vaginal, gravidez, síndrome de Cushing e hipogonadismo hipogonadotrófico congênito.
 - Hipotireoidismo severo, transtorno alimentar, tuberculose genital e carcinoma de ovário.
 - Sinéquias intrauterinas, gravidez, síndrome de Cushing e tuberculose genital.
 - Gravidez, anorexia nervosa, síndrome do ovário policístico e hiperprolactinemia.
57. Na abordagem da cefaleia em adultos na Atenção Primária à Saúde, considerando a classificação ICHD-3 (2018) e as Diretrizes Brasileiras de Cefaleia (SBCe, 2022), assinale a alternativa incorreta.
- A solicitação de neuroimagem (TC ou RM de crânio) é obrigatória em todos os episódios agudos de cefaleia atendidos na APS, independentemente da presença de sinais de alarme (red flags).
 - A migrânea (enxaqueca) é tipicamente unilateral, pulsátil, de intensidade moderada a grave, agravada por esforço físico, podendo associar-se a náuseas, fotofobia e fonofobia; cerca de 25 a 30% dos pacientes apresentam aura.
 - A cefaleia em salvas (cluster) caracteriza-se por dor estritamente unilateral, periorbitária ou temporal, de intensidade excruciante, acompanhada de sintomas autonômicos ipsilaterais (lacrimejamento, rinorreia, ptose) e inquietação motora.
 - O tratamento agudo de crises leves a moderadas de migrânea e cefaleia tensional pode incluir analgésicos simples e anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), reservando-se os triptanos para crises moderadas a graves de migrânea.
 - A cefaleia do tipo tensional é a cefaleia primária mais prevalente na população, caracterizando-se por dor bilateral, em pressão ou aperto, de intensidade leve a moderada, sem agravamento por atividade física rotineira.

58. Sobre a abordagem clínica da síndrome do olho vermelho na Atenção Primária à Saúde, considerando as principais causas e seus achados semiológicos típicos, assinale a alternativa incorreta.

- a) A conjuntivite viral, geralmente por adenovírus, inicia-se de forma unilateral e evolui para acometimento bilateral em 24-48 horas, com secreção aquosa, folículos conjuntivais e linfadenopatia pré-auricular.
- b) A conjuntivite alérgica caracteriza-se por prurido ocular bilateral, hiperemia conjuntival, lacrimejamento e quemose, frequentemente associada a atopia e sazonalidade.
- c) A uveíte anterior cursa tipicamente com dor ocular, fotofobia, miose, hiperemia ciliar (perilímbica) e presença de células e flare na câmara anterior, podendo evoluir com hipópio em casos graves.
- d) A conjuntivite bacteriana aguda apresenta-se classicamente com secreção purulenta abundante, ausência de dor ocular significativa, ausência de fotofobia e acuidade visual preservada, sendo achados típicos a baixa acuidade visual e o reflexo pupilar comprometido.
- e) O glaucoma agudo de ângulo fechado manifesta-se com dor ocular intensa, hiperemia, midríase média fixa, edema de córnea, visão borrada com halos coloridos e náuseas, exigindo encaminhamento oftalmológico emergencial.

59. Mulher de 24 anos, hígida, não gestante, sem comorbidades, apresenta-se com disúria, polaciúria, urgência miccional e hematúria macroscópica de início há 48 horas. Nega febre, calafrios, dor lombar ou náuseas. Trata-se do primeiro episódio. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) O quadro é compatível com pielonefrite aguda, sendo a internação hospitalar e a antibioticoterapia intravenosa condutas mandatórias.
- b) O diagnóstico mais provável é cistite aguda não complicada, sendo a *Escherichia coli* o agente etiológico predominante em aproximadamente 75-90% dos casos, segundo as séries epidemiológicas.
- c) A solicitação de urocultura é obrigatória antes do início de qualquer antibioticoterapia, mesmo em cistite não complicada.
- d) O suco de cranberry é considerado tratamento de primeira linha para o episódio agudo, substituindo a antibioticoterapia.
- e) A ultrassonografia de rins e vias urinárias está indicada de rotina já no primeiro episódio, independentemente da evolução clínica.

60. Analise as assertivas sobre a Resistência aos Antimicrobianos (RAM) e assinale a alternativa correta.

- I. A RAM afeta não apenas a saúde humana, mas também a saúde animal, ambiental e a segurança alimentar.
 - II. Microrganismos como bactérias e fungos podem desenvolver resistência aos antimicrobianos, não ocorre em casos de vírus.
 - III. A resistência não tem relação com mutações genéticas nos microrganismos.
 - IV. O uso excessivo e inadequado de antimicrobianos é um dos principais fatores que aceleram a resistência.
 - V. A falta de saneamento e higiene contribui para a disseminação da RAM.
 - VI. A RAM está diretamente relacionada ao conceito de “Uma Só Saúde” (*One Health*), que reconhece a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental.
- a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - c) Apenas II, III, IV e VI estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e VI estão corretas.
 - e) Apenas I, IV, V e VI estão corretas.