



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

003. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** e **02**.



(Bill Watterson. *O melhor de Calvin*. www.estadao.com.br, 06.04.2024)

01. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que o garoto

- (A) decide aprender sozinho a fazer uma bomba, pois ficou contrariado com a resposta da biblioteca.
- (B) considera livros que ensinam a fazer bombas caseiras os que despertam verdadeiro interesse pela leitura.
- (C) tem consigo que as bibliotecas escolares são melhores que as municipais por terem mais livros.
- (D) se indigna com a admiração da atendente da biblioteca, que acha que o garoto quer explodir o seu local de trabalho.
- (E) teme que sua vontade seja descoberta por seus pais e opta por não contatar outras bibliotecas atrás do livro.

02. No trecho “Depois eles se perguntam **por que** as crianças não leem mais” (último quadro), a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, por:

- (A) o motivo ao qual
- (B) a causa de que
- (C) o porquê no qual
- (D) a razão pela qual
- (E) a explicação para que

Leia o texto para responder às questões de números **03 a 07**.

Houve um tempo em que a velhice parecia vir mais cedo. Mal saídos da juventude, homens e mulheres (eles, em especial) se rendiam, quase sempre sem muita resistência, a costumes – em mais de um sentido da palavra – severos e engravatados. De “moço” e “moça”, passavam, bruscamente, a irremediáveis “senhor” e “senhora”. Desse processo, ninguém escapava. Mas Rubem Braga, convenhamos, exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga” antes de lhe vir o primeiro fio de cabelo branco.

Menos conformada é Rachel de Queiroz, que, aos 85 anos, esperneia contra piedosos eufemismos do tipo “terceira idade”. Sem meias palavras, ela diz tudo no título de uma crônica “Não aconselho envelhecer”: “Para que o velho não se sinta tão velho, deixem-no sentir-se livre”, sustenta a octogenária Rachel com veemência de moça.

Ao contrário de Rachel de Queiroz, Otto Lara Resende não esperneia ante o processo de envelhecimento. “Se não é desejável, a velhice é fatal”, rende-se ele em “Vigor e sabedoria” – e, com graça, lembra que “a única alternativa é sinistra”. Para o cronista mineiro, “achar interesse e graça na vida ajuda”, porque “velhice azeda ou ressentida é de amargar”.

Com igual leveza, volta ao assunto em “A velhice do bebê”, e lança um olhar para o que nos espera a todos no extremo do percurso, seja ele longo seja ele breve. “Sooou a hora, ninguém escapa”, diz Otto. A vida, registrou ele nessa crônica de 17 de outubro de 1992, “é uma sucessão de ciladas”. No seu caso, a maior delas o espreitava pouco mais de dois meses depois, quando um suposto erro médico levou, aos 70, quem irradiava pique para emplacar o dobro disso.

(Humberto Werneck. *Senhores & senhoras*. <https://cronicabrasileira.org.br>, 15.03.2019. Adaptado)

03. Assinale a alternativa em que se faz afirmação correta quanto ao que foi tratado no texto.

- (A) Rubem Braga e Otto Lara Resende, diferentemente de Rachel de Queiroz, aceitavam melhor a ideia de envelhecimento.
- (B) Rachel de Queiroz acreditava que a velhice precisava ser chamada por nomes menos agressivos para ser suportada.
- (C) Rubem Braga se reconhecia como alguém velho por ter precocemente ganhado cabelos brancos na juventude.
- (D) Rachel de Queiroz escreveu a crônica “A velhice do bebê” para retratar a rapidez com que as pessoas envelhecem.
- (E) Otto Lara Resende acreditava que a vida só fazia sentido se ela fosse vivida com qualidade e por muito tempo.

04. É correto afirmar que Otto Lara Resende quando faleceu era um

- (A) septuagésimo.
- (B) septuagenário.
- (C) sexagenário.
- (D) sexagésimo.
- (E) septingentésimo.

05. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado está empregado em sentido figurado no contexto em que se encontra.

- (A) Houve um tempo em que a **velhice** parecia vir mais cedo. (1º parágrafo)
- (B) Sem meias palavras, ela diz tudo no **título** de uma crônica... (2º parágrafo)
- (C) ... porque “velhice **azeda** ou ressentida é de amargar”. (3º parágrafo)
- (D) Com igual leveza, volta ao **assunto** em “A velhice do bebê”... (4º parágrafo)
- (E) A vida, registrou ele nessa **crônica** de 17 de outubro de 1992... (4º parágrafo).

06. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado estabelece ideia de tempo.

- (A) **Mal** saídos da juventude, homens e mulheres (eles, em especial) se rendiam... (1º parágrafo)
- (B) **Mas** Rubem Braga, convenhamos, exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga”... (1º parágrafo)
- (C) “**Se** não é desejável, a velhice é fatal”, rende-se ele em “Vigor e sabedoria”... (3º parágrafo)
- (D) ... “achar interesse e graça na vida ajuda”, **porque** “velhice azeda ou ressentida é de amargar”. (3º parágrafo)
- (E) Com igual leveza, volta ao assunto em “A velhice do bebê”, **e** lança um olhar... (4º parágrafo)

07. Considere os trechos:

- ... exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga” antes de **lhe vir** o primeiro fio de cabelo branco. (1º parágrafo)
- ... “Para que o velho não se sinta tão velho, **deixem-no sentir-se livre**”... (2º parágrafo)
- ... a maior delas **o espreitava** pouco mais de dois meses depois... (4º parágrafo)

As expressões destacadas podem ser substituídas, sem prejuízo da norma-padrão de emprego e colocação pronominal, respectivamente, por:

- (A) o vir ... o deixem se sentir ... espreitava-no
- (B) o vir ... o deixem se sentir ... lhe espreitava
- (C) vi-lo ... deixem-no se sentir ... lhe espreitava
- (D) vir-lo ... o deixem sentir-se ... espreitava-lhe
- (E) vir-lhe ... deixem-no se sentir ... espreitava-o

08. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) O exagero de Rubem Braga o conduz à uma imagem negativa de si mesmo.
- (B) Alega-se que um erro médico tirou à vida do escrito Otto Lara Resende.
- (C) Hoje, tem-se a sensação de que a velhice leva mais tempo à chegar.
- (D) Rachel de Queiroz não temia as críticas à sua forma de escrever.
- (E) Quem vem a este mundo está sujeito à ciladas, já dizia o escritor.

Leia o texto para responder às questões de números **09** e **10**.

A história da dengue vem de longe. As primeiras descrições de epidemias de uma doença semelhante à que hoje nos _____ datam do século 18. O vírus só foi isolado em 1943.

Sempre _____ quatro vírus causadores de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, os quais compartilham entre si dois terços do genoma. São chamados de sorotipos, em função de suas interações com os anticorpos produzidos contra eles, no sangue da pessoa que foi infectada, a qual apresenta fase febril por dois a sete dias. As lesões da pele permanecem por mais três a seis dias depois que a febre cedeu. _____ pequenos sangramentos nasais, vaginais ou nas gengivas ao escovar os dentes.

A mortalidade varia de 0,01% a 5%, dependendo do acesso aos cuidados médicos. Se o paciente _____ o volume de líquido extravasado no adoecimento, a morte pode ser evitável.

O Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 60 mililitros de líquido por quilograma de peso, por dia, assim que a febre se instala. Portanto, um adulto de 70 quilos deve tomar cerca de quatro litros por dia, volume quase proibitivo para os que têm náuseas e vômitos. Esses casos exigem hidratação por veia, nem sempre acessível a todos.

É impossível acabar com a dengue no Brasil, mas é vergonhoso convivemos até hoje com as mortes pela doença.

(Drauzio Varella. *Dengue, a doença*.
www1.folha.uol.com.br, 13.03.2024. Adaptado)

09. As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) aflige ... houveram ... Podem ocorrer ... repor
- (B) aflige ... existiram ... Podem ocorrer ... repuser
- (C) afligem ... existiu ... Pode ocorrer ... repuser
- (D) afligem ... houve ... Podem ocorrerem ... repor
- (E) afligem ... houveram ... Pode ocorrerem ... repor

10. Está em conformidade com o que se afirma no texto e a norma-padrão de regência a frase:

- (A) Acessar a certos cuidados médicos é algo que nem todos conseguem.
- (B) O término ao período febril é sucedido de lesões da pele por alguns dias.
- (C) Pode acontecer de o paciente não conseguir receber hidratação por veia.
- (D) Acabar com as mortes por dengue no Brasil corresponde a algo inatingível.
- (E) O Ministério da Saúde recomenda da quantidade mínima de água a tomar.

11. A prefeitura de uma determinada cidade, dando continuidade às estratégias de combate à dengue no município, está disponibilizando para a população um medicamento homeopático, que suaviza e reduz os sintomas da doença. Esse medicamento é envasado em frascos de vidro contendo 15 mL cada um. O preparo para consumo é feito adicionando-se 3 gotas desse medicamento diluídas em 500 mL de água mineral. Considerando-se que cada gota tem 0,05 mL e que 1 L equivale a 1 000 mL, a quantidade de frascos, que serão utilizados para ser diluído esse medicamento em 1 500 L de água mineral, será de
- (A) 10.
(B) 30.
(C) 50.
(D) 70.
(E) 90.
12. Um agente comunitário de saúde registra suas ações realizadas em dois bairros, A e B, em fichas específicas, de acordo com as orientações técnicas em vigor. Foram registradas 255 fichas para o bairro A e 165 fichas para o bairro B. Todas essas fichas devem ser organizadas em pastas, cada pasta com o mesmo número de fichas, sendo esse número o maior possível. Se cada pasta só poderá ter fichas de um mesmo bairro, a diferença entre a quantidade de pastas com fichas do bairro A e a quantidade de pastas com fichas do bairro B é
- (A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.
13. A prefeitura de uma determinada cidade identificou, em 400 imóveis vistoriados pelas equipes de combate às endemias que, a cada 7 imóveis com criadouros com larvas do *aedes aegypti*, há 3 imóveis sem criadouros com larvas. Portanto, do total de imóveis vistoriados, o número de imóveis com criadouros de larvas é
- (A) 80.
(B) 120.
(C) 240.
(D) 280.
(E) 320.

14. A tabela a seguir apresenta os números de casos de dengue, por faixa etária e por sexo, de um bairro da Grande São Paulo.

Faixa etária	Masculino	Feminino
Menos de 1 ano	11	9
1 a 19 anos	9	4
20 a 39 anos	x	7
40 a 59 anos	11	8
60 a 80 anos	19	12

Sabendo-se que a média aritmética dos números dos casos de dengue do sexo masculino supera em 3 unidades a média aritmética dos números dos casos de dengue do sexo feminino, então o número dos casos de dengue do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos, é

- (A) 5.
 (B) 7.
 (C) 9.
 (D) 11.
 (E) 19.
15. Pacientes com sintomas de dengue devem ingerir bastante líquido, e a quantidade varia de acordo com a massa corporal da pessoa. Especialistas da área de saúde orientam que a pessoa infectada beba, por dia, 80 mL de água para cada quilograma da sua massa corporal. Uma pessoa com 54 quilogramas de massa corporal utiliza, para ingerir água, uma garrafa na forma de um paralelepípedo reto retângulo de medidas internas indicadas na figura.





Figura fora de escala

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Sabendo-se que $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, o número mínimo dessas garrafas, todas elas contendo a capacidade máxima de água que essa pessoa deverá tomar para ingerir o recomendado pelos especialistas é

- (A) 4.
 (B) 5.
 (C) 6.
 (D) 7.
 (E) 8.

16. Observe a seguinte estrutura de pastas no MS-Windows 10, em sua configuração padrão:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Um usuário, posicionado na pasta “Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias -> Arquivos-Educação”, executou o atalho ALT + Seta para cima.

É correto afirmar que o usuário foi posicionado na pasta:

- (A) Arquivos_Prefeitura.
- (B) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias.
- (C) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias -> Arquivos-Desenvolvimento.
- (D) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas.
- (E) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> Secretarias -> 2023 -> Arquivos-Saúde.

17. No MS-Word 2016, um usuário alterou a formatação de um trecho de documento que inicialmente estava com o conteúdo seguinte:

FUNDAÇÃO VUNESP 2024

Ao término da formatação, o conteúdo do trecho ficou conforme mostrado a seguir:

FUNDAÇÃO VUNESP 2024

Quantas aplicações de diferentes opções de formatação (negrito, itálico, tachado, sobrescrito e sublinhado) foram necessárias, no mínimo, para realizar o ajuste no texto?


- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

18. Considere a seguinte planilha no MS-Excel 2016:

Valores
20
35
40
55
80
60
61
85
80
64
80
75

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

O gráfico a seguir foi gerado para esses dados, nesse mesmo programa:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Qual foi o tipo de gráfico utilizado?

- (A) Mapa de Árvore.
- (B) Radar.
- (C) Colunas.
- (D) Histograma.
- (E) Barras.

19. No Google Documentos, um usuário compartilhou um arquivo utilizando as opções "Acesso geral" para "Qualquer pessoa com o link" e com o nível de "Leitor".

Assinale a alternativa correta sobre o acesso ao arquivo compartilhado.

- (A) Qualquer pessoa com o link poderá visualizar o arquivo apenas caso esteja logada em sua conta do Google.
- (B) Qualquer pessoa com o link poderá visualizar o arquivo, mesmo que não esteja logada em sua conta do Google, devendo fazer *login* para pedir acesso de Edição.
- (C) Qualquer pessoa conectada em sua conta do Google poderá visualizar e editar o documento.
- (D) Apenas pessoas do rol de usuários pré-habilitados a visualizar o arquivo poderá acessá-lo a partir do link gerado.
- (E) Qualquer pessoa com o link deverá enviar uma solicitação de leitura do arquivo ao proprietário para que haja efetiva liberação de acesso.

20. O Google Workspace é uma suíte que abrange uma série de aplicativos, dentre eles o Google *Forms*, ou Google Formulários.

Esse aplicativo tem a finalidade de

- (A) diagramação.
- (B) criação de reuniões online.
- (C) criação de apresentações.
- (D) criação e gerenciamento de pesquisas.
- (E) edição de documentos de texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O odontograma é uma representação gráfica da boca do paciente. Trata-se de um formulário importante da documentação, sendo o ponto de partida do plano de tratamento odontológico.

De acordo com a notação dentária baseada na Organização Internacional para Padronização, o dente 54 equivale ao

- (A) primeiro pré-molar superior direito decíduo.
- (B) primeiro molar superior direito decíduo.
- (C) primeiro pré-molar superior direito permanente.
- (D) primeiro molar superior esquerdo permanente.
- (E) primeiro molar inferior esquerdo decíduo.

22. No preenchimento do odontograma, o cirurgião-dentista menciona a existência de uma cavidade de cárie ocluso-mesial no dente 14. De acordo com a classificação que considera o número de faces envolvidas, trata-se de uma cavidade

- (A) complexa.
- (B) simples.
- (C) composta.
- (D) comum.
- (E) terapêutica.

23. Com relação ao processamento de radiografias intra-orais, o uso de soluções aquecidas, transporte automático de filmes pelas soluções, agitação dos líquidos de processamento, uso de soluções energéticas ou concentradas e combinação de métodos visam

- (A) aumentar a escala de contraste radiográfico.
- (B) diminuir a sensibilidade do filme radiográfico.
- (C) aumentar o detalhe e/ou a definição na imagem radiográfica.
- (D) impedir o "véu" na película radiográfica.
- (E) abreviar o tempo gasto para o processamento das radiografias.

24. Levando em consideração o método de montagem labial de radiografias periapicais em cartelas, assinale a alternativa correta.
- (A) As radiografias são colocadas na cartela com os pontos de relevo virados para baixo (côncavo).
 - (B) Com esse método, as radiografias são visualizadas como se o examinador estivesse dentro da boca do paciente e olhando para fora.
 - (C) As películas radiográficas que contêm os dentes anteriores são dispostas com o longo eixo do filme paralelo ao plano horizontal.
 - (D) O lado esquerdo do paciente está à direita da visão do examinador e o lado direito do paciente está à esquerda da visão do examinador.
 - (E) As películas radiográficas que contêm os dentes posteriores são dispostas com o longo eixo do filme perpendicular ao plano horizontal.
25. A American Dental Association (ADA) e a International Standards Organization (ISO) classificam os cimentos dentários de acordo com suas propriedades e suas indicações de uso em odontologia. Os cimentos tipo I incluem:
- (A) cimentos permanentes e temporários (agente cimentante).
 - (B) materiais restauradores temporários.
 - (C) materiais restauradores definitivos.
 - (D) bases e forramentos.
 - (E) materiais seladores de fóssulas e cicatrículas.
26. De acordo com a classificação do ionômero de vidro, o cimento utilizado como bases e forramentos que são colocados dentro do preparo cavitário é o tipo
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) IV.
 - (E) V.
27. Os materiais de moldagem são classificados de acordo com sua elasticidade (elásticos e anelásticos) e subdivididos de acordo com o tipo de reação que sofrem (presa química e presa física).
- Os materiais de moldagem anelásticos tendem a se fraturar sem exibir qualquer deformação plástica se as forças aplicadas excederem a sua resistência a tração, cisalhamento ou compressão. Esses materiais incluem:
- (A) gôdiva e a pasta de óxido de zinco e eugenol (pasta ZOE).
 - (B) pasta de óxido de zinco e eugenol (pasta ZOE) e hidrocoloide irreversível.
 - (C) gôdiva e hidrocoloide reversível.
 - (D) elastômeros e hidrocoloide reversível.
 - (E) elastômeros e hidrocoloide irreversível.
28. Em relação a manipulação e cuidados no manejo do cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa correta.
- (A) A espatulação do cimento deve ser feita até que se forme uma massa homogênea e sem brilho, para ser inserida na cavidade dentária.
 - (B) O líquido deve ser armazenado na geladeira para não perder suas propriedades originais.
 - (C) A adição de pouco pó à mistura origina um menor tempo de trabalho e de presa, diminui a solubilidade e a adesividade e reduz a translucidez.
 - (D) O pó ou bloco de espatulação não podem ser mantidos em refrigerador com a finalidade de aumentar o tempo de trabalho.
 - (E) O frasco de pó deve ser agitado antes de sua utilização, principalmente os cimentos anidros, com a finalidade de evitar-se que quantias exageradas de partículas de vidro ou de ácido liofilizado sejam proporcionadas com o líquido.
29. Assinale a alternativa que contém o procedimento a ser realizado de forma compatível com os materiais que podem estar dispostos na bandeja para o atendimento do paciente.
- (A) Isolamento relativo do campo operatório: lençol de borracha, pinça Palmer, perfurador de Ainsworth e grampo.
 - (B) Restauração Classe II para amálgama: porta-matriz, condensadores e brunidores.
 - (C) Raspagem radicular subgingival do dente 31: cureta de Gracey 9-10, cureta PL 5/6 e cureta de Lucas.
 - (D) Acesso à câmara pulpar (tratamento endodôntico): broca esférica carbide alta rotação, espaçador digital e condensadores de Paiva.
 - (E) Exodontia do dente 17 erupcionado: fórceps 18 L, porta-agulha e tesoura cirúrgica.

30. A técnica de Loop é indicada para higienização

- (A) em pacientes portadores de próteses parciais fixas extensas.
- (B) em pacientes portadores de prótese protocolo sobre implantes.
- (C) em pacientes portadores de aparelho ortodôntico fixo.
- (D) dentária por crianças ou pacientes com dificuldade motora.
- (E) de próteses totais.

31. Durante o atendimento clínico, a posição do(a) Auxiliar em Saúde Bucal sentada no mocho vai variar de acordo com o tipo de equipamento profissional utilizado e a posição adotada pelo cirurgião-dentista.

Se o cirurgião-dentista adotar a posição de 9 horas, a Auxiliar ficará em posição de

- (A) 1 hora.
- (B) 3 horas.
- (C) 6 horas.
- (D) 11 horas.
- (E) 12 horas.

32. Em relação ao índice Periodontal (Russell), é correto afirmar que

- (A) usa uma sonda periodontal especialmente desenhada, com uma ponta arredondada de 0,5 mm, para determinar os níveis de inserção.
- (B) foi desenvolvido exclusivamente para avaliar a gravidade da gengivite.
- (C) mede a área da superfície do dente coberta por resíduos e cálculos.
- (D) tem o propósito de avaliar a necessidade de tratamento periodontal numa comunidade.
- (E) foi planejado para avaliar a extensão da doença periodontal.

33. Assinale a alternativa que contém apenas informações corretas em relação ao uso do flúor, em aplicações tópicas.

- (A) Quanto mais jovem o dente, maior sua capacidade de absorver flúor; sendo assim, as aplicações tópicas são recomendadas logo após a erupção dentária.
- (B) As crianças menores de nove anos de idade devem usar dentifrícos não fluoretados ou com baixa concentração de fluoretos.
- (C) Os dentes com defeitos de estrutura, como porosidades, lesões cariosas, cáries incipientes, hipomíneralização ou restaurações defeituosas, adquirem quantidades muito menores de flúor que os com superfície de esmalte sadia.
- (D) Os produtos formados a partir da aplicação tópica são insolúveis no meio bucal, sendo, portanto, retidos permanentemente sobre a superfície do dente.
- (E) Os bochechos com fluoreto de sódio a 0,2% apresentam sabor desagradável, possibilidade de descaamar a gengiva, risco de manchar os dentes descalcificados ou bordas das restaurações.

34. A biossegurança nunca pode ser menosprezada na prática odontológica, e a infecção cruzada sempre deve ser controlada para os riscos biológicos se reduzirem ao mínimo. Sendo assim, é necessário controlar a limpeza e desinfecção dos moldes que são enviados para laboratórios, bem como os trabalhos que vêm dos laboratórios, pois serão provados em boca e retornarão para o laboratório.

Com relação à desinfecção de moldes, assinale a alternativa correta.

- (A) A desinfecção de alto nível da pasta zinco-enólica e dos silicones pode ser feita por meio de imersão em amônia quaternária por 10 minutos.
- (B) A desinfecção de alto nível de polissulfetos pode ser feita por meio de imersão em detergentes fenólicos simples por 10 minutos.
- (C) A desinfecção de alto nível do alginato pode ser feita borrifando glutaraldeído 2,0% e mantendo o molde fechado em um saco plástico por 10 minutos.
- (D) A desinfecção de nível intermediário dos silicones não pode ser feita por meio de imersão em hipoclorito de sódio 0,5% por 10 minutos.
- (E) A desinfecção de alto nível envolve a destruição dos microrganismos como o bacilo da tuberculose, mas não é capaz de matar ou inativar esporos.

35. Com relação à desinfecção do ambiente clínico, realizada por meio do álcool 70%, assinale a alternativa correta.
- (A) Apresenta ação tuberculicida, bactericida, fungicida, virucida e esporicida.
 - (B) Promove desinfecção de alto nível.
 - (C) Não é indicada para artigos metálicos, pois apresenta ação corrosiva.
 - (D) É recomendada fricção, em três etapas, intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos.
 - (E) Não é volátil e não forma resíduos tóxicos, mas é efetiva na presença de matéria orgânica e apresenta rápida ação em baixa temperatura.
36. Assinale a alternativa correta em relação à esterilização de artigos críticos em autoclaves.
- (A) O instrumental cirúrgico e os produtos para saúde processados por meio do ciclo *flash* podem ser utilizados até sete dias após o processo de esterilização.
 - (B) O instrumental esterilizado por meio do ciclo *flash* dispensa o uso de emuladores e/ou integradores, mas só deve ser liberado para utilização após leitura negativa do indicador biológico.
 - (C) Os pacotes de grau cirúrgico devem ser posicionados para que o lado do filme esteja em contato com o lado do filme do outro pacote. Da mesma forma, as superfícies de papel devem estar em contato entre si.
 - (D) O ciclo *flash* é recomendado para esterilização de artigos de implante e cirurgia rotineiramente no consultório odontológico.
 - (E) Os artigos como cubas e frascos devem ser dispostos com a abertura para cima, facilitando a secagem da carga de forma eficiente.
37. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são classificados em função de suas características e os consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Assinale a alternativa que contenha exemplos de resíduos de saúde do grupo E.
- (A) Pontas diamantadas e lâminas de bisturi.
 - (B) Reagentes de laboratório e resíduos contendo metais pesados.
 - (C) Mercúrio de termômetros e substâncias para revelação de radiografia.
 - (D) Embalagens para esterilização com papel crepado e barreiras de proteção de plástico.
 - (E) Lâminas de laboratório e bolsas transfusionais contendo sangue.
38. Paciente de 21 anos, do sexo masculino, saudável, relata sentir medo do tratamento odontológico. Durante a consulta, o paciente se queixa de visão turva, observa-se palidez e sudorese aumentada, sem a perda de consciência. Sabendo se tratar de um episódio de lipotimia, uma das medidas imediatas para reversão dessa crise é
- (A) iniciar compressões torácicas e assistência ventilatória.
 - (B) administrar, por via sublingual, um comprimido vasodilatador coronariano.
 - (C) aplicar a manobra de Heimlich.
 - (D) administrar injeção de adrenalina.
 - (E) colocar o paciente deitado de costas, com os pés levemente elevados em relação à cabeça (10 a 15 graus).
39. A oferta de ações conjuntas em saúde bucal, no âmbito do SUS, por meio de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto no coletivo, constitui a
- (A) intersetorialidade.
 - (B) integralidade da atenção.
 - (C) interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo.
 - (D) ampliação e a qualificação da assistência.
 - (E) gestão participativa.
40. Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal:
- (A) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
 - (B) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista.
 - (C) realizar isolamento do campo operatório.
 - (D) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
 - (E) remover suturas.

