



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

004. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** e **02**.



(Bill Watterson. *O melhor de Calvin*. www.estadao.com.br, 06.04.2024)

01. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que o garoto

- (A) decide aprender sozinho a fazer uma bomba, pois ficou contrariado com a resposta da biblioteca.
- (B) considera livros que ensinam a fazer bombas caseiras os que despertam verdadeiro interesse pela leitura.
- (C) tem consigo que as bibliotecas escolares são melhores que as municipais por terem mais livros.
- (D) se indigna com a admiração da atendente da biblioteca, que acha que o garoto quer explodir o seu local de trabalho.
- (E) teme que sua vontade seja descoberta por seus pais e opta por não contatar outras bibliotecas atrás do livro.

02. No trecho “Depois eles se perguntam **por que** as crianças não leem mais” (último quadro), a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, por:

- (A) o motivo ao qual
- (B) a causa de que
- (C) o porquê no qual
- (D) a razão pela qual
- (E) a explicação para que

Leia o texto para responder às questões de números **03 a 07**.

Houve um tempo em que a velhice parecia vir mais cedo. Mal saídos da juventude, homens e mulheres (eles, em especial) se rendiam, quase sempre sem muita resistência, a costumes – em mais de um sentido da palavra – severos e engravatados. De “moço” e “moça”, passavam, bruscamente, a irremediáveis “senhor” e “senhora”. Desse processo, ninguém escapava. Mas Rubem Braga, convenhamos, exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga” antes de lhe vir o primeiro fio de cabelo branco.

Menos conformada é Rachel de Queiroz, que, aos 85 anos, esperneia contra piedosos eufemismos do tipo “terceira idade”. Sem meias palavras, ela diz tudo no título de uma crônica “Não aconselho envelhecer”: “Para que o velho não se sinta tão velho, deixem-no sentir-se livre”, sustenta a octogenária Rachel com veemência de moça.

Ao contrário de Rachel de Queiroz, Otto Lara Resende não esperneia ante o processo de envelhecimento. “Se não é desejável, a velhice é fatal”, rende-se ele em “Vigor e sabedoria” – e, com graça, lembra que “a única alternativa é sinistra”. Para o cronista mineiro, “achar interesse e graça na vida ajuda”, porque “velhice azeda ou ressentida é de amargar”.

Com igual leveza, volta ao assunto em “A velhice do bebê”, e lança um olhar para o que nos espera a todos no extremo do percurso, seja ele longo seja ele breve. “Sooou a hora, ninguém escapa”, diz Otto. A vida, registrou ele nessa crônica de 17 de outubro de 1992, “é uma sucessão de ciladas”. No seu caso, a maior delas o espreitava pouco mais de dois meses depois, quando um suposto erro médico levou, aos 70, quem irradiava pique para emplacar o dobro disso.

(Humberto Werneck. *Senhores & senhoras*. <https://cronicabrasileira.org.br>, 15.03.2019. Adaptado)

03. Assinale a alternativa em que se faz afirmação correta quanto ao que foi tratado no texto.

- (A) Rubem Braga e Otto Lara Resende, diferentemente de Rachel de Queiroz, aceitavam melhor a ideia de envelhecimento.
- (B) Rachel de Queiroz acreditava que a velhice precisava ser chamada por nomes menos agressivos para ser suportada.
- (C) Rubem Braga se reconhecia como alguém velho por ter precocemente ganhado cabelos brancos na juventude.
- (D) Rachel de Queiroz escreveu a crônica “A velhice do bebê” para retratar a rapidez com que as pessoas envelhecem.
- (E) Otto Lara Resende acreditava que a vida só fazia sentido se ela fosse vivida com qualidade e por muito tempo.

04. É correto afirmar que Otto Lara Resende quando faleceu era um

- (A) septuagésimo.
- (B) septuagenário.
- (C) sexagenário.
- (D) sexagésimo.
- (E) septingentésimo.

05. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado está empregado em sentido figurado no contexto em que se encontra.

- (A) Houve um tempo em que a **velhice** parecia vir mais cedo. (1º parágrafo)
- (B) Sem meias palavras, ela diz tudo no **título** de uma crônica... (2º parágrafo)
- (C) ... porque “velhice **azeda** ou ressentida é de amargar”. (3º parágrafo)
- (D) Com igual leveza, volta ao **assunto** em “A velhice do bebê”... (4º parágrafo)
- (E) A vida, registrou ele nessa **crônica** de 17 de outubro de 1992... (4º parágrafo).

06. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado estabelece ideia de tempo.

- (A) **Mal** saídos da juventude, homens e mulheres (eles, em especial) se rendiam... (1º parágrafo)
- (B) **Mas** Rubem Braga, convenhamos, exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga”... (1º parágrafo)
- (C) “**Se** não é desejável, a velhice é fatal”, rende-se ele em “Vigor e sabedoria”... (3º parágrafo)
- (D) ... “achar interesse e graça na vida ajuda”, **porque** “velhice azeda ou ressentida é de amargar”. (3º parágrafo)
- (E) Com igual leveza, volta ao assunto em “A velhice do bebê”, **e** lança um olhar... (4º parágrafo)

07. Considere os trechos:

- ... exagerava, ao assumir-se como “o velho Braga” antes de **lhe vir** o primeiro fio de cabelo branco. (1º parágrafo)
- ... “Para que o velho não se sinta tão velho, **deixem-no sentir-se livre**”... (2º parágrafo)
- ... a maior delas **o espreitava** pouco mais de dois meses depois... (4º parágrafo)

As expressões destacadas podem ser substituídas, sem prejuízo da norma-padrão de emprego e colocação pronominal, respectivamente, por:

- (A) o vir ... o deixem se sentir ... espreitava-no
- (B) o vir ... o deixem se sentir ... lhe espreitava
- (C) vi-lo ... deixem-no se sentir ... lhe espreitava
- (D) vir-lo ... o deixem sentir-se ... espreitava-lhe
- (E) vir-lhe ... deixem-no se sentir ... espreitava-o

08. Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) O exagero de Rubem Braga o conduz à uma imagem negativa de si mesmo.
- (B) Alega-se que um erro médico tirou à vida do escrito Otto Lara Resende.
- (C) Hoje, tem-se a sensação de que a velhice leva mais tempo à chegar.
- (D) Rachel de Queiroz não temia as críticas à sua forma de escrever.
- (E) Quem vem a este mundo está sujeito à ciladas, já dizia o escritor.

Leia o texto para responder às questões de números **09** e **10**.

A história da dengue vem de longe. As primeiras descrições de epidemias de uma doença semelhante à que hoje nos _____ datam do século 18. O vírus só foi isolado em 1943.

Sempre _____ quatro vírus causadores de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, os quais compartilham entre si dois terços do genoma. São chamados de sorotipos, em função de suas interações com os anticorpos produzidos contra eles, no sangue da pessoa que foi infectada, a qual apresenta fase febril por dois a sete dias. As lesões da pele permanecem por mais três a seis dias depois que a febre cedeu. _____ pequenos sangramentos nasais, vaginais ou nas gengivas ao escovar os dentes.

A mortalidade varia de 0,01% a 5%, dependendo do acesso aos cuidados médicos. Se o paciente _____ o volume de líquido extravasado no adoecimento, a morte pode ser evitável.

O Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 60 mililitros de líquido por quilograma de peso, por dia, assim que a febre se instala. Portanto, um adulto de 70 quilos deve tomar cerca de quatro litros por dia, volume quase proibitivo para os que têm náuseas e vômitos. Esses casos exigem hidratação por veia, nem sempre acessível a todos.

É impossível acabar com a dengue no Brasil, mas é vergonhoso convivemos até hoje com as mortes pela doença.

(Drauzio Varella. *Dengue, a doença*.
www1.folha.uol.com.br, 13.03.2024. Adaptado)

09. As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) aflige ... houveram ... Podem ocorrer ... repor
- (B) aflige ... existiram ... Podem ocorrer ... repuser
- (C) afligem ... existiu ... Pode ocorrer ... repuser
- (D) afligem ... houve ... Podem ocorrerem ... repor
- (E) afligem ... houveram ... Pode ocorrerem ... repor

10. Está em conformidade com o que se afirma no texto e a norma-padrão de regência a frase:

- (A) Acessar a certos cuidados médicos é algo que nem todos conseguem.
- (B) O término ao período febril é sucedido de lesões da pele por alguns dias.
- (C) Pode acontecer de o paciente não conseguir receber hidratação por veia.
- (D) Acabar com as mortes por dengue no Brasil corresponde a algo inatingível.
- (E) O Ministério da Saúde recomenda da quantidade mínima de água a tomar.

11. A prefeitura de uma determinada cidade, dando continuidade às estratégias de combate à dengue no município, está disponibilizando para a população um medicamento homeopático, que suaviza e reduz os sintomas da doença. Esse medicamento é envasado em frascos de vidro contendo 15 mL cada um. O preparo para consumo é feito adicionando-se 3 gotas desse medicamento diluídas em 500 mL de água mineral. Considerando-se que cada gota tem 0,05 mL e que 1 L equivale a 1 000 mL, a quantidade de frascos, que serão utilizados para ser diluído esse medicamento em 1 500 L de água mineral, será de
- (A) 10.
(B) 30.
(C) 50.
(D) 70.
(E) 90.
12. Um agente comunitário de saúde registra suas ações realizadas em dois bairros, A e B, em fichas específicas, de acordo com as orientações técnicas em vigor. Foram registradas 255 fichas para o bairro A e 165 fichas para o bairro B. Todas essas fichas devem ser organizadas em pastas, cada pasta com o mesmo número de fichas, sendo esse número o maior possível. Se cada pasta só poderá ter fichas de um mesmo bairro, a diferença entre a quantidade de pastas com fichas do bairro A e a quantidade de pastas com fichas do bairro B é
- (A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.
13. A prefeitura de uma determinada cidade identificou, em 400 imóveis vistoriados pelas equipes de combate às endemias que, a cada 7 imóveis com criadouros com larvas do *aedes aegypti*, há 3 imóveis sem criadouros com larvas. Portanto, do total de imóveis vistoriados, o número de imóveis com criadouros de larvas é
- (A) 80.
(B) 120.
(C) 240.
(D) 280.
(E) 320.

14. A tabela a seguir apresenta os números de casos de dengue, por faixa etária e por sexo, de um bairro da Grande São Paulo.

Faixa etária	Masculino	Feminino
Menos de 1 ano	11	9
1 a 19 anos	9	4
20 a 39 anos	x	7
40 a 59 anos	11	8
60 a 80 anos	19	12

Sabendo-se que a média aritmética dos números dos casos de dengue do sexo masculino supera em 3 unidades a média aritmética dos números dos casos de dengue do sexo feminino, então o número dos casos de dengue do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos, é

- (A) 5.
 (B) 7.
 (C) 9.
 (D) 11.
 (E) 19.
15. Pacientes com sintomas de dengue devem ingerir bastante líquido, e a quantidade varia de acordo com a massa corporal da pessoa. Especialistas da área de saúde orientam que a pessoa infectada beba, por dia, 80 mL de água para cada quilograma da sua massa corporal. Uma pessoa com 54 quilogramas de massa corporal utiliza, para ingerir água, uma garrafa na forma de um paralelepípedo reto retângulo de medidas internas indicadas na figura.





Figura fora de escala

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Sabendo-se que $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, o número mínimo dessas garrafas, todas elas contendo a capacidade máxima de água que essa pessoa deverá tomar para ingerir o recomendado pelos especialistas é

- (A) 4.
 (B) 5.
 (C) 6.
 (D) 7.
 (E) 8.

16. Observe a seguinte estrutura de pastas no MS-Windows 10, em sua configuração padrão:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Um usuário, posicionado na pasta “Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias -> Arquivos-Educação”, executou o atalho ALT + Seta para cima.

É correto afirmar que o usuário foi posicionado na pasta:

- (A) Arquivos_Prefeitura.
- (B) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias.
- (C) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> 2023 -> Secretarias -> Arquivos-Desenvolvimento.
- (D) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas.
- (E) Arquivos_Prefeitura -> Prestação de Contas -> Secretarias -> 2023 -> Arquivos-Saúde.

17. No MS-Word 2016, um usuário alterou a formatação de um trecho de documento que inicialmente estava com o conteúdo seguinte:

FUNDAÇÃO VUNESP 2024

Ao término da formatação, o conteúdo do trecho ficou conforme mostrado a seguir:

FUNDAÇÃO VUNESP 2024

Quantas aplicações de diferentes opções de formatação (negrito, itálico, tachado, sobrescrito e sublinhado) foram necessárias, no mínimo, para realizar o ajuste no texto?


- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

18. Considere a seguinte planilha no MS-Excel 2016:

Valores
20
35
40
55
80
60
61
85
80
64
80
75

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

O gráfico a seguir foi gerado para esses dados, nesse mesmo programa:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Qual foi o tipo de gráfico utilizado?

- (A) Mapa de Árvore.
- (B) Radar.
- (C) Colunas.
- (D) Histograma.
- (E) Barras.

19. No Google Documentos, um usuário compartilhou um arquivo utilizando as opções "Acesso geral" para "Qualquer pessoa com o link" e com o nível de "Leitor".

Assinale a alternativa correta sobre o acesso ao arquivo compartilhado.

- (A) Qualquer pessoa com o link poderá visualizar o arquivo apenas caso esteja logada em sua conta do Google.
- (B) Qualquer pessoa com o link poderá visualizar o arquivo, mesmo que não esteja logada em sua conta do Google, devendo fazer *logon* para pedir acesso de Edição.
- (C) Qualquer pessoa conectada em sua conta do Google poderá visualizar e editar o documento.
- (D) Apenas pessoas do rol de usuários pré-habilitados a visualizar o arquivo poderá acessá-lo a partir do link gerado.
- (E) Qualquer pessoa com o link deverá enviar uma solicitação de leitura do arquivo ao proprietário para que haja efetiva liberação de acesso.

20. O Google Workspace é uma suíte que abrange uma série de aplicativos, dentre eles o Google *Forms*, ou Google Formulários.

Esse aplicativo tem a finalidade de

- (A) diagramação.
- (B) criação de reuniões online.
- (C) criação de apresentações.
- (D) criação e gerenciamento de pesquisas.
- (E) edição de documentos de texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Resolução COFEN nº 736/2024, dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem (PE) em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. Em relação ao PE, é correto afirmar que o técnico de enfermagem

- (A) participa na implementação dos cuidados prescritos e sua checagem, sob a supervisão e orientação do enfermeiro, realizando as anotações de enfermagem pertinentes.
- (B) tem como atribuição específica realizar a etapa de evolução de enfermagem.
- (C) sob a supervisão e orientação do enfermeiro, desenvolve as cinco etapas do PE, a saber: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem.
- (D) sob supervisão do enfermeiro, prescreve os cuidados de enfermagem a serem realizados pelo auxiliar de enfermagem.
- (E) não atua no PE porque sua elaboração, implementação e avaliação são atribuições privativas do enfermeiro.

22. Em uma Unidade de Saúde da Família, após realizar a glicemia capilar de um usuário adulto, o técnico de enfermagem realizou a seguinte anotação no prontuário:

04.06.24

Glicemia capilar = 170 mg/dL. Sangue obtido por punção em região lateral da polpa digital do dedo médio da mão esquerda, que apresentava pele íntegra. Paciente relatou leve desconforto no momento da perfuração. Pequeno sangramento no local cessou rapidamente após breve compressão da área. Paciente orientado e encaminhado para consulta.

Maria da Silva. COREN-SP XXXX – TE

Considere as recomendações do COFEN para a realização dos registros de enfermagem no prontuário do paciente relacionados à realização da glicemia capilar, analise a anotação apresentada e assinale a alternativa correta.

- (A) A anotação realizada pelo técnico de enfermagem está completa e correta.
- (B) Foram anotados dados desnecessários uma vez que apenas a data e o resultado obtido devem ser registrados no prontuário do paciente, uma vez que, em seguida, ele seria atendido em consulta.
- (C) Além das informações registradas, a anotação de enfermagem deve conter o horário em que a punção foi realizada, se o paciente estava em jejum ou há quanto tempo havia se alimentado e quais orientações foram dadas.
- (D) Para que a anotação ficasse completa e correta, faltou apenas o registro do horário em que o procedimento foi realizado.
- (E) Os registros do desconforto relatado pelo paciente, do sangramento observado após a perfuração e da medida de controle realizada são desnecessários, pois se trata de condições normalmente observadas durante e após a realização do procedimento.

23. Antes de realizar o curativo em membro inferior de uma usuária, o técnico de enfermagem consultou a prescrição do enfermeiro constatando que, entre outras orientações, deveria aplicar um curativo de carvão ativado com prata.

Esse tipo de cobertura

- (A) deve ser recortada no tamanho e formato exatos da ferida na qual será utilizada.
- (B) promove a eliminação de odores desagradáveis e inativa bactérias.
- (C) dispensa o uso de cobertura secundária.
- (D) promove o desbridamento químico da ferida.
- (E) não pode ser utilizada em feridas com exsudato abundante.

24. A.A., 42 anos, sexo masculino, informou ao técnico de enfermagem (TE) da equipe de saúde da família que seria submetido a herniorrafia umbilical no dia seguinte e estava com dúvidas a respeito da remoção de pelos do abdome. Frente a essa situação, o TE deve esclarecer que a

- (A) remoção dos pelos deve ser realizada por meio de barbeador com lâminas, no domicílio, na noite anterior à data da internação.
- (B) tricotomia deve ser realizada por meio de barbeador com lâminas, no domicílio, durante o banho pela manhã, antes de sair de casa para sua internação.
- (C) remoção dos pelos deve ser realizada com uso de cremes depilatórios aplicados no domicílio, na noite anterior à data da internação.
- (D) tricotomia, se indicada, será realizada no hospital, em período de tempo mais próximo possível da realização do procedimento cirúrgico.
- (E) tricotomia deverá ser realizada no domicílio ou hospital, até 6 horas antes do horário marcado para o procedimento cirúrgico, podendo ser utilizado para tal, barbeador ou creme depilatório.

25. Para o rastreamento da hipertensão arterial, o Ministério da Saúde recomenda a aferição e registro da pressão arterial (PA) para todo indivíduo com idade maior ou igual a _____ anos, quando presente na Unidade de Atenção Primária para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, caso não exista registro no prontuário de pelo menos uma verificação da PA nos últimos _____ meses.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) 40 ... 6
- (B) 30 ... 12
- (C) 25 ... 12
- (D) 18 ... 24
- (E) 14 ... 24

26. Ao realizar grupos educativos com usuários portadores de diabetes melito, o técnico de enfermagem deve enfatizar os cuidados a serem observados para a prevenção de feridas nos pés, tais como

- (A) usar cremes ou óleos hidratantes para pele seca, porém, evitando usá-los entre os dedos.
- (B) remover calos e calosidades cuidadosamente, com o auxílio de lâminas desinfetadas.
- (C) usar meias de cor escura sempre que utilizar calçados fechados, trocando-as, no mínimo, a cada 6 horas.
- (D) cortar as unhas dos pés regularmente, aparando os cantos para evitar que se encravem.
- (E) usar calçados com um número maior do que o indicado para os pés, para evitar áreas de atrito com a pele.

27. A baciloscopia do escarro permite detectar a maioria dos casos pulmonares de tuberculose (TB). Em relação à coleta de material para a realização desse exame em indivíduo identificado como sintomático respiratório (SR), é correto afirmar que

- (A) para o diagnóstico, a 1ª amostra será coletada na primeira consulta ou visita domiciliar de SR, e a 2ª amostra será coletada na manhã do dia seguinte, se o resultado da 1ª amostra for negativo.
- (B) devem ser coletados de 5 a 10 mL de escarro, pois quando essa quantidade de escarro não é alcançada, a realização dos exames e seu desempenho podem ficar prejudicados.
- (C) para a coleta de escarro, deve ser utilizado um pote descartável transparente, com capacidade de 35-50 mL, que deve ser identificado com etiqueta afixada em sua tampa, contendo o nome do paciente e a data da coleta.
- (D) o paciente deve ser orientado a lavar as mãos e higienizar a cavidade oral com solução antisséptica para gargarejo, antes de o pote ser entregue a ele.
- (E) caso o paciente use próteses dentárias, ele não deverá retirá-las antes de higienizar a cavidade oral, uma vez que tal procedimento não interfere na qualidade da análise do material coletado.

28. Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), o técnico de enfermagem (TE) foi solicitado para realizar a prova do laço em uma gestante com suspeita de dengue. Entre outras ações, ao executar o procedimento, sob supervisão do enfermeiro, o TE aferiu a pressão arterial da paciente, obtendo o valor de 118 x 82 mmHg. Para dar continuidade à prova, deverá insuflar o manguito do esfigmomanômetro até o valor de _____ mmHg, mantendo-o insuflado por _____, desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado, abaixo _____ cm da dobra do cotovelo, anotar o número de petéquias formadas dentro dele e encaminhar a gestante ao médico para avaliação do resultado obtido, realizando as anotações pertinentes no prontuário da gestante.


Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da afirmação.

- (A) 118 ... 90 segundos ... 3
- (B) 100 ... 3 minutos ... 10
- (C) 82 ... 3 minutos ... 10
- (D) 100 ... 5 minutos ... 5
- (E) 118 ... 5 minutos ... 5

29. As quedas constituem um importante problema para idosos em função de seus potenciais danos e complicações, compreendendo lesões de partes moles, fraturas, hematoma subdural, restrição prolongada ao leito, hospitalização, incapacidade e morte. Assim sendo, idosos, seus familiares e cuidadores devem ser orientados quanto à adoção de medidas de prevenção de quedas no domicílio, tais como

- (A) dar preferência ao uso de banheira para o banho.
- (B) utilizar tapetes de cor clara para sinalizar o início e fim de escadas.
- (C) utilizar barras de apoio nos banheiros.
- (D) utilizar iluminação frontal em escadas para facilitar a visualização dos degraus.
- (E) dar preferência ao uso de cadeira, cama e vasos sanitários com pequena altura.

30. Observe atentamente a figura a seguir.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

No Programa Nacional de Triagem Biológica Neonatal, o técnico de enfermagem (TE) tem como uma de suas atribuições a coleta de sangue para a realização do exame, que deve ser realizada por punção com lanceta nas áreas, conforme indicação na figura, com os números:

- (A) I e VII.
- (B) VI e VIII.
- (C) II, III e IV.
- (D) VI, VII e VIII.
- (E) IV, V e VI.

31. Ao realizar visita domiciliar para uma família com uma criança com 12 meses de idade, beneficiária de programa de transferência de renda, a mãe informou ao técnico de enfermagem (TE) que estava com dúvidas sobre como deveria oferecer à criança os 60 sachês de suplementação alimentar oferecidos pelo NutriSUS.

Frente a essa situação, o TE deve esclarecer que

- (A) devem ser administrados 2 sachês por dia, um deles no almoço e o outro no jantar.
- (B) o pó do sachê deve ser diluído em líquidos, como água, leite ou sucos, antes de ser administrado à criança.
- (C) o conteúdo de cada sachê deve ser acrescentado aos alimentos que serão oferecidos à criança, durante sua cocção ou aquecimento em banho-maria.
- (D) em uma única refeição, pode ser oferecido o conteúdo de, no máximo, 2 sachês, que deverão ser acrescentados aos alimentos de consistência mais firme.
- (E) apenas 1 sachê/dia deve ser misturado a uma pequena quantidade de comida da criança (papas ou purês de frutas ou legumes; arroz com feijão), que deverá ser oferecida primeiro, seguida do restante da refeição.

32. A cada gestação, a partir da 20ª semana, as gestantes devem receber uma dose da vacina dTpa que confere proteção contra
- (A) difteria, tétano e coqueluche.
 - (B) tuberculose, varicela e caxumba.
 - (C) tétano, difteria e hepatite B.
 - (D) difteria, caxumba e varicela.
 - (E) tétano, difteria e caxumba.
33. Aos 6 meses de idade, a criança deve receber, por via intramuscular, as vacinas VIP, Pentavalente, Influenza e Covid-19. Idealmente, cada vacina deve ser administrada em um grupo muscular diferente, porém, quando necessário, é possível a administração de mais de uma vacina em um mesmo grupo muscular, respeitando-se, entre uma vacina e outra, a distância de
- (A) 0,5 cm.
 - (B) 1,0 cm.
 - (C) 1,5 cm.
 - (D) 2,0 cm.
 - (E) 2,5 cm.
34. Considere as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e assinale a alternativa correta em relação ao processo de esterilização dos frascos de vidro utilizados para armazenar o leite materno no banco de leite humano (BLH).
- (A) Os resíduos de leite humano dos frascos e tampas devem ser removidos com detergente de uso doméstico, sem diluição prévia.
 - (B) A esterilização pode ser realizada por produtos químicos, preferencialmente à base de aldeídos, sendo que frascos e tampas devem ficar totalmente mergulhados na solução por 2 horas.
 - (C) As tampas devem ser autoclavadas junto com os vidros, devendo-se apenas folgar seu fechamento, retornando a tampa $\frac{1}{4}$ de volta, para permitir a entrada do vapor.
 - (D) Os frascos devem ser autoclavados a 121 °C, por 3 minutos.
 - (E) Após autoclavagem, os frascos devem estar completamente secos e frios antes de serem fechados.
35. Como membro da equipe de saúde, o técnico de enfermagem participa de grupos de educação em saúde. Ao conversar com os participantes do grupo de planejamento familiar, deve enfatizar a importância em adotar a dupla proteção como método anticoncepcional e medida de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, o uso concomitante de dois métodos anticoncepcionais tais como:
- (A) anticoncepcional oral e vasectomia.
 - (B) dispositivo intrauterino (DIU) e gel espermicida.
 - (C) diafragma e anticoncepcional injetável.
 - (D) camisinha masculina e vasectomia.
 - (E) camisinha feminina e camisinha masculina.
36. Entre outras medidas de prevenção da toxoplasmose, a gestante deve ser orientada a
- (A) evitar beber leite e produtos lácteos elaborados com leite, independentemente de este ter sido pasteurizado.
 - (B) não usar facas, tábuas de corte, pratos, bancadas e utensílios utilizados para o manuseio de carne crua para outros alimentos, sem antes lavá-los com água tratada e sabão.
 - (C) dar preferência ao consumo de frutas com casca, uma vez que podem ser removidas antes de a fruta ser ingerida, dispensando sua lavagem prévia.
 - (D) consumir embutidos tais como linguiça e salsicha, entre outros, pois o processo de fabricação elimina do produto os cistos do agente causador da doença.
 - (E) quando possível, dar preferência ao cozimento de carnes em micro-ondas, pois é um método mais confiável do que o cozimento em chama do fogão.
37. O técnico de enfermagem atua no Banco de Leite Humano (BLH) da maternidade local. Ao realizar os procedimentos para a ordenha e coleta de leite deve, entre outros cuidados,
- (A) realizar a lavagem prévia das mamas da doadora com água e sabão antisséptico, secando-as com compressas estéreis.
 - (B) apoiar o peito com uma das mãos e, com a outra, fazer movimentos de deslizar ou de esfregar a mama para estimular a ejeção do leite.
 - (C) colocar o dedo polegar no limite superior da aréola e o indicador no limite inferior, pressionando o peito em direção ao mamilo.
 - (D) desprezar os primeiros jatos de leite (de 0,5 a 1 mL), pois melhora a qualidade do leite pela redução dos contaminantes microbianos.
 - (E) alternar a posição dos dedos, de superior e inferior para lateral direita e esquerda, e para a posição oblíqua, a cada movimento de expressão das mamas, buscando retirar o leite de todo o peito.

38. Ao realizar visita domiciliar para um usuário, o técnico de enfermagem (TE) foi solicitado a comparecer com urgência à casa do vizinho, porque “havia uma pessoa passando mal”. Ao chegar ao local, o TE constatou que um rapaz, com história de epilepsia, estava inconsciente, apresentando movimentos involuntários e desordenados dos membros, sialorreia e perda involuntária de urina. Frente a essa situação, o TE deve iniciar os cuidados de primeiros socorros que incluem, entre outras ações,

- (A) apoiar a cabeça da vítima, lateralizando seu rosto.
- (B) solicitar ajuda para conter braços e pernas da vítima, evitando que se machucasse.
- (C) tentar abrir a boca da vítima e inserir um tecido entre os dentes para evitar a mordedura da língua.
- (D) colocar a vítima na cama e mantê-la em decúbito lateral até a convulsão terminar.
- (E) introduzir na boca da vítima uma dose da medicação anticonvulsivante de que esta faz uso, para cessação e controle da convulsão.

39. Tem-se a seguinte prescrição:

Penicilina G Potássica = 750 000 UI. Dissolver em 30 mL de soro fisiológico. Correr em 30 minutos.

Considerando-se que, para o preparo e a administração dessa medicação, o técnico de enfermagem dispõe de frascos de penicilina G potássica com 5 000 000 UI e bomba de infusão configurada para mililitros por hora (mL/h), utilizando-se 3 mL de diluente, o volume (V) a ser retirado do frasco e a velocidade de infusão (VI) serão:

- (A) V = 4,5 mL; VI = 69,0 mL/h.
- (B) V = 0,45 mL; VI = 60,9 mL/h.
- (C) V = 0,45 mL; VI = 1,015 mL/h.
- (D) V = 0,75 mL; VI = 61,5 mL/h.
- (E) V = 0,75 mL; VI = 1,025 mL/h.

40. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao Programa Melhor em Casa (PMeC).

- (A) O Programa Melhor em Casa (PMeC) é um serviço prestado apenas para pessoas que apresentam dificuldades definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde.
- (B) O PMeC é executado, de modo tripartite, cabendo aos municípios prestar assessoria técnica ao Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos Estados.
- (C) O PMeC é composto por Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) e Equipe Multiprofissional de Apoio para Reabilitação (EMAP-R).
- (D) A admissão do usuário ao Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa (SAD/PMeC) se dá por solicitação médica, independentemente da concordância prévia do usuário ou de seu responsável legal.
- (E) O serviço de atenção domiciliar (SAD) deverá garantir continuidade e regularidade, por meio da prestação da assistência ao usuário nos dias úteis, das 7:00 às 19:00 horas.

