



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

018. PROVA OBJETIVA

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

22. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
23. Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
24. Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
25. Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Entre os instrumentos apresentados, destaca-se um de grande utilidade nas toracotomias, com intuito de facilitar o acesso e a visualização das estruturas intratorácicas. Este instrumento é o afastador autoestático denominado:
- (A) Volkmann.
 - (B) Finochietto.
 - (C) Farabeuf.
 - (D) Gosset.
 - (E) Weitlaner.
27. O nó cirúrgico completo é uma sobreposição de três ou mais laçadas. Cada laçada pode ser denominada seminó; cada laçada tem uma função primordial. Assinale a alternativa correta, referente a este tema.
- (A) Os nós das suturas vasculares são realizados com o auxílio de um porta agulhas.
 - (B) A primeira laçada ou primeiro seminó tem a função de segurança.
 - (C) A segunda laçada ou segundo seminó tem a função de fixação.
 - (D) A terceira laçada ou terceiro seminó tem a função de contenção.
 - (E) Devemos trazer sempre a estrutura até o nó, mantendo grande força de tração.
28. A fratura denominada em *blow out* corresponde a fratura de:
- (A) assoalho da órbita.
 - (B) zigomático.
 - (C) tábua anterior do seio frontal.
 - (D) maxila.
 - (E) mandíbula.
29. A ultrassonografia é um excelente método para a avaliação do politraumatizado e deve ser realizada em todos os pacientes, independentemente da condição hemodinâmica da vítima. Com relação a este tema, assinale a alternativa correta.
- (A) A função cardíaca é mal avaliada pela ultrassonografia, não sendo possível avaliar a veia cava.
 - (B) Na janela perihepática, avalia-se a presença ou não de líquido no espaço de Traube.
 - (C) Na janela subxifoide, avalia-se a presença de pneumoperitônio no trauma abdominal penetrante.
 - (D) Na janela suprapúbica, avalia-se a presença ou não de líquido no espaço retrovesical, podendo estar positivo no trauma pélvico.
 - (E) Na janela periesplênica, avalia-se a presença ou não de líquido no espaço de Morrison.

30. Com relação ao choque hipovolêmico no trauma, assinale a alternativa correta.
- (A) Na distribuição trimodal das mortes em vítimas de trauma, ele é responsável por óbitos na segunda fase.
 - (B) Soluções salinas hipertônicas são muito úteis nos protocolos de atendimento ao politraumatizado.
 - (C) São necessários grandes volumes de soluções cristaloides por via intravenosa para ressuscitação volêmica adequada dos pacientes instáveis hemodinamicamente.
 - (D) O emprego de soluções coloides é indicado no paciente politraumatizado por auxiliar na manutenção da perfusão periférica e baixo índice de efeitos colaterais.
 - (E) O principal hemoderivado utilizado nos pacientes em choque hipovolêmico é o sangue total.
31. Com relação à cicatrização das feridas operatórias, assinale a alternativa correta.
- (A) Numa ferida crônica, o mecanismo comum é a deficiência de colágeno, causada por descompensação diabética e hipovitaminoses.
 - (B) Na maioria das vezes, a interrupção da cicatrização ocorre na fase proliferativa.
 - (C) A cicatrização secundária ocorre quando a incisão é feita em tecido limpo e as bordas são anatomicamente reaproximadas.
 - (D) O processo de cicatrização de feridas agudas se completa dentro de 6 a 12 semanas.
 - (E) As feridas tratadas com fechamento primário retardado apresentam maior probabilidade de infecção do que as feridas que se fecham imediatamente.
32. Com relação aos tumores cervicais na infância, assinale a alternativa correta.
- (A) O cisto tireoglosso manifesta-se como uma massa cística arredondada, de tamanho variável na linha lateral do pescoço, logo acima do osso hioide.
 - (B) Cistos dermóides constituem-se num diagnóstico diferencial, pois estes não se movimentam com a deglutição, como ocorre com o cisto tireoglosso.
 - (C) Não há um potencial maligno do tecido tireoidiano disgenético localizado em um cisto de ducto tireoglosso.
 - (D) Há desenvolvimento de carcinoma mais frequentemente em glândulas tireoidianas normais do que em tecido tireoidiano ectópico.
 - (E) As anormalidades da primeira fenda branquial são mais comuns, ocorrendo seis vezes mais frequentemente que as anomalias da segunda fenda.
33. Uma avaliação pré-operatória adequada inclui uma avaliação pré-anestésica cuidadosa. Com relação ao uso de medicamentos fitoterápicos por pacientes que se submeterão a uma cirurgia, assinale a alternativa correta.
- (A) Os pacientes devem manter seus medicamentos naturais habituais.
 - (B) Interromper apenas os medicamentos reprovados por seu médico.
 - (C) Continuar ingerindo apenas os medicamentos aprovados pela ANVISA.
 - (D) Interromper o uso desses medicamentos 12 horas antes da cirurgia.
 - (E) Interromper todos os medicamentos naturais sem prescrição 2 a 3 semanas antes da cirurgia.
34. A trombose venosa profunda (TVP) é uma afecção temida em Cirurgia. Assinale a alternativa correta com relação a esse tema.
- (A) Em homens, o câncer de pâncreas e colorretal estão menos frequentemente associados a risco trombótico, enquanto as doenças malignas hematológicas têm maior risco.
 - (B) A TVP ocorre com maior frequência nas veias femorais ou ilíacas; os trombos originam-se mais comumente em placas ateroscleróticas dos vasos mesentéricos.
 - (C) Na Flegmasia alba dolens, a perna não tem pulso, está pálida e fria, podendo progredir para a Flegmasia cerúlea dolens, caracterizada por cianose do membro e sendo um precursor da gangrena.
 - (D) O sinal de Homans é específico para TVP, sendo positivo em aproximadamente 85-90% dos casos.
 - (E) As medidas dos níveis de D-dímero e fibrinogênio marcado são específicas para confirmação do diagnóstico de TVP, sendo amplamente utilizadas.

35. Homem de 38 anos deu entrada no Pronto-Socorro trazido por amigos, com relato de ferimento por arma branca em região do tronco à esquerda, após briga em um bar. Não houve atendimento pré-hospitalar. Chegou após 15 minutos do episódio e apresentava-se alcoolizado, agitado, reagindo a dor, com dificuldade para respirar e inspirações profundas e pausadas. Exame físico: ferimento penetrante por arma branca, de 6 cm de extensão em hemitórax esquerdo, no 6º EIC, com linha axilar média com presença de traumatopneia. Inspirações profundas e com pausas e uso de musculatura acessória. Presença de enfisema subcutâneo, diminuição da expansibilidade com hiper-timpanismo à percussão e ausência de MV em HTE. FR = 24 mrpm . Saturação O₂: 75%. PA: 115/74 mmHg. FC: 122 bpm. RX tórax demonstrado.



(www.bibliomed.com.br)

As condutas que deverão ser realizadas na etapa B do atendimento primário desse paciente, na sala de emergência, deverão ser:

- (A) Toracocentese descompressiva à direita e sutura do ferimento sob anestesia local.
- (B) Pericardiocentese, seguida de janela subxifoide e drenagem pericárdica.
- (C) Drenagem torácica esquerda pela presença de hemotórax volumoso detectado no RX.
- (D) Curativo de 3 pontas, seguido de drenagem torácica em selo d'água à esquerda.
- (E) Indicar videolaparoscopia pela presença de hérnia diafragmática esquerda.

36. Com relação aos sinais e sintomas da doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa correta.

- (A) Dor abdominal está presente em 90% dos pacientes.
- (B) A diverticulose é assintomática em até 80% dos casos.
- (C) Enterorragia geralmente está associada a divertículos de cólon transverso.
- (D) Diverticulite ocorre mais frequentemente no cólon direito.
- (E) Fístulas podem ocorrer, e as mais frequentes são as coloentéricas.

37. Homem de 16 anos, pardo, procurou o Pronto-Socorro com queixa de dor abdominal há uma semana. Duas semanas antes da consulta, tinha apresentado quadro de dor abdominal difusa, em cólica, de grande intensidade, que cedeu ao antiespasmódico aplicado em outro serviço. Passou uma semana apresentando dores leves, esporádicas. Na semana anterior, a dor voltou e como não apresentou melhora com a mesma medicação utilizada no primeiro episódio, buscou atendimento médico. Referia dois episódios de vômitos no dia da consulta, com saída de sangue na evacuação diarreica. Negava febre, negava história de dor abdominal anterior à relacionada a esta consulta, negava comorbidades. Ao exame físico abdominal apresentava dor à palpação profunda de fossa ilíaca direita, dor à descompressão brusca abdominal, sem visceromegalias, sem massas ou tumorações palpáveis. Uma peculiaridade do exame era que, à palpação da fossa ilíaca direita, não se palpavam alças. Exames laboratoriais e radiografias abdominais não mostraram alterações. Foi internado para investigação diagnóstica e submetido a exame contrastado (demonstrado na imagem). O diagnóstico do paciente é:



(Fonte: Dr. Melvyn H. Schreiber, The University of Texas Medical Branch, Galveston, TX)

- (A) Neoplasia de jejuno proximal.
- (B) Divertículo de Meckel.
- (C) Volvo de sigmoide.
- (D) Íleo biliar.
- (E) Intussuscepção intestinal jejunoileal.

38. Mulher de 34 anos, vítima de tentativa de estrangulamento, deu entrada na emergência apresentando intensa dificuldade respiratória, rouquidão, estridor laríngeo, enfisema subcutâneo cervical e fratura palpável na região anterior do pescoço. Saturação O₂: 88%; FR: 22 mrpm; PA: 125/75 mmHg; FC: 108 bpm. Demais segmentos do corpo sem lesões. A suspeita diagnóstica e conduta a ser tomada na sala de emergência são, respectivamente:

- (A) Trauma da laringe ; via aérea definitiva.
- (B) Pneumotórax simples ; drenagem torácica.
- (C) Pneumotórax hipertensivo ; toracocentese descompressiva.
- (D) Lesão esofágica ; endoscopia digestiva alta.
- (E) Trauma brônquico ; broncoscopia.

39. Com relação às queimaduras, assinale a alternativa correta.


- (A) Queimaduras de espessura integral não requerem enxerto de pele.
- (B) As queimaduras de 1º grau costumam ser caracterizadas pela formação de bolhas.
- (C) A dor é o principal sintoma das queimaduras de 1º grau.
- (D) Dor intensa é característica de queimaduras de espessura integral.
- (E) As queimaduras de espessura integral (3º grau) exibem uma aparência avermelhada e com calor local intenso.

40. Sua utilização no trauma surgiu com um grande ensaio prospectivo internacional (CRASH-2), bem como de um grande grupo retrospectivo de vítimas de combate. Pode ser útil na abordagem terapêutica de vítimas de hemorragia por trauma, desde que aplicado até 3 horas após o evento, e parece ser particularmente útil na presença de extensa fibrinólise, que pode ser avaliada pelo tromboelastograma (TEG).

Essas afirmações estão relacionadas ao seguinte fármaco:

- (A) Ácido aminocaproico.
- (B) Estreptoquinase.
- (C) Clopidogrel.
- (D) Tenecteplase.
- (E) Ácido tranexâmico.

41. Homem, 68 anos de idade, trazido pelo SAMU (suporte básico), apresentou parada cardiorrespiratória durante evento esportivo e foi transferido ao Pronto-Socorro, recebendo suporte básico de vida durante todo o trajeto (aproximadamente 10 minutos). Ao dar entrada na sala de emergência, sua avaliação inicial mostrou: vias aéreas pervias, mantendo-se, pela equipe de atendimento pré-hospitalar, ventilação com bolsa-valva-máscara com oxigênio a 100%, expansibilidade torácica presente bilateralmente, sem pulso central palpável. Ao mesmo tempo, instalou-se a monitorização cardíaca e observou-se o seguinte ritmo:



As condutas a serem tomadas na sala de emergência pela equipe médica deverão ser:

- (A) Máscara O₂ e adenosina IV.
- (B) Intubação orotraqueal, RCP e desfibrilação.
- (C) Cateter nasal com O₂ e amiodarona IV.
- (D) Instalar marca-passo subcutâneo.
- (E) Injeção de adrenalina intracardíaca.

42. Homem de 24 anos foi submetido a uma laparotomia exploradora (trauma fechado) e, após o procedimento, e durante o inventário da cavidade, a equipe cirúrgica encontrou o achado demonstrado na foto, localizado no íleo, a 50 cm proximal à válvula ileocecal. Trata-se de um(a):



(Fonte: arquivo pessoal dos autores)

- (A) Apêndice cecal ectópico.
(B) Cisto hidático intestinal.
(C) Hérnia de Richter.
(D) Divertículo de Meckel.
(E) Extrusão da mucosa intestinal.
43. Com relação à perfuração esofágica, assinale a alternativa correta.
- (A) A suspeita de perfuração esofágica começa com sintomas de dor epigástrica ou torácica, dor cervical ou odinofagia e disfagia.
(B) A causa mais comumente identificada é perfuração por ingestão de objetos pontiagudos, espinhas de peixe ou palitos de dente.
(C) A endoscopia digestiva alta é o padrão para o diagnóstico, com acurácia de 95-98%.
(D) Uma causa rara é perfuração por esforço de vômito vigoroso (síndrome de Mallory-Weiss).
(E) Qualquer sinal de obstrução deve ser corrigido posteriormente, após a cirurgia inicial, para que a perfuração cicatrize adequadamente.

44. A condição denominada *Hemosuccus pancreaticus* é causada por:

- (A) ruptura de cisto pancreático para a cavidade peritoneal.
(B) trauma por manipulação recente do ducto pancreático por neoplasias.
(C) erosão da artéria esplênica por pseudocisto pancreático.
(D) pancreatite crônica complicada.
(E) pancreatite aguda necrotizante.

45. Mulher de 39 anos procurou atendimento por dor abdominal vaga, de fraca intensidade, há 4 meses. No exame físico, detectou-se uma massa abdominal de limites imprecisos e pouco dolorosa. Foi solicitada tomografia abdominal (imagem demonstrada). O exame histológico do material colhido por punção aspirativa com agulha fina revelou níveis baixos de amilase, presença de células ricas em mucina e estroma similar ao do ovário. O diagnóstico da paciente é:



(TOWNSEND JR., C. M.; BEAUCHAMP, R.D.; B. EVERS, M. AND MATTOX, K.L. SABISTON - Tratado de Cirurgia. 20ª Edição, Ed. Elsevier, 2019, Cap. 55, pg. 2395)

- (A) Pseudocisto pancreático.
(B) Cisto simples de cabeça de pâncreas.
(C) Metástase de câncer de ovário no pâncreas.
(D) Tumor estromal gastrointestinal (GIST).
(E) Neoplasia cística mucinosa da cauda do pâncreas.

46. As listas de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial da Saúde têm, como objetivo principal:
- (A) aperfeiçoar as técnicas de monitorização intraoperatória, para observar melhor os sinais vitais do paciente durante o ato operatório.
 - (B) indicar os melhores preditores de antibioticoprofilaxia e servir de profilaxia de tromboembolismo, prevenindo complicações pós-operatórias indesejáveis.
 - (C) manejar de modo correto os fármacos anestésicos e prevenção de complicações anestésicas.
 - (D) melhoria da segurança das cirurgias e reduzir mortes e complicações cirúrgicas desnecessárias.
 - (E) evitar acidentes perfurocortantes dos membros da equipe cirúrgica com os cuidados corretos.
47. Com relação à sutura intradérmica, assinale a alternativa correta.
- (A) Atualmente, na sua confecção, aborda-se o subcutâneo.
 - (B) É considerada como uma sutura contínua.
 - (C) Pode ser utilizada em casos de ferimentos traumáticos.
 - (D) Pode ser utilizada em regiões com tensão moderada.
 - (E) Deve ser executada com fio multifilamentar.
48. Entre as manobras para evitar infecções cirúrgicas, devem estar incluídos procedimentos como:
- (A) tricotomia realizada em casa, 24 horas antes da cirurgia.
 - (B) realizar os exames pré-operatórios na sala de cirurgia, imediatamente antes do procedimento cirúrgico.
 - (C) colocar drenos (preferencialmente abertos) pela incisão cirúrgica.
 - (D) empregar álcool sobre a pele do paciente após a antisepsia.
 - (E) internar o paciente preferencialmente no dia do procedimento.
49. Com relação à toracocentese, assinale a alternativa correta.
- (A) O esvaziamento muito rápido do líquido acumulado no espaço pleural está relacionado ao edema pulmonar.
 - (B) A realização da punção deve ser feita na borda inferior da costela, para evitar lesão do feixe vasculonervoso.
 - (C) Inspeção, ausculta, percussão e palpação pouco antes do procedimento não são usados para detectar a presença da alteração pleural.
 - (D) A realização da anestesia local não é necessária, pois a dor é mínima na parede torácica.
 - (E) No trauma, está indicada como abordagem inicial do pneumotórax simples e hemotórax.
50. O principal aspecto da técnica cirúrgica para correção de hérnias inguinais proposta por Lichtenstein é:
- (A) Reforçar a parede posterior do canal inguinal, fazendo uso das estruturas anatômicas presentes na área da hérnia.
 - (B) Aproximação de tecidos necessária para “cobrir” a área de fraqueza com graus variáveis de tensão.
 - (C) Aplicação da tela fixada, cobrindo a área de abaulamento, na medida exata do defeito (*tension-free*).
 - (D) Fechamento do anel femoral por meio de sutura contínua e uso de fio cirúrgico inabsorvível.
 - (E) Sutura da fáscia transversa e do tendão conjunto com sutura em pontos separados e fio inabsorvível forte.

