



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

028. PROVA OBJETIVA

MÉDICO INFECTOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 22.** A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 23.** Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
- 24.** Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
- 25.** Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
- 26.** Paciente de 16 anos, sexo masculino, apresenta quadro de cefaleia, vômitos, rigidez da nuca, sinais de irritação meníngea (Kernig e Brudzinski), convulsões e manchas vermelhas no corpo. Realizados testes para investigação diagnóstica, hemoculturas, punção líquórica em andamento e raspado das lesões petequiais em membros inferiores, que evidenciaram diplococos GRAM negativos.
- Em face do exposto, assinale a alternativa correta.
- (A) Está recomendada a quimioprofilaxia para todos os profissionais da área de saúde que atenderam o caso.
 - (B) Em relação à quimioprofilaxia das gestantes, a rifampicina é contraindicada.
 - (C) A quimioprofilaxia também está indicada para o paciente, no momento da alta, se o tratamento da doença foi realizado com ceftriaxona.
 - (D) A notificação compulsória deve ser realizada em até 24 horas para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
 - (E) O ciprofloxacino é o medicamento de escolha para a quimioprofilaxia nas crianças.
- 27.** Paciente de 74 anos, morador da zona rural, em tratamento quimioterápico devido a um tumor de esôfago, apresentou um ferimento cortocotuso profundo em mão esquerda durante a manipulação de mudas de árvores frutíferas. Devido ao ocorrido, foi encaminhado para o atendimento médico para a avaliação da extensão do ferimento. O paciente refere nunca ter recebido nenhuma dose de vacina contra tétano.
- Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.
- (A) Está indicado o soro antitetânico (SAT) e três doses de vacina dupla adulto (dT), com intervalo de 30 dias entre as doses.
 - (B) Está indicada três doses de vacina dupla adulto (dT), com intervalo de 30 dias entre as doses.
 - (C) Está indicada a imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) e três doses de vacina dupla adulto (dT), com intervalo de 60 dias entre as doses.
 - (D) A IGHAT tem meia-vida de 7 a 10 dias em pacientes sem a imunização prévia.
 - (E) Para a aplicação do SAT, está indicada a realização do teste de sensibilidade cutânea.

- 28.** Assinale a alternativa correta quanto às medidas de controle indicadas na ocorrência de um surto de varicela em ambiente hospitalar.
- (A) A administração de imunoglobulina humana antivaricela para a realização de bloqueio está indicada até 7 dias após o contato com pessoas doentes.
 - (B) A vacina está indicada nos comunicantes suscetíveis imunocompetentes maiores de 9 meses de idade, até 120 horas após o contato.
 - (C) A vacina está indicada no terceiro trimestre de gestação.
 - (D) A vacina está indicada após a administração recente de sangue, plasma ou imunoglobulina.
 - (E) Após 14 dias sem novos casos, considera-se o surto controlado.
- 29.** Em relação a febre tifoide, assinale a alternativa correta:
- (A) A vacina de febre tifoide está indicada para controle de surto da doença.
 - (B) O teste sorológico para febre tifoide (reação de Widal) é o principal método diagnóstico.
 - (C) O cloranfenicol está contraindicado para tratamento.
 - (D) Se o portador de *Salmonella Typhi* for manipulador de alimentos, é preciso realizar coprocultura, uma vez por semana, durante três semanas.
 - (E) As complicações como o sangramento gastrointestinal e a perfuração intestinal são raras; ocorrem em menos de 2 % dos casos.
- 30.** Gestante de 14 semanas, primigesta. Recebe resultado de teste sorológico para toxoplasmose de IgM e IgG reagentes. Considerando o exposto, assinale a conduta correta.
- (A) Deve-se introduzir imediatamente sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
 - (B) Deve-se fazer o teste de avididade de IgG na mesma amostra de soro, sem aguardar nova requisição médica.
 - (C) São requeridos exames de avididade para IgM após a 16ª semana de gestação, para a confirmação diagnóstica.
 - (D) Está contraindicada a espiramicina na gestação.
 - (E) Está indicada a tomografia de crânio e fundo de olho na gestante.
- 31.** Paciente de 34 anos refere adentramento de morcego, há 1 dia, em sua residência enquanto ele, sua esposa e seu filho de 12 meses estavam dormindo. Referem não saber se o animal teve contato direto com eles.
- Com relação a essa família, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.
- (A) Observação clínica da família por 30 dias.
 - (B) Indicar vacinação antirrábica 4 doses (0, 3, 7 e 14 dias).
 - (C) Indicar vacinação de pré-exposição antirrábica com três doses.
 - (D) Indicar vacinação antirrábica 4 doses (0, 3, 7 e 14 dias) associada ao soro antirrábico.
 - (E) Indicar vacinação antirrábica 5 doses (0,3, 7,14 e 28 dias) associada ao soro homólogo antirrábico.
- 32.** Adolescente do sexo masculino, 16 anos, sofreu uma picada de jararaca durante um passeio na trilha com amigos. Procurou serviço médico por apresentar intensa dor no local da picada, além de edema e equimose. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
- (A) Esse acidente é crotálico e pode evoluir com parestesia local duradoura.
 - (B) O diagnóstico de certeza é feito por meio da solicitação de coagulograma.
 - (C) Esse acidente é botrópico e pode evoluir para síndrome compartimental.
 - (D) Esse caso é grave e deverá receber 12 ampolas de soro antiveneno.
 - (E) Está indicado o teste de sensibilidade cutânea, caso o paciente necessite de soro.
- 33.** Homem de 28 anos apresenta corrimento uretral com diagnóstico de uretrite sem identificação do agente etiológico. A primeira opção terapêutica deve ser:
- (A) azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, via oral (VO), dose única.
 - (B) ceftriaxona 500 mg, intramuscular (IM), dose única associada a azitromicina 500 mg, 4 comprimidos, VO, dose única.
 - (C) ceftriaxona a 500 mg, IM, dose única, associada a azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
 - (D) metronidazol 250 mg, 2 comprimidos VO, duas vezes ao dia, por 7 dias.
 - (E) ceftriaxona 1 g, IM, dose única.

34. Considerando os aspectos relacionados à hepatite C e gestação, assinale a alternativa correta.
- (A) O tratamento medicamentoso deve ser iniciado imediatamente.
 - (B) A gravidez deve ser evitada durante todo o período do tratamento de hepatite C e até os seis meses seguintes ao seu término.
 - (C) Se confirmada a gestação, o tratamento não deverá ser suspenso.
 - (D) Os medicamentos para tratamento de hepatites C, aguda e crônica, não são teratogênicos.
 - (E) O aleitamento materno está contraindicado.
35. A droga de escolha para o tratamento da leishmaniose visceral em crianças menores que 1 ano, gestantes e maiores que 50 anos é:
- (A) miltefosina.
 - (B) antimoniato de meglumina.
 - (C) isetionato de pentamidina.
 - (D) itraconazol.
 - (E) anfotericina B lipossomal.
36. Em 2024, o Programa Nacional de imunizações do Ministério da Saúde incorporou a vacina de dengue fornecida pelo laboratório Takeda Pharma no Sistema único de Saúde. Pode-se afirmar, corretamente, que essa vacina
- (A) é inativada.
 - (B) está indicada na gestação.
 - (C) não deve ser aplicada em indivíduos que já tiveram dengue.
 - (D) é indicada em dose única.
 - (E) está contraindicada em imunossuprimidos.
37. Paciente de 44 anos, professora, refere tosse com expectoração amarelada acompanhada de febre diária não aferida e sudorese noturna há 45 dias. Associando-se, ainda, o emagrecimento de 8 quilos nesse período. Foi realizado o teste molecular rápido para tuberculose no escarro com resultado positivo e iniciado o esquema básico de tratamento para tuberculose. A paciente evoluiu com hepatotoxicidade, apresentou o aumento das enzimas hepáticas, TGO de 255 U/L e TGP de 186 U/L, bilirrubinas totais e frações sem alterações após 30 dias do início da terapia.
- Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada para essa paciente.
- (A) Não suspender o tratamento se for assintomática e monitorar semanalmente.
 - (B) Suspender os medicamentos e reintroduzir o esquema básico completo no mesmo dia após a normalização dos exames.
 - (C) Suspender os medicamentos e reintroduzir os medicamentos, um a um, após a avaliação da função hepática (rifampicina e etambutol, seguidos de isoniazida e, por último, a pirazinamida).
 - (D) Não reintroduzir a rifampicina, pois é o medicamento mais hepatotóxico.
 - (E) Reduzir o tempo de tratamento para 4 meses, devido à hepatotoxicidade.
38. Assinale a alternativa que indica corretamente qual dos medicamentos para o tratamento da tuberculose pode apresentar como evento adverso rabdomiólise com mioglobinúria e insuficiência renal.
- (A) Rifampicina.
 - (B) Isoniazida.
 - (C) Pirazinamida.
 - (D) Etambutol.
 - (E) Estreptomicina.
39. Assinale a alternativa correta para o tratamento da diarreia pelo *Vibrio cholerae*.
- (A) Cefalexina 500 mg, via oral, 6 em 6 horas, por 7 dias.
 - (B) Amoxicilina 500 mg, via oral, 8 em 8 horas, por 5 dias.
 - (C) Vancomicina, 500 mg, via oral, 6 em 6 horas, por 10 dias.
 - (D) Doxiciclina 300 mg, via oral, dose única.
 - (E) Clindamicina 300 mg, via oral, 8 em 8 horas, por 7 dias.

40. Paciente de 22 anos, sexo masculino, estudante, apresenta lesões cutâneas, úlceras e nódulos próximos à lesão primária em mãos e antebraços, tendo associada a distribuição linfática com início há três semanas. Refere ter contato diário com gato próximo a sua residência que apresenta lesões na pele há um mês. Relata, ainda, ter sido arranhado algumas vezes nesse período.

Assinale a alternativa correta quanto ao provável diagnóstico e tratamento indicado, a partir do critério clínico-epidemiológico.

- (A) Doença da arranhadura do gato; azitromicina.
- (B) Esporotricose; itraconazol.
- (C) Furunculose; cefalexina.
- (D) Carbúnculo; doxiciclina.
- (E) Tuberculose cutânea; rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol.

41. Paciente de 49 anos, natural e procedente de São Paulo, hipertenso, diabético e obeso, apresenta sequela de acidente vascular isquêmico com hemiplegia à direita. Paciente acamado na residência, aos cuidados da família. Evoluiu com tosse, dispneia e febre diária há 3 dias. Ao exame físico: regular estado geral, descorado, hidratado, cianótico, febril, anictérico. Aparelho cardiovascular: bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros audíveis. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular presente com estertores crepitantes em base e terço médio de hemitórax direito e roncos difusos. Abdome: globoso, flácido, sem visceromegalias. Extremidades com edema de membros inferiores discreto bilateral.

Frente a esse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica.

- (A) Amoxicilina.
- (B) Cefuroxima.
- (C) Oxacilina associada à gentamicina.
- (D) Ceftriaxona associada à claritromicina.
- (E) Ciprofloxacina associada à azitromicina.

42. Paciente de 62 anos, aposentado, hipertenso, diabético com insuficiência renal crônica dialítica. Apresenta febre de 38,6 °C há dois dias, acompanhada de hiperemia e presença de secreção purulenta no óstio da inserção do cateter de Shiley. Ao exame físico: regular estado geral, descorado, desidratado, acianótico, febril, anictérico, consciente e orientado. Pressão arterial: 100 x 70 mmHg; frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto; frequência respiratória de 28 respirações por minuto, saturação de oxigênio de 92%. Aparelho cardiovascular: bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros audíveis. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Abdome: globoso, flácido, sem visceromegalias. Extremidades com edema de membros inferiores discreto bilateral.

Assinale a alternativa que apresenta o antibiótico indicado para esse caso.

- (A) Cefalexina.
- (B) Amoxicilina associada ao clavulanato.
- (C) Vancomicina.
- (D) Ceftriaxona.
- (E) Ciprofloxacina.

43. Paciente de 68 anos, feminina, branca, aposentada. Natural e procedente de Sorocaba –SP. Foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela filha, que refere que a paciente iniciou quadro de febre de 39,5 °C há 3 dias, acompanhada de cefaleia holocraniana importante e mal-estar. Procurou a unidade básica de saúde no 1º dia e foi medicada com dipirona e azitromicina, sem melhora. Paciente é diabética de difícil controle, em uso irregular dos medicamentos. Acompanhante refere que a paciente, apesar das medicações, evoluiu com piora da cefaleia associada a vômitos, sonolência e agitação psicomotora. Na entrada na UPA: MEG, desidratada 2/4+, febril, taquipnéica, acianótica, anictérica. PA: 100 x 60 mmHg; FC: 114 bpm; FR: 28 rpm; T : 38,8 °C. Exame neurológico: sonolenta, rigidez de nuca e sinal de Kernig positivos. Cavidade oral: hiperemia orofaringe e candidíase oral. Aparelho cardiovascular: bulhas rítmicas normofonéticas, sem sopros audíveis; aparelho respiratório: murmúrio vesicular, sem ruídos adventícios, e abdome plano, flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias. Pele e anexos: onicomicose. Realizada a coleta de hemoculturas e líquido, que evidenciou aspecto turvo, células 1 120 (88 % neutrófilos e 12 % linfócitos), glicorraquia de 45 mg/dL e proteínas: 234 mg/dL. Gram: não observadas bactérias.

Assinale a alternativa que apresenta a terapia de escolha para esse caso clínico.

- (A) Ampicilina associada a gentamicina.
- (B) Piperacilina + tazobactam.
- (C) Ceftriaxona associada a ampicilina.
- (D) Ceftriaxona.
- (E) Cefepime.

- 44.** Paciente de 34 anos após acidente automobilístico com politraumatismo evoluiu com fascíte necrotizante.
- Assinale alternativa que apresenta, corretamente, a opção terapêutica de escolha para esse caso.
- (A) Vancomicina associado a piperacilina + tazobactam.
 - (B) Ertapenem.
 - (C) Oxacilina associado a metronidazol.
 - (D) Cefazolina associado a metronidazol.
 - (E) Vancomicina associado a gentamicina
- 45.** Em relação aos pacientes que vivem com HIV e apresentam tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta.
- (A) O tratamento para tuberculose deverá ser instituído imediatamente, introduzindo-se os antirretrovirais (ARV) de acordo com o grau de imunossupressão.
 - (B) Se a contagem de linfócitos T CD4 for maior que 50 céls/mm³, os ARVs devem ser iniciados no mesmo momento que a terapia para tuberculose.
 - (C) Se a contagem de linfócitos T CD4 for menor que 50 céls/mm³, os ARVs devem ser iniciados na 8ª semana após o início da terapia para tuberculose.
 - (D) O esquema de escolha de ARV é tenofovir, lamivudina e darunavir associado a ritonavir.
 - (E) O uso de dolutegravir está contraindicado.
- 46.** O tratamento da bacteriúria assintomática está indicado em:
- (A) idosos.
 - (B) mulheres na pré-menopausa.
 - (C) gestantes.
 - (D) homens diabéticos.
 - (E) pacientes com piúria.
- 47.** Pode-se afirmar corretamente, sobre a febre maculosa, que a
- (A) leucopenia é o achado mais importante do hemograma.
 - (B) confirmação diagnóstica é feita com uma amostra de sangue para a reação de imunofluorescência indireta.
 - (C) introdução de antibiótico deve aguardar a confirmação diagnóstica.
 - (D) droga de escolha para o tratamento é a doxiciclina.
 - (E) profilaxia em indivíduos assintomáticos é realizada com cloranfenicol.
- 48.** Assinale a alternativa correta quanto à doença que requer precauções para aerossóis.
- (A) Meningite meningocócica.
 - (B) Sarampo.
 - (C) Escarlatina.
 - (D) Mononucleose infecciosa.
 - (E) Difteria.
- 49.** Assinale a alternativa correta quanto à primeira opção terapêutica para giardíase em adultos.
- (A) Tinidazol, 2 gramas, dose única.
 - (B) Mebendazol, 100 mg, dose única.
 - (C) Metronidazol, 250 mg, duas vezes ao dia, por 3 dias.
 - (D) Nitazoxanida, 500 mg, dose única.
 - (E) Albendazol, 400 mg, dose única.
- 50.** Em relação à doença de Chagas, podemos afirmar, corretamente, que
- (A) o tratamento é indicado para todos os casos em fase aguda e de reativação da doença.
 - (B) o nifurtimox é o fármaco de primeira escolha para tratamento.
 - (C) uma sorologia IgG por método ELISA confirma o diagnóstico na fase aguda.
 - (D) o exame parasitológico é o mais indicado na fase crônica.
 - (E) a forma cardíaca ocorre em 70 % dos casos crônicos.

