



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

031. PROVA OBJETIVA

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

22. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetorais, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
23. Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
24. Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
25. Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em casos de traumatismo ocular penetrante com indicação de sutura de córnea, o fio que deve ser utilizado é o
- (A) Algodão 10.0
 - (B) Mersilene 8.0
 - (C) Prolene 9.0
 - (D) Mononylon 10.0
 - (E) Vicryl 8.0
27. Em casos de queimaduras químicas da córnea graus 1 e 2 de Roper-Hall, após a lavagem copiosa, o tratamento clínico a ser instituído é:
- (A) pomada de antibiótico, cicloplégico e colírio de corticoide por 7 a 10 dias.
 - (B) colírio de antibiótico e corticoide por 7 a 10 dias e inibidor da anidrase carbônica.
 - (C) colírio de antibiótico sem conservantes, colírio anti-inflamatório não hormonal e corticoide tópico por 15 a 20 dias.
 - (D) pomada de antibiótico, lágrimas artificiais sem conservantes e lente de contato terapêutica.
 - (E) colírio de antibiótico e corticoide por 15 a 20 dias, atropina e hialuronato de sódio ao deitar.
28. Paciente de 71 anos, masculino, pardo, já sem nenhuma capacidade de acomodação, chega ao consultório queixando-se de dificuldade de enxergar o computador com os óculos para perto que havia feito há 6 meses, de +4.25 D.E. AO.
- Seu exame oftalmológico mostrou:
- Refração sob cicloplegia: OD: +1.00 D.E. = 20/25 Add +3.00 J1
- OE: +1.25 D.E. = 20/25
- Biomicroscopia: Catarata cortical + AO
- Tonometria de aplanção: 15 mmHg AO (10:00 hs)
- Mapeamento de retina: Raras drusas de coroide em polo posterior AO.
- Considerando que a tela de seu computador fica a 67 cm de distância de seu rosto, os óculos que devem ser prescritos para esse paciente são:
- (A) +1.75 D.E. OD e +2.00 D.E. OE
 - (B) +2.00 D.E. OD e +2.25 D.E. OE
 - (C) +2.50 D.E. OD e +2.75 D.E. OE
 - (D) +3.00 D.E. OD e +3.25 D.E. OE
 - (E) +3.50 D.E. OD e +3.75 D.E. OE

29. O colírio que está sendo utilizado para o tratamento da miopia progressiva em crianças é
- (A) a tropicamida a 0,05%.
 - (B) o ciclopentolato a 1%.
 - (C) a atropina a 1%.
 - (D) o ciclopentolato a 0,1%.
 - (E) a atropina a 0,025%.
30. As empresas responsáveis pelas lentes MyCon, Miyosmart, MyoCare e Stellest, desenvolvidas para o tratamento da miopia infantil progressiva, são, respectivamente:
- (A) Rodenstock, Zeiss, Hoya e Essilor.
 - (B) Zeiss, Hoya, Essilor e Rodenstock.
 - (C) Hoya, Essilor, Zeiss e Rodenstock.
 - (D) Rodenstock, Hoya, Zeiss e Essilor.
 - (E) Zeiss, Rodenstock, Essilor e Hoya.
31. A lente de contato rígida gás permeável (RGP) da Mediphacos, que foi desenvolvida para uma melhor adaptação em pacientes com ceratocone central, é a
- (A) Optimum XC.
 - (B) Rose K2 NC.
 - (C) Rose K2 IC.
 - (D) Rose K2 PG.
 - (E) Millennium XC.
32. Em relação à cirurgia refrativa com Excimer Laser, assinale a alternativa correta.
- (A) O Laser de Femtosegundo permite a confecção de flaps corneanos mais finos que o microcerátomo.
 - (B) A síndrome da areia do Saara é a principal complicação do Femto-LASIK.
 - (C) A ectasia corneana secundária é uma complicação mais frequente no PRK transeptelial.
 - (D) O uso da mitomicina C no intraoperatório da cirurgia de PRK tem como objetivo minimizar o risco de olho seco no pós-operatório.
 - (E) O PRK é a técnica de escolha em pacientes com miopia entre 6 e 10 graus, pelo fato de consumir menos tecido corneano.
33. A úlcera corneana em escudo e o pseudogerontoxon são sinais que podem ser encontrados
- (A) na conjuntivite bacteriana aguda.
 - (B) no tracoma.
 - (C) na ceratoconjuntivite vernal.
 - (D) na conjuntivite neonatal.
 - (E) na conjuntivite papilar gigante.
34. As estrias de Vogt, o anel de Fleischer e o sinal de Munson são achados oculares mais comumente encontrados
- (A) no ceratoglobo.
 - (B) na degeneração marginal pelúcida.
 - (C) na úlcera de Mooren.
 - (D) na degeneração marginal de Terrien.
 - (E) no ceratocone.
35. Paciente de 39 anos de idade, masculino, branco, chega ao consultório queixando-se de dor, embaçamento e vermelhidão em OD há 4 dias. Refere que apresentava também dor e rigidez na região da coluna lombar, e um RX de coluna evidenciou uma calcificação dos ligamentos da coluna (coluna em “bambu”).
- Seu exame oftalmológico mostrou:
- Refração subjetiva: OD -0.25 D.E. = 20/30
OE -0.25 D.C. x 180° = 20/20
- Biomicroscopia: Hiperemia conjuntival ++, precipitados ceráticos e células em câmara anterior OD. OE sem alterações.
- Tonometria de aplanção: 18 mmHg AO (10:30).
Mapeamento de retina: Sem alterações AO.
- A principal hipótese diagnóstica para esse caso é:
- (A) síndrome de Reiter.
 - (B) espondilite anquilosante.
 - (C) doença de Crohn.
 - (D) síndrome uveítica de Fuchs.
 - (E) doença de Whipple.
36. O tratamento preconizado para sífilis ocular ou neurosífilis consiste em
- (A) penicilina cristalina 4 milhões de unidades EV em dose única.
 - (B) penicilina G benzatina 7,2 milhões de unidades IM divididas em 3 doses de 2,4 milhões, uma por semana.
 - (C) penicilina procaína G 2,4 milhões IM uma vez ao dia + probenecida 500 mg VO 4 vezes ao dia por 2 semanas, seguida de penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades 1 vez por semana por 1 a 3 semanas.
 - (D) penicilina cristalina 3 milhões de unidades EV uma vez ao dia por 10 dias.
 - (E) penicilina procaína G 7,2 milhões de unidades IM divididas em 3 doses de 2,4 milhões, uma por semana.

37. Paciente de 34 anos, feminina, branca, tabagista, com 1,62 metro de altura e 84 kg, chega ao consultório queixando-se de diminuição da visão em OE, dor retro-orbitária e diplopia esporádica há 3 semanas. Queixa-se também de fadiga excessiva no final do dia. Refere estar tomando escitalopram VO há 3 meses e fazendo tratamento para incontinência urinária.
- Seu exame oftalmológico mostrou:
- Refração sob cicloplegia: OD +0.25 D.E. = 20/20
OE +0.50 D.E. = 20/60
- Biomicroscopia: Sem alterações AO.
- Tonometria de aplanção: 15 mmHg AO (11:00 hs)
- Mapeamento de retina: OD sem alterações.
OE hiperemia e discreto edema de papila.
- A principal hipótese diagnóstica para esse caso é:
- (A) neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica.
(B) neuropatia tabaco-álcool.
(C) doença de Graves.
(D) metástase tumoral no nervo óptico.
(E) esclerose múltipla.
38. Em relação ao glaucoma de pressão normal, assinale a alternativa correta.
- (A) É mais comum em pacientes da raça negra.
(B) Hipermétropes têm maior propensão à progressão da doença.
(C) A PIO geralmente está entre 10 e 14 mmHg.
(D) Hemorragia do disco óptico é um achado mais frequente do que no glaucoma crônico de ângulo aberto.
(E) O tartarato de brimonidina tem pouca eficácia nesses pacientes, assim não deve ser utilizado no tratamento.
39. São exemplos de causas de glaucoma secundário de ângulo fechado com bloqueio pupilar:
- (A) glaucoma facomórfico e subluxação de cristalino.
(B) sinequias posteriores 360° pós-uveíte e glaucoma neovascular.
(C) íris em plateau e glaucoma maligno.
(D) glaucoma facoanafilático e fístula carótido-cavernosa.
(E) glaucoma pigmentar e glaucoma de células fantasmas.
40. A trabeculoplastia seletiva a laser (SLT) é uma opção de tratamento com boa eficácia em casos de glaucoma
- (A) primário de ângulo aberto e uveíte hipertensiva.
(B) pigmentar e glaucoma pseudoexfoliativo.
(C) de pressão normal e glaucoma maligno.
(D) de células fantasmas e síndrome de Sturge-Weber.
(E) agudo e glaucoma facoanafilático.
41. Os padrões alfabéticos em “V” e “A” são considerados significativos quando a diferença entre as medidas feitas em supravisão e infravisão forem, respectivamente, iguais ou maiores a
- (A) 20 prisma-dioptrias e 15 prisma-dioptrias.
(B) 25 prisma-dioptrias e 20 prisma-dioptrias.
(C) 15 prisma-dioptrias e 10 prisma-dioptrias.
(D) 10 prisma-dioptrias e 15 prisma-dioptrias.
(E) 15 prisma-dioptrias e 20 prisma-dioptrias.
42. O fator etiológico não infeccioso mais comum da catarata congênita é
- (A) a síndrome de Down.
(B) a galactosemia.
(C) a rubéola congênita.
(D) o hipoparatiroidismo.
(E) a herança autossômica dominante.
43. A complicação intraoperatória conhecida como “sinal da bandeira argentina” que ocorre geralmente em casos de catarata é:
- (A) branca intumesciente.
(B) morganiana.
(C) nigra.
(D) secundária a uveíte.
(E) traumática.
44. O medicamento que é a principal causa da síndrome da íris flácida (*floppy iris syndrome*) na cirurgia de catarata é
- (A) a finasterida.
(B) a risperidona.
(C) o minoxidil.
(D) a tansulosina.
(E) o escitalopram.
45. Os efeitos colaterais mais comuns (ocorrem em mais de 10% dos casos) do OZURDEX, implante intravítreo utilizado no tratamento do edema macular diabético e no edema macular secundário à obstrução venosa da retina, são:
- (A) catarata subcapsular e descolamento do vítreo posterior.
(B) hipertensão ocular e hemorragia conjuntival.
(C) cefaleia e quemose conjuntival.
(D) descolamento de retina e hemorragia vítrea.
(E) endoftalmite e glaucoma secundário.

46. O primeiro medicamento aprovado pelo FDA para o tratamento da atrofia geográfica secundária à degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é o
- (A) Lucentis (ranibizumabe, Novartis).
 - (B) Eylia (aflibercepte, Bayer).
 - (C) Vsiqq (brolucizumabe, Novartis).
 - (D) Vabysmo (faricimabe, Roche).
 - (E) Syfovre (pegcetacoplan, Apellis Pharmaceuticals).
47. A degeneração retiniana periférica que está mais frequentemente associada ao descolamento de retina
- (A) é a degeneração em paliçada (*Lattice*).
 - (B) é a degeneração em rastro de caracol.
 - (C) são os tufos císticos retinianos.
 - (D) é a retinosquise degenerativa.
 - (E) é o branco sem pressão.
48. O topiramato, medicamento anticonvulsivante que também pode ser usado no tratamento da enxaqueca e da síndrome do pânico, pode causar um efeito colateral ocular grave, que é
- (A) a córnea verticilata.
 - (B) a catarata subcapsular posterior.
 - (C) o glaucoma de ângulo fechado.
 - (D) a maculopatia tóxica.
 - (E) a neurite óptica.
49. Em pacientes com doença de Graves, o principal fator de risco clínico para o desenvolvimento da doença ocular tireoidiana é
- (A) a obesidade.
 - (B) o tabagismo.
 - (C) a hipertensão arterial.
 - (D) a *diabetes mellitus*.
 - (E) o alcoolismo.
50. O tumor maligno mais comum das pálpebras é o
- (A) carcinoma espinocelular.
 - (B) sarcoma de Kaposi.
 - (C) melanoma maligno.
 - (D) carcinoma basocelular.
 - (E) hemangioma capilar.

