



431322

MODELO DE
PROVA
(VERSÃO)**A**

EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2026
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2027

026. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CIRURGIA DE OMBRO)

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Criança de 15 meses de idade, nascida prematura (31 semanas de idade gestacional), com alta da UTI neonatal aos 2 meses de vida é atendida na unidade básica de saúde para atualização do Calendário Nacional de Vacinação do SUS (CNV-SUS). Ao analisar o cartão vacinal, observa-se que todas as últimas doses de vacinação foram administradas adequadamente, conforme o CNV-SUS de 2026. A criança não apresenta intercorrências clínicas no momento, tem desenvolvimento pômbero-estatural adequado para a idade corrigida e não possui histórico de reações adversas graves a componentes vacinais.

Com base nas diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde para o CNV-SUS, é correto afirmar que

- (A) a vacina para varicela em dose única deve ser administrada nessa visita, junto com a tríple viral.
- (B) a vacina contra hepatite A deve ter seu esquema de dose única iniciado nesta oportunidade para proteção contra icterícia infecciosa.
- (C) a vacina inativada contra poliomielite substitui a vacina oral nos esquemas de reforço, conforme as atualizações recentes do Ministério.
- (D) a ausência de cicatriz vacinal da BCG após o período neonatal indica a necessidade de revacinação da criança nessa consulta.
- (E) a vacina meningocócica ACWY deve ser aplicada em substituição à meningocócica C para ampliar o espectro vacinal contra outros sorogrupos.

02. O atendimento a pessoas em situação de violência sexual no Sistema Único de Saúde exige uma atuação interdisciplinar que integre cuidados clínicos imediatos, suporte psicossocial e observância de marcos éticos e legais. Com base na Norma Técnica "Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes (2012)", do Ministério da Saúde, considerando as diretrizes para a profilaxia de agravos e a organização da rede de atenção, assinale a alternativa correta e em conformidade com as orientações técnicas vigentes.

- (A) A interrupção da gravidez decorrente de estupro requer a apresentação de alvará judicial ou autorização expressa da autoridade policial para ser realizada legalmente.
- (B) A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser administrada em vítimas não imunizadas no período de até catorze dias após a ocorrência da agressão sexual.
- (C) O atendimento em saúde deve ser pautado pela presunção de veracidade da palavra da vítima, mas necessitando de boletim de ocorrência policial.
- (D) O tempo máximo para início da quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV é de cinco dias, período após o qual os riscos superam os benefícios terapêuticos.
- (E) O método de Yuzpe é considerado a primeira escolha na anticoncepção de emergência por apresentar menor incidência de efeitos colaterais, como náuseas e vômitos persistentes.

03. A busca pela excelência no cuidado em saúde exige a compreensão de sistemas complexos, a aplicação de metodologias de melhoria contínua e o monitoramento rigoroso de indicadores de desempenho. Considerando a qualidade em saúde e as diretrizes e modelos de gestão, é correto afirmar, acerca da avaliação e do aprimoramento da qualidade nas instituições de saúde, que

- (A) a metodologia Lean concentra-se primordialmente na redução da variabilidade estatística dos processos, enquanto a abordagem Six Sigma busca eliminar desperdícios e atividades que não agregam valor direto ao paciente.
- (B) a implementação de inovações deve ocorrer de forma ampla e simultânea em todos os departamentos, para reduzir a resistência humana e garantir a uniformidade imediata dos novos processos de trabalho.
- (C) o ajuste por gravidade do caso (*case-mix adjustment*) é um método que simplifica a análise de mortalidade ao tratar todos os pacientes como clinicamente homogêneos, independentemente da complexidade de suas patologias.
- (D) a análise de modos de falha e efeitos (FMEA) funciona como uma técnica retrospectiva obrigatória, que é aplicada logo após a ocorrência de eventos adversos graves, para mitigar riscos jurídicos imediatos.
- (E) o ciclo *Plan-Do-Study-Act* (PDSA) permite que melhorias sejam testadas em pequenos incrementos e ciclos rápidos, assegurando que as intervenções sejam refinadas antes de uma implementação sistêmica em larga escala.

04. A quantificação do impacto de exposições e intervenções na saúde de indivíduos e populações requer a aplicação precisa de medidas de associação e impacto. Em relação à análise de riscos e benefícios em estudos epidemiológicos, segundo as diretrizes de epidemiologia clínica e saúde pública, é correto afirmar que

- (A) o Risco Relativo fornece informações precisas sobre a quantidade de casos evitáveis em uma comunidade, sendo a medida preferencial para a definição de prioridades em políticas de saúde coletiva.
- (B) a utilização do *Odds Ratio* (razão de risco) para estimar o risco de eventos futuros é recomendada em cenários de alta prevalência da doença, superando a precisão diagnóstica do risco relativo habitual.
- (C) o *Number Needed to Harm* (número necessário para dano) é calculado por meio da razão entre o Risco Relativo e a Redução Absoluta do Risco, fornecendo uma métrica de segurança para fármacos experimentais.
- (D) o Risco Atribuível entre os expostos representa a parcela da incidência da doença que seria teoricamente eliminada caso o fator de risco sob investigação fosse completamente removido daquela população.
- (E) o valor do *Number Needed to Treat* (número necessário para tratar) permanece estável diante de variações no risco basal dos pacientes, contanto que a redução proporcional do risco seja mantida em níveis satisfatórios.

05. Homem de 48 anos, desempregado, tabagista, reside em uma ocupação urbana com alta densidade populacional e saneamento básico precário. Relata tosse produtiva persistente há quatro semanas, acompanhada de sudorese noturna e perda ponderal de cinco quilos. Comparece à unidade básica de saúde para avaliação clínica inicial por iniciativa própria. O enfermeiro da equipe de Estratégia Saúde da Família identifica-o como um caso suspeito e inicia os protocolos de investigação epidemiológica e manejo clínico na Atenção Primária.

Analise as alternativas a seguir, sobre o manejo da tuberculose (TB) na rede de atenção à saúde, e assinale a alternativa correta.

- (A) A baciloscopia de escarro deve ser solicitada quinzenalmente durante o esquema terapêutico, para monitorar a resposta bacteriológica e confirmar a cura do paciente.
- (B) O teste rápido molecular é indicado como método prioritário para o diagnóstico inicial da tuberculose pulmonar nos serviços de atenção básica de saúde.
- (C) A realização do teste tuberculínico está indicada para o diagnóstico de doença ativa em pacientes que apresentam baciloscopia de escarro positiva no início.
- (D) A vacina BCG deve ser aplicada em adultos que vivem no mesmo domicílio de um caso diagnosticado de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva.
- (E) O encerramento do caso por abandono de tratamento ocorre quando o indivíduo deixa de comparecer à unidade de saúde por quinze dias consecutivos.

06. Enfermeira de 32 anos sofre um acidente percutâneo com agulha de lúmen calibroso durante a coleta de sangue de um paciente com diagnóstico confirmado de hepatite B crônica (HBsAg: positivo e HBeAg: positivo). A profissional relata ter completado o esquema vacinal com três doses há cinco anos, porém nunca realizou o teste de anti-HBs para confirmar a soroconversão. No momento do atendimento inicial na unidade de referência, a profissional encontra-se assintomática e preocupada com o risco de transmissão e as medidas profiláticas necessárias.

Com base no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções (2023)”, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) a administração da imunoglobulina hiperimune contra o vírus da hepatite B deve ocorrer preferencialmente nas primeiras vinte e quatro horas após o acidente biológico suspeito.
- (B) a prescrição de antivirais de ação direta como o Tenofovir está indicada como medida de profilaxia pós-exposição padrão para todos os acidentes com material perfurocortante.
- (C) o tratamento imediato com Entecavir deve ser iniciado para o profissional de saúde, visando prevenir a replicação viral nas células hepáticas logo após o contato biológico suspeito.
- (D) a comunicação do acidente de trabalho deve ser realizada apenas se houver confirmação laboratorial de soroconversão do profissional de saúde durante o período de janela imunológica.
- (E) a notificação compulsória do evento deve ser descartada se o trabalhador exposto apresentar um teste rápido reagente para anticorpos anti-HBs no momento da avaliação clínica inicial.

07. Sobre os procedimentos, responsabilidades e fluxos para o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) no Brasil, assinale a alternativa correta, condizente com base nas normas técnicas e éticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina para o manejo da DO.

- (A) Médicos legistas de Institutos Médico Legais realizam necropsias em casos em que há diagnóstico confirmado de doenças crônicas em locais onde não há assistência médica.
- (B) Em casos de morte por causas externas, o médico assistente do hospital emite a DO se o paciente permaneceu internado por mais de 14 dias.
- (C) Em situações de morte materna por gravidez ectópica rota, o diagnóstico da condição gestacional deve constar obrigatoriamente entre as causas do óbito.
- (D) A cobrança de honorários médicos pela emissão da DO é permitida quando o profissional realiza o exame de constatação do cadáver.
- (E) A codificação dos diagnósticos segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) é atribuição direta do médico que assina o documento oficial.

08. Mulher de 24 anos, primigesta, com 14 semanas de idade gestacional, comparece à segunda consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. No primeiro trimestre (8ª semana), seus exames de triagem apresentaram teste rápido para sífilis (TRS) não reagente. Na consulta atual, a paciente relata o surgimento de uma lesão ulcerada única, indolor, de bordas endurecidas na região vulvar há 10 dias, que desapareceu espontaneamente antes da consulta. Ela não apresenta outras queixas. Um novo TRS é realizado, resultando reagente. O marido da gestante é convocado, mas recusa a testagem imediata. Não há alergias a medicamentos. O médico solicita o teste não treponêmico (VDRL) para seguimento.

Com base nas diretrizes de vigilância em saúde da sífilis em gestantes, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização do teste não treponêmico na hora do parto é opcional se a paciente tiver exames de monitoramento reagentes e estáveis durante o terceiro trimestre.
- (B) O caso é classificado como sífilis em gestante devido ao Teste Rápido reagente, independentemente da presença ou ausência de sintomas no momento da consulta.
- (C) A ausência de queda dos títulos de VDRL após o esquema de dose única em sífilis primária exige o retratamento imediato, com três doses semanais.
- (D) A gestante deve ser considerada adequadamente tratada se receber a última dose de penicilina pelo menos quinze dias antes da data provável do parto.
- (E) A ocorrência de um segundo caso de sífilis em uma gestação subsequente deve ser notificada no SINAN como recidiva e não como um novo caso.

09. Um grupo de pesquisadores iniciou um estudo de coorte prospectivo para investigar se o uso regular de um novo suplemento fitoterápico, denominado "Composto Delta", está associado à redução do risco de insuficiência coronariana em adultos entre 45 e 65 anos. Foram recrutados 10.000 participantes inicialmente livres de doença cardiovascular, sendo 5.000 usuários habituais do suplemento (por escolha própria) e 5.000 não usuários (grupo controle). Após 8 anos de acompanhamento sistemático, os pesquisadores observaram um Risco Relativo (RR) de 0,72 para eventos coronarianos (IC 95%: 0,55 a 0,94). Uma análise detalhada das características basais revelou que o grupo de usuários do Composto Delta apresentava, em média, maior nível de escolaridade, maior frequência de atividade física vigorosa e menor prevalência de tabagismo em relação ao grupo comparativo (controle).

Com base nos princípios de epidemiologia clínica e medicina baseada em evidências, é correto afirmar que

- (A) a regressão à média é a explicação mais provável para o efeito observado se os pesquisadores tivessem incluído indivíduos com baixo risco cardíaco inicial.
- (B) o delineamento prospectivo da coorte e o tamanho da amostra asseguram que a associação estatística encontrada representa uma relação de causa e efeito direta entre a exposição e o desfecho.
- (C) a validade externa das conclusões para a população geral torna-se limitada se o grupo de usuários do fitoterápico for composto por pessoas mais atentas a cuidados preventivos.
- (D) o viés de aferição nesse estudo seria eliminado se o desfecho clínico fosse restrito a casos de morte súbita, anulando a necessidade de critérios diagnósticos padronizados.
- (E) o viés de memória representa a maior ameaça à validade da pesquisa, visto que os participantes foram recrutados com base na presença prévia do desfecho clínico.

10. A organização da atenção integral à saúde da criança pressupõe a articulação de serviços em Redes de Atenção à Saúde (RAS), fundamentadas em diretrizes de regionalização, hierarquização e coordenação do cuidado. Acerca da estruturação e do funcionamento dos pontos de atenção, segundo as orientações para implementação da “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)”, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência estabelece que a identificação de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor deve ser postergada até a fase escolar, para evitar diagnósticos precipitados e iatrogenias clínicas.
- (B) O processo de medicalização da aprendizagem é incentivado pela Rede de Atenção Psicossocial como a principal estratégia para o manejo de distúrbios comportamentais em crianças no ambiente escolar da região.
- (C) O clampeamento imediato do cordão umbilical é uma prática recomendada pela Rede Cegonha para todos os recém-nascidos, visando acelerar os procedimentos de recepção e avaliação clínica nas salas de parto.
- (D) O Programa Saúde na Escola define que as ações de avaliação clínica e diagnóstico devem ser realizadas dentro das salas de aula, reduzindo o encaminhamento para a rede de saúde local.
- (E) A Atenção Básica exerce a coordenação do cuidado e a ordenação da rede, priorizando a continuidade da assistência por meio do acompanhamento longitudinal das crianças e suas famílias no território adstrito.

11. Paciente de 32 anos, operária em uma unidade de reciclagem de baterias automotivas (exposição ocupacional a chumbo), está na 22ª semana de gestação. Ela comparece a uma Unidade de Pronto Atendimento apresentando febre referida, cefaleia intensa e dispneia, com saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente. No prontuário, consta que ela reside em um município onde a homogeneidade de coberturas vacinais para crianças menores de 1 ano é de 60%. Ela relata ter apresentado exantema súbito após a ingestão de um analgésico por conta própria no domicílio. Devido ao agravamento do quadro respiratório, ela é internada, mas evolui para óbito materno 48 horas após a admissão, sem que a causa básica tenha sido inicialmente definida pelo hospital.

De acordo com as diretrizes de Vigilância do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) a suspeita de evento adverso relacionado ao uso de medicamento deve ser registrada no sistema VigilMed, para monitoramento pela agência reguladora.
- (B) a estratégia de farmacovigilância ativa constitui o método mais difundido e custo-efetivo para o monitoramento da segurança de medicamentos no serviço público.
- (C) a investigação epidemiológica do óbito materno deve ser concluída pela equipe municipal de vigilância no prazo de 30 dias.
- (D) o conceito de morte materna presumida aplica-se aos casos em que a declaração de óbito registra claramente a patologia obstétrica como causa básica inicial.
- (E) a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho é atribuição compulsória do médico assistente hospitalar, para o encerramento da investigação epidemiológica no SINAN.

12. A equipe de planejamento de um hospital regional está revisando seu modelo assistencial e de gestão para se adequar às normas da Política Nacional de Humanização (PNH). Durante o debate, surgem propostas sobre como lidar com o acolhimento, o processo de tomada de decisão, a organização do espaço físico e a abordagem clínica das doenças. A gestão busca consolidar uma cultura institucional voltada para o protagonismo dos sujeitos e a melhoria da qualidade do cuidado.

Sobre as definições e operacionalizações propostas pela PNH, assinale a alternativa correta.

- (A) O protagonismo dos sujeitos no sistema de saúde fundamenta-se na delegação de competências técnicas específicas para que a família decida sobre a realização dos procedimentos cirúrgicos do paciente.
- (B) A classificação de risco no acolhimento funciona como um instrumento administrativo que organiza as filas de espera, priorizando a ordem cronológica de chegada das pessoas na unidade hospitalar.
- (C) A clínica ampliada determina que o profissional de saúde priorize a investigação dos sinais fisiopatológicos, para garantir a objetividade científica durante o preenchimento do prontuário eletrônico do indivíduo.
- (D) O princípio da transversalidade orienta que as propostas de humanização devem conectar as diferentes especialidades e as diversas áreas de saber presentes no cotidiano da unidade.
- (E) A visita aberta no ambiente assistencial é uma flexibilização do tempo de internação concedida pela direção para reduzir a sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem do hospital regional.

13. Criança de 11 anos, vive com HIV por transmissão vertical e reside com sua avó materna, que é sua cuidadora principal e possui baixa escolaridade. Ele encontra-se clinicamente estável, com carga viral indetectável há dois anos e contagem de linfócitos T CD4 de 23%. Ele frequenta a escola regularmente, mas a avó relata receio de que o neto sofra preconceito caso a escola descubra o diagnóstico. O paciente está iniciando a puberdade e começou a questionar a finalidade dos medicamentos que utiliza diariamente. Durante a consulta na Unidade de Referência, a equipe multiprofissional avalia o plano de imunização, as estratégias de adesão e o processo de revelação diagnóstica.

Nessa circunstância, é correto afirmar que a

- (A) recomendação de vacinação contra febre amarela deve ser aplicada para pacientes pediátricos baseando-se no critério de ausência de sintomas clínicos graves.
- (B) participação da rede de apoio social configura-se como elemento estruturante para a manutenção dos níveis de adesão ao tratamento antirretroviral prolongado.
- (C) comunicação da soropositividade à direção da escola garante a segurança biológica dos demais alunos e funcionários durante as atividades recreativas.
- (D) revelação da condição de saúde para a criança deve ocorrer em sessão breve para evitar ansiedade prolongada e facilitar a aceitação precoce.
- (E) transferência para o serviço de infectologia de adultos deve ser efetuada quando o adolescente atinge a maioridade civil prevista.

14. Senhor de 74 anos, portador de insuficiência cardíaca estável e diabetes mellitus tipo 2, reside em área com alta infestação de *Aedes aegypti*. Apresenta há três dias febre alta, cefaleia e poliartralgia intensa e simétrica, com edema em tornozelos e punhos. No quarto dia, evolui com tontura ortostática, diminuição do débito urinário e sonolência intermitente. Ao exame físico: pressão arterial: 90 x 55 mmHg; frequência cardíaca: 108 bpm; tempo de enchimento capilar de 4 segundos. A equipe da Unidade de Pronto Atendimento realiza a classificação de risco e define o plano terapêutico imediato.

Conforme os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) O plano terapêutico imediato deve priorizar o suporte hemodinâmico e o monitoramento contínuo das funções vitais, uma vez que manifestações extra-articulares podem evoluir rapidamente para disfunções orgânicas severas.
- (B) A aplicação de compressas quentes sobre as articulações acometidas na fase aguda auxilia na redução do processo inflamatório e na recuperação da amplitude de movimento articular.
- (C) A administração de prednisona durante a primeira semana de sintomas reduz a progressão da doença para a fase crônica, incapacitante em pacientes idosos.
- (D) O tratamento etiológico com antivirais específicos deve ser iniciado nas primeiras quarenta e oito horas de sintomas, para garantir a eliminação completa da carga viral do organismo.
- (E) A persistência de sintomas articulares além do vigésimo primeiro dia caracteriza a fase subaguda, na qual pode haver necessidade de introdução de corticosteroides em doses baixas.

15. Em relação ao guia de manejo e tratamento do vírus influenza do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) o zanamivir é um novo antiviral inibidor da neuraminidase que deve ser considerado para uso preferencial em pacientes adultos de risco de evolução desfavorável, sobretudo naqueles que necessitam de admissão em UTI/ventilação mecânica.
- (B) pacientes com sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$) com necessidade de suplementação de O_2 para manter $\text{SatO}_2 > 90\%$ devem ser internados em enfermaria.
- (C) gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com oseltamivir, na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal, independentemente de sinais de agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna.
- (D) em pacientes com condições e fatores de risco para complicações e com síndrome respiratória aguda grave, o antiviral ainda apresenta benefícios, mesmo se iniciado até sete dias do início dos sintomas.
- (E) a quimioprofilaxia antiviral é recomendada em pessoas com graves deficiências imunológicas ou em uso de drogas imunossupressoras, após contato com pessoas com infecção nos últimos 7 dias.

16. Homem de 66 anos comparece à unidade básica de saúde para consulta de rotina. Relata histórico de transfusão sanguínea em 1988 devido a um acidente automobilístico grave. Nega sintomas atuais, mas o teste rápido para hepatite C realizado na unidade apresenta resultado reagente. Os exames séricos atuais são: AST (TGO): 55 U/L; ALT (TGP): 62 U/L; contagem de plaquetas: $145.000/\text{mm}^3$. A equipe de saúde coletiva planeja as próximas etapas de diagnóstico, estadiamento e tratamento com base no "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (2019)" do Ministério da Saúde.

Nessa circunstância, é correto afirmar que

- (A) a monitoração da eficácia do tratamento baseia-se na normalização dos níveis de transaminases hepáticas durante o segundo mês de tratamento.
- (B) pacientes que apresentam resposta virológica sustentável estão protegidos contra novas infecções pelo vírus da hepatite C ao longo da sua jornada.
- (C) o uso de alfa-interferon peguilado associado à ribavirina representa a primeira linha de escolha para pessoas idosas com diagnóstico de genótipo 1.
- (D) o uso de sofosbuvir é indicado para indivíduos que apresentam insuficiência renal grave com taxa de filtração glomerular abaixo de $30 \text{ mL/min/1,73m}^2$.
- (E) o tratamento com antivirais de ação direta é recomendado para pacientes infectados, mesmo na ausência de sintomas clínicos ou fibrose avançada.

17. Um médico pesquisador clínico conduz um ensaio experimental para avaliar a eficácia de um novo fármaco na redução da pressão arterial sistólica (PAS). O estudo seleciona uma amostra de 60 pacientes com hipertensão essencial, divididos aleatoriamente em dois grupos independentes, de 30 indivíduos: um recebeu o fármaco e outro um placebo. Após 6 meses, os resultados demonstram que a redução média da PAS no grupo intervenção foi de 15 mmHg (desvio padrão: 10), enquanto no grupo placebo a redução média foi de 5 mmHg (desvio padrão: 12). A aplicação do teste t de *Student* para amostras independentes (bi-caudal) resultou em um valor de $p: 0,001$. Adicionalmente, o pesquisador calculou o coeficiente de correlação de Pearson entre a idade dos participantes e a magnitude da redução pressórica, obtendo um valor de $r = 0,60$. Para uma análise secundária, os pacientes foram classificados de forma dicotômica entre os que atingiram a meta pressórica e os que não atingiram, utilizando-se o teste qui-quadrado para avaliar a associação com o tipo de tratamento ($p < 0,05$). Observa-se que a distribuição dos valores iniciais de PAS na amostra era levemente assimétrica à direita.

Com base no cenário descrito e nos princípios bioestatísticos, é correto afirmar que

- (A) a análise por Qui-quadrado mostra-se pertinente para avaliar a associação entre o tratamento e o alcance da meta.
- (B) a expansão do tamanho da amostra para 1.000 participantes provocaria uma elevação proporcional no erro padrão das médias.
- (C) o teste de *Mann-Whitney* representa o método de maior poder estatístico para variáveis contínuas com distribuição perfeitamente normal.
- (D) o coeficiente de correlação de Pearson de 0,60 estabelece que a idade é o determinante causal da redução pressórica.
- (E) o teste t pareado é a ferramenta estatística recomendada para contrastar as médias finais entre dois grupos distintos.

18. Homem de 38 anos atua como técnico de manutenção em uma metalúrgica de grande porte há dez anos. Durante a manutenção corretiva de um duto industrial, sofre uma lesão perfurocortante no antebraço direito por uma ferramenta que continha resíduos orgânicos e químicos acumulados. Ele lava o ferimento com água e sabão, retornando às atividades. Quinze dias após o evento, o trabalhador procura atendimento médico apresentando exantema pruriginoso no antebraço e nas mãos, além de zumbido bilateral constante, irritabilidade severa e insônia persistente. Na anamnese ocupacional, revela que a empresa utiliza um sistema de gestão baseado em metas individuais rígidas, com frequente necessidade de horas extras; diz que utiliza protetores auriculares do tipo *plug* e manipula óleos lubrificantes sem o uso sistemático de luvas impermeáveis. A empresa emite a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) referente ao acidente perfurocortante típico inicial.

Em relação à saúde do trabalhador e sob a ótica da epidemiologia e vigilância em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O acidente de trabalho com exposição a material biológico deve ser notificado como agravo de notificação compulsória imediata, em 24 horas, à autoridade sanitária.
- (B) O prazo para conclusão de casos de acidente de trabalho típico no SINAN é fixado em 180 dias após a ocorrência da lesão perfurante inicial.
- (C) O limiar audiométrico de 8 kHz deve ser o mais prejudicado no início da PAIR para que o diagnóstico clínico seja confirmado pelo especialista.
- (D) A irritabilidade e a insônia podem ser classificadas como transtorno mental relacionado ao trabalho se houver nexos com a gestão por metas.
- (E) A progressão da perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ocorre de forma acelerada após os primeiros quinze anos de exposição continuada no ambiente industrial insalubre.

19. Homem de 32 anos é atendido na unidade de emergência apresentando quadro de febre elevada, mialgia generalizada, cefaleia holocraniana intensa e episódios repetidos de vômitos iniciados há 36 horas. O histórico médico revela que ele foi submetido a uma esplenectomia anatômica pós-traumática há cinco anos e não possui registros de imunização recente. Ao exame físico, o paciente encontra-se torporoso, demonstrando sinais de irritação meníngea com rigidez de nuca proeminente, tempo de enchimento capilar de 3 segundos e discretas máculas eritematosas distribuídas no tronco, sem sufusões hemorrágicas ou petéquias visíveis. A punção lombar é realizada acompanhada da coleta de amostras de sangue periférico. O quimiocitológico do líquido cefalorraquidiano (LCR) evidencia aspecto turvo; concentração de glicose marcadamente reduzida; níveis de proteínas totais elevados; e contagem celular de 1.200 leucócitos/mm³, com predomínio de polimorfonucleares. A bacterioscopia direta por coloração de Gram revela a presença de diplococos Gram-negativos.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, nessa circunstância, é correto afirmar que

- (A) a administração simultânea da quimioprofilaxia com rifampicina está indicada para contatos domiciliares do caso suspeito na dose de sessenta miligramas por quilo de peso.
- (B) a indicação de quimioprofilaxia para os profissionais de saúde que prestaram o atendimento ocorre quando há realização de procedimentos na via aérea sem barreira protetora.
- (C) a eficácia vacinal protetora da imunização conjugada atinge o patamar máximo de proteção imediatamente após vinte e quatro horas da primeira aplicação.
- (D) o tratamento específico para a manifestação neurológica inicial deve associar corticosteroides sistêmicos e aciclovir por via endovenosa durante vinte e um dias.
- (E) os contatos domiciliares do paciente que apresentaram esquema vacinal atualizado para o sorogrupo correspondente estão dispensados da realização imediata da quimioprofilaxia.

20. Com base nas “Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde”, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) uma parcela de adolescentes que consomem álcool apresenta comportamento de risco regular, com relatos de episódios de *binge* registrados duas vezes por mês.
- (B) a incidência de jovens que não trabalham nem estudam demonstra relação direta com o aumento progressivo da renda familiar per capita no país.
- (C) os registros do sistema de vigilância apontam que os homens constituem a maioria das vítimas de violência doméstica e abuso sexual no território brasileiro.
- (D) os dados oficiais indicam que a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 a 24 anos apresentou elevação recente nas regiões norte e nordeste do país.
- (E) a mortalidade materna proporcional entre adolescentes concentra seus maiores índices na idade de 14 anos, conforme os dados da Secretaria de Vigilância.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No teste de impacto de Hawkins-Kennedy, o membro superior é posicionado em 90° de elevação, com o cotovelo fletido, sendo considerado positivo quando ocorre dor à rotação do ombro

- (A) externa ativa.
- (B) externa passiva.
- (C) interna passiva.
- (D) neutra passiva.
- (E) interna ativa.

22. No tratamento cirúrgico da lesão do tendão distal do bíceps, a complicação neurológica mais frequente é a lesão do nervo

- (A) mediano.
- (B) cutâneo lateral do antebraço.
- (C) interósseo anterior.
- (D) interósseo posterior.
- (E) ulnar.

23. Em relação aos elementos estruturais de sustentação do complexo suspensório superior do ombro, os chamados pilares ósseos (*struts*), correspondem

- (A) ao terço médio da clavícula e ao acrômio.
- (B) à extremidade lateral (distal) da clavícula e ao acrômio.
- (C) à extremidade medial (proximal) da clavícula e ao acrômio.
- (D) à extremidade medial (proximal) da clavícula e à junção da espinha da escápula com seu corpo lateral.
- (E) ao terço médio da clavícula e à junção da espinha da escápula com seu corpo lateral.

- 24.** O ângulo glenopolar (GPA) é utilizado na avaliação das fraturas da escápula e é definido radiograficamente pela relação entre duas linhas, sendo correto afirmar que é formado entre a linha
- (A) da espinha da escápula e a linha do bordo lateral da escápula.
 - (B) que une os polos da glenoide (eixo longitudinal da glenoide) e a linha que une o polo superior da glenoide ao ângulo inferior da escápula.
 - (C) da espinha da escápula e a linha do bordo medial da escápula.
 - (D) que une os polos da glenoide (eixo longitudinal da glenoide) e a linha da espinha da escápula.
 - (E) que une os polos da glenoide (eixo longitudinal da glenoide) e a linha que une o polo inferior da glenoide ao ângulo inferior da escápula.
- 25.** A incidência radiográfica denominada serendipidade (*serendipity view*) é utilizada na avaliação da articulação esternoclavicular, sendo corretamente realizada com paciente em
- (A) decúbito dorsal e inclinação do tubo em 40 graus cranial.
 - (B) ortostatismo e inclinação do tubo em 20 graus cranial.
 - (C) ortostatismo e inclinação do tubo em 40 graus cranial.
 - (D) decúbito dorsal e inclinação do tubo em 20 graus cranial.
 - (E) ortostatismo e inclinação do tubo em 10 graus cranial.
- 26.** Na avaliação de dor no ombro, em relação à presença do Os acromiale sintomático, é correto afirmar que
- (A) está associado à piora dos resultados funcionais em artroplastia reversa do ombro, sendo considerada fator prognóstico negativo independente.
 - (B) corresponde a uma condição adquirida após trauma, com incidência aumentada em pacientes com osteoporose e é geralmente unilateral.
 - (C) decorre da fusão precoce dos centros de ossificação do acrômio, sendo mais comum no pré-acrômio e raramente é bilateral.
 - (D) representa uma variante anatômica resultante da falha de fusão dos centros do acrômio, frequentemente bilateral e é mais comum na região meso-meta.
 - (E) apresenta menor prevalência na população geral e localização mais frequente entre pré e mesoacrômio, sendo raramente confundida com fraturas.
- 27.** Na capsulite adesiva do ombro, é correto afirmar que
- (A) nos estágios avançados não há fibrose capsular.
 - (B) a doença cursa sem dor e sem limitação de movimento nos estágios iniciais.
 - (C) ocorre inflamação capsular inicial seguida de fibrose e contratura capsular.
 - (D) a limitação da mobilidade ocorre apenas na fase final da doença.
 - (E) os recessos capsulares permanecem preservados durante a evolução da doença.
- 28.** Na artrodese do ombro, o posicionamento adequado do membro superior é fundamental para otimizar a função nas atividades de vida diária, sendo correto afirmar que
- (A) valores de rotação interna abaixo de 40° ou acima de 60° podem caracterizar mau posicionamento com prejuízo funcional.
 - (B) a posição ideal inclui cerca de 30° de abdução, 30° de flexão e 60° de rotação interna, favorecendo alcance global do membro.
 - (C) a rotação é o fator menos importante no posicionamento final, sendo a abdução o principal determinante funcional.
 - (D) a flexão acima de 15° está associada a melhores resultados funcionais, sendo recomendada em todos os casos.
 - (E) valores de abdução entre 30° e 40° apresentam melhor função para atividades da vida diária.
- 29.** Na avaliação do trauma agudo do ombro, a descontinuidade da linha formada pelo arco inferior que conecta a glenoide ao colo inferior do úmero, conhecida como linha de Moloney, em radiografia simples do ombro, está mais frequentemente associada a
- (A) fratura isolada da tuberosidade maior do úmero.
 - (B) lesão traumática do manguito rotador.
 - (C) luxação posterior do ombro (glenoumeral) não diagnosticada.
 - (D) luxação acromioclavicular.
 - (E) lesão do complexo suspensório superior do ombro (complexo de Goss).

- 30.** O nervo supraescapular, originado do tronco superior do plexo braquial, ao atravessar a incisura escapular, apresenta a relação anatômica clássica com o ligamento transversso superior da escápula de forma que o nervo supraescapular
- (A) passa acima e a artéria supraescapular abaixo do ligamento transversso.
 - (B) B passa abaixo e a artéria supraescapular acima do ligamento transversso.
 - (C) e a artéria supraescapular passam acima do ligamento transversso.
 - (D) passa acima do ligamento transversso sem relação com a artéria supraescapular.
 - (E) e a artéria supraescapular passam abaixo do ligamento transversso.
- 31.** Na avaliação da perda óssea glenoidal na osteoartrose primária do ombro, a classificação modificada de Walch é um sistema descritivo que tem como objetivo
- (A) estimar o grau de degeneração da cartilagem glenoidal.
 - (B) quantificar a perda óssea por métodos tridimensionais baseados na reconstrução da anatomia pré-mórbida.
 - (C) caracterizar a morfologia da glenoide e a relação espacial da cabeça umeral em relação à escápula.
 - (D) determinar valores numéricos de versão e inclinação glenoidal em exames de imagem.
 - (E) estabelecer critérios para indicação cirúrgica conforme a gravidade da deformidade óssea.
- 32.** No exame físico do ombro, o teste de Gerber (*lift-off test*) é utilizado para avaliar a integridade funcional do músculo
- (A) infraespinal.
 - (B) supraespinhal.
 - (C) deltoide.
 - (D) redondo menor.
 - (E) subescapular.
- 33.** Na avaliação radiográfica das lesões associadas à instabilidade anterior do ombro, a lesão de Hill-Sachs e as perdas ósseas da glenoide são classicamente melhor demonstradas, respectivamente, nas incidências
- (A) oblíqua apical (West Point) e AP em rotação medial.
 - (B) axilar e Zanca.
 - (C) Zanca e Stryker notch.
 - (D) Stryker notch e oblíqua apical (West Point).
 - (E) AP em rotação medial e axilar.
- 34.** Com o ombro em posição neutra e o membro superior ao lado do corpo, o principal restritor passivo à translação inferior da cabeça umeral é o ligamento
- (A) glenoumeral superior.
 - (B) coracoacromial.
 - (C) glenoumeral médio.
 - (D) transversso do úmero.
 - (E) glenoumeral inferior.
- 35.** Um educador físico, vítima de trauma, apresenta lesão neurológica com importante déficit funcional do ombro. Ao exame, observam-se incapacidade de realizar movimentos de protração escapular e dificuldade em manter a escápula aderida à parede torácica, comprometendo gestos como o soco no boxe.
- O principal músculo acometido nesse caso é o
- (A) supraespinal.
 - (B) serrátil anterior.
 - (C) trapézio.
 - (D) romboide maior.
 - (E) latíssimo do dorso.
- 36.** Paciente, vítima de queda de bicicleta, apresenta fratura desviada do terço médio da clavícula, tratada de forma conservadora.
- De acordo com a literatura, o(s) fator(es) relacionado(s) às características da fratura que está consistentemente associado a maior risco de pseudartrose é
- (A) a idade do paciente no momento da lesão.
 - (B) o tipo de imobilização utilizado no tratamento inicial.
 - (C) o mecanismo de trauma de alta energia.
 - (D) o tempo para início da mobilização do ombro.
 - (E) o grau de desvio e encurtamento da fratura da clavícula.

37. Nos casos de lesões irreparáveis posterossuperiores do manguito rotador, a transferência do músculo latíssimo do dorso é uma opção terapêutica.

Para adequada indicação e melhores resultados funcionais dessa técnica, é fundamental a integridade do tendão do músculo

- (A) peitoral maior.
- (B) peitoral menor.
- (C) subescapular.
- (D) redondo maior.
- (E) redondo menor.

38. Em relação à artroplastia reversa do ombro, é considerada contraindicação clássica para sua realização a

- (A) artrose glenoumeral concêntrica com manguito rotador íntegro.
- (B) ruptura irreparável do manguito rotador com pseudoparalisia.
- (C) falha de artroplastia prévia do ombro com deficiência do manguito rotador.
- (D) ausência ou disfunção grave do músculo deltoide.
- (E) artrose glenoumeral excêntrica associada à deficiência do manguito rotador.

39. A tendinite calcária do ombro acomete preferencialmente os tendões do manguito rotador.

Em relação à sua frequência, em ordem decrescente, os tendões mais comumente envolvidos são:

- (A) supraespinal, subescapular, infraespinal e redondo menor.
- (B) supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor.
- (C) infraespinal, supraespinal, subescapular e redondo menor.
- (D) infraespinal, subescapular, supraespinal e redondo menor.
- (E) subescapular, supraespinal, infraespinal e redondo menor.

40. A síndrome do espaço quadrilateral é uma condição rara causada pela compressão de estruturas neurovasculares na região posterior do ombro.

Em relação a essa síndrome, é correto afirmar que ela envolve principalmente a compressão da artéria circunflexa umeral posterior e do nervo

- (A) axilar.
- (B) subescapular.
- (C) torácico longo.
- (D) supraescapular.
- (E) musculocutâneo.

41. Paciente de 28 anos, jogador de voleibol, apresenta dor posterior no ombro associada à fraqueza na rotação externa. Ao exame físico, observa-se atrofia isolada do músculo infraespinal, com preservação do supraespinal. A ressonância magnética evidencia cisto paralabral posterior.

O local mais provável de compressão do nervo responsável pelo quadro descrito é:

- (A) incisura escapular, sob o ligamento transvers superior da escápula.
- (B) intervalo rotador, próximo ao ligamento coracoumeral.
- (C) incisura espinoglenoidal, ao nível do ligamento transvers inferior da escápula.
- (D) canal bicipital, ao nível do sulco intertubercular.
- (E) espaço quadrilateral, junto ao nervo axilar.

42. Paciente, vítima de acidente automobilístico de alta energia, apresenta dor intensa no ombro e importante deslocamento lateral da escápula. Ao exame, observa-se fratura da clavícula associada à ausência de pulso distal no membro superior. Não há déficit neurológico identificado ao exame clínico.

De acordo com a classificação de Zelle et al., esse quadro é classificado como tipo

- (A) 4.
- (B) 2B.
- (C) 3.
- (D) 2A.
- (E) 1.

43. Em relação ao *Oxford Instability Shoulder Score* (OISS), também denominado *Oxford Shoulder Instability Score* (OSIS), independentemente da versão de pontuação utilizada, é correto afirmar que

- (A) é composto por 22 itens distribuídos em quatro domínios.
- (B) utiliza escala visual analógica para quantificação dos sintomas.
- (C) é composto por 12 itens, cada um com cinco opções de resposta em escala ordinal.
- (D) apresenta escore total padronizado de 0 a 100 pontos.
- (E) avalia exclusivamente dor e episódios de instabilidade do ombro.

44. Paciente, vítima de trauma de alta energia, apresenta dissociação escapulotorácica associada à avulsão pré-ganglionar completa do plexo braquial, evoluindo após mais de 18 meses com membro flácido, anestésico, doloroso e sem possibilidade de reconstrução funcional.
- Nessa situação, a conduta mais indicada é:
- (A) reconstrução tardia do plexo braquial.
 - (B) manutenção do membro com medidas paliativas exclusivamente analgésicas.
 - (C) artrodese escapulotorácica.
 - (D) artrodese glenoumeral.
 - (E) amputação acima do nível do cotovelo.
45. Em relação ao tratamento das lesões da articulação acromioclavicular, a ressecção distal da clavícula (procedimento de Mumford) está indicada isoladamente
- (A) em casos crônicos sintomáticos (artropatia degenerativa) dos tipos I e II com integridade dos ligamentos coracoclaviculares.
 - (B) nas lesões agudas dos tipos I e II.
 - (C) nas lesões agudas dos tipos III e IV.
 - (D) em casos crônicos sintomáticos (artropatia degenerativa) dos tipos III e IV com instabilidade coracoclavicular persistente.
 - (E) nas lesões agudas dos tipos IV e V.
46. Em relação ao tratamento das luxações acromioclaviculares crônicas, a técnica de Weaver-Dunn consiste na transferência
- (A) do ligamento coracoacromial para a clavícula.
 - (B) do ligamento glenoumeral superior para a clavícula.
 - (C) do ligamento coracoclavicular – conoide para a clavícula.
 - (D) do ligamento coracoclavicular – trapezoide para a clavícula.
 - (E) dos ligamentos coracoclaviculares – conoide e trapezoide para a clavícula.
47. Em relação aos fragmentos descritos por Codman nas fraturas do úmero proximal, a linha de fratura que separa o fragmento diafisário dos fragmentos proximais localiza-se imediatamente
- (A) distal à inserção do tendão do músculo peitoral maior.
 - (B) proximal à inserção do tendão do músculo peitoral maior.
 - (C) distal à inserção do tendão do músculo deltoide.
 - (D) proximal à inserção do tendão do músculo deltoide.
 - (E) entre as inserções dos tendões dos músculos deltoide e peitoral maior.
48. Em relação à estabilidade glenoumeral, é correto afirmar que
- (A) o infraespinal isoladamente é o principal estabilizador dinâmico.
 - (B) o lábio da glenoide atua como principal estabilizador dinâmico da articulação.
 - (C) a redução da força do manguito rotador aumenta a translação da cabeça umeral.
 - (D) o manguito rotador atua predominantemente como estabilizador estático da articulação.
 - (E) a compressão articular diminui a estabilidade em presença de forças de cisalhamento.
49. O músculo latíssimo do dorso executa, na articulação do ombro, todos os seguintes movimentos
- (A) extensão, adução e rotação lateral.
 - (B) extensão, adução e rotação medial.
 - (C) flexão, abdução e rotação medial.
 - (D) extensão, abdução e rotação lateral.
 - (E) extensão, abdução e rotação medial.
50. Em relação ao manguito rotador, o músculo responsável por iniciar o movimento de abdução do ombro é:
- (A) infraespinal.
 - (B) redondo menor.
 - (C) subescapular.
 - (D) supraespinal.
 - (E) deltoide.

RASCUNHO

