



431243

MODELO DE
PROVA
(VERSÃO)**A**

EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2026
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2027

028. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Criança de 15 meses de idade, nascida prematura (31 semanas de idade gestacional), com alta da UTI neonatal aos 2 meses de vida é atendida na unidade básica de saúde para atualização do Calendário Nacional de Vacinação do SUS (CNV-SUS). Ao analisar o cartão vacinal, observa-se que todas as últimas doses de vacinação foram administradas adequadamente, conforme o CNV-SUS de 2026. A criança não apresenta intercorrências clínicas no momento, tem desenvolvimento pôndero-estatural adequado para a idade corrigida e não possui histórico de reações adversas graves a componentes vacinais.

Com base nas diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde para o CNV-SUS, é correto afirmar que

- (A) a vacina meningocócica ACWY deve ser aplicada em substituição à meningocócica C para ampliar o espectro vacinal contra outros sorogrupos.
- (B) a vacina contra hepatite A deve ter seu esquema de dose única iniciado nesta oportunidade para proteção contra icterícia infecciosa.
- (C) a ausência de cicatriz vacinal da BCG após o período neonatal indica a necessidade de revacinação da criança nessa consulta.
- (D) a vacina para varicela em dose única deve ser administrada nessa visita, junto com a tríplice viral.
- (E) a vacina inativada contra poliomielite substitui a vacina oral nos esquemas de reforço, conforme as atualizações recentes do Ministério.

02. O atendimento a pessoas em situação de violência sexual no Sistema Único de Saúde exige uma atuação interdisciplinar que integre cuidados clínicos imediatos, suporte psicossocial e observância de marcos éticos e legais. Com base na Norma Técnica "Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes (2012)", do Ministério da Saúde, considerando as diretrizes para a profilaxia de agravos e a organização da rede de atenção, assinale a alternativa correta e em conformidade com as orientações técnicas vigentes.

- (A) O atendimento em saúde deve ser pautado pela presunção de veracidade da palavra da vítima, mas necessitando de boletim de ocorrência policial.
- (B) A interrupção da gravidez decorrente de estupro requer a apresentação de alvará judicial ou autorização expressa da autoridade policial para ser realizada legalmente.
- (C) A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser administrada em vítimas não imunizadas no período de até catorze dias após a ocorrência da agressão sexual.
- (D) O tempo máximo para início da quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV é de cinco dias, período após o qual os riscos superam os benefícios terapêuticos.
- (E) O método de Yuzpe é considerado a primeira escolha na anticoncepção de emergência por apresentar menor incidência de efeitos colaterais, como náuseas e vômitos persistentes.

03. A busca pela excelência no cuidado em saúde exige a compreensão de sistemas complexos, a aplicação de metodologias de melhoria contínua e o monitoramento rigoroso de indicadores de desempenho. Considerando a qualidade em saúde e as diretrizes e modelos de gestão, é correto afirmar, acerca da avaliação e do aprimoramento da qualidade nas instituições de saúde, que

- (A) a implementação de inovações deve ocorrer de forma ampla e simultânea em todos os departamentos, para reduzir a resistência humana e garantir a uniformidade imediata dos novos processos de trabalho.
- (B) a metodologia Lean concentra-se primordialmente na redução da variabilidade estatística dos processos, enquanto a abordagem Six Sigma busca eliminar desperdícios e atividades que não agregam valor direto ao paciente.
- (C) o ajuste por gravidade do caso (*case-mix adjustment*) é um método que simplifica a análise de mortalidade ao tratar todos os pacientes como clinicamente homogêneos, independentemente da complexidade de suas patologias.
- (D) o ciclo *Plan-Do-Study-Act* (PDSA) permite que melhorias sejam testadas em pequenos incrementos e ciclos rápidos, assegurando que as intervenções sejam refinadas antes de uma implementação sistêmica em larga escala.
- (E) a análise de modos de falha e efeitos (FMEA) funciona como uma técnica retrospectiva obrigatória, que é aplicada logo após a ocorrência de eventos adversos graves, para mitigar riscos jurídicos imediatos.

04. A quantificação do impacto de exposições e intervenções na saúde de indivíduos e populações requer a aplicação precisa de medidas de associação e impacto. Em relação à análise de riscos e benefícios em estudos epidemiológicos, segundo as diretrizes de epidemiologia clínica e saúde pública, é correto afirmar que

- (A) a utilização do *Odds Ratio* (razão de risco) para estimar o risco de eventos futuros é recomendada em cenários de alta prevalência da doença, superando a precisão diagnóstica do risco relativo habitual.
- (B) o Risco Atribuível entre os expostos representa a parcela da incidência da doença que seria teoricamente eliminada caso o fator de risco sob investigação fosse completamente removido daquela população.
- (C) o *Number Needed to Harm* (número necessário para dano) é calculado por meio da razão entre o Risco Relativo e a Redução Absoluta do Risco, fornecendo uma métrica de segurança para fármacos experimentais.
- (D) o valor do *Number Needed to Treat* (número necessário para tratar) permanece estável diante de variações no risco basal dos pacientes, contanto que a redução proporcional do risco seja mantida em níveis satisfatórios.
- (E) o Risco Relativo fornece informações precisas sobre a quantidade de casos evitáveis em uma comunidade, sendo a medida preferencial para a definição de prioridades em políticas de saúde coletiva.

05. Homem de 48 anos, desempregado, tabagista, reside em uma ocupação urbana com alta densidade populacional e saneamento básico precário. Relata tosse produtiva persistente há quatro semanas, acompanhada de sudorese noturna e perda ponderal de cinco quilos. Comparece à unidade básica de saúde para avaliação clínica inicial por iniciativa própria. O enfermeiro da equipe de Estratégia Saúde da Família identifica-o como um caso suspeito e inicia os protocolos de investigação epidemiológica e manejo clínico na Atenção Primária.

Analise as alternativas a seguir, sobre o manejo da tuberculose (TB) na rede de atenção à saúde, e assinale a alternativa correta.

- (A) O teste rápido molecular é indicado como método prioritário para o diagnóstico inicial da tuberculose pulmonar nos serviços de atenção básica de saúde.
- (B) A realização do teste tuberculínico está indicada para o diagnóstico de doença ativa em pacientes que apresentam baciloscopia de escarro positiva no início.
- (C) A baciloscopia de escarro deve ser solicitada quinzenalmente durante o esquema terapêutico, para monitorar a resposta bacteriológica e confirmar a cura do paciente.
- (D) O encerramento do caso por abandono de tratamento ocorre quando o indivíduo deixa de comparecer à unidade de saúde por quinze dias consecutivos.
- (E) A vacina BCG deve ser aplicada em adultos que vivem no mesmo domicílio de um caso diagnosticado de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva.

06. Enfermeira de 32 anos sofre um acidente percutâneo com agulha de lúmen calibroso durante a coleta de sangue de um paciente com diagnóstico confirmado de hepatite B crônica (HBsAg: positivo e HBeAg: positivo). A profissional relata ter completado o esquema vacinal com três doses há cinco anos, porém nunca realizou o teste de anti-HBs para confirmar a soroconversão. No momento do atendimento inicial na unidade de referência, a profissional encontra-se assintomática e preocupada com o risco de transmissão e as medidas profiláticas necessárias.

Com base no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções (2023)”, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) a comunicação do acidente de trabalho deve ser realizada apenas se houver confirmação laboratorial de soroconversão do profissional de saúde durante o período de janela imunológica.
- (B) a notificação compulsória do evento deve ser descartada se o trabalhador exposto apresentar um teste rápido reagente para anticorpos anti-HBs no momento da avaliação clínica inicial.
- (C) a administração da imunoglobulina hiperimune contra o vírus da hepatite B deve ocorrer preferencialmente nas primeiras vinte e quatro horas após o acidente biológico suspeito.
- (D) a prescrição de antivirais de ação direta como o Tenofovir está indicada como medida de profilaxia pós-exposição padrão para todos os acidentes com material perfurocortante.
- (E) o tratamento imediato com Entecavir deve ser iniciado para o profissional de saúde, visando prevenir a replicação viral nas células hepáticas logo após o contato biológico suspeito.

07. Sobre os procedimentos, responsabilidades e fluxos para o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) no Brasil, assinale a alternativa correta, condizente com base nas normas técnicas e éticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina para o manejo da DO.

- (A) A codificação dos diagnósticos segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) é atribuição direta do médico que assina o documento oficial.
- (B) Em situações de morte materna por gravidez ectópica rota, o diagnóstico da condição gestacional deve constar obrigatoriamente entre as causas do óbito.
- (C) A cobrança de honorários médicos pela emissão da DO é permitida quando o profissional realiza o exame de constatação do cadáver.
- (D) Em casos de morte por causas externas, o médico assistente do hospital emite a DO se o paciente permaneceu internado por mais de 14 dias.
- (E) Médicos legistas de Institutos Médico Legais realizam necropsias em casos em que há diagnóstico confirmado de doenças crônicas em locais onde não há assistência médica.

08. Mulher de 24 anos, primigesta, com 14 semanas de idade gestacional, comparece à segunda consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. No primeiro trimestre (8ª semana), seus exames de triagem apresentaram teste rápido para sífilis (TRS) não reagente. Na consulta atual, a paciente relata o surgimento de uma lesão ulcerada única, indolor, de bordas endurecidas na região vulvar há 10 dias, que desapareceu espontaneamente antes da consulta. Ela não apresenta outras queixas. Um novo TRS é realizado, resultando reagente. O marido da gestante é convocado, mas recusa a testagem imediata. Não há alergias a medicamentos. O médico solicita o teste não treponêmico (VDRL) para seguimento.

Com base nas diretrizes de vigilância em saúde da sífilis em gestantes, assinale a alternativa correta.

- (A) A ocorrência de um segundo caso de sífilis em uma gestação subsequente deve ser notificada no SINAN como recidiva e não como um novo caso.
- (B) O caso é classificado como sífilis em gestante devido ao Teste Rápido reagente, independentemente da presença ou ausência de sintomas no momento da consulta.
- (C) A gestante deve ser considerada adequadamente tratada se receber a última dose de penicilina pelo menos quinze dias antes da data provável do parto.
- (D) A realização do teste não treponêmico na hora do parto é opcional se a paciente tiver exames de monitoramento reagentes e estáveis durante o terceiro trimestre.
- (E) A ausência de queda dos títulos de VDRL após o esquema de dose única em sífilis primária exige o retratamento imediato, com três doses semanais.

09. Um grupo de pesquisadores iniciou um estudo de coorte prospectivo para investigar se o uso regular de um novo suplemento fitoterápico, denominado "Composto Delta", está associado à redução do risco de insuficiência coronariana em adultos entre 45 e 65 anos. Foram recrutados 10.000 participantes inicialmente livres de doença cardiovascular, sendo 5.000 usuários habituais do suplemento (por escolha própria) e 5.000 não usuários (grupo controle). Após 8 anos de acompanhamento sistemático, os pesquisadores observaram um Risco Relativo (RR) de 0,72 para eventos coronarianos (IC 95%: 0,55 a 0,94). Uma análise detalhada das características basais revelou que o grupo de usuários do Composto Delta apresentava, em média, maior nível de escolaridade, maior frequência de atividade física vigorosa e menor prevalência de tabagismo em relação ao grupo comparativo (controle).

Com base nos princípios de epidemiologia clínica e medicina baseada em evidências, é correto afirmar que

- (A) o viés de memória representa a maior ameaça à validade da pesquisa, visto que os participantes foram recrutados com base na presença prévia do desfecho clínico.
- (B) o delineamento prospectivo da coorte e o tamanho da amostra asseguram que a associação estatística encontrada representa uma relação de causa e efeito direta entre a exposição e o desfecho.
- (C) o viés de aferição nesse estudo seria eliminado se o desfecho clínico fosse restrito a casos de morte súbita, anulando a necessidade de critérios diagnósticos padronizados.
- (D) a regressão à média é a explicação mais provável para o efeito observado se os pesquisadores tivessem incluído indivíduos com baixo risco cardíaco inicial.
- (E) a validade externa das conclusões para a população geral torna-se limitada se o grupo de usuários do fitoterápico for composto por pessoas mais atentas a cuidados preventivos.

10. A organização da atenção integral à saúde da criança pressupõe a articulação de serviços em Redes de Atenção à Saúde (RAS), fundamentadas em diretrizes de regionalização, hierarquização e coordenação do cuidado. Acerca da estruturação e do funcionamento dos pontos de atenção, segundo as orientações para implementação da “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)”, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) O clampeamento imediato do cordão umbilical é uma prática recomendada pela Rede Cegonha para todos os recém-nascidos, visando acelerar os procedimentos de recepção e avaliação clínica nas salas de parto.
 - (B) A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência estabelece que a identificação de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor deve ser postergada até a fase escolar, para evitar diagnósticos precipitados e iatrogenias clínicas.
 - (C) O Programa Saúde na Escola define que as ações de avaliação clínica e diagnóstico devem ser realizadas dentro das salas de aula, reduzindo o encaminhamento para a rede de saúde local.
 - (D) A Atenção Básica exerce a coordenação do cuidado e a ordenação da rede, priorizando a continuidade da assistência por meio do acompanhamento longitudinal das crianças e suas famílias no território adstrito.
 - (E) O processo de medicalização da aprendizagem é incentivado pela Rede de Atenção Psicossocial como a principal estratégia para o manejo de distúrbios comportamentais em crianças no ambiente escolar da região.
11. Paciente de 32 anos, operária em uma unidade de reciclagem de baterias automotivas (exposição ocupacional a chumbo), está na 22ª semana de gestação. Ela comparece a uma Unidade de Pronto Atendimento apresentando febre referida, cefaleia intensa e dispneia, com saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente. No prontuário, consta que ela reside em um município onde a homogeneidade de coberturas vacinais para crianças menores de 1 ano é de 60%. Ela relata ter apresentado exantema súbito após a ingestão de um analgésico por conta própria no domicílio. Devido ao agravamento do quadro respiratório, ela é internada, mas evolui para óbito materno 48 horas após a admissão, sem que a causa básica tenha sido inicialmente definida pelo hospital.
- De acordo com as diretrizes de Vigilância do Ministério da Saúde, é correto afirmar que
- (A) a suspeita de evento adverso relacionado ao uso de medicamento deve ser registrada no sistema VigilMed, para monitoramento pela agência reguladora.
 - (B) a estratégia de farmacovigilância ativa constitui o método mais difundido e custo-efetivo para o monitoramento da segurança de medicamentos no serviço público.
 - (C) a investigação epidemiológica do óbito materno deve ser concluída pela equipe municipal de vigilância no prazo de 30 dias.
 - (D) a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho é atribuição compulsória do médico assistente hospitalar, para o encerramento da investigação epidemiológica no SINAN.
 - (E) o conceito de morte materna presumida aplica-se aos casos em que a declaração de óbito registra claramente a patologia obstétrica como causa básica inicial.

12. A equipe de planejamento de um hospital regional está revisando seu modelo assistencial e de gestão para se adequar às normas da Política Nacional de Humanização (PNH). Durante o debate, surgem propostas sobre como lidar com o acolhimento, o processo de tomada de decisão, a organização do espaço físico e a abordagem clínica das doenças. A gestão busca consolidar uma cultura institucional voltada para o protagonismo dos sujeitos e a melhoria da qualidade do cuidado.

Sobre as definições e operacionalizações propostas pela PNH, assinale a alternativa correta.

- (A) O protagonismo dos sujeitos no sistema de saúde fundamenta-se na delegação de competências técnicas específicas para que a família decida sobre a realização dos procedimentos cirúrgicos do paciente.
- (B) A clínica ampliada determina que o profissional de saúde priorize a investigação dos sinais fisiopatológicos, para garantir a objetividade científica durante o preenchimento do prontuário eletrônico do indivíduo.
- (C) O princípio da transversalidade orienta que as propostas de humanização devem conectar as diferentes especialidades e as diversas áreas de saber presentes no cotidiano da unidade.
- (D) A visita aberta no ambiente assistencial é uma flexibilização do tempo de internação concedida pela direção para reduzir a sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem do hospital regional.
- (E) A classificação de risco no acolhimento funciona como um instrumento administrativo que organiza as filas de espera, priorizando a ordem cronológica de chegada das pessoas na unidade hospitalar.

13. Criança de 11 anos, vive com HIV por transmissão vertical e reside com sua avó materna, que é sua cuidadora principal e possui baixa escolaridade. Ele encontra-se clinicamente estável, com carga viral indetectável há dois anos e contagem de linfócitos T CD4 de 23%. Ele frequenta a escola regularmente, mas a avó relata receio de que o neto sofra preconceito caso a escola descubra o diagnóstico. O paciente está iniciando a puberdade e começou a questionar a finalidade dos medicamentos que utiliza diariamente. Durante a consulta na Unidade de Referência, a equipe multiprofissional avalia o plano de imunização, as estratégias de adesão e o processo de revelação diagnóstica.

Nessa circunstância, é correto afirmar que a

- (A) comunicação da soropositividade à direção da escola garante a segurança biológica dos demais alunos e funcionários durante as atividades recreativas.
- (B) revelação da condição de saúde para a criança deve ocorrer em sessão breve para evitar ansiedade prolongada e facilitar a aceitação precoce.
- (C) participação da rede de apoio social configura-se como elemento estruturante para a manutenção dos níveis de adesão ao tratamento antirretroviral prolongado.
- (D) transferência para o serviço de infectologia de adultos deve ser efetuada quando o adolescente atinge a maioridade civil prevista.
- (E) recomendação de vacinação contra febre amarela deve ser aplicada para pacientes pediátricos baseando-se no critério de ausência de sintomas clínicos graves.

14. Senhor de 74 anos, portador de insuficiência cardíaca estável e diabetes mellitus tipo 2, reside em área com alta infestação de *Aedes aegypti*. Apresenta há três dias febre alta, cefaleia e poliartralgia intensa e simétrica, com edema em tornozelos e punhos. No quarto dia, evolui com tontura ortostática, diminuição do débito urinário e sonolência intermitente. Ao exame físico: pressão arterial: 90 x 55 mmHg; frequência cardíaca: 108 bpm; tempo de enchimento capilar de 4 segundos. A equipe da Unidade de Pronto Atendimento realiza a classificação de risco e define o plano terapêutico imediato.

Conforme os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração de prednisona durante a primeira semana de sintomas reduz a progressão da doença para a fase crônica, incapacitante em pacientes idosos.
- (B) A aplicação de compressas quentes sobre as articulações acometidas na fase aguda auxilia na redução do processo inflamatório e na recuperação da amplitude de movimento articular.
- (C) O tratamento etiológico com antivirais específicos deve ser iniciado nas primeiras quarenta e oito horas de sintomas, para garantir a eliminação completa da carga viral do organismo.
- (D) O plano terapêutico imediato deve priorizar o suporte hemodinâmico e o monitoramento contínuo das funções vitais, uma vez que manifestações extra-articulares podem evoluir rapidamente para disfunções orgânicas severas.
- (E) A persistência de sintomas articulares além do vigésimo primeiro dia caracteriza a fase subaguda, na qual pode haver necessidade de introdução de corticosteroides em doses baixas.

15. Em relação ao guia de manejo e tratamento do vírus influenza do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) o zanamivir é um novo antiviral inibidor da neuraminidase que deve ser considerado para uso preferencial em pacientes adultos de risco de evolução desfavorável, sobretudo naqueles que necessitam de admissão em UTI/ventilação mecânica.
- (B) gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com oseltamivir, na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal, independentemente de sinais de agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna.
- (C) a quimioprofilaxia antiviral é recomendada em pessoas com graves deficiências imunológicas ou em uso de drogas imunossupressoras, após contato com pessoas com infecção nos últimos 7 dias.
- (D) pacientes com sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$) com necessidade de suplementação de O_2 para manter $\text{SatO}_2 > 90\%$ devem ser internados em enfermaria.
- (E) em pacientes com condições e fatores de risco para complicações e com síndrome respiratória aguda grave, o antiviral ainda apresenta benefícios, mesmo se iniciado até sete dias do início dos sintomas.

16. Homem de 66 anos comparece à unidade básica de saúde para consulta de rotina. Relata histórico de transfusão sanguínea em 1988 devido a um acidente automobilístico grave. Nega sintomas atuais, mas o teste rápido para hepatite C realizado na unidade apresenta resultado reagente. Os exames séricos atuais são: AST (TGO): 55 U/L; ALT (TGP): 62 U/L; contagem de plaquetas: $145.000/\text{mm}^3$. A equipe de saúde coletiva planeja as próximas etapas de diagnóstico, estadiamento e tratamento com base no "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (2019)" do Ministério da Saúde.

Nessa circunstância, é correto afirmar que

- (A) o tratamento com antivirais de ação direta é recomendado para pacientes infectados, mesmo na ausência de sintomas clínicos ou fibrose avançada.
- (B) pacientes que apresentam resposta virológica sustentável estão protegidos contra novas infecções pelo vírus da hepatite C ao longo da sua jornada.
- (C) o uso de alfa-interferon peguilado associado à ribavirina representa a primeira linha de escolha para pessoas idosas com diagnóstico de genótipo 1.
- (D) o uso de sofosbuvir é indicado para indivíduos que apresentam insuficiência renal grave com taxa de filtração glomerular abaixo de $30 \text{ mL/min/1,73m}^2$.
- (E) a monitoração da eficácia do tratamento baseia-se na normalização dos níveis de transaminases hepáticas durante o segundo mês de tratamento.

17. Um médico pesquisador clínico conduz um ensaio experimental para avaliar a eficácia de um novo fármaco na redução da pressão arterial sistólica (PAS). O estudo seleciona uma amostra de 60 pacientes com hipertensão essencial, divididos aleatoriamente em dois grupos independentes, de 30 indivíduos: um recebeu o fármaco e outro um placebo. Após 6 meses, os resultados demonstram que a redução média da PAS no grupo intervenção foi de 15 mmHg (desvio padrão: 10), enquanto no grupo placebo a redução média foi de 5 mmHg (desvio padrão: 12). A aplicação do teste t de *Student* para amostras independentes (bi-caudal) resultou em um valor de $p: 0,001$. Adicionalmente, o pesquisador calculou o coeficiente de correlação de Pearson entre a idade dos participantes e a magnitude da redução pressórica, obtendo um valor de $r = 0,60$. Para uma análise secundária, os pacientes foram classificados de forma dicotômica entre os que atingiram a meta pressórica e os que não atingiram, utilizando-se o teste qui-quadrado para avaliar a associação com o tipo de tratamento ($p < 0,05$). Observa-se que a distribuição dos valores iniciais de PAS na amostra era levemente assimétrica à direita.

Com base no cenário descrito e nos princípios bioestatísticos, é correto afirmar que

- (A) a expansão do tamanho da amostra para 1.000 participantes provocaria uma elevação proporcional no erro padrão das médias.
- (B) o coeficiente de correlação de Pearson de 0,60 estabelece que a idade é o determinante causal da redução pressórica.
- (C) o teste de *Mann-Whitney* representa o método de maior poder estatístico para variáveis contínuas com distribuição perfeitamente normal.
- (D) o teste t pareado é a ferramenta estatística recomendada para contrastar as médias finais entre dois grupos distintos.
- (E) a análise por Qui-quadrado mostra-se pertinente para avaliar a associação entre o tratamento e o alcance da meta.

18. Homem de 38 anos atua como técnico de manutenção em uma metalúrgica de grande porte há dez anos. Durante a manutenção corretiva de um duto industrial, sofre uma lesão perfurocortante no antebraço direito por uma ferramenta que continha resíduos orgânicos e químicos acumulados. Ele lava o ferimento com água e sabão, retornando às atividades. Quinze dias após o evento, o trabalhador procura atendimento médico apresentando exantema pruriginoso no antebraço e nas mãos, além de zumbido bilateral constante, irritabilidade severa e insônia persistente. Na anamnese ocupacional, revela que a empresa utiliza um sistema de gestão baseado em metas individuais rígidas, com frequente necessidade de horas extras; diz que utiliza protetores auriculares do tipo *plug* e manipula óleos lubrificantes sem o uso sistemático de luvas impermeáveis. A empresa emite a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) referente ao acidente perfurocortante típico inicial.

Em relação à saúde do trabalhador e sob a ótica da epidemiologia e vigilância em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O acidente de trabalho com exposição a material biológico deve ser notificado como agravo de notificação compulsória imediata, em 24 horas, à autoridade sanitária.
- (B) O prazo para conclusão de casos de acidente de trabalho típico no SINAN é fixado em 180 dias após a ocorrência da lesão perfurante inicial.
- (C) A irritabilidade e a insônia podem ser classificadas como transtorno mental relacionado ao trabalho se houver nexos com a gestão por metas.
- (D) A progressão da perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ocorre de forma acelerada após os primeiros quinze anos de exposição continuada no ambiente industrial insalubre.
- (E) O limiar audiométrico de 8 kHz deve ser o mais prejudicado no início da PAIR para que o diagnóstico clínico seja confirmado pelo especialista.

19. Homem de 32 anos é atendido na unidade de emergência apresentando quadro de febre elevada, mialgia generalizada, cefaleia holocraniana intensa e episódios repetidos de vômitos iniciados há 36 horas. O histórico médico revela que ele foi submetido a uma esplenectomia anatômica pós-traumática há cinco anos e não possui registros de imunização recente. Ao exame físico, o paciente encontra-se torporoso, demonstrando sinais de irritação meníngea com rigidez de nuca proeminente, tempo de enchimento capilar de 3 segundos e discretas máculas eritematosas distribuídas no tronco, sem sufusões hemorrágicas ou petéquias visíveis. A punção lombar é realizada acompanhada da coleta de amostras de sangue periférico. O quimiocitológico do líquido cefalorraquidiano (LCR) evidencia aspecto turvo; concentração de glicose marcadamente reduzida; níveis de proteínas totais elevados; e contagem celular de 1.200 leucócitos/mm³, com predomínio de polimorfonucleares. A bacterioscopia direta por coloração de Gram revela a presença de diplococos Gram-negativos.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, nessa circunstância, é correto afirmar que

- (A) a indicação de quimioprofilaxia para os profissionais de saúde que prestaram o atendimento ocorre quando há realização de procedimentos na via aérea sem barreira protetora.
- (B) a administração simultânea da quimioprofilaxia com rifampicina está indicada para contatos domiciliares do caso suspeito na dose de sessenta miligramas por quilo de peso.
- (C) a eficácia vacinal protetora da imunização conjugada atinge o patamar máximo de proteção imediatamente após vinte e quatro horas da primeira aplicação.
- (D) o tratamento específico para a manifestação neurológica inicial deve associar corticosteroides sistêmicos e aciclovir por via endovenosa durante vinte e um dias.
- (E) os contatos domiciliares do paciente que apresentaram esquema vacinal atualizado para o sorogrupo correspondente estão dispensados da realização imediata da quimioprofilaxia.

20. Com base nas “Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde”, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) a incidência de jovens que não trabalham nem estudam demonstra relação direta com o aumento progressivo da renda familiar per capita no país.
- (B) os registros do sistema de vigilância apontam que os homens constituem a maioria das vítimas de violência doméstica e abuso sexual no território brasileiro.
- (C) uma parcela de adolescentes que consomem álcool apresenta comportamento de risco regular, com relatos de episódios de *binge* registrados duas vezes por mês.
- (D) os dados oficiais indicam que a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 a 24 anos apresentou elevação recente nas regiões norte e nordeste do país.
- (E) a mortalidade materna proporcional entre adolescentes concentra seus maiores índices na idade de 14 anos, conforme os dados da Secretaria de Vigilância.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente, 46 anos, diabético com controle irregular da glicemia, apresenta obstrução nasal e rinorreia amarelada unilateral, tosse produtiva e hiposmia, há 1 ano, com melhora parcial após tratamento com antibiótico. Tem exame físico otorrinolaringológico sem alterações, nasofibroscopia com secreção mucopurulenta em meato médio direito e tomografia de seios paranasais com espessamento mucoso importante e hiperostose de seio maxilar direito, além de pequena área de erosão óssea em assoalho de seio maxilar direito. Nega tabagismo, etilismo, asma, quadro de atopia e manipulação dentária.

Avaliando-se o quadro clínico apresentado, qual a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Fístula oroantral em seio maxilar.
- (B) Rinossinusite fúngica alérgica.
- (C) Rinossinusite crônica sem polipose nasal.
- (D) Rinossinusite fúngica invasiva.
- (E) Rinossinusite fúngica não invasiva.

22. Na anatomia cirúrgica, a espinha de Henle é um parâmetro importante para a realização de qual cirurgia?

- (A) Timpanoplastia endoscópica.
- (B) Mastoidectomia simples.
- (C) Tireoplastia do tipo I.
- (D) Estapedotomia.
- (E) Ligadura da artéria esfenopalatina.

23. Um paciente procura ambulatório de Otorrinolaringologia referindo otalgia ao tentar limpar as orelhas com hastes flexíveis com algodão. À otoscopia, apresenta abaulamentos endurecidos em meatos acústicos externos (três à direita e quatro à esquerda), sem lesão de pele sobrejacente a eles.

Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, assinala a alternativa correta.

- (A) É doença prevalente em nadadores de águas frias.
- (B) Tem potencial elevado de malignização.
- (C) É mais comum no sexo feminino.
- (D) O tratamento baseia-se em uso de corticoide tópicos.
- (E) As otites externas de repetição não são indicação de canaloplastia.

- 24.** Durante a realização de estapedotomia, ocorre saída de perilinfa em grande quantidade pelo orifício da ostetotomia da platina. Essa complicação tem relação com
- (A) o aqueduto vestibular alargado.
 - (B) a glicemia alterada.
 - (C) a malformação de cadeia ossicular.
 - (D) a pressão arterial descontrolada no intraoperatório.
 - (E) a cirurgia revisional.
- 25.** Em paciente com língua fissurada, qual dado da história clínica deve ser investigado?
- (A) Hipertireoidismo.
 - (B) Uso de enxaguantes bucais com álcool.
 - (C) Tabagismo.
 - (D) Diabetes mellitus.
 - (E) Paralisia facial periférica recorrente.
- 26.** Nas otites médias, a conduta *Watchful Waiting* pode ser adotada em qual situação clínica?
- (A) Crianças de 2 a 5 anos com otite média com efusão (OME) e comprometimento do desenvolvimento de linguagem.
 - (B) Criança de 4 anos com história de OMAs e amigdalites de repetição.
 - (C) Crianças de 6 meses a 2 anos com otite média aguda (OMA) unilateral e sem otorreia.
 - (D) Criança de 1 ano com síndrome de Down e OMA bilateral, sem otorreia.
 - (E) Crianças com menos de 6 meses e com OMA.
- 27.** Paciente apresenta Vertigem Posicional Paroxística Benigna de canal semicircular anterior.
- Nesse contexto, qual manobra está indicada para o tratamento?
- (A) Lempert.
 - (B) Brandt-Daroff.
 - (C) Yacovino.
 - (D) Zuma.
 - (E) Epley modificado.
- 28.** Paciente, 45 anos, sexo feminino, tem tontura diária há 2 anos, pior ao caminhar em ambientes movimentados, com início após ter sido assaltado e ter ficado como refém durante algumas horas. O sintoma é persistente, durando, em média, 10 horas por dia.
- Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, qual o tratamento medicamentoso indicado?
- (A) Meclizina.
 - (B) Amitriptilina.
 - (C) Flunarizina.
 - (D) Sertralina.
 - (E) Betaistina.
- 29.** Criança tem diagnóstico de vertigem paroxística benigna da infância, com relação a esse diagnóstico é correto afirmar que
- (A) está relacionada a doenças do metabolismo dos carboidratos.
 - (B) tem relação com história familiar de migrânea vestibular.
 - (C) as crises são caracterizadas por vertigem, desencadeadas com posicionamento da cabeça, com remissão espontânea em segundos.
 - (D) as crises de tontura iniciam-se após 9 anos de idade.
 - (E) o quadro clínico é mais comum no sexo masculino.
- 30.** Durante a investigação de paciente com perda sensorio-neural unilateral, foi encontrada lesão de ápice petroso com sinal hipointenso em T1, hiperintenso em T2, sem realce ao gadolínio na ressonância magnética.
- Nesse caso, qual a principal hipótese diagnóstica?
- (A) Carcinoma espinocelular.
 - (B) Schwannoma.
 - (C) Mucocoele.
 - (D) Granuloma de colesterol.
 - (E) Colesteatoma congênito.
- 31.** Assinale a alternativa correta sobre os gliomas nasossinusais.
- (A) Apresentam conexão com o compartimento intracraniano na maioria dos casos.
 - (B) São mais frequentes em japoneses e chineses.
 - (C) Os intranasais são os mais comuns.
 - (D) Tem alta chance de malignização.
 - (E) Apresentam sinal de Furstenberg negativo.

- 32.** Considerando-se a rinite eosinofílica não alérgica, assinale a alternativa correta.
- (A) Pode ser precursora da doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios.
 - (B) Os pacientes apresentam teste cutâneo negativo e excesso de neutrófilos no citológico nasal.
 - (C) É uma rinite de início tardio, após os 60 anos de idade.
 - (D) Não há desenvolvimento de pólipos nasais associado à doença.
 - (E) O tratamento com anti-histamínicos e anti-leucotrienos tem pouca efetividade no controle da doença.
- 33.** A área K é um importante marco na anatomia cirúrgica para realização das septoplastias.
Qual estrutura anatômica faz parte dessa região?
- (A) Crista etmoidal.
 - (B) Crista nasal superior.
 - (C) Cartilagem lateral superior.
 - (D) Processo nasal do osso maxilar.
 - (E) Vômer.
- 34.** Qual a droga de escolha para tratamento do rinoscleroma?
- (A) Isoniazida.
 - (B) Ciprofloxacina.
 - (C) Amicacina.
 - (D) Amoxicilina.
 - (E) Prednisona.
- 35.** Assinale a alternativa que apresenta barreiras anatômicas que retardam a progressão dos tumores da laringe?
- (A) Músculos cricoaritenóideo posterior, tireoaritenóideo e cricótireóideo.
 - (B) Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e prega vestibular.
 - (C) Ligamento vocal, cone elástico e membrana quadrangular.
 - (D) Espaço de Reinke, espaço paraglótico e espaço pré-epiglótico.
 - (E) Regiões supraglótica, subglótica e retrocricóidea.
- 36.** Em paciente com carcinoma espinocelular glótico, podemos considerar como um tumor inicial as lesões que
- (A) comprometem apenas uma prega vocal, com fixação ipsilateral.
 - (B) apresentam um linfonodo comprometido cervical.
 - (C) comprometem o espaço paraglótico e são unilaterais.
 - (D) comprometem ambas as pregas vocais, com mobilidade de pregas vocais normal.
 - (E) atingem a comissura anterior, com discreta infiltração da cartilagem tireóidea, com mobilidade preservada das pregas vocais.
- 37.** A ação deste músculo laríngeo faz com que as pregas vocais fiquem alongadas e estiradas, com o estiramento, o contorno da prega vocal, quando visto no plano frontal, é adelgado.
Essa descrição se refere ao músculo
- (A) cricótireóideo.
 - (B) cricoaritenóideo posterior.
 - (C) tireo-hióideo.
 - (D) interaritenóideo.
 - (E) cricoaritenóideo lateral.
- 38.** Foi isolado o subtipo 16 na imunotipagem em paciente com papilomatose laríngea.
Qual medida deve ser realizada frente a esse diagnóstico?
- (A) Orientar o paciente de que a recidiva da lesão é incomum e que ele não precisa de acompanhamento.
 - (B) Indicar uso de corticoide inalatório por 3 meses.
 - (C) Indicar uso de antiviral por 1 mês.
 - (D) Contraindicar vacinação para papilomavírus para evitar a recidiva da doença.
 - (E) Orientar o paciente de que a doença tem alta taxa de malignização.
- 39.** Qual o principal exame para comprovação do diagnóstico da rinite alérgica local?
- (A) IgE sérico específico.
 - (B) Teste de provocação nasal.
 - (C) Exame anatomopatológico.
 - (D) IgE sérico total.
 - (E) Citológico nasal.

40. Paciente, do sexo feminino, fisioculturista, fez uso de medicação anabolizante durante muitos anos e está insatisfeita com a qualidade e o timbre de sua voz, que ficou mais grave. Parou o uso da medicação e realizou fonoterapia, por 1 ano, com pouca melhora. Gostaria de ter uma voz mais aguda.
- Qual o tipo de tireoplastia poderia ser indicado nesse caso?
- (A) V
 - (B) I
 - (C) IV
 - (D) II
 - (E) III
41. É correto afirmar que a audiometria de altas frequências deve ser solicitada, obrigatoriamente, para o paciente
- (A) feminino de 45 anos com plenitude auricular, vertigem e zumbido em crises, com duração menor que 12 horas, a cada 3 meses.
 - (B) masculino de 30 anos com otorreia recorrente em orelha direita há 20 anos.
 - (C) feminino de 35 anos com hipoacusia progressiva, iniciada durante a menacme e com história familiar de perda auditiva.
 - (D) masculino de 51 anos sem hipoacusia, em tratamento oncológico com cisplatina.
 - (E) masculino de 70 anos com hipoacusia progressiva unilateral à direita.
42. Paciente, 9 anos, sexo feminino, apresenta otalgia esquerda há 7 dias. Há 1 dia, iniciou quadro de desequilíbrio e náuseas, sem outras queixas ou alterações no exame neurológico. À otoscopia, foi observada membrana timpânica esquerda abaulada e hiperemiada, sem outras alterações no exame físico geral e otorrinolaringológico.
- Qual a conduta mais adequada?
- (A) Introduzir antibiótico e corticoide por via endovenosa e indicar miringotomia com colocação de tubo de ventilação de urgência.
 - (B) Solicitar exame otoneurológico, introduzir antibiótico e corticoide por via endovenosa e indicar mastoidectomia simples de urgência.
 - (C) Solicitar audiometria e imitanciometria, introduzir corticoide por via endovenosa e sedativo labiríntico por via oral.
 - (D) Solicitar potencial evocado auditivo de tronco encefálico e introduzir antibiótico e corticoide por via oral.
 - (E) Solicitar ressonância magnética de ossos temporais e introduzir antibiótico por via oral.
43. Qual artéria está mais frequentemente relacionada à fisiopatologia da paroxismia vestibular?
- (A) Basilar.
 - (B) Cerebelar posteroinferior.
 - (C) Meningea média.
 - (D) Vertebral.
 - (E) Cerebelar anteroinferior.
44. Sobre o líquen plano da cavidade oral, assinale a alternativa correta.
- (A) É pouco comum causar lesão na mucosa jugal.
 - (B) A forma atrófica tem maior chance de malignização.
 - (C) A forma atrófica é mais comum e mais sintomática.
 - (D) Seu pico de incidência ocorre na faixa etária entre 50 e 60 anos.
 - (E) A forma reticular é mais rara e menos sintomática.
45. O implante auditivo de tronco encefálico é indicado em paciente com
- (A) discriminação de sentenças menor que 50% com uso de AASI.
 - (B) perda sensorineural bilateral moderada pós-sarampo.
 - (C) diabetes e insucesso na reabilitação auditiva pós-implante coclear.
 - (D) perda sensorineural severa após exérese de neurofibromatose do tipo II.
 - (E) perda sensorineural severa pós-acidente vascular de tronco encefálico.
46. Quais são fatores relacionados ao aumento da resistência nasal?
- (A) Aumento da idade e exercício físico.
 - (B) Umidade baixa e aumento da PCO_2 .
 - (C) Hiperventilação e decúbito dorsal horizontal.
 - (D) Hipertensão arterial e hipotireoidismo.
 - (E) Hipertireoidismo e uso de mentol.

47. Paciente, 14 meses, sexo masculino, nascido de parto normal sem intercorrências, apresenta estridor bifásico e episódios de “cansaço para mamar”, há 6 meses, que estão piorando, segundo informações de sua mãe. Não apresenta desconforto respiratório ao repouso. Ao exame físico geral, presença de hemangioma cutâneo plano em região frontal e maxilar à esquerda, assintomático.

Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, qual o tratamento medicamentoso indicado?

- (A) Enalapril.
- (B) Anlodipino.
- (C) Losartana.
- (D) Nifedipina.
- (E) Propranolol.

48. Após colocação de piercing, um paciente apresenta otalgia, hiperemia e edema moderados em pavilhão auditivo direito.

Considerando-se o principal agente etiológico causador da afecção, qual a medicação mais indicada?

- (A) Gentamicina.
- (B) Vancomicina.
- (C) Ceftazidima.
- (D) Ceftriaxona.
- (E) Metronidazol.

49. Assinale a alternativa correta sobre a leucoplasia pilosa.

- (A) Na maioria das vezes, é assintomática.
- (B) É causada pelo citomegalovírus em pacientes imunocomprometidos.
- (C) O tratamento é a exérese cirúrgica da lesão.
- (D) Sua localização mais frequente é a porção mediana da língua.
- (E) O pênfigo vulgar é um diagnóstico diferencial possível.

50. Paciente com rinite alérgica, sem antecedentes psiquiátricos, começa a apresentar ideias suicidas após início de tratamento.

Nesse contexto, é correto afirmar que a droga que pode causar esse efeito adverso é

- (A) Desloratadina.
- (B) Ebastina.
- (C) Cetirizina.
- (D) Montelukaste.
- (E) Beclometasona.

RASCUNHO

