



CARGO: MÉDICO ESF

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo ao qual você concorre, se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada (A, B, C, D e E) e se possui a folha rascunho da prova de redação;
- Caso o caderno esteja incompleto, possua qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo ao qual você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores neste sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, a folha definitiva da prova de redação e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala corrigir em Ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva e transcrever a folha de rascunho da prova de redação para a folha definitiva da prova de redação;**
- Na duração da prova, está incluso o tempo destinado à entrega do material de prova, ao preenchimento do cartão resposta e folha definitiva da prova de redação;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como calculadoras, MP3, MP4, celular, tablet, notebook, gravador, máquina fotográfica ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, dicionários, consultas ou qualquer outro material impresso que não esteja expressamente permitido; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não seja permitido;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado, a folha definitiva da prova de redação e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de questões e o rascunho da prova de redação, poderá levar somente a anotação de gabarito a ser destacada abaixo;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente caderno de prova, cartão resposta e folha definitiva da prova de redação poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar o seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

[illegible]

01) Leia o texto a seguir:

O avanço das tecnologias digitais tem proporcionado novas oportunidades de inclusão social para a população idosa. Aplicativos de mensagens, serviços bancários online e plataformas de comunicação permitem que muitos idosos mantenham contato com familiares, realizem tarefas cotidianas e tenham acesso a informações de forma mais rápida. Entretanto, para que esse processo ocorra de maneira eficaz, é necessário oferecer orientação adequada e promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso dessas ferramentas.

Considerando as normas da ortografia oficial da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas **CORRETAMENTE**:

- (A) Tecnologia – comunicação – inclusão – habilidade.
- (B) Mensagem – familiares – acesso – orientação.
- (C) Eficaz – desenvolvimento – ferramentas – digitais.
- (D) População – aplicativos – informassão – oportunidade.
- (E) Bancário – cotidiâno – plataforma – informação.

02) Analise o trecho abaixo:

Os adolescentes da geração Z cresceram conectados a diferentes tecnologias digitais. O uso constante de aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo e redes sociais faz parte de sua rotina. Essa geração desenvolveu novas formas de comunicação, compartilhando informações de maneira rápida e interativa. No entanto, especialistas destacam a importância do equilíbrio entre o mundo virtual e as experiências presenciais para o desenvolvimento saudável dos jovens.

Considerando os aspectos fonológicos da Língua Portuguesa, especialmente a ocorrência de dígrafos, assinale a alternativa que apresenta uma palavra retirada do texto que contém dígrafo consonantal:

- (A) Uso.
- (B) Jovens.
- (C) Geração.
- (D) Compartilhando.
- (E) Rotina.

03) Considere o texto para resolução da questão:

O futebol ocupa lugar de destaque na sociedade brasileira. Mais do que uma prática esportiva, ele influencia hábitos culturais, movimenta a economia e fortalece o sentimento de pertencimento entre torcedores. Em dias de grandes partidas, cidades inteiras alteram sua rotina para acompanhar os jogos e celebrar os resultados alcançados por suas equipes.

No período “Em dias de grandes partidas, cidades inteiras alteram sua rotina para acompanhar os jogos e celebrar os resultados alcançados por suas equipes”, analise a função sintática dos termos destacados e assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O sujeito da oração é “Em dias de grandes partidas”.
- (B) O termo “cidades inteiras” exerce a função de sujeito da oração.
- (C) A expressão “sua rotina” exerce a função de predicativo do sujeito.
- (D) O termo “os jogos” exerce a função de sujeito do verbo “acompanhar”.
- (E) A expressão “por suas equipes” exerce a função de objeto indireto do verbo “alcançados”.

04) Em uma crônica esportiva, o autor escreveu:

"Após a vitória no campeonato, a cidade vestiu as cores do time e o coração dos torcedores explodiu de alegria."

Considerando os sentidos denotativo e conotativo da linguagem, assinale a alternativa CORRETA acerca da expressão "o coração dos torcedores explodiu de alegria":

- (A) A expressão deve ser interpretada literalmente, indicando uma alteração física no coração dos torcedores.
- (B) O verbo "explodiu" foi empregado em sentido denotativo, indicando uma ação concreta e real.
- (C) A expressão apresenta sentido conotativo, sugerindo a intensa emoção vivenciada pelos torcedores.
- (D) A expressão demonstra um uso inadequado da norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (E) O trecho não apresenta recurso expressivo, pois todas as palavras foram empregadas em seu sentido habitual.

05) No contexto das discussões sobre responsabilidades parentais, considere o trecho a seguir:

"Cabe aos responsáveis garantir _____ crianças e aos adolescentes condições adequadas de desenvolvimento, assegurando acesso _____ educação, _____ saúde e _____ oportunidades que favoreçam sua formação integral."

De acordo com as normas da Língua Portuguesa relativas ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas:

- (A) às – à – à – às.
- (B) as – a – à – às.
- (C) às – à – a – as.
- (D) as – à – à – às.
- (E) às – a – à – as.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Em uma cooperativa, os colaboradores recebem ao final de um ciclo de um ano uma participação nos resultados do lucro e esta participação é medida por um fator numérico multiplicado pelo salário do colaborador. Em um destes ciclos, o fator foi de 1,75, o que indica que o colaborador irá receber 1,75 vezes o valor do seu salário. Considerando estas informações, um colaborador que tem um salário de R\$ 4.680,00 recebeu de participação dos lucros o valor de:

- (A) R\$ 7.920,00.
- (B) R\$ 8.190,00.
- (C) R\$ 8.320,00.
- (D) R\$ 8.670,00.
- (E) R\$ 9.070,00.

07) A nova piscina de um colégio tem forma de paralelepípedo retângulo, com 10 metros de comprimento e 6 de largura. Se esta piscina tem capacidade para 90.000 mil litros de água, a sua altura em metros é igual a:

- (A) 1,40 metros.
- (B) 1,45 metros.
- (C) 1,50 metros.
- (D) 1,55 metros.
- (E) 1,60 metros.

08) Um contêiner carregado pesa 30 toneladas, e somente o peso do contêiner é de 3.500 quilos. Após ser descarregado exatamente a metade da sua carga, o peso da carga restante mais o peso do contêiner é igual a:

- (A) 16,75 toneladas.
- (B) 15,50 toneladas.
- (C) 17,75 toneladas.
- (D) 14,50 toneladas.
- (E) 18,75 toneladas.

09) Camila comprou três trufas por R\$ 10,00, sendo cada trufa de um preço diferente, e o seu preço é um número inteiro. Com base nestes dados, a trufa de maior preço pode custar, no máximo:

- (A) R\$ 4,00.
- (B) R\$ 5,00.
- (C) R\$ 6,00.
- (D) R\$ 7,00.
- (E) R\$ 8,00.

10) Uma empresa de embalagens produz e vende caixas de papelão, sendo o custo para produzir x caixas é dado pela função $C(x) = \frac{2.000}{x+10}$. Considerando esta função, qual é o custo por caixa quando a produção total é de 240 caixas?

- (A) R\$ 6,00.
- (B) R\$ 7,50.
- (C) R\$ 8,00.
- (D) R\$ 8,50.
- (E) R\$ 9,00.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Azul organiza o regime disciplinar em torno de um rol fechado de penalidades, de critérios de dosimetria que consideram a natureza e a gravidade da infração e de prazos próprios de prescrição. A lei também define as hipóteses em que a apuração exige processo administrativo disciplinar, e não apenas sindicância. Sobre as penalidades disciplinares previstas na Lei Municipal nº 465/2008, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

() São penalidades disciplinares a advertência, a multa, a suspensão, a destituição da função gratificada ou comissionada, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

() A pena de suspensão não excederá noventa dias e, havendo conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de cinquenta por cento por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

() A pena de advertência prescreve em cinco anos e a de demissão em dois anos, contados ambos os prazos da data do julgamento do processo administrativo.

() A instauração de processo administrativo disciplinar é sempre necessária para a aplicação da penalidade de demissão.

- (A) V-F-V-F.
- (B) F-V-V-F.
- (C) V-V-F-V.
- (D) F-F-V-V.
- (E) V-F-F-V.

12) O comércio marítimo mundial depende de um número reduzido de passagens estratégicas capazes de encurtar rotas entre oceanos. Uma dessas passagens é uma via navegável artificial construída na América Central, que atravessa a faixa de terra mais estreita entre dois grandes oceanos e utiliza um sistema de eclusas para vencer o desnível do terreno, elevando as embarcações até um lago artificial situado acima do nível do mar. Antes de sua abertura, os navios que iam da costa atlântica à costa pacífica do continente americano precisavam contornar o extremo sul da América do Sul. Qual das alternativas abaixo se refere a essa via navegável?

- (A) Canal do Panamá.
- (B) Canal de Suez.
- (C) Estreito de Magalhães.
- (D) Canal de Kiel.
- (E) Canal de Corinto.

13) Em novembro de 2015, o Brasil sediou, pela primeira vez em uma cidade da Amazônia, a conferência anual das Nações Unidas dedicada à mudança do clima, realizada no âmbito da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. Sob presidência brasileira, o encontro reuniu delegações de 195 países, que aprovaram por consenso um conjunto de decisões conhecido como Pacote de Belém, tendo como texto central a chamada Decisão Mutirão. O evento marcou os dez anos do Acordo de Paris e lançou iniciativas voltadas ao financiamento da conservação de florestas tropicais. Qual das alternativas abaixo se refere a essa conferência?

- (A) Cúpula do G20.
- (B) Rio+20.
- (C) Fórum Econômico Mundial.
- (D) COP30.
- (E) Assembleia Geral da ONU.

14) A inserção internacional de um país se expressa, entre outros meios, pela sua participação em organizações e blocos que estruturam a ordem mundial contemporânea. Cada uma dessas entidades possui natureza, finalidade e composição próprias, de modo que o pertencimento a uma delas não implica pertencimento às demais. Considerando a política externa brasileira até o final do ano de 2025, identifique aquelas das quais o Brasil é Estado-membro. Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA:

I - O Grupo dos Vinte (G20), fórum internacional que reúne dezenove países, a União Europeia e a União Africana, com foco na coordenação macroeconômica global.

II - A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dedicada ao estabelecimento de padrões globais de políticas públicas e que exige rigorosos processos de acesso de seus parceiros.

III - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar intergovernamental pautada no princípio da defesa coletiva e com sede administrativa em Bruxelas.

IV - O Mercado Comum do Sul (Mercosul), bloco de integração econômica sul-americano instituído pelo Tratado de Assunção e estruturado por órgãos como o Conselho do Mercado Comum.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

15) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

A Lei Orgânica do Município de Rio Azul estabelece regras estritas para o processo legislativo, regulando a interação entre os poderes locais. Conforme essa norma, se o Prefeito julgar um projeto de lei inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo dentro de _____ dias úteis. Caso o Chefe do Executivo não se manifeste nesse período, o seu silêncio implicará em _____. Uma vez comunicado o veto, a Câmara Municipal terá o prazo de trinta dias para apreciá-lo, sendo que a sua rejeição exige o voto contrário da _____ dos membros do Legislativo municipal.

- (A) 10 (dez)/rejeição/maioria simples.
- (B) 15 (quinze)/sanção/maioria absoluta.
- (C) 20 (vinte)/promulgação/maioria de dois terços.
- (D) 30 (trinta)/aprovação tácita/maioria simples.
- (E) 05 (cinco)/veto tácito/maioria absoluta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Os marcadores tumorais são substâncias produzidas pelas células cancerígenas ou pelo próprio organismo em resposta à presença do câncer. Eles possuem grande utilidade na prática clínica para o acompanhamento e monitoramento de diversas neoplasias malignas. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a aplicação e a especificidade dos marcadores tumorais:

- (A) O PSA (Antígeno Prostático Específico) é amplamente utilizado no rastreamento e monitoramento do câncer de próstata, porém seus níveis também podem se elevar em condições benignas, como a hiperplasia prostática benigna (HPB) e a prostatite.
- (B) O CA 125 (Antígeno do Câncer 125) é o marcador tumoral de escolha para o monitoramento da resposta ao tratamento e da recorrência do carcinoma epitelial de ovário, embora patologias benignas como a endometriose também possam elevá-lo.
- (C) O CEA (Antígeno Carcinoembrionário) é um marcador altamente específico e exclusivo para o diagnóstico inicial do câncer colorretal precoce, não sofrendo influência de hábitos como o tabagismo.
- (D) A AFP (Alfa-fetoproteína) é utilizada como marcador tumoral no monitoramento do carcinoma hepatocelular e de certos tumores de células germinativas dos testículos ou ovários.
- (E) O CA 19-9 (Antígeno do Câncer 125) é o principal marcador associado ao adenocarcinoma de pâncreas, sendo valioso para avaliar a resposta terapêutica e a progressão da doença, apesar de não ser totalmente específico do pâncreas.

17) A prática regular de atividade física é amplamente recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os efeitos e as recomendações da atividade física:

- (A) O exercício físico regular auxilia no controle da pressão arterial e reduz significativamente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
- (B) A prática de atividades físicas promove a liberação de neurotransmissores como a endorfina, que auxiliam na redução do estresse e da ansiedade.
- (C) Para obter benefícios à saúde, a OMS recomenda que adultos pratiquem exclusivamente atividades aeróbicas intensas, sendo contraindicados os exercícios de fortalecimento muscular para indivíduos acima de 60 anos.
- (D) A atividade física atua como um fator importante no controle do peso corporal, pois aumenta o gasto energético diário e estimula o metabolismo.
- (E) O sedentarismo é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes tipo 2.

18) No manejo de pacientes com sintomas dispépticos crônicos, a diferenciação entre a dispepsia funcional (DF) e a dispepsia associada à infecção pelo *Helicobacter pylori* é um desafio frequente na prática clínica. Considerando os critérios diagnósticos de Roma IV e as diretrizes atuais de conduta, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O diagnóstico de dispepsia funcional exige a presença de um ou mais sintomas principais (como plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica ou queimação epigástrica) sem evidência de doença estrutural que justifique os sintomas na endoscopia digestiva alta.
- (B) Pacientes com sintomas dispépticos e teste positivo para *H. pylori* que apresentam melhora sustentada e completa dos sintomas por pelo menos 6 a 12 meses após a erradicação bacteriana bem-sucedida são classificados como portadores de dispepsia associada ao *H. pylori*, e não dispepsia funcional.
- (C) A estratégia de "testar e tratar" o *H. pylori* é indicada como abordagem inicial para pacientes com dispepsia que possuem menos de 55 anos e não apresentam sinais de alarme, especialmente em regiões com alta prevalência da infecção.
- (D) A presença de sinais de alarme, tais como perda de peso inexplicada, disfagia progressiva, vômitos persistentes ou anemia, autoriza o tratamento empírico imediato para *H. pylori*, postergando a realização da endoscopia digestiva alta para evitar custos desnecessários.
- (E) A dispepsia funcional é subdividida pelos critérios de Roma IV em dois subtipos clínicos principais: a Síndrome do Desconforto Pós-Prandial (SDPP), induzida principalmente pelas refeições, e a Síndrome da Dor Epigástrica (SDE), que ocorre de forma independente da ingestão alimentar.

19) Com base nos princípios da assistência preventiva à saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A prevenção primária atua antes do surgimento da doença, eliminando os fatores de risco por meio de ações como a vacinação e a promoção de hábitos saudáveis.
- (B) A prevenção secundária foca no diagnóstico precoce e no tratamento imediato de patologias em estágio inicial, utilizando exames de rastreamento.
- (C) A prevenção terciária busca reduzir os impactos negativos de uma doença já estabelecida, focando na reabilitação e na prevenção de complicações.
- (D) A prevenção quaternária consiste na identificação de pacientes em risco de supermedicalização, visando protegê-los de intervenções médicas desnecessárias ou excessivas.
- (E) A assistência preventiva deve priorizar o atendimento de alta complexidade hospitalar em detrimento das ações de Atenção Primária, garantindo que os recursos financeiros fiquem centralizados nos grandes centros cirúrgicos.

20) Homem, 34 anos, procura o pronto-atendimento com quadro de diarreia aquosa há 2 dias, associada a cólicas abdominais e náuseas. Evacuou cerca de 8 vezes nas últimas 24 horas. Ao exame físico: desidratado ++/4+, prostrado, mucosas secas, PA (Pressão Arterial) 110/70 mmHg, FC (Frequência Cardíaca) 96 bpm, tempo de enchimento capilar de 2 segundos. Abdome propício ao ruído hidroaéreo aumentado, difusamente doloroso à palpação, sem sinais de peritonite. Considerando a abordagem inicial do paciente com diarreia aguda, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Em pacientes com desidratação grave ou sinais de choque, a coleta de exames de fezes é a prioridade absoluta antes de iniciar qualquer infusão de fluidos.
- (B) A maioria dos casos de diarreia aguda tem etiologia viral ou bacteriana autolimitada, dispensando o uso inicial de antimicrobianos.
- (C) Sinais de alarme como febre alta, fezes com sangue (disenteria), dor abdominal grave ou sepse justificam a investigação diagnóstica com coprocultura.
- (D) A terapia de reidratação oral (TRO) é a conduta de escolha para pacientes com desidratação leve a moderada que toleram a via oral.
- (E) Medicamentos antimotilidade (como a loperamida) são contraindicados em casos de diarreia inflamatória/disentérica devido ao risco de prolongar a infecção ou causar megacólon tóxico.

21) Uma paciente de 34 anos procura atendimento médico queixando-se de tristeza constante, desânimo e preocupações excessivas que persistem há cerca de oito meses. Ela relata que não sente mais prazer em suas atividades habituais, como cuidar do jardim e ler. Refere também insônia de conciliação, fadiga diária extrema, irritabilidade crônica e dificuldade severa de concentração no trabalho, o que tem gerado medo constante de ser demitida. Durante a consulta, a paciente apresenta-se tensa, com tremores leves nas mãos e relata episódios frequentes de tensão muscular dolorosa na região cervical. Ela nega ideação suicida ou episódios prévios de mania. Com base no quadro clínico, foi estabelecido o diagnóstico comórbido de Transtorno Depressivo Maior (TDM) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Considerando o diagnóstico, a fisiopatologia e o manejo terapêutico farmacológico e não farmacológico da associação entre Transtorno Depressivo Maior (TDM) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), assinale a alternativa INCORRETA:

(A) O diagnóstico de TAG exige que a ansiedade e a preocupação excessivas estejam presentes na maioria dos dias por um período mínimo de 3 meses, associadas a pelo menos três sintomas físicos ou cognitivos.

(B) No início do tratamento com antidepressivos ISRS (Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina) ou IRSN (Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina), pode ocorrer um aumento paradoxal dos sintomas de ansiedade e agitação, sendo comum o uso temporário de benzodiazepínicos de curta ou média ação para controle inicial desses sintomas.

(C) A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é a abordagem psicoterapêutica com maior evidência científica de eficácia, atuando na reestruturação de pensamentos disfuncionais e na redução da esquia comportamental.

(D) Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) e os Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN) são considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento de longo prazo de ambas as condições.

(E) Medicamentos como a pregabalina e a gabapentina atuam como moduladores dos canais de cálcio dependentes de voltagem e possuem eficácia demonstrada no tratamento dos sintomas de ansiedade do TAG (transtorno de ansiedade generalizada), embora não sejam tratamentos de primeira linha isolados para a depressão maior.

22) Uma paciente de 62 anos, costureira aposentada, comparece à consulta médica queixando-se de dor crônica nos joelhos e nas mãos há cerca de 4 anos, com piora progressiva. Relata que a dor piora ao final do dia, após realizar tarefas domésticas, e melhora significativamente com o repouso. Sente rigidez nas articulações ao acordar, que dura em média 15 minutos. Ao exame físico, apresenta índice de massa corporal (IMC) de 31 kg/m² (obesidade grau I). Nota-se aumento de volume fibroósseo indolor nas articulações interfalangeanas distais (IFD) e proximais (IFP) de ambas as mãos, além de crepitação palpável e redução da amplitude de movimento bilateral dos joelhos. Não há sinais de sinovite aguda (calor, rubor ou eritema). As radiografias dos joelhos demonstram estreitamento assimétrico do espaço femorotibial, esclerose do osso subcondral e presença de osteófitos marginais. Com base no quadro clínico, radiológico e nas diretrizes atuais para o manejo da osteoartrite, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) O uso de paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) tópicos é preferível como terapia farmacológica inicial em relação aos AINEs orais, visando menor taxa de efeitos colaterais.

(B) Os nós observados nas articulações interfalangeanas distais e proximais correspondem, respectivamente, aos nódulos de Heberden e Bouchard.

(C) A perda de peso e a prática de exercícios físicos de baixo impacto (como fortalecimento muscular e aeróbicos) são pilares fundamentais no tratamento desta paciente.

(D) A rigidez matinal menor que 30 minutos e a ausência de manifestações sistêmicas ajudam a diferenciar a osteoartrite da artrite reumatoide.

(E) O repouso prolongado deve ser a principal recomendação terapêutica a longo prazo para evitar o desgaste cartilaginoso adicional.

23) No contexto da medicina preventiva e da realização de exames de rastreamento (check-up) em adultos assintomáticos, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O rastreamento do câncer de colo de útero por meio do exame Papanicolau deve ser iniciado rotineiramente a partir dos 25 anos de idade para mulheres que já iniciaram a vida sexual.
- (B) A mamografia de rastreamento para o câncer de mama é indicada anualmente ou a cada dois anos para todas as mulheres a partir dos 35 anos, independentemente do histórico familiar.
- (C) A pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia são métodos válidos para o rastreamento do câncer colorretal, geralmente recomendados a partir dos 45 ou 50 anos de idade.
- (D) A medição da pressão arterial é um exame de triagem fundamental e deve ser realizada periodicamente em adultos para a detecção precoce da hipertensão arterial sistêmica.
- (E) O perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos) deve ser solicitado para avaliar o risco cardiovascular, variando a idade de início conforme as diretrizes médicas e fatores de risco do paciente.

24) Analise as afirmativas abaixo sobre a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) e assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A HPB se desenvolve predominantemente na zona de transição da próstata, envolvendo a uretra proximal.
- (B) Os sintomas do trato urinário inferior (STUI) são divididos em sintomas de esvaziamento (como hesitação e jato fraco) e de armazenamento (como noctúria e urgência).
- (C) Os inibidores da 5-alfa-redutase (como a finasterida) agem reduzindo o volume prostático a longo prazo por meio do bloqueio da conversão da testosterona em di-hidrotestosterona (DHT).
- (D) O Antígeno Prostático Específico (PSA) é um marcador biológico exclusivo do câncer de próstata, não sofrendo elevação em decorrência da HPB (Hiperplasia Prostática Benigna) ou de processos inflamatórios.
- (E) Os alfa-bloqueadores (como a tansulosina) promovem o relaxamento da musculatura lisa do colo vesical e da próstata, proporcionando alívio rápido dos sintomas urinários obstrutivos.

25) Homem, 34 anos, dá entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) queixando-se de dor lombar direita de início súbito, com forte intensidade, que irradia para a região inguinal ipsilateral. O paciente relata náuseas e dois episódios de vômitos associados. Nega febre ou sintomas respiratórios. Ao exame físico, apresenta-se desidratado, inquieto na maca (sem encontrar posição de alívio) e com sinal de Giordano positivo à direita. Os sinais vitais mostram Pressão Arterial de 135/85 mmHg, Frequência Cardíaca de 98 bpm e Temperatura de 36,7 °C. Uma tomografia computadorizada (TC) de abdome e pelve sem contraste revela um cálculo de 4 mm localizado no ureter distal direito, sem evidência de hidronefrose acentuada. Considerando o caso clínico e as diretrizes atuais para o manejo da nefrolitíase, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O manejo inicial do paciente deve priorizar a analgesia, sendo os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) a primeira linha de escolha, associados ou não a opioides se a dor for refratária.
- (B) Devido à presença do cálculo ureteral detectado na tomografia, a intervenção cirúrgica imediata (como a ureterolitotripsia a laser) é mandatória para evitar a perda da função renal direita.
- (C) A terapia médica expulsiva (TME) com o uso de alfa-bloqueadores (como a tansulosina) pode ser indicada para este paciente para facilitar a passagem espontânea do cálculo de 4 mm.
- (D) A TC (Tomografia Computadorizada) de abdome e pelve sem contraste é considerada o padrão-ouro no diagnóstico por imagem da cólica nefrética devido à sua alta sensibilidade e especificidade.
- (E) A reavaliação ambulatorial posterior deve incluir orientações metabólicas, como o estímulo à ingestão hídrica para manter um volume urinário superior a 2 litros por dia.

26) Um homem de 52 anos, obeso, sedentário e tabagista, comparece à consulta médica na Unidade Básica de Saúde para apresentar um diário de monitorização residencial da pressão arterial (MRPA). O relatório da MRPA demonstra uma média de 142/92 mmHg. O paciente nega sintomas como cefaleia, dor torácica ou palpitações. Exames laboratoriais recentes revelam ritmo de filtração glomerular estimado (eFG) de 85 mL/min/1,73m² e microalbuminúria de 45 mg/g (valor de referência: < 30 mg/g). Considerando as diretrizes atuais de Hipertensão Arterial Sistêmica, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica está confirmado para este paciente, dispensando a necessidade de novas medições em consultório para fins diagnósticos.
- (B) A presença de microalbuminúria acima dos valores de referência já configura uma lesão de órgão-alvo mediada pela hipertensão (doença renal crônica estágio 3).
- (C) O tratamento inicial deste paciente deve obrigatoriamente associar mudanças no estilo de vida com terapia farmacológica combinada, devido ao risco cardiovascular e estágio da pressão.
- (D) Diuréticos tiazídicos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA) são considerados fármacos de primeira linha.
- (E) A meta pressórica terapêutica recomendada para este paciente deve ser buscar valores inferiores a 130/80 mmHg, desde que tolerado pelo paciente.

27) As normas operacionais e os manuais de procedimentos são ferramentas fundamentais para a padronização, a eficiência e a governança dentro de uma organização pública ou privada. Eles servem para orientar os colaboradores e garantir a conformidade dos processos. Considerando os conceitos, objetivos e a aplicação das normas operacionais, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O Manual de Procedimentos deve ser um documento estático, imutável após sua publicação original, para garantir a segurança jurídica absoluta dos atos praticados ao longo do tempo.
- (B) As normas operacionais buscam a uniformidade das ações, minimizando a variabilidade na execução das tarefas e aumentando a previsibilidade dos resultados.
- (C) A conformidade (compliance) é um dos principais objetivos das normas operacionais, assegurando que a rotina da instituição respeite as leis, decretos e regulamentos vigentes.
- (D) A existência de fluxogramas e rotinas detalhadas facilita o treinamento de novos colaboradores, reduzindo o tempo de integração e os erros de aprendizado.
- (E) Normas operacionais bem estruturadas auxiliam na atribuição de responsabilidades, tornando mais clara a identificação de falhas ou gargalos em cada etapa do processo.

28) Homem de 68 anos, hipertenso e tabagista, é trazido ao pronto-socorro após episódio de perda súbita e transitória da consciência enquanto caminhava até a padaria. Testemunhas relatam que o paciente caiu ao chão, permaneceu desacordado por cerca de 30 segundos e se recuperou espontaneamente, sem confusão mental pós-evento. Ao exame físico inicial, apresenta PA 130/80 mmHg, FC 72 bpm, eupneico e sem déficits neurológicos. O eletrocardiograma (ECG) realizado na admissão revelou bloqueio de ramo esquerdo (BRE) novo. Com base no quadro clínico e nas diretrizes atuais de manejo da síncope, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O paciente apresenta critérios de alto risco e necessita de internação hospitalar para investigação diagnóstica.
- (B) A ausência de confusão mental após o evento ajuda a diferenciar a síncope de uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada.
- (C) O ecocardiograma transtorácico é um exame inicial recomendado para este paciente para avaliar a presença de cardiopatia estrutural.
- (D) A ocorrência da síncope durante o esforço físico (caminhada) é um preditor de evolução benigna e sugere etiologia vasovagal.
- (E) O bloqueio de ramo esquerdo no ECG (Eletrocardiograma) é considerado um fator de risco cardiovascular relevante no contexto da síncope.

29) Paciente do sexo masculino, 24 anos, solteiro, auxiliar administrativo, procura atendimento médico queixando-se do surgimento de um "caroço" no pescoço há cerca de 3 semanas. Relata que a lesão aumentou progressivamente de tamanho, é indolor e não apresenta sinais inflamatórios locais (como vermelhidão ou calor). Refere ainda febre baixa diária vespertina (não aferida), sudorese noturna que o obriga a trocar de roupa e perda ponderal não intencional de 6 kg no último mês (aproximadamente 8% do seu peso corporal). Nega tosse, dispneia, odinofagia ou histórico de viagens recentes. Não possui comorbidades ou uso de medicações contínuas.

Exame Físico:

Sinais Vitais: Frequência cardíaca: 82 bpm; Frequência respiratória: 16 irpm; Pressão arterial: 120/75 mmHg; Temperatura axilar: 37,6 °C.

Ectoscopia: Regular estado geral, descorado (+/4+), acianótico, anictérico.

Linfonodos: Presença de linfonodomegalia em cadeia cervical anterior esquerda, caracterizada por conglomerado ganglionar de aproximadamente 3,5 cm no maior diâmetro, de consistência endurecida, aderido aos planos profundos, indolor à palpação. Ausência de linfonodomegalias palpáveis em regiões supraclaviculares, axilares ou inguinais.

Sistemas Cardiorespiratório e Gastrointestinal: Aparelho respiratório com murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular com bulhas rítmicas e normofonéticas, sem sopros. Abdômen plano, flácido, indolor, sem visceromegalias (fígado e baço não palpáveis).

Com base na abordagem diagnóstica e conduta indicada para o caso clínico estruturado acima, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A presença de sintomas constitucionais (febre, sudorese noturna e perda de peso), associada a linfonodo de consistência endurecida e aderido a planos profundos, eleva significativamente a suspeita de neoplasias hematológicas, como o Linfoma de Hodgkin.
- (B) Diante do tamanho do linfonodo (3,5 cm) e do tempo de evolução superior a duas semanas, a conduta inicial mais adequada e definitiva para o esclarecimento diagnóstico é a realização de uma biópsia excisional do linfonodo acometido.
- (C) A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é o método padrão-ouro e substitui completamente a biópsia excisional neste caso, pois preserva a arquitetura linfonodal e permite o diagnóstico histopatológico completo de linfomas.
- (D) A ausência de dor ou de sinais logísticos locais (calor, rubor) no linfonodo cervical do paciente afasta a principal suspeita de linfadenopatia reacional infecciosa bacteriana aguda (como por *Staphylococcus aureus* ou *Streptococcus pyogenes*).
- (E) Exames de imagem torácica e abdominal (como Tomografia Computadorizada) serão necessários após a confirmação diagnóstica para o estadiamento adequado da doença, avaliando o acometimento de cadeias linfonodais profundas e órgãos sólidos.

30) Um homem de 68 anos, portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e hipertensivo, procura o pronto-atendimento com quadro de tosse produtiva com escarro amarelado, febre de 38,5°C e dispneia progressiva há 3 dias. Ao exame físico, apresenta-se vigil, orientado, com frequência respiratória de 26 incursões por minuto, frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto e pressão arterial de 110/70 mmHg. A ausculta pulmonar revela estertores crepitantes em terço inferior do hemitórax direito. A oximetria de pulso em ar ambiente é de 90%. A radiografia de tórax mostra uma consolidação lobar em base direita. Exames laboratoriais revelam ureia plasmática de 42 mg/dL. Com base no quadro clínico e nas diretrizes atuais para o manejo da Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O escore CURB-65 (é uma escala médica e um escore de risco usado para avaliar a gravidade da Pneumonia Adquirida na Comunidade) deste paciente é igual a 2, o que sugere a necessidade de avaliação individualizada para decidir entre o tratamento ambulatorial ou internação hospitalar.
- (B) O patógeno bacteriano mais provável envolvido na etiologia do quadro clínico deste paciente é o *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) A reavaliação clínica nas primeiras 48 a 72 horas é fundamental para verificar a resposta terapêutica e a estabilidade hemodinâmica do paciente.
- (D) A presença de saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente indica hipoxemia e justifica a suplementação de oxigênio alvo para manter a saturação entre 88-92% (considerando o histórico de DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) ou 93-96%.
- (E) Devido às comorbidades (DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e à idade do paciente, a monoterapia inicial com amoxicilina em dose padrão (500mg a cada 8 horas) por via oral é a conduta empírica ambulatorial mais adequada.

FOLHA RASCUNHO DA PROVA DISSERTATIVA - REDAÇÃO

O conteúdo exigido na prova de redação será estritamente relacionado aos conhecimentos específicos e à área de atuação do cargo/especialidade escolhido pelo candidato no momento da inscrição;

A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, valerá o total de 100,00 (cem) pontos e consistirá em desenvolver um texto dissertativo-argumentativo;

Não serão permitidas consultas em nenhum tipo de material e o candidato não poderá levar consigo o caderno da prova de redação;

A prova de redação deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato quando da correção pela banca examinadora, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas;

A versão definitiva da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova;

A folha da versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova de redação. O rascunho, no caderno da prova de redação, será de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação;

A omissão de dados que forem exigidos ou necessários para a correta solução da prova de redação acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato;

O candidato terá sua prova de redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar a folha da versão definitiva ou entregá-la em branco;
- f) apresentar identificação em local indevido de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

ENUNCIADO:

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é prioritária para a expansão e consolidação da Atenção Básica no Brasil, fundamentada em princípios como a territorialização, a adstrição de clientela e o cuidado multiprofissional. Considere uma equipe de Saúde da Família que, ao realizar o diagnóstico comunitário, identifica um aumento expressivo nos índices de gravidez na adolescência e de complicações por Diabetes Mellitus tipo 2 em um bairro periférico sob sua responsabilidade.

Com base no enunciado acima e nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre as atribuições e ferramentas da equipe da ESF, considerando o conceito de Territorialização e como ele se diferencia da mera delimitação geográfica de um mapa, o papel da Equipe Multiprofissional na abordagem de uma das duas problemáticas identificadas (gravidez na adolescência OU diabetes), a ação intersetorial e a importância do Acolhimento e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) para garantir a integralidade do cuidado aos pacientes crônicos desse território.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	