

# CARGO: ENFERMEIRO

## PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

| Disciplina                | Composição |
|---------------------------|------------|
| Língua Portuguesa         | 01 a 05    |
| Matemática                | 06 a 07    |
| Informática Básica        | 08 a 10    |
| Conhecimentos Gerais      | 11 a 12    |
| Conhecimentos Específicos | 13 a 40    |

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Cérebro: Descoberto “botão” que nos faz procrastinar

Uma conexão entre duas regiões profundas do cérebro parece ser a responsável pelo bloqueio que sentimos diante de tarefas desagradáveis, a que chamamos procrastinação.

Inúmeras vezes, descobrimos que sabemos o que é preciso fazer, compreendemos a urgência, entendemos a recompensa... mas algo dentro de nós se recusa a dar o primeiro passo. Essa estranha paralisia não é simples preguiça, nem falta de interesse. É uma barreira invisível, muitas vezes intransponível, que separa o pensamento da ação. Um grupo de cientistas conseguiu vislumbrar o que acontece no cérebro nesses momentos e, com isso, pode ter-se aberto uma porta inesperada para a compreensão de distúrbios mentais profundamente incapacitantes.

Num estudo publicado na *Current Biology* e liderado por Ken-Ichi Amemori, do Instituto para o Estudo Avançado da Biologia Humana da Universidade de Quioto, foi identificado um circuito cerebral específico que atua como um verdadeiro travão interno.

Esta via, que liga o estriado ventral (EV) ao pálido ventral (PV), parece impedir o início de uma ação quando o contexto antecipa desconforto ou esforço, mesmo que a recompensa seja clara. De forma reveladora, inibir esta conexão em macacos treinados com tarefas difíceis restaurou a sua vontade de agir, sem alterar a sua avaliação do objetivo final.

## CÉREBROS DE MACACOS

Os investigadores trabalharam com macacos que foram treinados para realizar dois tipos de tarefas: uma baseada apenas em recompensas e outra em que a mesma recompensa era acompanhada por um castigo leve (uma rajada de ar no rosto). Na tarefa que provocava aversão, muitos dos animais optaram por não agir. Mas ao aplicar uma técnica chamada quimiogenética, que permite silenciar temporariamente conexões neuronais específicas, o canal EV-PV foi desativado e os macacos voltaram a participar, como se o freio tivesse sido solto.

Essas observações revelam que o EV atua diante de sinais antecipados de desconforto e, através da sua conexão com o PV (responsável por ativar comportamentos direcionados a um objetivo), pode bloquear o próprio início do comportamento. Não é que o cérebro não valorize a meta: recusa-se a dar o primeiro passo quando antecipa sofrimento. Uma distinção subtil, mas essencial.

O estudo registou a atividade cerebral com eléctrodos. Perante sinais de tarefas incómodas, a atividade do estriado ventral aumentava rapidamente. Ao mesmo tempo, a do pálido ventral diminuía mais lentamente, como se o aviso de desconforto do EV silenciasses gradualmente a ordem de “começar” emitida pelo PV. Este padrão, persistente e repetido, sugere uma arquitetura neuronal projetada para nos proteger do que antecipamos como prejudicial.

## UMA MUDANÇA DE PARADIGMA

De uma perspectiva clínica, esta descoberta representa uma mudança de paradigma. Muitas vezes, a falta de motivação é tratada como um problema de avaliação errada do valor de uma tarefa: tenta-se aumentar a atratividade da meta ou adicionar incentivos.

Mas se o problema está na etapa anterior, na decisão de começar, essas intervenções são inúteis. Segundo Amemori, “quando a motivação está alterada no nível da iniciação, reduzir

os sinais de desconexão antecipada pode ser mais eficaz do que aumentar as recompensas”.

Os autores do estudo sugerem que este circuito pode estar desequilibrado em distúrbios como a depressão, a esquizofrenia ou mesmo a doença de Parkinson, onde aparece frequentemente um sintoma conhecido como abulia: uma incapacidade de iniciar ações, embora a pessoa compreenda perfeitamente a sua importância.

Identificar este freio neuronal abre a porta a novas terapias. Algumas possibilidades são intervenções como estimulação cerebral profunda, estimulação magnética transcraniana, ultrassom focal ou mesmo medicamentos que modulam esta via.

No entanto, não se trata de eliminar esse freio do nada. Os investigadores insistem que este mecanismo cumpre uma função adaptativa essencial. Durante milhões de anos, ajudou os organismos a não desperdiçar recursos em tarefas de alto custo. O problema surge quando o freio é excessivo e é ativado mesmo em tarefas cotidianas. Por isso, qualquer intervenção deve ser calibrada com extrema cautela: desligá-lo completamente poderia levar à impulsividade ou ao esgotamento extremo.

Nem todos os macacos responderam da mesma forma ao estímulo aversivo, o que sugere uma variabilidade individual na sensibilidade ao stress e na ativação desse circuito. Essa diferença aponta para uma base biológica concreta para a vulnerabilidade ao bloqueio motivacional. Não é uma questão de carácter: é uma questão de conexões neuronais.

Adaptado de [https://www.nationalgeographic.pt/ciencia/cerebro-descoberto-botao-que-nos-faz-procrastinar\\_6764](https://www.nationalgeographic.pt/ciencia/cerebro-descoberto-botao-que-nos-faz-procrastinar_6764)

1. No trecho “...mas algo dentro de nós se recusa a dar o primeiro passo”, o vocábulo em destaque é uma conjunção que estabelece uma relação de
  - a) adição, pois complementa a ideia de que compreendemos a urgência da tarefa.
  - b) explicação, justificando por que sabemos o que é preciso fazer.
  - c) conclusão, fechando o raciocínio sobre a recompensa da atividade.
  - d) oposição ou contraste, indicando que, apesar de entendermos a tarefa, a ação não ocorre.
2. De acordo com a compreensão geral do texto, o sintoma conhecido como “abulia” é caracterizado como
  - a) uma falha na avaliação do valor de uma meta ou recompensa.
  - b) a incapacidade de iniciar ações, mesmo quando a pessoa entende a importância delas.
  - c) um comportamento impulsivo gerado pelo desligamento do circuito cerebral.
  - d) uma reação de preguiça comum a todos os seres humanos diante de tarefas fáceis.
3. No período “É uma barreira invisível, muitas vezes intransponível, que separa o pensamento da ação”, a oração iniciada pelo pronome relativo “que” exerce a função de
  - a) oração subordinada substantiva objetiva direta.
  - b) oração subordinada adverbial consecutiva.
  - c) oração subordinada adjetiva restritiva.
  - d) oração coordenada sindética explicativa.

4. Analisando a concordância verbal e a estrutura do sujeito no trecho “Uma conexão entre duas regiões profundas do cérebro parece ser a responsável pelo bloqueio...”, caso o núcleo do sujeito fosse alterado para o plural (“conexões”), a forma verbal correta para manter a norma culta seria
- parecem, concordando com o núcleo do sujeito “conexões”.
  - parecem, concordando com o termo preposicionado “regiões profundas”.
  - parece, pois o verbo deve obrigatoriamente ficar no singular após o artigo “uma”.
  - parecera, mantendo a concordância com o sentido de dúvida do texto.
5. No fragmento “...inibir esta conexão em macacos treinados com tarefas difíceis restaurou a sua vontade de agir...”, o emprego do pronome possessivo “sua” refere-se anaforicamente à/aos
- tarefas difíceis.
  - conexão cerebral.
  - macacos treinados.
  - vontade de agir.

## Matemática

6. Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & x & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ . Sabendo que o determinante da matriz A é igual a 1, então o valor de x é igual a
- 5
  - 6
  - 7
  - 8
7. Considere a equação  $x^2 - x - 12 = 0$ . A soma das raízes da equação é igual a:
- 7
  - 5
  - 3
  - 1

## Informática Básica

8. Considere a imagem a seguir, que representa parte do grupo “Área de Transferência” disponível no Microsoft Word 365 (versão português):




Fonte: Grupo Área de Transferência – Microsoft Word 365 (versão português).

Nesse contexto, relacione corretamente os atalhos de teclado com as ações correspondentes e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. (O sinal de + representa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- Ctrl + C
  - Ctrl + V
  - Ctrl + X
  - ( ) Colar.
  - ( ) Recortar.
  - ( ) Copiar.
- 1 – 2 – 3.
  - 2 – 1 – 3.
  - 2 – 3 – 1.
  - 3 – 1 – 2.

9. Considere a imagem a seguir, que apresenta um painel de despesas pessoais criado no Microsoft Excel 365 (versão português).



Fonte: Gráfico de despesas pessoais – Microsoft Excel 365 (versão português).

Com base nas características apresentadas, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de gráfico utilizado na planilha.

- Gráfico de Linhas.
- Gráfico de Colunas.
- Gráfico de Dispersão.
- Gráfico de Barras.

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.  
No PowerPoint 365, o recurso \_\_\_\_\_ controla a forma como um slide \_\_\_\_\_ para o próximo, permitindo ajustar a \_\_\_\_\_ do efeito e escolher o \_\_\_\_\_ em que será aplicado.

a) transições / avança / duração / slide  
b) animações / aparece / cor / texto  
c) slide mestre / organiza / posição / tema  
d) exibição / altera / cor / objeto

## Conhecimentos Gerais

11. De acordo com a Lei Orgânica de Congonhinhas/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente \_\_\_\_\_, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Município e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso \_\_\_\_\_ dos recursos ambientais.

a) equilibrado / racional  
b) degradado / racional  
c) equilibrado / irracional  
d) insustentável / irracional

12. De acordo com o artigo 150 da Lei Orgânica de Congonhinhas/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da \_\_\_\_\_, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para \_\_\_\_\_.

a) justiça / a vida adulta  
b) iniciativa privada / as férias  
c) sociedade / o trabalho  
d) imprensa / o ensino superior

## Conhecimentos Específicos

13. Durante a consulta de pré-natal de uma gestante de 26 semanas, o enfermeiro realizou a ausculta fetal com o estetoscópio de Pinard e registrou uma frequência cardíaca fetal de 100 bpm. Sobre esse achado, assinale a alternativa correta.

a) Com 26 semanas ainda não é possível auscultar a frequência cardíaca fetal com o estetoscópio de Pinard, portanto, o registro deve ser desconsiderado.  
b) A frequência cardíaca fetal de 100 bpm é compatível com os valores normais para essa idade gestacional, indicando boa vitalidade.  
c) A frequência de 100 bpm caracteriza bradicardia fetal e deve acionar um alerta, pois pode indicar possível sofrimento fetal.  
d) A frequência registrada corresponde a taquicardia fetal, exigindo encaminhamento imediato para um serviço de maior complexidade.

14. A infecção pela hepatite B é um problema de saúde pública no Brasil e exige atenção especial devido ao seu potencial de transmissão para o recém-nascido. No pré-natal, o rastreamento de infecções transmissíveis é realizado para prevenir complicações maternas e reduzir o risco de transmissão vertical. Acerca do rastreamento e do manejo da hepatite B na gestação, assinale a alternativa correta.

a) O HBsAg deve ser coletado em gestantes que desconhecem seu histórico vacinal contra hepatite B.  
b) O anti-HbsAg deve ser solicitado nos exames pré-concepcionais, na primeira consulta de pré-natal, e ser repetido no terceiro trimestre.  
c) Toda gestante com HBsAg reagente e com idade menor que 20 anos deve receber a vacina para hepatite B.  
d) Gestantes com HBsAg reagente e com HBeAg reagente devem ser encaminhadas ao serviço de referência para gestação de alto risco.

15. Com base no Calendário Nacional de Vacinação, considere uma criança de 2 anos que não recebeu nenhuma dose anterior da vacina pneumocócica 10-valente (conjugada). Assinale a alternativa que corresponde ao esquema indicado para essa situação.

a) Administração de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.  
b) Administração de duas doses, respeitando intervalo mínimo de 60 dias entre cada aplicação.  
c) Administração de uma dose inicial, seguida de uma dose de reforço após 3 meses.  
d) Administração de dose única.

16. Um paciente de 70 anos foi internado na clínica cirúrgica após sofrer uma queda em sua residência, resultando em fratura no membro inferior direito e necessidade de intervenção cirúrgica. Devido ao quadro, o paciente apresenta limitação importante do movimento. O enfermeiro de plantão identificou o diagnóstico de enfermagem: mobilidade física prejudicada. Considerando esse diagnóstico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. São intervenções de enfermagem adequadas para esse diagnóstico:

I. remover estímulos que criem excesso de estimulação sensorial.  
II. monitorar sinais e sintomas de infecção.  
III. monitorar a circulação, o movimento e a sensibilidade da extremidade afetada.  
IV. manter medidas de segurança no leito, como elevar as grades laterais quando houver risco de queda.

a) Apenas I e III estão corretas.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III e IV estão corretas.  
d) Apenas IV está correta.

17. A hipertensão arterial resistente (HAR) é caracterizada pela dificuldade em alcançar o controle adequado da pressão arterial (PA), mesmo com tratamento otimizado. Dessa forma, considera-se uma hipertensão arterial resistente e refratária quando
- o paciente necessita do uso de um bloqueador do sistema renina-angiotensina para alcançar o controle da PA, e possui outras comorbidades, como obesidade.
  - a PA permanece acima das metas recomendadas, após seis meses de tratamento intensivo adequado com três fármacos de diferentes classes.
  - a PA permanece acima das metas recomendadas, mesmo após um ano de tratamento farmacológico convencional.
  - o paciente necessita do uso isolado de um bloqueador do receptor de angiotensina para obter o controle da PA.
18. Considere um paciente acamado, apresentando rebaixamento do nível de consciência devido ao uso de medicações. Durante a realização dos cuidados orais, qual posição mais indicada para esse caso?
- Posição decúbito lateral.
  - Posição de Sims.
  - Posição supina.
  - Posição Trendelenburg.
19. A Escala de Coelho-Savassi é um instrumento utilizado na Atenção Primária à Saúde para classificação do risco familiar, considerando sentinelas de risco relacionadas a aspectos clínicos, epidemiológicos, sanitários e sociais, com o objetivo de orientar o planejamento das ações das equipes de saúde. Sobre essa escala, assinale a alternativa incorreta.
- Um escore total igual ou superior a 9 pontos classifica a família como risco máximo.
  - A presença de hipertensão arterial sistêmica é considerada uma sentinela de risco e pontua 1 ponto na escala.
  - A sentinela de risco relacionada à drogadição se justifica por sua relevância epidemiológica, sanitária e impacto na dinâmica familiar.
  - A presença de lactente com idade inferior a 6 meses, até 5 meses e 29 dias, é considerada uma sentinela de risco na escala.
20. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.  
Uma paciente internada em uma clínica médica apresenta icterícia. Após exames laboratoriais, identificou-se uma infecção por hepatite A, que é uma infecção \_\_\_\_\_, transmitida via \_\_\_\_\_, com período médio de incubação de \_\_\_\_\_ dias.
- bacteriana / parental / 45
  - viral / sexual / 15
  - viral / vertical / 50
  - viral / fecal-oral / 30
21. De acordo com o Protocolo de Manchester, utilizado para triagem de risco no acolhimento hospitalar, cada cor indica o tempo máximo de espera recomendado para atendimento. Nesse protocolo, assinale a alternativa que corresponde ao tempo máximo de espera de 60 minutos.
- Amarelo.
  - Laranja.
  - Verde.
  - Azul.
22. Em uma unidade de saúde, durante a administração de medicamentos, a enfermeira identifica que a prescrição médica apresenta uma dose incompatível com a terapêutica indicada, oferecendo risco potencial ao paciente. Levando em consideração o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, qual deve ser a conduta da enfermeira nessa situação?
- Recusar-se a executar a prescrição e comunicar imediatamente o erro ao prescritor, registrando a intercorrência.
  - Registrar a divergência no prontuário e aguardar orientações posteriores, sem interromper o fluxo do atendimento.
  - Realizar o procedimento apenas se houver protocolo institucional específico para esse tipo de situação.
  - Manter a administração da medicação, priorizando o cumprimento da prescrição para não atrasar o cuidado.
23. A escolha do método contraceptivo deve considerar as condições clínicas da paciente, garantindo a sua segurança e eficácia. A enfermagem pode orientar a mulher sobre os métodos mais adequados para sua situação. Sobre a elegibilidade dos contraceptivos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Para a paciente com hipertensão arterial controlada e em acompanhamento, os anticoncepcionais combinados com estrogênio são totalmente seguros e recomendados.
  - Mulheres amamentando com menos de 6 semanas do parto não devem utilizar anticoncepcionais combinados, sejam orais ou injetáveis.
  - Em pacientes com histórico atual de TEP/TVP, indica-se o DIU de cobre e métodos de barreira.
  - Pacientes com câncer de mama não devem usar nenhum tipo de anticoncepcional oral ou injetável.
- F – F – V – V.
  - F – V – V – V.
  - V – V – F – F.
  - V – F – V – F.
24. A promoção da saúde busca melhorar a qualidade de vida das populações, por meio de ações de proteção e prevenção direcionadas a diferentes condições de saúde. Nesse contexto, para o HIV, são medidas de prevenção secundária, exceto:
- realizar monitoramento laboratorial com contagem de LT-CD4+ e carga viral.
  - realizar investigação de tuberculose.
  - indicar profilaxia pré-exposição (PrEP).
  - iniciar tratamento com antirretrovirais.



25. Os resíduos de serviços de saúde classificados no Grupo A incluem materiais com risco biológico e são subdivididos em diferentes subgrupos (A1 a A5). Com relação à classificação desses subgrupos, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Peças anatômicas do ser humano (membros).
  2. Culturas e estoques de microrganismos.
  3. Tecidos de alta infectividade para príons.
  4. Peças anatômicas de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos.
  5. Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração.
- ( ) Subgrupo A1.  
 ( ) Subgrupo A2.  
 ( ) Subgrupo A3.  
 ( ) Subgrupo A4.  
 ( ) Subgrupo A5.
- a) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
  - b) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
  - c) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.
  - d) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.
26. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM) reúne diretrizes e objetivos voltados à promoção de cuidados integrais à saúde feminina, fortalecendo a autonomia das mulheres e garantindo atenção qualificada em todas as fases da vida. Um dos objetivos específicos da PNAISM é promover a atenção à saúde da mulher negra. Quanto a esse objetivo, assinale a alternativa que corresponde a uma estratégia alinhada a ele.
- a) Implantar o Programa de Anemia Falciforme (PAF/MS), dando ênfase às especificidades das mulheres em idade fértil e no ciclo gravídico-puerperal.
  - b) Ampliar o acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais.
  - c) Construir, em parceria com outros atores, um Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal.
  - d) Melhorar a informação sobre a magnitude e tendência da mortalidade materna.
27. Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro da equipe 1 identifica um grande número de pacientes tabagistas em sua área de cobertura. Para promover a saúde dessa população, ele organiza um grupo de apoio ao tabagista na unidade. De acordo com esse caso, qual diretriz da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) está sendo aplicada pelo profissional?
- a) Participação social, quando as intervenções consideram a visão de diferentes grupos na identificação de problemas e soluções, atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, execução e avaliação das ações.
  - b) Planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, com base no reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades, para promover espaços de produção social, ambientes saudáveis, equidade, direitos humanos e justiça social.
  - c) Intersetorialidade, no processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns.
- d) Sustentabilidade, com permanência e continuidade de ações e intervenções, levando em consideração as dimensões política, econômica, social, cultural e ambiental.
28. Conforme as diretrizes do processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Relatório de Gestão é um instrumento de gestão de elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS) e orientar eventuais redirecionamentos no Plano de Saúde. Nesse sentido, o Relatório de Gestão contemplará os seguintes itens, exceto:
- a) as metas da PAS previstas e executadas.
  - b) a análise da execução orçamentária.
  - c) a análise situacional do Plano de Saúde, orientada pelos temas contidos no Mapa da Saúde.
  - d) as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde.
29. O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um documento que permite a identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a organização das informações e para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde. O cadastramento de usuários no sistema do CNS diz respeito à uma ação pertencente a qual dimensão de atuação da Política Nacional de Regulação do SUS?
- a) Regulação de Sistemas de Saúde.
  - b) Regulação da Atenção à Saúde.
  - c) Regulação do Acesso à Assistência.
  - d) Regulação de Tecnologias em Saúde.
30. As unidades sentinelas para Síndromes Gripais (SG) têm papel importante na Vigilância Epidemiológica de vírus respiratórios ao monitorar a circulação desses vírus por meio da coleta semanal de amostras clínicas de pacientes atendidos com quadro compatível com SG e enviando-as em tempo oportuno ao laboratório de referência local. Considerando que uma determinada unidade registrou 12 coletas semanais dentro do período avaliado, esse resultado se enquadra em qual indicador?
- a) Excelente.
  - b) Bom.
  - c) Muito bom.
  - d) Baixo.
31. Um paciente adulto deu entrada no pronto atendimento após sofrer uma mordida profunda no tronco à esquerda enquanto separava uma briga entre seus próprios cães em casa. Com base nas informações colhidas com o paciente, o animal possui vacinação antirrábica em dia. Nesse caso, qual é o esquema recomendado de profilaxia da raiva humana?
- a) Lavar a ferida apenas com água e sabão.
  - b) Lavar a ferida com água e sabão e manter o animal em observação por 10 dias.
  - c) Lavar a ferida com água e sabão e indicar vacinação e soro antirrábico.
  - d) Lavar a ferida com água e sabão e indicar apenas soro antirrábico.

32. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com a RDC nº 36/2013, que institui as ações voltadas para a segurança do paciente, compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:
- acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
  - estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
  - monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde.
  - promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde.
- Apenas I e IV estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - Apenas III está correta.
  - Todas estão corretas.
33. A comunicação terapêutica é a base para uma série de interações planejadas e sistematizadas pelo enfermeiro no manejo da saúde mental. Segundo Peplau, o relacionamento terapêutico ocorre em diferentes fases. Considerando essas fases, qual das alternativas descreve corretamente a fase de pré-interação?
- Fase em que o enfermeiro e o paciente estabelecem metas de cuidado e definem estratégias para atingi-las.
  - Momento em que o enfermeiro obtém informações iniciais sobre o paciente e sua família, construindo a primeira impressão.
  - Momento em que paciente e enfermeiro vivenciam a conclusão das metas, percebendo melhora no desempenho social e maior senso de independência.
  - Fase de conhecimento mútuo, na qual o paciente é esclarecido sobre objetivos da relação e contrato de sigilo.
34. As intoxicações por cianeto podem resultar da exposição a produtos químicos ou da inalação de gases tóxicos durante incêndios, a identificação e o uso do antídoto em tempo oportuno são fundamentais para a redução da mortalidade. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica um antídoto para a intoxicação por cianeto.
- Bicarbonato de sódio.
  - Álcool etílico.
  - Dimercaprol.
  - Hidroxicobalamina.
35. Com relação à biomecânica e da cinemática do trauma facial, levando em conta a anatomia óssea da face, os vetores de impacto e sua relação com a dissipação de energia e o risco de lesões associadas, assinale a alternativa incorreta.
- O osso frontal é o menos espesso da face, apresentando menor tolerância aos impactos e menor resistência ao trauma.
  - Os impactos laterais na face estão associados a maior frequência de fraturas quando comparados aos impactos frontais.
  - Devido à conformação anatômica da face e à transmissão de energia do impacto, as fraturas faciais podem ser consideradas indicativas para ocorrência de traumatismo cranioencefálico (TCE).
  - Os ossos da face, por serem parcialmente preenchidos por ar, funcionam como um coxim de proteção, auxiliando na absorção e dissipação da energia do impacto, contribuindo para a proteção do encéfalo.
36. Nesse grupo populacional, o trauma torácico pode passar despercebido, pois o gradeado costal é bastante flexível, ocasionando menor lesão óssea e maior risco de lesão parenquimatosa, como contusão pulmonar, pneumotórax e hemotórax. A que grupo populacional o enunciado se refere?
- Pediátrico.
  - Gestantes.
  - Idosos.
  - Obesos.
37. A lidocaína é um antiarrítmico utilizado em situações específicas de emergências, especialmente quando se busca controlar arritmias refratárias após intervenções iniciais. Conforme a *American Heart Association* (AHA), nos ritmos chocáveis, qual é a dose de ataque recomendada de lidocaína para o público pediátrico?
- 0,01 mg/kg.
  - 1 mg/kg.
  - 1,5 mg/kg.
  - 0,75 mg/kg.
38. Um paciente adulto internado na unidade de cuidados intensivos foi avaliado pelo enfermeiro de plantão utilizando a Escala de Coma de Glasgow. Durante a avaliação, observou-se resposta motora em descerebração, ausência de resposta verbal e abertura ocular apenas ao estímulo doloroso. Com base nessa avaliação, preencha o formulário com a pontuação do paciente em cada parâmetro e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ☐ Resposta motora.
  - ☐ Resposta verbal.
  - ☐ Abertura ocular.
  - ☐ 1 – 0 – 0.
  - ☐ 3 – 1 – 1.
  - ☐ 3 – 0 – 1.
  - ☐ 2 – 1 – 2.
39. A destruição do tecido muscular esquelético na rabdomiólise provoca a liberação de substâncias, como o potássio, que podem afetar o sistema cardiovascular. Nesse sentido, qual é o principal risco associado ao aumento de potássio circulante?
- Pode causar bradicardia devido à acidose metabólica.
  - Aumenta o risco de arritmias por hiperpotassemia.
  - Provoca choque hipovolêmico.
  - Pode levar à parada cardiorrespiratória em casos graves de hipocalemia.
40. O manejo do diabetes melito tipo 2 (DM2) demanda metas glicêmicas específicas para reduzir o risco de complicações agudas e crônicas, além de promover adequado controle metabólico. Acerca das metas recomendadas para criança e adolescente com DM2, assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores-alvo para HbA1c, glicemia de jejum, glicemia 2 horas pós-prandial e glicemia ao deitar, respectivamente:
- < 6,0%, 90-130mg/dL, < 170 mg/dL e 110-200 mg/dL.
  - < 7,5%, 80-150mg/dL, < 90 mg/dL e 90-180 mg/dL.
  - < 7,0%, 70-130mg/dL, < 180 mg/dL e 90-150 mg/dL.
  - < 8,0%, 50-110mg/dL, < 180 mg/dL e 100-180 mg/dL.



