

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 05
Matemática	06 a 07
Informática Básica	08 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Neurociência e estudos de biologia evolutiva indicam: autismo pode ser o próximo passo da evolução humana

A compreensão contemporânea do Transtorno do Espectro Autista (TEA) atravessa um momento de ruptura paradigmática. Apesar de historicamente ser enquadrado principalmente sob a ótica de alterações cerebrais que dificultam a vida em sociedade, agora o autismo começa a ser reavaliado. Novas correntes da Psicologia Evolucionista e da Genética de Populações começam a apontar a possibilidade de se tratar de uma variação estratégica que está sendo mantida, e talvez até amplificada, pela seleção natural.

Afinal, esse transtorno de desenvolvimento, que costuma causar dificuldades de comunicação, de interação social e alterações sensoriais significativas, muitas vezes também está acompanhado de habilidades notáveis. E o aumento de indivíduos com capacidades excepcionais de sistematização e reconhecimento de padrões sugere que o futuro da organização social humana poderá ser profundamente influenciado pela neurodivergência.

Evolução de neurônios e genes

A base para essa hipótese foi reforçada com o trabalho seminal de Starr e Fraser, da universidade de Stanford, publicado recentemente na revista científica *Molecular Biology and Evolution*. Os autores fornecem um mecanismo celular preciso dessa mudança.

O estudo analisou um tipo de neurônio excitatório (que libera sinais para ativar outros neurônios) do neocórtex, algo crucial para a cognição humana complexa. Eles descobriram que esses neurônios evoluíram em uma velocidade excepcionalmente rápida na linhagem humana, em comparação com outros primatas.

O dado mais surpreendente que eles observaram é que essa evolução acelerada coincidiu com uma queda acentuada na expressão de genes cuja menor atividade está estatisticamente associada a um maior risco de diagnóstico de TEA.

Isso indica que a evolução responsável por altas funções cognitivas pode ter tido como trade-off evolutivo a redução na expressão de genes protetores do neurodesenvolvimento. Ou seja, as mesmas pressões seletivas que refinaram a inteligência humana e nossa capacidade de processamento complexo aumentaram, como subproduto, a prevalência de traços autísticos. Isso nos faz pensar que no ambiente ancestral, esse perfil cognitivo provavelmente oferecia vantagens evolutivas vitais.

Outros indícios e teorias

Um fenômeno que corrobora essa visão evolutiva é o aumento expressivo na prevalência do autismo. Dados do Centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada dentro desse espectro.

Embora parte desse crescimento se deva à mudança nos critérios diagnósticos e maior conscientização, há um debate na comunidade científica se não podem haver outros fatores que estejam contribuindo para esses números. A tendência tem sido relatada em muitos estudos, principalmente em países de alta renda como EUA, Reino Unido, Dinamarca, Coreia do Sul e Japão.

Diferente de hipóteses pseudocientíficas e ambientais sem comprovação, como a hipótese ambiental sugerida pelo secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy, os dados apresentados por Starr e Fraser sugerem que pode haver um

aumento real impulsionado pelos mecanismos genéticos descritos anteriormente.

O psicólogo e neurocientista Britânico Simon Baron-Cohen propôs a teoria do acasalamento assortativo. Segundo ela, a sociedade moderna, ao agrupar pessoas com traços de personalidade “sistematizadores” em polos tecnológicos e universidades, facilita a união reprodutiva entre indivíduos com perfil genético semelhante. O resultado seria um aumento na frequência de descendentes que herdaram uma “dose dupla” de genes associados a altas habilidades de sistematização, o que também eleva a probabilidade de manifestação do autismo.

Um futuro neurodivergente?

Mesmo que perfis com alto poder cognitivo sejam apenas uma parte do espectro do TEA, proponho aqui pensarmos sobre a possibilidade de um cenário distópico. Caso a seleção natural favoreça mesmo cada vez mais nascimentos de gênios neurodiversos e menos de pessoas com fenótipos alternativos, esse futuro hipotético traz implicações sociológicas interessantes.

Afinal, como a sociedade estaria preparada para essa inversão, caso o que é considerado o funcionamento cerebral típico de hoje se tornasse o atípico de amanhã (e vice-versa)?

É possível recair num argumento sensacionalista, sobre os perigos do surgimento de uma elite cognitiva que poderia passar a ver a população que atualmente é considerada neurotípica como ineficiente.

Mas, paradoxalmente, essa ideia entra em conflito com uma das principais reivindicações atuais da comunidade autista: o combate ao capacitismo. Ele argumenta que o reconhecimento de que valor humano, dignidade e direito à participação social não dependem de produtividade, genialidade ou adaptação a modelos normativos.

Em conclusão, o autismo parece ser parte integrante e crescente da nossa evolução. Os sistemas educacionais, que hoje enfrentam grande dificuldade na inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais, precisam ser aprimorados urgentemente.

Devemos considerar as diferenças como um aspecto positivo da diversidade humana. Uma sociedade verdadeiramente evoluída não é aquela que seleciona os “gênios”, mas aquela que é capaz de ser inclusiva, garantindo dignidade e espaço para todos os tipos de mentes. Essa é a condição essencial para o futuro da humanidade.

Disponível em <https://theconversation.com/neurociencia-e-estudos-de-biologia-evolutiva-indicam-autismo-pode-ser-o-proximo-passo-da-evolucao-humana-272539>

1. **Análise: “A compreensão contemporânea do Transtorno do Espectro Autista (TEA) atravessa um momento de ruptura paradigmática”, e assinale a alternativa que apresenta a função morfológica de “contemporânea”.**

- a) Substantivo, pois nomeia um período de tempo específico.
- b) Adjetivo, pois caracteriza o substantivo “compreensão”, indicando que ela é atual ou do tempo presente.
- c) Advérbio de tempo, pois indica quando a ruptura ocorre no texto.
- d) Artigo definido, pois determina o gênero e o número do termo seguinte.



2. De acordo com a organização do texto e os elementos de coesão no parágrafo, o vocábulo “afinal” inicia a frase para estabelecer uma relação de
- adição de informações sobre a elite cognitiva.
 - conclusão lógica sobre o surgimento de gênios neurodiversos.
 - retomada argumentativa, classificado como advérbio de valor discursivo.
 - explicação detalhada sobre o funcionamento cerebral típico.
3. No fragmento “...esse transtorno de desenvolvimento, que costuma causar dificuldades de comunicação...”, presente no parágrafo, o emprego das vírgulas para isolar a oração iniciada pelo pronome relativo “que” permite classificá-la sintaticamente como
- oração subordinada adjetiva restritiva, limitando o conceito de transtorno.
 - oração subordinada adjetiva explicativa, pois adiciona uma característica inerente ou um esclarecimento ao termo antecedente.
 - oração subordinada substantiva objetiva direta, funcionando como complemento do verbo.
 - oração coordenada sindética explicativa, ligando ideias independentes.
4. Analise: “Um futuro neurodivergente?”, o autor utiliza o verbo “propor” na primeira pessoa: “proponho aqui pensarmos...”. De acordo com as regras de flexão verbal de verbos derivados de “pôr”, caso a ideia fosse expressa no futuro do subjuntivo na 3ª pessoa do plural, a forma correta seria
- se eles propuserem.
 - se eles proporem.
 - se eles propusessem.
 - se eles proporão.
5. Analisando a concordância verbal no trecho “Dados do Centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada dentro desse espectro”, a regra aplicada para o verbo “indicar” e para a locução “1 em cada 36” justifica-se porque
- o verbo “indicar” está no plural para concordar com o núcleo do sujeito “Dados”.
 - o verbo “ser” (é) está no singular por concordar obrigatoriamente com o numeral “36”.
 - o termo “indicam” é um caso de concordância ideológica (silepse de número) com o CDC.
 - o verbo “indicar” concorda com o núcleo “Dados”, e a expressão “é diagnosticada” mantém-se no singular concordando com o numeral “1”.

Matemática

6. Em um experimento de uma feira de ciências, foram comparados os volumes de um bloco retangular com dimensões 10 cm, 10 cm e 12 cm com o de uma pirâmide de base quadrada com arestas de 10 cm e altura h . Sabendo que o volume da pirâmide era igual ao do bloco retangular, assinale a alternativa que representa a altura h .
- 20 cm
 - 24 cm
 - 30 cm


- d) 36 cm
7. Três números foram colocados em sequência a partir de uma progressão geométrica. Sabendo que o primeiro número da sequência é 10, a razão é um número positivo e a soma dos três números corresponde a 130. Com isso, assinale a alternativa que apresenta corretamente a razão dessa progressão geométrica.
- 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

Informática Básica

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
No Windows 10, a Barra de Tarefas integra funções essenciais para o uso do sistema. O _____ centraliza o acesso a programas e configurações, enquanto _____ reúne ícones de aplicativos em segundo plano, incluindo controle de _____. Já _____ exibem alertas instantâneos sobre atividades do sistema e aplicativos.
- menu iniciar / a bandeja do sistema / data e hora / as notificações rápidas
 - painel de controle / a área de trabalho / relógio / as notificações rápidas
 - explorador de arquivos / as notificações rápidas / painel de controle / a data e hora
 - gerenciador de tarefas / as notificações rápidas / menu iniciar / a barra de títulos
9. Considere o seguinte cenário: após um forte temporal em Congoninhas, muitos moradores perceberam que seus aparelhos celulares e computadores continuaram funcionando normalmente, porém sem acesso à internet. Reiniciar os dispositivos não resolveu e diferentes pessoas da mesma região relataram dificuldades semelhantes. Com base no cenário apresentado, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A interrupção do serviço pode ter sido causada por falhas externas à residência, como danos na rede provocados pelo temporal.
 - Quando diversos usuários da mesma área enfrentam o mesmo problema, é provável que a causa esteja fora do equipamento do usuário.
 - É aconselhável entrar em contato com a operadora para registrar a ocorrência, para que ela possa restabelecer o serviço.
 - Verificar o funcionamento interno da casa (modem, roteador e cabos) é válido e pode resolver o problema de acesso.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.



10. Considere a tela de impressão do Microsoft Word 365 (versão português) apresentada na imagem a seguir:



Fonte: Microsoft Word 365 (versão português).

Considerando essas informações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A opção “Imprimir em Um Lado” indica que o documento será impresso apenas em um lado da folha, sendo necessário selecionar manualmente a opção de impressão frente e verso, quando essa funcionalidade for suportada pela impressora.
- () O campo “Páginas” permite inserir intervalos e páginas alternadas, como 1,3,5 ou 2-4, não se limitando a números consecutivos.
- () A configuração “Orientação Retrato” determina que o conteúdo será impresso verticalmente, podendo ser alterada para Paisagem conforme a necessidade do documento.
- () O tamanho A4 (210 x 297 mm) não pode ser alterado pelo usuário, mesmo que a impressora ofereça outros formatos compatíveis.
- a) V – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) F – F – V – V.

Conhecimentos Gerais

11. De acordo com o artigo 144 da Lei Orgânica de Congoninhas/PR, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta. As ações e serviços de saúde pública integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
- () Centralização estadual dos recursos, serviços e ações com posterior regionalização deles.
- () Integridade na prestação das ações preventivas e curativas.
- () Participação da comunidade, na forma da Lei.
- a) V – V – V.
b) F – V – V.
c) F – F – V.
d) F – F – F.
12. A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena realizado anualmente no Brasil, sempre no dia 31 de dezembro, e costuma atrair milhões de apostadores em busca de prêmios bilionários. Em sua edição mais recente, o sorteio bateu recorde histórico e se tornou o maior já realizado no país. Qual foi o valor aproximado do prêmio principal sorteado na última Mega da Virada?
- a) R\$ 1,91 bilhão.
b) R\$ 800 milhões.
c) R\$ 1,09 bilhão.
d) R\$ 910 milhões.

Conhecimentos Específicos

13. De acordo com a Lei nº 11.889/2008, compete ao Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), sempre sob supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal:
- a) processar filme radiográfico.
- b) realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica de flúor.
- c) fazer a remoção do biofilme (placa bacteriana) de acordo com indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
- d) inserir e distribuir materiais odontológicos no preparo cavitário para restauração dentária direta.
14. Sobre o papel da saliva na proteção contra a cárie dentária, assinale a alternativa correta.
- a) A viscosidade salivar não influencia a limpeza da cavidade bucal; saliva espessa e saliva fluida apresentam a mesma capacidade de remoção de carboidratos.
- b) A principal proteção química da saliva ocorre porque ela remove totalmente as bactérias cariogênicas, independentemente do fluxo salivar.
- c) A saliva contribui para a proteção do dente por mecanismos físicos (limpeza/diluição de ácidos), químicos (tampões e disponibilidade de cálcio, fosfato e flúor para remineralização) e antibacterianos (imunoglobulinas e outras substâncias).
- d) A redução do fluxo salivar (por doença, medicamentos ou radioterapia) não altera o risco de cárie, desde que o paciente realize escovação diária.

- 15. Sobre a aplicação de verniz fluoretado, assinale a alternativa correta.**
- O verniz fluoretado é sensível à umidade, portanto a aplicação só deve ocorrer após isolamento absoluto e ausência completa de saliva.
 - Entre os materiais indicados estão verniz de fluoreto de sódio a 5%, microaplicador (ou seringa aplicadora), gaze/roletes de algodão e sugador de saliva; o verniz pode ser aplicado na presença de saliva, sendo o sugador principalmente para conforto do paciente.
 - A primeira etapa do procedimento é aplicar o verniz diretamente sobre os dentes e, somente após, obter o consentimento informado do paciente.
 - Recomenda-se aplicar 2 a 3 mL de verniz por dente, com tempo de aplicação superior a 10 minutos para garantir efetividade.
- 16. Sobre a conduta após acidente com material perfurocortante/material biológico na prática odontológica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- ☐ A profilaxia pós-exposição (PEP) para HIV deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras 2 horas, tendo como limite até 72 horas após a exposição.
 - ☐ Após o acidente, recomenda-se provocar sangramento do local e utilizar agentes cáusticos, pois reduzem o risco de infecção.
 - ☐ O atendimento após exposição ocupacional deve ser considerado urgência, devendo o profissional procurar imediatamente serviço/centro de referência para avaliação do risco e definição de conduta.
 - ☐ O risco médio estimado de transmissão ocupacional do HIV é de aproximadamente 0,3% após exposição percutânea e 0,09% após exposição em mucosas.
- V – F – V – V.
 - V – V – F – V.
 - F – F – V – V.
 - V – F – V – F.
- 17. Sobre a avaliação da necessidade de flúor no contexto da prevenção da cárie, assinale a alternativa correta.**
- É utilizada apenas para fins administrativos, sem relação com envolvimento do paciente na prevenção da cárie.
 - Padroniza a terapia com flúor para todos os pacientes, independentemente do risco de cárie, evitando variações de conduta.
 - Substitui a anamnese e o exame clínico, pois o uso do flúor é definido exclusivamente pela idade.
 - Tem como objetivo principal identificar fatores de risco, melhorar a comunicação profissional-paciente e individualizar a terapia com flúor, permitindo seleção mais adequada do método preventivo.
- 18. No monitoramento químico da esterilização por vapor saturado em autoclave pré-vácuo, assinale a alternativa correta sobre o teste Bowie-Dick (classe II).**
- É utilizado para verificar a eficácia do processo em autoclaves por gravidade e deve ser realizado semanalmente, após a última carga do dia.
 - É utilizado para detectar falhas na remoção de ar/penetração de vapor em autoclaves pré-vácuo e deve ser realizado diariamente, antes da primeira carga processada.
 - É utilizado para confirmar esterilidade do material, substituindo o indicador biológico quando houver mudança uniforme de cor.
 - Deve ser colocado dentro de cada pacote a ser esterilizado, no ponto de maior dificuldade de penetração do vapor.
- 19. Sobre fundamentos e diretrizes da Atenção Básica na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- A PNAB considera Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos equivalentes.
 - A Atenção Básica é principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, atuando como coordenadora do cuidado.
 - A territorialização na Atenção Básica pressupõe atendimento sem população adscrita, sendo vedado estabelecer equipe de referência para famílias e grupos do território.
 - A longitudinalidade do cuidado e a população adscrita são diretrizes operacionalizadas na Atenção Básica.
 - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas III e V estão corretas.
 - Todas estão corretas.
- 20. Sobre o Programa Saúde na Escola, assinale a alternativa correta.**
- Foi instituído pela Lei nº 8.080/1990 e restringe-se à realização de atendimentos clínicos odontológicos dentro da escola.
 - É um programa exclusivo do Ministério da Educação, sem participação das equipes de saúde da Atenção Básica.
 - A gestão do PSE é centralizada apenas no nível federal, sem instâncias municipais ou estaduais de articulação intersetorial.
 - Foi instituído pelo Decreto nº 6.286/2007 e constitui uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, desenvolvida de forma integrada no território, com participação da Atenção Básica e da escola.

21. **Sobre a dentição decídua e suas características morfológicas, assinale a alternativa correta.**
- A dentição decídua é composta por 20 dentes, sendo 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior, e apresenta câmaras pulpares proporcionalmente maiores quando comparada à dentição permanente.
 - A dentição decídua é composta por 28 dentes, incluindo pré-molares, e apresenta coroas longas em relação ao comprimento total do dente.
 - Os dentes decíduos possuem esmalte mais espesso do que os permanentes e câmaras pulpares proporcionalmente menores, reduzindo risco de exposição pulpar.
 - Os dentes decíduos têm raízes curtas e espessas, com pouca constrição na junção amelocementária, o que facilita exodontias sem risco para o germe permanente.
22. **Sobre o uso do limpador ultrassônico na limpeza de instrumentais odontológicos, assinale a alternativa correta.**
- A atividade antimicrobiana de algumas soluções ultrassônicas desinfeta o instrumental, dispensando a etapa posterior de esterilização.
 - É recomendado utilizar desinfetantes comuns (ex.: desinfetante de superfície) no tanque ultrassônico, pois ajudam a “soltar” o sangue e os resíduos aderidos.
 - A solução do ultrassom pode ser usada por vários dias sem troca, desde que não esteja com odor, pois o ultrassom elimina os microrganismos presentes na cuba.
 - O limpador ultrassônico remove resíduos por cavitação (formação e implosão de microbolhas), devendo-se usar EPI completo (luvas utilitárias resistentes à perfuração, máscara, óculos e jaleco) e solução específica para ultrassom, conforme recomendação do fabricante.
23. **Sobre agentes ergonômicos e medidas para minimizar o risco ergonômico no trabalho odontológico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho e atos repetitivos são exemplos de fatores associados ao risco ergonômico e podem contribuir para adoecimento osteomuscular relacionado ao trabalho.
 - A organização do ambiente e o planejamento do atendimento diário contribuem para reduzir esforços desnecessários e melhorar o desempenho do trabalho, favorecendo condições mais seguras.
 - Trabalhar preferencialmente em equipe (ex.: odontologia a quatro mãos), quando possível, tende a reduzir movimentos de torção e alcances excessivos do operador, contribuindo para menor sobrecarga musculoesquelética.
 - A ausência de capacitação do pessoal auxiliar não interfere no risco ergonômico, pois a ergonomia depende exclusivamente da postura do cirurgião-dentista.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
24. **No projeto de implantação das equipes de Saúde da Família e/ou Saúde Bucal e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, deve constar, entre outros itens:**
- o território a ser coberto, com estimativa da população residente, definição do número de equipes e mapeamento das áreas.
 - a definição do valor do salário de cada profissional da equipe, detalhando gratificações e adicionais por produtividade.
 - a autorização para cobrança de taxas dos usuários atendidos na UBS para custear materiais e insumos.
 - a exigência de que todos os atendimentos da UBS sejam realizados apenas por demanda espontânea, sem planejamento/programação.
25. **Sobre o monitoramento biológico da esterilização por vapor saturado em autoclave, assinale a alternativa correta.**
- O monitoramento biológico em autoclave utiliza preferencialmente *Bacillus atrophaeus*, com leitura imediata ao final do ciclo, sem necessidade de incubação.
 - O indicador biológico deve ser colocado sempre na parte superior da câmara, pois é o ponto de menor temperatura e maior dificuldade de penetração do vapor.
 - O monitoramento biológico substitui os controles físicos e químicos do processo, sendo suficiente para liberar cargas sem outros registros.
 - O monitoramento biológico deve ser realizado com *Geobacillus stearothermophilus*, colocado no local mais desafiador para a esterilização (ex.: próximo ao dreno) e, na rotina, executado pelo menos semanalmente.
26. **Sobre o uso de barreiras mecânicas de superfície na prática odontológica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- As barreiras de superfície são especialmente importantes em áreas de contato clínico difíceis de limpar e, idealmente, devem ser impermeáveis para impedir a passagem de microrganismos provenientes de saliva, sangue e outros fluidos.
 - Filmes adesivos podem ser utilizados como barreira plástica para proteger superfícies lisas, como painéis digitais e interruptores do comando da cadeira ou do aparelho de radiografia.
 - Entre pacientes, ao remover e descartar as barreiras contaminadas, sempre é necessário limpar e desinfetar a superfície abaixo, independentemente de ter havido contato com a área protegida.
 - Mesmo com uso de barreiras, recomenda-se que as superfícies sejam limpas e desinfetadas no início e ao final do expediente.
- V – F – V – V.
 - V – V – F – V.
 - F – V – F – V.
 - V – V – V – F.

27. Sobre empacotamento e seleção de embalagens para esterilização em autoclave, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A embalagem deve permitir a penetração do agente esterilizante e proteger o artigo, mantendo a esterilidade até o momento da abertura.
 - Para esterilização em autoclave, é aceitável improvisar embalagens com papel toalha, papel manilha ou papel Kraft, desde que o ciclo seja válido.
 - Em embalagens do tipo papel grau cirúrgico/filme plástico (pouches) e nylon, recomenda-se remover o excesso de ar antes da selagem, pois o ar dificulta a transferência de calor e a penetração do vapor.
 - Pinças e tesouras devem ser esterilizadas com suas articulações fechadas, a fim de evitar deformações durante o ciclo.
 - A identificação das embalagens deve ser feita antes da esterilização, preferencialmente em etiqueta/fita própria, contendo informações como data, validade e responsável pelo processamento.
- Apenas I, III e V estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
28. Sobre a esterilização por vapor saturado sob pressão em autoclave, assinale a alternativa correta.
- As autoclaves gravitacionais removem o ar por meio de bomba de vácuo e são as mais frequentes na Odontologia no Brasil.
 - No carregamento da autoclave, os pacotes podem ser dispostos comprimidos e encostados nas laterais, desde que não ultrapassem 2/3 da capacidade da câmara.
 - Embalagens compostas por papel e filme devem ser colocadas com o papel para baixo, permitindo circulação do vapor e contato com todas as superfícies do material.
 - Após a conclusão do ciclo, o material deve ser retirado imediatamente, ainda com temperatura elevada, para evitar condensação.
29. Sobre o manejo de resíduos biológicos (Grupo A), conforme diretrizes de gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Resíduos provenientes da atenção à saúde com suspeita ou certeza de contaminação por agentes de classe de risco 4 devem ser acondicionados em sacos vermelhos, substituídos quando atingirem 2/3 da capacidade ou em até 24 horas, e submetidos a tratamento com nível elevado de inativação microbiana.
 - Materiais contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre podem ser descartados sem tratamento prévio em saco branco leitoso, desde que identificados corretamente.
 - Resíduos como luvas, máscaras e gazes sem sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, bem como determinados resíduos de procedimentos, podem ser acondicionados em saco branco leitoso e encaminhados para disposição final em local licenciado, sem necessidade de tratamento prévio.
 - Quando o tratamento do resíduo biológico ocorrer fora da unidade geradora, o acondicionamento para transporte deve utilizar recipiente rígido, resistente à punctura/ruptura/vazamento, com tampa e devidamente identificado.
- V – F – V – V.
 - V – V – F – V.
 - F – F – V – V.
 - V – F – F – V.
30. Sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme a RDC Anvisa nº 222/2018, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- O PGRSS é um documento que descreve as ações relativas ao gerenciamento dos RSS, contemplando etapas como geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final, além de ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente.
 - Todo serviço gerador de RSS deve dispor de PGRSS, observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal.
 - O serviço gerador deve manter cópia do PGRSS disponível para consulta apenas pelos órgãos de vigilância sanitária ou ambientais, não sendo necessária a consulta por funcionários, pacientes ou público em geral.
 - O PGRSS deve descrever ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes e também os programas de capacitação relacionados ao gerenciamento dos resíduos.
- V – F – F – V.
 - F – V – F – V.
 - V – V – F – V.
 - V – V – V – F.

31. Com base em um programa de odontologia preventiva abrangente, assinale a alternativa correta.
- Nutrição limita-se exclusivamente a reduzir o consumo de açúcar, sem considerar saúde geral ou orientações alimentares.
 - Controle de placa corresponde à remoção diária da placa bacteriana dos dentes e tecidos orais adjacentes.
 - Selantes são aplicados preferencialmente em superfícies lisas (vestibulares e linguais) por serem as mais suscetíveis a fissuras profundas.
 - Terapia com flúor inclui apenas o uso doméstico de dentifrício fluoretado, não envolvendo aplicação profissional nem água de abastecimento fluoretada.
32. Sobre as funções da Atenção Básica (AB) no funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A Atenção Básica é a principal porta de entrada e o centro de comunicação da RAS, atuando como coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
 - Coordenar o cuidado envolve elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da RAS, atuando como centro de comunicação entre esses pontos.
 - Conforme o Decreto nº 7.508/2011, as Portas de Entrada do SUS são, prioritariamente, os serviços hospitalares e ambulatoriais especializados, por serem de maior densidade tecnológica.
 - Ordenar as redes implica reconhecer as necessidades de saúde da população sob responsabilidade da AB e organizá-las em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para o planejamento e a programação a partir das necessidades das pessoas.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
33. Sobre os dentes anteriores permanentes, assinale a alternativa correta.
- Incluem incisivos centrais, incisivos laterais, caninos e pré-molares; não são sucessores e não apresentam cingulo.
 - Desempenham papel secundário na estética e não participam da fonação; sua principal função é triturar alimentos.
 - Incluem incisivos centrais, incisivos laterais e caninos; são dentes sucessores e apresentam, na face lingual, cingulo no terço cervical e cristas marginais mesial e distal.
 - A face lingual dos dentes anteriores não apresenta acidentes anatômicos; não há fossa nem cristas marginais.
34. A fim de evitar exposições indevidas e reduzir a dose no paciente em radiografias odontológicas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- É proibida a exposição aos raios X diagnósticos quando não houver justificativa, incluindo exposições deliberadas com objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação.
 - Exames radiográficos devem ser realizados apenas quando necessários após exame clínico, e deve-se verificar a existência de exames anteriores para evitar repetições desnecessárias.
 - Para radiografias intraorais, recomenda-se que o paciente segure o filme/sensor com os dedos para facilitar o posicionamento e evitar o uso de posicionadores.
 - O tempo de exposição deve ser o menor possível, compatível com a obtenção de imagem adequada, o que inclui o uso de receptores mais sensíveis e técnica correta para reduzir repetições.
- V – F – F – V.
 - F – V – V – V.
 - V – V – V – F.
 - V – V – F – V.
35. Com base nas estruturas do periodonto, assinale a alternativa correta.
- Cimento recobre a raiz do dente e tem como função primária ancorar o dente no alvéolo ósseo por meio da inserção dos ligamentos periodontais.
 - Sulco gengival é o tecido localizado na base do sulco, onde a gengiva se liga ao dente.
 - Inserção epitelial é formada por fibras conjuntivas densas que conectam o cimento ao osso alveolar.
 - Gengiva é o osso que sustenta o dente na sua posição dentro da maxila.
36. Sobre a lavagem das mãos com água e sabonete (higiene simples) em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.
- Molhar as mãos e friccionar rapidamente; é recomendado fazer inspeção visual do filme de sabão durante a lavagem para decidir o momento do enxágue.
 - Molhar as mãos, aplicar quantidade suficiente de sabonete para cobrir todas as superfícies, friccionar incluindo espaços interdigitais e unhas, enxaguar sem encostar na pia/torneira e secar com papel-toalha descartável.
 - Após ensaboar, é recomendado “espremer” as mãos para aumentar o sangramento e favorecer a remoção de microrganismos; em seguida, secar com toalha de pano de uso coletivo.
 - Para evitar desperdício de papel, deve-se secar as mãos ao ar e, em seguida, fechar a torneira com as mãos já limpas.

37. Sobre manutenção de equipamentos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Manutenção é a combinação de ações técnicas e administrativas destinadas a manter ou recolocar um item em condições de executar a função requerida.
 - Manutenção preventiva é realizada em intervalos predeterminados ou segundo critérios prescritos, visando reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento do item.
 - Manutenção corretiva é realizada após a ocorrência de uma pane, com a finalidade de recolocar o item em condições de executar a função requerida.
 - Manutenção sistemática ou programada é aquela realizada após o recebimento de uma informação relacionada ao estado do item, quando ele está na iminência de falhar.
- Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
38. Sobre Educação Permanente em Saúde no contexto das equipes de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.
- Corresponde, prioritariamente, a cursos padronizados e desvinculados do cotidiano do serviço, com foco exclusivo em atualização teórica.
 - É aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano do serviço, estruturando-se a partir da problematização do processo de trabalho e visando transformar práticas e a organização do trabalho.
 - É uma atividade restrita a instituições de ensino, sem participação de trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
 - Trata-se de ação eventual, sem relação com gestão, utilizada apenas para cumprir carga horária obrigatória.
39. Sobre o cálculo dentário (tártaro), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- O cálculo é um depósito duro aderido à superfície dentária, formado a partir de sais de cálcio e fosfato, e sua superfície áspera favorece retenção e acúmulo de placa bacteriana.
 - O cálculo pode ser removido pelo paciente apenas com escovação e fio dental, desde que realizados diariamente.
 - O cálculo supragengival é encontrado acima da margem gengival e costuma ocorrer com maior frequência próximo às aberturas dos ductos de Wharton (lingual de anteriores inferiores) e de Stensen (vestibular de molares superiores).
 - O cálculo subgengival pode formar-se abaixo da margem gengival, estender-se para bolsas periodontais e apresentar coloração verde-escura ou preta relacionada a pigmentos do sangramento subgengival.
- V – V – F – V.
 - F – F – V – V.
 - V – F – V – F.
 - V – F – V – V.
40. Mesmo em situações incomuns ou dolorosas, o paciente deve ser orientado quanto à manutenção do controle de placa. Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Em casos de inflamação oral aguda ou lesão traumática, recomenda-se interromper totalmente a escovação até desaparecer a dor, para evitar piora da condição.
 - Após cirurgia periodontal, o paciente deve escovar a face oclusal dos dentes e realizar movimentos bem leves nas regiões operadas, evitando escovação vigorosa sobre áreas com cimento cirúrgico.
 - Após extrações dentárias, os dentes adjacentes ao local da extração devem ser bem escovados o quanto antes, evitando-se escovar diretamente a área da extração conforme orientação profissional.
 - Após restaurações, coroas ou pontes fixas, na maioria das vezes o paciente é orientado a escovar todas as áreas normalmente, recebendo instruções específicas quando necessário.
- F – V – V – V.
 - V – F – V – V.
 - F – V – F – V.
 - V – V – V – F.

