



CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Leilão dos apartamentos do “prédio giratório” de Curitiba acontece nesta sexta

Os apartamentos do edifício Suite Vollard, conhecido como o prédio giratório de Curitiba, vão a leilão nesta sexta-feira (18). Os 10 imóveis, que ficam no bairro Mossunguê, poderão ser habitados pela primeira vez desde sua inauguração, em 2004. Neste primeiro momento, os apartamentos têm lance inicial de R\$ 1,4 milhões cada, preço bem menor comparado aos valores iniciais, quando custavam cerca de R\$ 2,3 milhões.

Caso não sejam vendidos, um novo leilão está marcado para o dia 24 de fevereiro, com lance inicial de R\$ 849 mil, equivalente a 60% do valor avaliado, um desconto de 40%. Quem comandará as vendas é o leiloeiro público Helcio Kronberg.

De acordo com Kronberg, o juízo determinou a venda de vários apartamentos. Entretanto, caso o valor da execução seja atingido antes de todos os lofts serem leiloados, o leilão poderá ser finalizado. Portanto, quem tiver interesse já deve registrar seus lances previamente. O leilão iniciará pelos apartamentos dos andares mais altos para os mais baixos.

O município de Curitiba, credor em mais de R\$ 1 milhão pelo IPTU devido, e alguns outros credores dos proprietários, já estão requerendo ao juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba a reserva de seus créditos, o que poderá favorecer a venda de mais unidades. Para participar, os interessados precisam fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados, com entrada de 25% e o remanescente em até 30 parcelas. Essa é primeira vez que os imóveis serão vendidos após as diversas tentativas feitas em 2018, quando não houve nenhum comprador.

A história do prédio é bastante famosa na capital paranaense. O projeto pioneiro, feito em 1997, saiu do papel em 2004 e atraiu olhares do mundo todo, com espaço até em uma matéria exclusiva do The New York Times e uma citação no The Economist. Na estrutura há um anel externo que gira impulsionado por um motor de 40 cavalos. Apesar do sucesso de mídia, os apartamentos nunca foram habitados. Na época, o motivo apontado foi o alto valor da venda para um empreendimento desse porte, além de problemas judiciais enfrentados pela Construtora Moro, responsável pela obra.

Cada andar pode se mover de maneira independente nos sentidos horário ou anti-

horário, de acordo com a preferência do morador, e há pouco atrito no movimento. Os únicos aposentos fixos são a cozinha e o banheiro, por causa do encanamento. O giro completo do Suíte Vollard é feito em uma hora e pode ser ativado por comandos de voz, ou por um painel eletrônico instalado na parede, que controla também luz, ar-condicionado e sistemas de segurança.

Os apartamentos são cercados de janelas e oferecem vista 360° da cidade, além de receberem luz do sol a qualquer hora do dia. O prédio conta com 11 lofts de 270 metros quadrados cada.

Fonte: <https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/leilao-dos-apartamentos-do-predio-giratorio-de-curitiba-acontece-nesta-sexta/>

Acesso em 20 de fevereiro de 2022.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) No leilão de apartamentos do edifício Suite Vollard, o pagamento pode ser parcelado.
- (B) O edifício Suite Vollard foi inaugurado em 2004.
- (C) Cada andar do edifício Suite Vollard pode mover-se independentemente dos outros.
- (D) O giro completo de um apartamento do Suite Vollard dura uma hora.
- (E) Os apartamentos do edifício Suite Vollard foram um sucesso de mídia e de vendas, sendo rapidamente habitados.

02) Assinale a alternativa na qual as duas palavras possuam dígrafo:

- (A) prédio – público.
- (B) bairro – olhares.
- (C) sucesso – problemas.
- (D) cozinha – atrito.
- (E) habitados – registrar.

03) Assinale a alternativa na qual as duas palavras sejam paroxítonas:

- (A) poderá – mídia.
- (B) créditos – além.
- (C) prédio – juízo.
- (D) época – prévio.
- (E) até – únicos.

04) Assinale a alternativa que apresente a relação de sentido estabelecida entre a parte anterior do texto e o período pelo termo em destaque: Entretanto, caso o valor da execução seja atingido antes de todos os lofts

serem leiloados, o leilão poderá ser finalizado.

- (A) Adição.
- (B) Alternância.
- (C) Conformidade.
- (D) Oposição.
- (E) Explicação.

05) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo advérbio em destaque no período: A história do prédio é bastante famosa na capital paranaense.

- (A) Negação.
- (B) Dúvida.
- (C) Modo.
- (D) Tempo.
- (E) Intensidade.

06) Assinale a alternativa cujo termo em destaque seja um numeral:

- (A) ...pela primeira vez desde sua inauguração...
- (B) Os apartamentos são cercados de janelas...
- (C) De acordo com Kronberg, o juízo determinou a venda de vários apartamentos.
- (D) O leilão iniciará pelos apartamentos dos andares mais altos para os mais baixos.
- (E) Quem comandará as vendas é o leiloeiro...

07) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período: O projeto pioneiro, feito em 1997, saiu do papel em 2004 e atraiu olhares do mundo todo, com espaço até em uma matéria exclusiva do The New York Times e uma citação no The Economist.

- (A) Aposto.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Vocativo.
- (E) Objeto Indireto.

08) Assinale a alternativa que apresente a justificativa correta para o uso da crase no período: Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados, com entrada de 25% e o remanescente em até 30 parcelas.

- (A) Regência nominal.
- (B) Substantivo feminino.
- (C) Regência verbal.
- (D) Locução adverbial.
- (E) Substantivo masculino.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

09) A tabela seguinte descreve o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito em um mês qualquer em um grande centro urbano:

Número de Vítimas fatais	Número de acidentes
1	6
2	7
3	4
4	3
Total	20

Com base nestas informações, a média de vítimas fatais por acidente neste centro urbano é de:

- (A) 1,75.
- (B) 2.
- (C) 2,2.
- (D) 2,75.
- (E) 3.

10) O Coeficiente de Variação é uma medida relativa de variação e é calculado dividindo o valor do desvio padrão, pelo valor da média e multiplicando o resultado por cem. Para os dados amostrais 1, 3 e 5 anos, o seu valor é aproximadamente:

- (A) 20%.
- (B) 42,5%.
- (C) 55,63%.
- (D) 66,67%.
- (E) 72,63%.

11) A Empresa X venceu uma licitação no valor de R\$ 180.000,00, deste recurso vai destinar 20% para pagar impostos, 10% para adquirir equipamentos, 15% para reposição de seu estoque. Do restante, metade será usado para pagar os trabalhadores da obra e a outra parte vai para o caixa da empresa. Com base nestas informações o valor destinado a pagamento dos trabalhadores é igual a:

- (A) R\$ 49.500,00.
- (B) R\$ 39.600,00.
- (C) R\$ 60.000,00.
- (D) R\$ 52.000,00.
- (E) R\$ 72.000,00.

12) Uma das salas do posto de saúde do município de Tagamandapiu tem 169 metros quadrados, e todas as suas paredes tem a mesma dimensão (é uma sala de formato quadrado). Em uma das paredes será

colocado um armário para organizar os itens que lá são utilizados. Se o armário vai ter o tamanho de um dos lados desta sala, seu comprimento é igual a:

- (A) 8,5 m.
- (B) 10,5 m.
- (C) 12 m.
- (D) 13 m.
- (E) 14,5 m.

13) A função $L(x) = -10x^2 + 200x - 160$ descreve o lucro em milhares de reais na venda de respiradores artificiais, a variável x representa a quantidade de aparelhos vendidos. Com base neste modelo o lucro máximo é obtido quando forem vendidos:

- (A) 8 aparelhos.
- (B) 10 aparelhos.
- (C) 12 aparelhos.
- (D) 14 aparelhos.
- (E) 16 aparelhos.

14) Em um determinado bairro da cidade, o posto de atendimento odontológico fez uma campanha para reduzir a lista de pacientes que aguardavam avaliação deste setor. Após o primeiro dia de campanha 50 pessoas foram atendidas e destas, 20 necessitavam de alguma forma de intervenção cirúrgica. Considerando esta proporção e sabendo que a lista tem 480 pessoas para serem avaliadas, a quantidade de intervenções cirúrgicas esperada é de:

- (A) 192.
- (B) 204.
- (C) 400.
- (D) 312.
- (E) 188.

15) A sequência seguinte $1, 1/4, 1/16, 1/64, \dots$ Segue um padrão lógico. Assim seu próximo elemento na sua forma não fracionária está representado pela alternativa:

- (A) 0,00025600.
- (B) 0,00390625.
- (C) 0,00042695.
- (D) 0,00782560.
- (E) 0,00063250.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Qual foi o ano de instalação do município de Santa Fé? Assinale a alternativa correta:

- (A) 1956.

- (B) 1945.
- (C) 1889.
- (D) 1964.
- (E) 1918.

17) Qual importante crítico e jornalista brasileiro faleceu em fevereiro de 2022? Assinale a alternativa correta:

- (A) William Bonner.
- (B) Ricardo Boechat.
- (C) Antônio Liberato.
- (D) Arnaldo Jabor.
- (E) Hilton Gomes.

18) Qual dos espaços abaixo foi criado recentemente no município de Santa Fé, em virtude das consequências da atual pandemia sobre a população local? Assinale a alternativa correta:

- (A) Parque do Lago.
- (B) Cemitério Municipal Catalo Buchi.
- (C) Balneário popular de Santa Fé.
- (D) Capela Nossa Senhora de Aparecida.
- (E) Bosque da Saudade.

19) A Rússia causou preocupação na comunidade internacional pelo conflito com a Ucrânia. Dentre suas reivindicações, o país afirma se sentir ameaçado por uma organização internacional chamada _____, pois estaria ocupando um posto cada vez mais avançado em direção ao Leste da _____, e, portanto, demasiado perto de suas fronteiras. Analise as opções e assinale aquela que completa as sentenças corretamente:

- (A) Mercosul/América Latina.
- (B) OTAN/Europa.
- (C) OEA/América Central.
- (D) OPEP/África Meridional.
- (E) Tigres Asiáticos/Ásia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20) As seguintes situações clínicas devem ser consideradas como suspeitas de hepatite viral:

I - Icterícia aguda e colúria.

II - Aminotransferases (transaminases) > 3 vezes o limite superior da normalidade.

III - História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HCV.

IV - História de contato sexual ou domiciliar

com indivíduo sabidamente HBsAg reator e/ou anti-HBc reator.

V - Exames sorológicos de triagem reatores para hepatites (doadores de sangue e/ou órgãos, usuários de hemodiálise e ambulatórios de DST).

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Todas as alternativas estão incorretas.
- (C) Somente as alternativas I, III e V estão corretas.
- (D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente as alternativas I, IV e V estão incorretas.

21) Sobre a conduta da Insuficiência Cardíaca, assinale a alternativa correta:

I - Estágio A: Redução dos fatores de risco; Tratar HAS, Diabetes, dislipidemia; IECA ou Bloqueadores de At2 para alguns pacientes.

II - Estágio B: IECA ou bloqueadores At2 para todos.

III - Estágio C: IECA e beta bloqueadores para todos; Restrição de sódio, diuréticos e digoxina; Ressincronização cardíaca se há bloqueio de ramo; Cirurgia de valva Mitral, se necessidade; Equipe multidisciplinar; Aldosterona.

IV - Estágio D: Inotrópicos e transplante.

Estão corretas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22) Sobre o código de ética médica assinale a alternativa correta:

- (A) No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico não aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.
- (B) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, mesmo em caso de iminente risco de morte.
- (C) Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos,

substâncias ou conhecimentos que as facilitem.

(D) Aceitar de livre conduta à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.

(E) Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando não pertencente à equipe de transplante.

23) Sobre a abordagem da diarreia, analise as alternativas e assinale a correta:

I - Diarreia aguda aquosa: diarreia que pode durar até 14 dias e determina perda de grande volume de fluidos e pode causar desidratação. Pode ser causada por bactérias e vírus, na maioria dos casos. A desnutrição persistente pode ocorrer se a alimentação não é fornecida de forma adequada e se episódios sucessivos acontecem.

II - Diarreia aguda com sangue (disenteria): é caracterizada pela presença de sangue nas fezes. Representa lesão na mucosa intestinal. Pode associar-se com infecção sistêmica e outras complicações, incluindo desidratação. Bactérias do gênero Shigella são as principais causadoras de disenteria.

III - Diarreia persistente: quando a diarreia aguda se estende por 14 dias ou mais. Pode provocar desnutrição e desidratação. Pacientes que evoluem para diarreia persistente constituem um grupo com alto risco de complicações e elevada letalidade.

- (A) Alternativas corretas I e II.
- (B) Alternativas corretas II e III.
- (C) Alternativas corretas I e III.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.
- (E) Todas as alternativas estão incorretas.

24) Sobre Doença Inflamatória Intestinal (DII) analise as alternativas e assinale a correta:

I - Os sintomas da doença intestinal inflamatória variam conforme a parte do intestino afetada e se a pessoa tem doença de Crohn ou colite ulcerativa. Pessoas com doença de Crohn normalmente têm diarreia crônica e dor abdominal. A pessoa com colite ulcerativa normalmente tem episódios intermitentes de dores abdominais e diarreia sanguinolenta. Em ambas as doenças, as pessoas com diarreia persistente podem perder peso e se tornar desnutridas.

II - A maioria das pessoas e suas famílias têm interesse em dietas e no controle do estresse. Embora algumas pessoas aleguem que certas dietas as ajudaram a melhorar sua saúde,

incluindo dietas com restrições rígidas de carboidratos, essas não têm se mostrado eficazes em estudos clínicos. Às vezes, o médico recomenda técnicas de controle do estresse para ajudar a pessoa a lidar com a tensão de ter uma doença crônica.

III - A doença intestinal inflamatória afeta pessoas de todas as idades, mas, geralmente, começa após dos 30 anos, geralmente entre 34 e 54 anos. Algumas pessoas têm seu primeiro ataque entre os 14 e 24 anos. A DII é mais comum entre pessoas de ascendência norte-europeia e anglo-saxônica, e é de duas a quatro vezes mais comum entre judeus Ashkenazi do que brancos não judeus que habitam na mesma região. Os dois sexos são igualmente afetados. Parentes de primeiro grau (mãe, pai ou irmãos) de pessoas com DII têm de quatro a vinte vezes mais risco de desenvolverem tais doenças. A tendência de hereditariedade é mais elevada na doença de Crohn em relação à colite ulcerativa.

- (A) Alternativa I e II Corretas.
- (B) Alternativa I e III Corretas.
- (C) Alternativa II e III Corretas.
- (D) Todas as alternativas Corretas.
- (E) Todas as alternativas incorretas.

25) Sobre cefaleias e síncope, analise as alternativas e assinale a alternativa que contém os itens incorretos:

Sinais de alerta – Os achados a seguir são particularmente preocupantes:

I - Sinais e sintomas neurológicos (p. ex., alteração do estado mental, fraqueza, diplopia, papiledema, deficits neurológicos focais).

II - Hipertensão grave.

III - Imunossupressão ou câncer.

IV - Meningismo.

V - Início da cefaleia após os 30 anos.

VI - Cefaleia “em trovoadas” (cefaleia intensa com pico em alguns segundos).

VII - Sintomas de arterite de células gigantes (p. ex., transtornos visuais, claudicação mandibular, febre, perda ponderal, sensibilidade na artéria temporal, mialgias proximais).

VIII - Sintomas sistêmicos (p. ex., febre, perda ponderal).

IX - Cefaleia sem agravamento progressivo.

X - Olhos sem alterações e halos ao redor das luzes.

- (A) I, V, IX.
- (B) IV, VI, IX.
- (C) VI, VIII e X.

- (D) V, IX e X.
- (E) II, III e VII.

26) Sobre Diabetes, analise as alternativas e assinale a correta:

I - Tipo 1: causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos.

II - Tipo 2: resulta da resistência à insulina e de deficiência na secreção de insulina. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos.

III - Diabetes Gestacional: é a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida.

IV - Outros tipos: são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças ou com o uso de medicamentos. Podem ser: defeitos genéticos da função da célula beta; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas exócrino (pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, etc.); induzidos por drogas ou produtos químicos (diuréticos, corticóides, betabloqueadores, contraceptivos, etc.).

- (A) Corretas - I, II e III.
- (B) Corretas - II, III e IV.
- (C) Corretas - I, III e IV.
- (D) Corretas - I, II e IV.
- (E) Todas corretas.

27) Sobre gripe e resfriado, analise as alternativas e responda a incorreta:

(A) A vacina é a melhor maneira de se evitar a gripe e suas complicações.

(B) Seus sintomas geralmente aparecem de forma repentina, com febre, vermelhidão no rosto, dores no corpo e cansaço.

(C) Entre o segundo e o quarto dias os sintomas do corpo tendem a diminuir enquanto os sintomas respiratórios aumentam, aparecendo com frequência uma tosse seca. Como no resfriado, na gripe a presença de secreções nasais e espirros é comum.

(D) Resfriados é causado na maioria das vezes por Influenza.

(E) Seus primeiros sinais costumam ser coceira no nariz ou irritação na garganta, os quais são seguidos após algumas horas por espirros e secreções nasais. A congestão nasal também é comum nos resfriados, porém, ao contrário da gripe, a maioria dos adultos e crianças não

apresenta febre ou apenas febre baixa.

28) Sobre pancreatite aguda:

As principais complicações da pancreatite incluem. Assinale a alternativa que não tem uma complicação da pancreatite aguda:

- (A) Pseudocisto pancreático.
- (B) Pancreatite necrosante.
- (C) Formação de tecido cicatricial (fibrose) no pâncreas.
- (D) Infecção do pâncreas.
- (E) Insuficiência de órgãos.

29) Sobre marcadores tumorais, correlacione:

- 1 - Antígeno Específico da Próstata (PSA).**
- 2 - CA-125.**
- 3 - Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG).**
- 4 - Alfa-fetoproteína (AFP).**
- 5 - Cromogranina A (CgA).**
- 6 - CA 19-9.**

A - Podem aumentar na presença do câncer neuroendócrino.

B - Esta substância é produzida por alguns tumores de células germinativas, assim como de alguns cânceres que começam no fígado.

C - Altos níveis desse marcador tumoral sugerem que o câncer começou nos dutos pancreáticos ou nas vias biliares.

D - Um alto nível desse marcador sugere um câncer primário de ovário, trompas de Falópio ou de peritônio.

E - Homens sugere que o câncer tenha se iniciado na glândula prostática.

F - Sugerem um tumor de células germinativas, um tipo de câncer que pode começar nos testículos, ovários, mediastino ou retroperitônio.

- (A) 1 - D; 2 - F; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - E.
- (B) 1 - E; 2 - D; 3 - F; 4 - B; 5 - A; 6 - C.
- (C) 1 - A; 2 - E; 3 - B; 4 - F; 5 - C; 6 - D.
- (D) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - E; 6 - F.
- (E) 1 - F; 2 - B; 3 - C; 4 - E; 5 - D; 6 - A.

30) Sobre o ombro doloroso, analise as alternativas e assinale a incorreta. As principais causas são:

- (A) O manguito rotador.
- (B) Capsulite adesiva.
- (C) Lesão de Labrum.
- (D) Tendinopatia Calcárea.
- (E) Lesões do Cabo Longo do Bíceps.

31) O tromboembolismo pulmonar (TEP) é a

complicação aguda mais temível da trombose venosa profunda, sendo a causa de morte evitável mais comum no paciente hospitalizado.

Sobre a abordagem ao paciente com sangramento e trombose, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Em pacientes cirúrgicos, a chance de desenvolvimento de TEP depende, essencialmente, da idade do paciente, do tipo de cirurgia e da presença de fatores de risco adicionais associados.
- (B) Pacientes com risco intermediário. Devem ser submetidos à profilaxia com heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não fracionada (HNF) subcutânea.
- (C) Pacientes com risco alto. Devem ser submetidos à profilaxia com HBPM ou HNF subcutânea.
- (D) As sensações de frio, dor em queimação, parestesias ou alterações intermitentes da cor de um ou mais dedos são precipitadas por exposição ao frio, estresse emocional ou vibração. Tudo pode ser revertido pela remoção do estímulo. O reaquecimento das mãos acelera a restauração da cor e sensação normais.
- (E) Pacientes de baixo risco. Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos considerados de baixo risco para TEV podem ainda assim apresentar trombose, particularmente aqueles mais idosos ou com fatores de risco associados, como câncer, história prévia ou familiar de TEV, ou mesmo associações de vários fatores comuns, como tabagismo, varizes, obesidade, reposição hormonal, etc. Nestes pacientes, a avaliação de risco deve ser individualizada, podendo-se optar pela prescrição da profilaxia.

32) Sobre uropatia obstrutiva, analise as alternativas e assinale a correta:

I - Crianças: anormalidades anatômicas (incluindo válvulas uretrais posteriores ou estreitamento e estenose na junção ureterovesical ou ureteropélvica).

II - Adultos jovens: cálculos.

III - Adultos mais velhos: hiperplasia prostática benigna (HPB) ou câncer de próstata, tumores retroperitoneais ou pélvicos (incluindo câncer metastático) e cálculos.

- (A) Alternativa I e II Corretas.
- (B) Alternativa I e III Corretas.
- (C) Alternativa II e III Corretas.
- (D) Todas as alternativas Corretas.
- (E) Todas as alternativas incorretas.

33) É possível curar a maioria das úlceras pépticas sem complicações. No entanto, em alguns casos, as úlceras pépticas podem desenvolver complicações de possível risco à vida, como:

- I - Sangramento (hemorragia).**
- II - Penetração.**
- III - Perfuração.**
- IV - Obstrução (bloqueio).**
- V - Câncer.**

Estão corretos os itens:

- (A) I, II e III.
- (B) II, IV e V.
- (C) III, IV e V.
- (D) Todas estão incorretas.
- (E) Todas estão corretas.

34) Sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS), analise os itens e assinale a alternativa correta:

Os sinais e sistemas acometidos depende do órgão afetado:

- I - Sinais neurológicos focais.**
- II - Alterações visuais.**
- III - Congestão (edema agudo de pulmão).**
- IV - Dor torácica.**
- V - Insuficiência renal (edema, diminuição do volume urinário).**
- VI - Insuficiência hepática (náusea, mal-estar, fadiga, encefalopatia e icterícia).**

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Todas as alternativas estão incorretas.
- (C) Somente os itens I, II, IV e V estão corretas.
- (D) Somente os itens I, III, IV e V estão corretas.
- (E) Somente os itens I, II, III e IV estão corretas.

35) Em poucos casos, os pacientes podem não apresentar sintomas ou sentir pouca dor durante a passagem da pedra pelo canal que leva a urina do rim para a bexiga (ureter). Porém, a maioria apresenta os sintomas a seguir:

I - Dor muito forte, quase insuportável, que começa nas costas e se irradia para o abdômen em direção à virilha. É uma dor que se manifesta em cólicas, isto é, com um pico de dor intensa seguido de certo alívio.

II - Náuseas e vômitos.

III - Sangue na urina.

IV - Suspensão ou diminuição do fluxo urinário.

V - Necessidade de urinar com mais frequência.

VI - Infecções urinárias.

- (A) Somente os itens I, II, IV e V estão corretas.
- (B) Somente os itens I, III, IV e V estão corretas.
- (C) Somente os itens I, II, III e IV estão corretas.
- (D) Todas as alternativas estão incorretas.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

36) Sobre marcadores tumorais, correlacione:

- 1 - Asma.**
- 2 - Bronquiolite aguda.**
- 3 - Pneumonia.**
- 4 - Aspiração de corpo estranho.**
- 5 - Tuberculose.**
- 6 - Pneumonia aspirativa.**

A - Os gânglios infartados podem levar à obstrução das vias aéreas nas crianças pequenas com tuberculose e acarretar sibilância.

B - Pode causar sibilância uni ou bilateral. Uma história de início agudo, que não melhora com broncodilador, é um dado que auxilia no diagnóstico.

C - É causada por aspiração de líquido, conteúdo gástrico ou corpo estranho.

D - Principalmente de etiologia viral, predomínio em lactentes. Além de sibilância, apresenta comumente, taquipneia e aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax.

E - Doença crônica das vias aéreas caracterizada por obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. Clinicamente, expressa-se por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse.

F - Não é comum, mas nas etiologias virais a pneumonia pode apresentar sibilância durante a infecção aguda.

- (A) 1 - D; 2 - F; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - E.
- (B) 1 - E; 2 - D; 3 - F; 4 - B; 5 - A; 6 - C.
- (C) 1 - A; 2 - E; 3 - B; 4 - F; 5 - C; 6 - D.
- (D) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - E; 6 - F.
- (E) 1 - F; 2 - B; 3 - C; 4 - E; 5 - D; 6 - A.

37) Sobre a abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares, analise as alternativas e assinale a incorreta:

(A) Desfibrilador bifásico: 100 a 200 J; Desfibrilador monofásico: 100, 200, 300 e 360J; Em pacientes com QRS estreito e R-R regular: Iniciar com 150 J.

(B) Alterações do ritmo cardíaco caracterizadas por frequência cardíaca (FC) maior ou igual a 100 batimentos por minuto (bpm), com a presença de pulso. Geralmente a FC está maior ou igual a 150 bpm para causar sinais e sintomas de instabilidade relacionados à taquicardia.

(C) - QRS estreito ($< 0,12$ ms): * R-R irregular = fibrilação atrial (FA), flutter atrial e taquicardia atrial multifocal; * R-R regular = taquicardia por reentrada nodal (TRN), taquicardia atrial, flutter atrial e taquicardia por reentrada átrio-ventricular (TRAV).

(D) - QRS alargado ($\geq 0,12$ ms): 80% dos casos são taquicardia ventricular (TV): * R-R regular = TV monomórfica, ou taquicardia supraventricular com condução aberrante; * R-R irregular = TV polimórfica, torsades de pointes, fibrilação atrial associada com préexcitação ventricular.

(E) Cardioversão Elétrica (CVE): deve ser sempre sincronizada, com exceção das TV polimórficas, nas quais deve-se realizar a desfibrilação (não sincronizada). Realizar sedação e analgesia antes da CVE.

38) Sobre síndrome paraneoplásica, analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - Anormalidades hídricas e do equilíbrio de eletrólitos, incluindo hiponatremia, podem resultar da produção de vasopressina e hormônios do tipo hormônio paratireoideo (PTHrP, parathyroid hormone-related peptide) decorrente de câncer de pulmão de células pequenas e não pequenas.

II - Síndrome de Cushing (excesso de cortisol, causando hiperglicemia, hipopotassemia, hipertensão, obesidade central, “face de lua”), pode resultar da produção ectópica de ACTH ou moléculas como ACTH, com mais frequência, com câncer de pulmão de células pequenas.

III - Diarreia aquosa com desidratação subsequente e desequilíbrios de eritrócitos podem resultar de secreção de prostaglandinas relacionadas ao tumor ou de peptídio intestinal vasoativo. Os tumores implicados incluem tumores de células

gástricas (gastrinoma) e outros.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Todas as alternativas estão incorretas.
- (C) Somente os itens I e II estão corretas.
- (D) Somente os itens I e III estão corretas.
- (E) Somente os itens II e III estão corretas.

39) Sobre princípios de eletrocardiograma, tendo como consideração os índices de sobrecarga ventricular esquerda. Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - Índice de Sokolow-Lyon y S V1 ou V2 + R V5 ou V6 ≥ 35 mm.

II - Índice de Lewis y (R1 + S3) – (R3 + S1) = ou > 17 mm y Amplitude de S em V1 > 24 mm y Soma de R1 + S3 > 35 mm.

III - Critérios de Hutchins y SV1 + RV5 ou V6 > 35 mm y crescimento do átrio esquerdo y aumento da DI > 50 ms em V5 ou V6.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Todas as alternativas estão incorretas.
- (C) Somente os itens I e II estão corretas.
- (D) Somente os itens I e III estão corretas.
- (E) Somente os itens II e III estão corretas.

40) Sobre cistite e pielonefrite. Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - A cistite é uma infecção na bexiga provocada por bactérias, sendo a Escherichia coli a principal causadora. Essa infecção é mais comum nos homens, uma vez que as bactérias atingem a bexiga por meio da uretra, canal em que a urina percorre para sair do corpo. Menos comum nas mulheres, mas existem casos registrados também.

II - Uretrite é uma inflamação na uretra ocasionada por diferentes bactérias, como Nesseria gonorrhoeae (sim, a mesma da gonorreia) e a Chlamydia trachomatis.

III - Pielonefrite é um tipo de infecção urinária extremamente perigosa. Potencialmente grave, o problema pode, caso não seja tratado de forma adequada, evoluir para uma doença renal crônica.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Todas as alternativas estão incorretas.
- (C) Somente os itens I e II estão corretas.
- (D) Somente os itens I e III estão corretas.
- (E) Somente os itens II e III estão corretas.