

CARGO: MÉDICO

GINECOLOGISTA OBSTETRA

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constatare alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer logon no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

- I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.
 - II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.
 - III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.
 - IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: Ransomware.

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.
 - II. Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.
 - III. Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.
 - IV. A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. Paciente apresentando resultado citológico indicando metaplasia escamosa imatura. Assinale a alternativa com a conduta adequada.

- a) Seguir a rotina de rastreamento citológico.
- b) Repetir citologia em 3 semanas após tratamento de atrofia vaginal.
- c) Repetir citologia em 3 meses.
- d) Repetir citologia em 6 meses.
- e) Encaminhar para colposcopia.

12. A incidência do câncer do colo do útero na gestação é rara, ocorrendo de um a 15 casos para 10 mil gestações e não superior aos demais períodos da vida da mulher. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O exame citológico não deve ser realizado no primeiro trimestre da gestação.
 - II. Na colposcopia, realizar biópsia apenas se houver suspeita de lesão invasiva.
 - III. A coleta endocervical não deve ser realizada, uma vez que a junção escamocolumnar no ciclo gravídico-puerperal encontra-se exteriorizada na ectocérvice na maioria das vezes.
 - IV. A paciente gestante com resultado de células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H) deverá ser reavaliada em 90 dias após o parto na unidade secundária, para confirmação diagnóstica e decisão terapêutica.
- a) Apenas III e IV estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - e) Apenas I, II e III estão corretas.

13. Assinale a alternativa que apresenta o teste padrão ouro para o diagnóstico de diabetes após a gestação e em quanto tempo após o parto deve ser realizado.

- a) Teste oral de tolerância a glicose com 75g de glicose, seis semanas após o parto.
- b) Teste oral de tolerância a glicose com 75g de glicose, duas semanas após o parto.
- c) Dosagem de insulina sérica, seis semanas após o parto.
- d) Dosagem de insulina sérica, duas semanas após o parto.
- e) Dosagem de hemoglobina glicada ao final do puerpério.

14. Sobre o manejo obstétrico e as vias de parto na gestante vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Em mulheres com carga viral desconhecida ou maior que 1.000 cópias/mL após 34 semanas de gestação, a cesárea eletiva a partir da 38ª semana de gestação diminui o risco de transmissão vertical do HIV.
 - Para gestantes em uso de antirretrovirais e com supressão da carga viral sustentada, caso não haja indicação de cesárea por outro motivo, a via de parto vaginal é indicada.
 - Gestantes com carga viral indetectável na 34ª semana não necessitam de administração de zidovudina intravenosa profilática durante o parto.
 - O parto instrumentalizado deve ser evitado, porém, quando indicado, o vácuo-extrator deve ser preferido ao fórceps.
- Apenas III está incorreta.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas II está incorreta.
 - Todas estão corretas.
15. A imunoprofilaxia para a hepatite B está indicada em casos de violência sexual em que ocorrer exposição da gestante ao sêmen, sangue ou outros fluidos corporais do agressor. A respeito dessa imunoprofilaxia, assinale a alternativa correta.
- As vítimas com HBsAg e Anti-HBc total não reagentes devem receber a vacina, não sendo necessária a realização de imunoglobulina humana anti-hepatite B.
 - Mesmo gestantes imunizadas para hepatite B, com esquema vacinal completo, necessitam de reforço.
 - A gravidez, em qualquer idade gestacional, não contraindica a imunização para a hepatite B.
 - A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser utilizada até, no máximo, 30 dias após a violência sexual.
 - A vacina para hepatite B deve ser aplicada em região glútea. Não deve ser realizada na região deltoide, por resultar em menor imunogenicidade.
16. A sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo a possibilidade de transmissão vertical. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.
- A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante, ou seja, quanto mais tardia a infecção materna, mais treponemas estão circulantes e, portanto, mais grave e frequente será o comprometimento fetal.
 - O intervalo mínimo necessário entre o início do tratamento e o parto para que o recém-nascido seja considerado tratado intraútero é de 60 dias.
 - O parceiro deve sempre ser testado e somente tratado se a paciente ainda estiver mantendo relações sexuais com o mesmo.
 - Nas gestantes, o VDRL de seguimento deve ser realizado mensalmente e a duração da gestação pode não ser suficiente para a negatificação.
 - Fetos tratados com eritromicina, em gestantes com história comprovada de alergia à penicilina, devem ser considerados tratados.
17. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação absoluta de parto cesáreo.
- Gravidez gemelar.
 - Cicatriz uterina prévia corporal.
 - Gestante HIV positivo.
 - Apresentação pélvica.
 - Cesárea prévia.
18. O índice de choque é um parâmetro clínico que reflete o estado hemodinâmico da paciente, podendo ser útil para prever a necessidade de transfusão maciça. Valores maiores ou iguais a _____ em puérperas com hemorragia pós-parto sugerem perda sanguínea significativa, com risco de transfusão, em que se deve aventar abordagem agressiva e hemotransfusão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- 0,2.
 - 0,4.
 - 0,5.
 - 0,7.
 - 0,9.
19. Assinale a alternativa que não apresenta uma indicação de tratamento hospitalar de doença inflamatória pélvica.
- Impossibilidade de excluir apendicite.
 - Presença de abscesso tubo-ovariano.
 - Uso de dispositivo intrauterino.
 - Dor à palpação anexial.
 - Gravidez.
20. Mulher de 24 anos, com vida sexual ativa, apresentando corrimento abundante amarelo-esverdeado, bolhoso, acompanhado de ardor genital, disúria e dispareunia. Sobre a principal hipótese diagnóstica para o caso, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta condutas adequadas no seu tratamento.
- Metronidazol 2g, via oral, em dose única.
 - Nova testagem três meses após o tratamento.
 - Referenciar os parceiros sexuais para tratamento de doença de transmissão sexual.
 - Alcalinizar o meio vaginal com duchas de água e bicarbonato de sódio.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I está incorreta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas IV está incorreta.
21. Assinale a alternativa que apresenta a técnica que apresenta as melhores e maiores evidências científicas no tratamento cirúrgico da incontinência urinária de esforço.
- Cirurgia de Burch.
 - Sling de uretra média.
 - Sling de aponeurose.
 - Tela de Marlex.
 - Cirurgia de Marshall-Marchetti-Krantz.

22. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta para o uso do implante de etonogestrel.

- a) Trombofilias.
- b) Endometriose.
- c) Câncer de mama atual.
- d) Portadoras de HIV.
- e) Mulheres com dependência química.

23. A fisiologia menstrual é determinada pela sincronia extremamente refinada entre hormônios secretados por diversos órgãos, com ação autócrina e parácrina, e também pela atividade de neurotransmissores que atuam como inibidores ou estimuladores dessa secreção de hormônios. Sobre o ciclo menstrual, assinale a alternativa correta.

- a) O hormônio folículo-estimulante tem como finalidade produzir a luteinização das células somáticas foliculares (teca e granulosa), completar a maturação do óvulo e promover a ovulação.
- b) O estrogênio tem papel ativo na liberação das gonadotrofinas pela hipófise previamente sensibilizada pela ação da progesterona.
- c) A produção de progesterona pela granulosa é proporcional ao número de células da granulosa que se prolifera no folículo, tendo impacto sistêmico em diferentes órgãos, inclusive o útero.
- d) Apenas as células da teca, externas no folículo, são vascularizadas, de maneira que são as únicas com acesso ao colesterol plasmático e, portanto, as únicas com capacidade de produzir os primeiros esteroides da cascata.
- e) Quanto maior o folículo, menor a sensibilidade ao hormônio folículo-estimulante.

24. A Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser é de grande importância principalmente pelo impacto do diagnóstico para a paciente e familiares. Sobre essa condição, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Ocorre quando ambos os ductos de Müller não se desenvolvem, resultando em útero rudimentar sólido e não canalização da vagina.
 - II. Ocorre em pacientes XX com tubas uterinas e ovários normais.
 - III. Paciente desenvolve normalmente sua puberdade, ou seja, desenvolvimento mamário e pelos pubianos com estatura normal, exibindo, assim, um tipo feminino puro, mas sem menstruação.
 - IV. Caracteriza-se por amenorreia secundária.
- a) Apenas IV está incorreta.
 - b) Apenas II está incorreta.
 - c) Apenas I e II estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) Apenas I está incorreta.

25. A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, com mudanças físicas e biológicas que transformam a menina em mulher no sentido da maturidade sexual. A puberdade tardia no sexo feminino é considerada quando o broto mamário não surge até os 13 anos de idade ou quando a menstruação não ocorre após cinco anos do início da puberdade. Assinale a alternativa que apresenta a etiologia mais importante no hipogonadismo hipergonadotrófico, uma condição de puberdade tardia.

- a) Galactosemia.
- b) Síndrome de Savage.
- c) Síndrome de Turner.
- d) Síndrome de Kallman.
- e) Hiperprolactinemia.

26. “Possuem dimensões habitualmente superiores ao fibroadenoma e apresentam crescimento rápido. Mais comum entre os 30 e 50 anos. Histologicamente, caracterizam-se por lesões proliferativas fibroepiteliais e maior celularidade do estroma. Podem apresentar-se sob a forma benigna, borderline e maligna de acordo com o número de mitoses e celularidade do estroma”. Assinale a alternativa que apresenta a alteração compatível com a descrição.

- a) Tumor phyllodes.
- b) Hamartoma.
- c) Esteatonecrose.
- d) Papiloma.
- e) Alteração funcional benigna das mamas.

27. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as condutas recomendadas pelo ASLO (Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia) diante de uma gestante de 33 semanas e 2 dias com diagnóstico de ruptura prematura de membranas ovulares, considerando cultura de estreptococo do grupo B (GBS) desconhecida.

- I. Sulfato de magnésio para neuroproteção no parto iminente.
 - II. Profilaxia para GBS.
 - III. Indução de trabalho de parto.
 - IV. Administração de corticosteroides.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I está incorreta.
 - d) Apenas IV está incorreta.
 - e) I, II, III e IV estão corretas.

28. O fórceps é um instrumento destinado a apreender a cabeça fetal e extraí-la através do canal do parto. Sobre o modelo ilustrado nas figuras abaixo, assinale a alternativa correta.




- a) É o mais empregado nas maternidades brasileiras.
b) Indicado na variedade de posição occípitosacra.
c) Indicado nas apresentações pélvicas.
d) Colocados os ramos sobre uma superfície plana, observa-se que as colheres se elevam a partir da cauda.
e) Possui função de correção do assinclitismo, pois permite pega assimétrica.

29. A gravidez deve ser suspeitada sempre que uma mulher em idade reprodutiva apresentar atraso menstrual, principalmente quando maior que uma semana. Didaticamente, os achados na gravidez podem ser divididos em sinais de presunção, probabilidade e certeza. Assinale a alternativa que apresenta apenas sinais de certeza.

- a) Ausculta dos batimentos cardíofetais com o estetoscópio de Pinard, aumento da sensibilidade álgica mamária e rede de Haller.
b) Tubérculos de Montgomery, percepção de partes fetais pelo examinador e Sinal de Hunter.
c) Sinal de Halban, sinal de Puzos e cloasma gravídico.
d) Sinal de Kluge, percepção de partes fetais pela mulher e alterações do muco cervical.
e) Ausculta dos batimentos cardíofetais com o sonar, percepção de partes fetais pelo examinador e Sinal de Puzos.

30. O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar a sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios, evitando, assim, intervenções desnecessárias. Considerando o partograma a seguir, assinale a alternativa com o diagnóstico adequado e a provável causa.



- a) Parada secundária da dilatação, contrações uterinas ineficazes.
b) Parada secundária da descida, desproporção cefalopélvica.
c) Período pélvico prolongado, desproporção cefalopélvica.
d) Parada secundária da dilatação, desproporção cefalopélvica.
e) Parada secundária da descida, contrações uterinas ineficazes.

