

CARGO: MÉDICO

PLANTONISTA

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Informática	6 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Obesidade mais do que dobra na população com mais de 20 anos, diz IBGE

Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. No período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2% e se manteve acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%.

Já a proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de idade subiu de 43,3% para 61,7% nos mesmos 17 anos. Entre os homens, foi de 43,3% para 60% e, entre as mulheres, de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e foram divulgados na quarta (21.out.2020), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas. Eram 29,5% das mulheres e 21,8% dos homens.

Já o excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens.

O excesso de peso também ocorria em 19,4% dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, o que corresponde a 1 total estimado em 1,8 milhão de pessoas, sendo 22,9% de moças e 16% dos rapazes. A obesidade atingia 6,7% dos adolescentes: 8% no sexo feminino e 5,4 % no sexo masculino.

Para a responsável pela pesquisa, a analista Flávia Vinhaes, as causas para o excesso de peso e a obesidade são a baixa qualidade da alimentação do brasileiro e a escassez de atividades físicas. “Faltam políticas públicas estruturadas de combate à obesidade e ao excesso de peso, como o incentivo à ingestão de alimentos saudáveis e à prática esportiva”, indica.

É considerado como excesso de peso o índice de massa corporal (IMC) maior do que 25. A pessoa obesa tem IMC maior do que 30. O IMC é calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro.

Segundo o IBGE, a prevalência de déficit de peso em adultos com 18 ou mais anos de idade foi de 1,6%, (1,7% para homens e 1,5% para mulheres), ficando, portanto, bem abaixo do limite de 5% fixado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como indicativo de exposição da população adulta à desnutrição.

Atenção Primária à Saúde

Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS). O questionário foi aplicado aos moradores com 18 anos ou mais de idade que tiveram pelo menos dois atendimentos com o mesmo médico em unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. A meta era avaliar o cuidado médico prestado nessas unidades.

No ano passado, 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade utilizaram algum serviço da

Atenção Primária à Saúde, nos seis meses anteriores à data da entrevista, em mais de um atendimento médico.

As respostas dos questionários receberam valores que foram usados para se calcular o escore geral da APS, que varia de 0 a 10. Segundo o IBGE, 1 escore igual ou superior a 6,6 aponta excelente qualidade de atenção primária à saúde. O escore geral da Atenção Primária à Saúde obtido na pesquisa no Brasil foi de 5,9.

Para o IBGE, 1 resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença de atributos da APS, como a facilidade para utilizar os serviços de saúde; a regularidade do serviço de saúde e a relação humanizada entre equipe de saúde e pacientes; a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao paciente; a orientação familiar e comunitária.

“Como é a primeira vez que o IBGE faz esse tipo de avaliação, a gente ainda não tem uma forma de avaliar se houve evolução ou não nessa pontuação. A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9”, disse a responsável pela pesquisa.

Disponível em

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/21/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-populacao-com-mais-de-20-anos.htm>

1. **Análise: “A gente, agora, está trabalhando numa linha de base que é esse 5,9” e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito dessa oração é simples.
- b) O sujeito dessa oração é composto.
- c) O sujeito dessa oração é indeterminado.
- d) O sujeito dessa oração é oculto.
- e) O sujeito dessa oração é os pesquisadores.

2. **Análise: “Em 2019, pela primeira vez a Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações sobre a Atenção Primária à Saúde (APS).” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há verbo.
- b) Há pronome.
- c) Não há sujeito.
- d) Há advérbio de modo.
- e) Não há numeral.

3. **Assinale a alternativa que apresenta uma das causas para que a obesidade aumentasse no Brasil.**

- a) Falta de exames de rotina.
- b) Falta de qualidade na saúde.
- c) Falta de alimentação.
- d) Falta de atividade física.
- e) Falta de vitaminas.

4. **De acordo com a pesquisa, a obesidade é mais elevada em**

- a) homens.
- b) mulheres.
- c) crianças.
- d) adolescentes.
- e) grávidas.

5. **Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso das aspas no texto.**

- a) Para transcrever um texto.
- b) Para destacar um estrangeirismo.
- c) Para ironizar.
- d) Para citar nomes de obras literárias.
- e) Para citar falas.

Informática

6. Usando como referência o Windows 10 e seus aplicativos, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa incorreta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).

- a) No Windows 10, é possível descer e subir qualquer janela, mesmo se não estiver trabalhando nela diretamente. Abrindo duas telas de forma que pelo menos parte delas esteja visível, é possível usar a roda do mouse ou o touchpad para rolar qualquer uma das duas. Caso o recurso não esteja ativado, basta ir em “Configurações > Dispositivos > Mouse” e alternar a opção “Rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse”.
- b) Embora você já possa capturar sua tela usando o botão PrtScn, agora, no Windows 10, é possível pressionar a tecla do logotipo do Windows + Shift + S para abrir a nova experiência moderna de captura (também chamada de barra de captura), então arraste o cursor sobre a área que deseja capturar. Assim que você capturar uma área da sua tela — a imagem capturada será adicionada à sua área de transferência e você poderá colá-la imediatamente em outro app. Uma solicitação de tela também permitirá que você faça anotações, salve ou compartilhe usando o app Captura e Esboço.
- c) No Windows 10, a nova central de ações é onde você encontrará as notificações de aplicativos e ações rápidas. Na barra de tarefas, o usuário poderá encontrar o ícone da central de ações.
- d) O Windows Cortana é uma maneira mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos Windows 10 usando impressão digital ou reconhecimento facial. A maioria dos computadores com leitores de impressão digital já funciona com o Windows Cortana, tornando mais fácil e seguro fazer login no computador.
- e) O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade, que podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de navegação em geral. O Narrador, é uma dessas funções, é usado para que uma voz leia o conteúdo da tela. É possível usar uma voz masculina ou feminina, personalizar a velocidade e até que tipo de conteúdo ela vai narrar.

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, analise as assertivas e assinale alternativa correta.

I. O Word 2016 salva automaticamente no formato de arquivo .doc. Para salvar seu documento em um formato diferente de .doc, clique na opção “Salvar como” e no campo “tipo” selecione o formato do arquivo desejado.

II. Cada vez que você inicia o Word 2016, é possível escolher um modelo a partir da galeria, clicar em uma categoria para ver mais modelos ou pesquisar outros modelos online.

III. Ao abrir um documento criado em versões anteriores do Word 2016, o usuário terá a opção de escolher no Modo de Compatibilidade na barra de título da janela do documento. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade ou atualizar o documento para usar os recursos do Word 2016.

IV. Quando você estiver trabalhando em um documento Word 2016 com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative a opção “Controlar Alterações” para ver cada mudança. O Word 2016 marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-Excel 2016, (versão em português e em sua configuração padrão), assinale a alternativa que descreve o resultado da fórmula: =SOMASE()

- a) Retorna a soma total entre os valores inseridos incondicionalmente.
- b) Adiciona os valores de um intervalo especificado apenas se elas passarem em um teste lógico.
- c) Analisa uma matriz e retorna o número de valores encontrados em um determinado intervalo.
- d) Multiplica os valores do intervalo.
- e) Calcula a potência entre dois números.

9. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques em um computador, assinale a alternativa que descreve: **Ransomware**.

- a) É um tipo programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal-intencionados possam invadir seu computador.
- b) É um recurso utilizado por diversos malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall, para abrir portas do roteador.
- c) É um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido.
- d) É um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado. Ou seja, transforma um computador em um “zumbi” para realizar tarefas de forma automatizada na Internet, sem o conhecimento do usuário.
- e) É um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina um computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de Internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos.

10. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A Intranet utiliza os mesmos protocolos que a Internet, tais como: Protocolos TCP/IP, para fazer a conexão entre os computadores, HTTP, para mostrar conteúdos e serviços de rede, SMTP, para serviços de e-mail e FTP, para transferência de arquivos.
 - II. Pode se conectar à uma rede de Intranet através de um equipamento usando tecnologia Wi-Fi, usando a mesma tecnologia que se conecta à uma rede de Internet.
 - III. Uma Intranet pode ser conectada a outras redes, inclusive à uma rede de Internet.
 - IV. A Intranet por ser uma rede privada não possui os recursos de troca de e-mails entre seus usuários.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Todas estão incorretas.

Conhecimentos Específicos

11. Assinale a alternativa com o diagnóstico adequado para o eletrocardiograma a seguir.



- a) Bradicardia sinusal.
- b) Bloqueio atrioventricular de 1º grau.
- c) Bloqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz I.
- d) Bloqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz II.
- e) Bloqueio atrioventricular de 3º grau.

12. A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação grave que pode ocorrer durante a evolução do diabetes mellitus tipos 1 e 2. Sobre essa condição, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Os estados infecciosos são a etiologia mais comum de CAD.
 - II. Ocorre a redução da concentração efetiva de insulina circulante associada à liberação excessiva de hormônios contrarreguladores, entre os quais o glucagon, as catecolaminas, o cortisol e o hormônio do crescimento.
 - III. A hiperglicemia é resultante de três mecanismos: ativação da gliconeogênese, ativação da glicogenólise e redução da utilização periférica de glicose, principalmente nos músculos.
 - IV. Com a evolução do tratamento, quando a concentração de glicose na CAD atingir 200 a 250 mg/dL, deve-se iniciar soro glicosado 5% associado à insulina regular IV contínua ou SC a cada 4 horas, até a resolução da CAD.
- a) Apenas III e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e IV estão corretas.
 - d) Apenas I está incorreta.
 - e) Todas estão corretas.

13. As emergências hipertensivas são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da pressão arterial (definida arbitrariamente como pressão arterial diastólica ≥ 120 mmHg) com lesão de órgão alvo aguda e progressiva. Pacientes devem ser admitidos em Unidade de Terapia Intensiva, usarem anti-hipertensivos intravenosos e serem monitorados cuidadosamente durante a terapia para evitar hipotensão. As recomendações gerais de redução da pressão arterial para emergências hipertensivas devem ser:

- a) Redução $\leq 25\%$ da pressão arterial na primeira hora e atingir PA 160/100 a 110mmHg em 2 a 6h.
- b) Redução $\leq 15\%$ da pressão arterial nas primeiras 6 horas e atingir PA 120/80mmHg em 24h.
- c) Redução $\leq 50\%$ da pressão arterial na primeira hora e atingir PA 140/90 a 100mmHg em 2 a 6h.
- d) Redução $\leq 15\%$ da pressão arterial na primeira hora e atingir PA 120/80mmHg em 2 a 6h.
- e) Redução $\leq 25\%$ da pressão arterial na primeira hora e atingir PA 160/100 a 110mmHg em 24h.

14. Sobre o tratamento e prevenção da influenza humana, assinale a alternativa incorreta.
- Os antivirais fosfato de oseltamivir e zanamivir são medicamentos de escolha para o tratamento de influenza.
 - O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode reduzir a duração dos sintomas, principalmente em pacientes com imunossupressão.
 - A vacina quadrivalente (fragmentada e inativada) é utilizada nos serviços públicos de vacinação do país, anualmente, para prevenção da doença.
 - Recomenda-se, para crianças de 6 meses a 9 anos incompletos, que estarão recebendo a vacina pela primeira vez, administrar duas doses.
- Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas III está incorreta.
 - Apenas I está incorreta.
 - Todas estão corretas.
15. A hemorragia pós-parto (HPP) é definida como a perda sanguínea acima de 500 mL após parto vaginal ou acima de 1000 mL após parto cesariana nas primeiras 24 horas ou qualquer perda de sangue pelo trato genital capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de HPP.
- Rotura uterina.
 - Lacerações vaginais.
 - Retenção de tecido placentário.
 - Atonia uterina.
 - Coagulopatias.
16. Os quadros clínicos agudos das hepatites virais são muito diversificados, variando desde formas assintomáticas até formas de insuficiência hepática aguda grave. Sobre o diagnóstico clínico, assinale a alternativa incorreta.
- O diagnóstico das hepatites virais, principalmente os tipos B e C, ocorre na maioria das vezes durante a fase aguda dessas doenças.
 - A hepatite crônica é assintomática na maioria dos casos.
 - As aminotransferases – alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) – são marcadores sensíveis para detecção de lesão do parênquima hepático, porém não são específicas para nenhum tipo de hepatite.
 - Nas hepatites B e C, a definição de suas formas crônicas se dá pela presença de replicação viral persistente por mais de seis meses.
 - O diagnóstico etiológico só é possível por meio de exames sorológicos e/ou de biologia molecular.
17. Com relação aos acidentes ofídicos, assinale a alternativa que apresenta o mais comum no Brasil.
- Acidente crotálico.
 - Acidente elapídico.
 - Acidente laquélico.
 - Acidente loxocélico.
 - Acidente botrópico.
18. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta antibióticos de eliminação predominantemente hepática.
- Levofloxacina.
 - Azitromicina.
 - Meropenem.
 - Doxiciclina
- Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas III está correta.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
19. Assinale a alternativa que apresenta o órgão mais lesado no trauma abdominal contuso.
- Fígado.
 - Intestino delgado.
 - Baço.
 - Rim.
 - Bexiga.
20. Sobre o manejo da insuficiência cardíaca aguda, assinale a alternativa que apresenta uma medida que não deve ser realizada.
- Prescrição de diuréticos no tratamento de congestão em doses endovenosas equivalentes ou o dobro das doses orais utilizadas.
 - Iniciar betabloqueador nos pacientes clínica e hemodinamicamente estáveis sem evidências de congestão.
 - Em pacientes com disfunção renal (*clearance* de creatinina < 30 mL/minuto), evitar o uso de heparina de baixo peso molecular e utilizar preferencialmente heparina não fracionada.
 - Uso de cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz) como rotina em pacientes com insuficiência cardíaca aguda.
 - Suspender os betabloqueadores em pacientes com choque cardiogênico ou séptico.
21. Homem, 25 anos, vítima de capotamento após colisão, é encontrado consciente andando na rodovia pela equipe do SAMU. Após 2 horas do trauma, paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência, com escala de coma de Glasgow de 9. O achado esperado na tomografia de crânio desse paciente é:
- Imagem hiperdensa acompanhando a convexidade cerebral.
 - Lesão hiperdensa biconvexa com desvio de linha média.
 - Lesão hiperdensa localizada no parênquima cerebral.
 - Imagem hiperdensa difusa entre os sulcos cerebrais.
 - Sem achados na tomografia.
22. A presença de hipotensão associada à bradicardia está mais relacionada a qual tipo de choque?
- Hipovolêmico.
 - Cardiogênico.
 - Séptico.
 - Obstrutivo.
 - Neurogênico.

23. Durante uma parada cardiorrespiratória, independente do ritmo, deve-se administrar um vasopressor, sendo a droga de primeira escolha a adrenalina. A dose e intervalo de administração da adrenalina deve ser:
- 1mg a cada minuto.
 - 1 mg a cada 3 a 5 minutos.
 - 0,5mg a cada 3 a 5 minutos.
 - 0,5mg a cada minuto.
 - 1mg a cada 3 a 6 minutos.
24. Sobre os anestésicos endovenosos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O Propofol apresenta um potente efeito hipnótico e sedativo, sendo a droga de escolha na indução anestésica em pacientes asmáticos e DPOC, devido ao seu efeito broncodilatador.
 - O Etomidato possui efeito hipnótico rápido, com a vantagem de causar pouca alteração hemodinâmica, porém pode provocar depressão respiratória.
 - A Quetamina apresenta potente efeito hipnótico e analgésico e está associada à anestesia dissociativa.
 - O Tiopental é um barbitúrico que possui efeito hipnótico e sedativo e, devido ao efeito vasodilatador e de depressão da função miocárdica, não está indicado para paciente hipotensos e com insuficiência cardíaca.
- Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
25. São alterações esperadas na intoxicação por antidepressivos tricíclicos, exceto:
- sonolência.
 - bradicardia.
 - midríase.
 - hipotensão.
 - hiporreflexia.
26. Paciente de 70 anos, hipertenso e diabético, chega ao pronto socorro com quadro de tosse há 5 dias, associado a dois picos febris, com evolução para desconforto respiratório há poucas horas. No exame físico admissional, paciente apresentava-se confuso e sonolento, MV+ bilateralmente com estertores crepitantes em base pulmonar direita, BCRNF 2T sem sopros audíveis, abdome sem alterações. Sinais vitais: PA: 100 x 60 mmHg, FC = 110 bpm, FR = 30 irpm, Sat = 94% em ar ambiente, Tax = 37,9°C. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.
- O paciente não tem critérios para síndrome inflamatória sistêmica, não havendo necessidade de abrir protocolo sepse no momento.
 - É necessário coletar exames para avaliar disfunção orgânica pelos critérios SOFA, incluindo hemograma, creatinina, coagulograma e gasometria arterial.
 - As medidas iniciais incluem reposição volêmica com 20ml/kg de cristalóide, coletar hemocultura e lactato sérico e iniciar antibioticoterapia endovenosa de largo espectro na primeira hora.
 - De acordo com os critérios do Surviving Sepsis Campaign (2012) se o paciente apresentar PAS < 90 mmHg ou PAM < 60 mmHg ou queda de 40mmHg sobre o basal há indicação de iniciar drogas vasoativas.
 - Deve ser iniciada antibioticoterapia de amplo espectro o mais precoce possível, apenas após coleta de culturas, com preferência pela via endovenosa.
27. Assinale a alternativa que apresenta a Lei Orgânica de Saúde que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.
- Lei n. 8080/1990.
 - Lei n. 9836/1999.
 - Lei n. 8940/1990.
 - Lei n. 9090/1999.
 - Lei n. 8142/1990.
28. Paciente feminina, 35 anos, com diagnóstico de epilepsia há 6 anos apresenta-se no pronto-socorro, trazida por familiares, em crise convulsiva tônico-clônica generalizada de cerca de 40 minutos. A conduta imediata é:
- Midazolam 10mg IM.
 - Fenitoína 20mg/kg EV.
 - Diazepam 10mg IM.
 - Fenobarbital 20mg/kg EV.
 - Glicose hipertônica EV.
29. Não faz parte dos critérios de Berlim para síndrome do desconforto respiratório agudo:
- Início até 7 dias da doença de base.
 - Opacidades bilaterais sugestivas de edema pulmonar e não causados por derrame pleural ou nodulações.
 - Insuficiência respiratória não completamente explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de fluidos.
 - Hipoxemia, definida como relação P/F $\leq$ 300.
 - Frequência respiratória $\geq$ 30 irpm e sinais de desconforto respiratório.
30. Considere um paciente adulto, de 70kg, vítima de queimadura de segundo grau, que chega ao pronto socorro 2 horas após o trauma, com 25% da área de superfície corporal queimada. Assinale a alternativa que apresenta a reposição volêmica adequada nesse caso.
- 3500ml nas primeiras 4 horas e 3500ml nas 16 horas seguintes.
 - 3500ml nas primeiras 6 horas e 3500ml nas 16 horas seguintes.
 - 7000ml nas primeiras 8 horas e 7000ml nas 16 horas seguintes.
 - 3500ml nas primeiras 8 horas e 3500ml nas 16 horas seguintes.
 - 3000ml nas primeiras 6 horas e 3000ml nas 16 horas seguintes.