



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



FundMed
Pesquisa Ensino Inovação

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2025

CATEGORIA PROFISSIONAL:

ENFERMAGEM

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA), assine no local indicado.
- Este caderno contém **40 questões de múltipla escolha**, com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais somente uma será a correta.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para a correção da prova objetiva, sendo de responsabilidade do candidato sua guarda durante a prova, seu preenchimento e sua entrega ao fiscal de sala.
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS com bastante atenção, à caneta esferográfica (ponta grossa, tinta azul ou preta), marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. Sob nenhuma circunstância, o cartão de respostas será substituído devido a erro, desatenção ou falha no preenchimento por parte do candidato.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de **até 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
- Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo **tempo mínimo de 60 minutos**.
- Ao terminar a prova, o candidato devolverá ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- O candidato somente poderá levar o caderno de provas **quando estiver faltando 60 minutos para o término do tempo total de duração da prova**. Por razões de segurança, o candidato que sair antes desse horário não poderá copiar as suas respostas.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar o lacre do material, quando então poderão retirar-se do local após concluído o procedimento.

1) Segundo Backes et al. (2009), em relação aos conceitos e às ideias de saúde e doença desenvolvidos ao longo da história e na contemporaneidade, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Na Antiguidade, acreditava-se que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais. Nesse período, a compreensão das doenças era por meio da filosofia religiosa. A doença é resultante do desequilíbrio do organismo humano.
- () A multicausalidade das doenças aparece na Renascença, em que os fatores causadores das doenças eram relacionados ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao meio ambiente. Acreditavam que as causas agiam entre si, acarretando maior gravidade das doenças.
- () Na contemporaneidade, a atenção à saúde volta-se para a promoção da saúde. Consideram-se importantes as vulnerabilidades e o empoderamento dos indivíduos, assim como a subjetividade e a singularidade do que acontece nas esferas individual e coletiva.
- () O conhecimento científico contribui para a caracterização da saúde e das doenças. Suas verdades são estanques e devem desconsiderar as práticas de cuidado e autocuidado de cada indivíduo e cultura.

- a) C - E - C - C.
- b) C - E - C - E.
- c) C - C - E - C.
- d) C - C - E - E.

2) Para Albuquerque (2014), em relação à produção social do humano e à determinação da saúde e da doença, é CORRETO afirmar que:

- a) A humanidade modifica a natureza, controlando seus processos de forma a adequá-la às suas necessidades.
- b) O ser humano, a partir de uma ideia, realiza processos para manutenção de bens e produtos que sejam obsoletos para sua sobrevivência.
- c) A sobrevivência humana se dá por meio de uma relação instintiva de subordinação à natureza.
- d) A humanidade reduz a mortalidade precoce, diminuindo a longevidade.

3) Em relação ao processo de saúde e doença e seus determinantes sociais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Segundo Albuquerque (2014), com a utilização dos meios de vida que o ser humano elabora e intencionalmente modifica, ele consegue garantir sua sobrevivência e ter maiores possibilidades de realização, o que pode reduzir a mortalidade precoce, aumentar a longevidade e desenvolvimento de seus saberes.
- II. Albuquerque (2014) nos diz que compreender a determinação social da saúde não consiste em compreender apenas que a saúde depende do acesso aos objetos humanos, mas à possibilidade de realização, de satisfação das necessidades da vida e ao acesso aos produtos necessários para tal fim.
- III. Segundo Albuquerque (2014), a saúde, entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo, apresenta-se de modo semelhante nas diferentes sociedades, classes e estratos de classes sociais, apesar das diferenças biológicas entre os corpos dos seres humanos que as compõem.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.

4) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Incidente.
- (2) Evento adverso.
- (3) Gestão de risco.
- (4) Cultura de segurança.

- () Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- () Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, oportunizando aprender com as falhas e melhorando a atenção à saúde.
- () Incidente que resulta em dano à saúde.
- () Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

- a) 3 - 2 - 4 - 1.
- b) 2 - 3 - 1 - 4.
- c) 3 - 1 - 4 - 2.
- d) 1 - 4 - 2 - 3.

5) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Resolução se aplica a todos os serviços de saúde, excetuando-se os privados.
- II. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar como princípio e diretriz a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
- III. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 60 dias a partir do ocorrido para análise aprofundada do evento.
- IV. Compete aos NSP estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

6) Em um ensaio clínico randomizado, pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais, para avaliar seu impacto na prevenção de quedas. Como resultado primário, o risco relativo (RR) estimado para quedas foi de 1,11 (IC 95%, 0,94 a 1,31), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nesses dados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O risco de quedas foi 1,11% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) O risco de quedas foi 11% maior no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para quedas seja de 11% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

7) Em um ensaio clínico randomizado, no qual pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais. O risco relativo (RR) estimado para alcançar a descontinuação do uso dessas medicações foi de 1,79 (IC 95%, 1,29-2,50), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Descontinuação da medicação foi 1,79% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) Descontinuação da medicação foi 79% mais frequentemente alcançada no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para descontinuação da medicação seja de 79% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

8) O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, entre outros. Sobre essas ações e serviços, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- III. Vigilância em saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

9) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Entende-se por vigilância _____ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde _____, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de _____ das doenças ou agravos.

- a) epidemiológica | individual ou coletiva | prevenção e controle
- b) sanitária | coletiva | controle
- c) epidemiológica | individual | fiscalização e reabilitação
- d) sanitária | individual ou coletiva | prevenção e controle

10) Sobre as atribuições diferenciadas da União, dos Estados e dos Municípios no âmbito da Vigilância em Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Compete exclusivamente à União a elaboração de normas pertinentes à vigilância em saúde.
- b) A União é a única responsável pela execução de ações de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras, sem possibilidade de compartilhamento com Estados e Municípios.
- c) Os Municípios são responsáveis por participar da pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de vigilância em saúde.
- d) Os Estados, diferentemente da União, não têm atribuições relacionadas ao financiamento das ações de vigilância em saúde.

11) Sobre as redes de atenção à saúde (RAS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece as diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS.
- II. Propor novas formas de financiamento para a Atenção Primária à Saúde dos municípios, desde que cumpram os seguintes atributos: primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária, que é uma estratégia para implantação da RAS.
- III. As RAS são definidas como os serviços e as ações que intervêm em processos de saúde doença, pautados em diferentes densidades tecnológicas, logísticas e de gestão para assegurar a integralidade do cuidado, melhorar o acesso, a equidade, bem como a eficácia proposta no SUS.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12) O terceiro componente das redes de atenção, os sistemas de apoio, são os lugares institucionais em que se realizam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Quais são estes sistemas de apoio?

- a) Sistema de diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica e sistemas de informação à saúde.
- b) Sistemas de governança, sistema de identificação da área geográfica e sua população.
- c) Sistemas logísticos e sistema de saúde mental.
- d) Sistema da rede hospitalar no nível federal.

13) A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas Comissões Intergestores. Sobre estas comissões, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Comissões Intergestores Tripartite.
- (2) Comissões Intergestores Bipartite.
- (3) Comissões Intergestores Regionais.

- () Âmbito das regiões de saúde.
- () Âmbito federal.
- () Âmbito estadual.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 2.

14) Sobre o tema da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As condições necessárias para que a interdisciplinaridade ocorra são a existência de uma linguagem comum; objetivos comuns; reconhecimento da necessidade de considerar diferenças existentes; domínio dos conteúdos específicos de cada um dos participantes; e elaboração de uma síntese complementar.
- b) Bioética é uma reflexão compartilhada, complexa e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver.
- c) Na bioética, a humildade é uma característica que não é levada em consideração, pois o resultado das reflexões são sempre definitivos e imutáveis.
- d) Conhecimentos e discussões gerados pela bioética e pela ecologia contribuíram para ampliar a noção de responsabilidade.

15) Considerando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Como política pública, baseia-se na aprendizagem pelo método tradicional de ensino.
- b) A residência multiprofissional em saúde (RMS) é considerada um espaço para o desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde (EPS), o qual pode se constituir como um dispositivo potencial para promover as mudanças pretendidas pelos profissionais de saúde, a fim de consolidar os princípios do SUS.
- c) Para a operacionalização da PNEPS, torna-se imperativa a premissa de que as práticas dos profissionais de saúde respondam prioritariamente às demandas das redes ambulatoriais e hospitalares privadas.
- d) O fazer profissional na área da saúde, incluindo a RMS e a EPS, é um fim em si mesmo e tem como ação principal a oferta de cursos na modalidade a distância.

16) No que se refere às medidas para a prevenção das pneumonias relacionadas à assistência à saúde, de acordo com a ANVISA, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Manter o decúbito elevado diminui a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, especialmente em pacientes recebendo nutrição por sonda enteral.
- II. Aspirar secreção subglótica rotineiramente em pacientes com tubo endotraqueal facilita a colonização bacteriana da árvore traqueobrônquica, predispondo aspiração da secreção, o que aumenta a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica.
- III. Higienizar as mãos deve fazer parte de campanhas educativas para a prevenção das pneumonias relacionadas à assistência à saúde. A utilização de preparação alcoólica para as mãos deve ser estimulada em todas as áreas do serviço de saúde. Para realizar a higiene de mãos, pode ser utilizado produto alcoólico rotineiramente ou água e sabonete líquido, caso as mãos estejam visivelmente sujas.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

17) As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas utilizando água e sabão, preparação alcoólica e antisséptico. De acordo com a ANVISA, sobre as indicações para o uso de cada produto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Uso de preparação alcoólica antes e depois do uso de luvas, pois esta etapa substitui a lavagem de mãos.
- b) Uso de água e sabão para degermação da pele no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico e antes da realização de procedimentos invasivos. Exemplos: inserção de cateter intravascular central, punções, drenagens de cavidades, instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros.
- c) Uso de antissépticos sem degermantes indicados no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico e antes da realização de procedimentos invasivos. Exemplos: inserção de cateter intravascular central, punções, drenagens de cavidades, instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros.
- d) Uso de antissépticos que se destinam à higienização antisséptica das mãos e que estão indicados nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos casos de surtos.

18) Segundo Brunner & Suddarth (2020), a insuficiência cardíaca (IC) resulta de distúrbios cardíacos estruturais ou funcionais que comprometem a capacidade de enchimento ou de ejeção de sangue dos ventrículos. Neste contexto, assinale a alternativa que contemple as manifestações clínicas.

- a) A IC esquerda causa as mesmas manifestações clínicas que a IC direita.
- b) Na IC crônica, os pacientes podem apresentar apenas sinais e sintomas de insuficiência ventricular esquerda.
- c) Na IC esquerda, ocorre congestão pulmonar evidenciada por dispneia, tosse, estertores pulmonares e baixos níveis de saturação de oxigênio; uma bulha cardíaca extra, a B3, é, possivelmente, detectada à ausculta.
- d) Na IC esquerda, ocorre edema dos membros inferiores (edema dependente), hepatomegalia (aumento do fígado), ascite (acúmulo de líquido na cavidade peritoneal), anorexia, náuseas, fraqueza e ganho de peso provocados por retenção de líquido.

19) Segundo Brunner & Suddarth (2020), o edema pulmonar é definido como o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais dos pulmões que se difunde para os alvéolos. Quanto ao manejo de enfermagem, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Ajudar na administração de oxigênio; preparar o material para a intubação e a ventilação mecânica, se necessário.
- () Posicionar o paciente em Trendelenburg (no leito) com as pernas pendentes.
- () Observar o paciente quanto à retenção de grande quantidade de urina após a administração de diuréticos, depressão respiratória excessiva, hipotensão e vômitos.
- () Fornecer apoio psicológico, tranquilizando o paciente; usar o toque para transmitir uma sensação de realidade concreta. Como o paciente se encontra em um estado instável, permanecer com ele.

- a) C - E - E - C.
- b) E - C - C - E.
- c) C - C - E - E.
- d) E - E - C - C.

20) Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Conforme Montenegro & Rezende (2017), a síndrome HELLP costuma desenvolver-se de maneira repentina durante a gravidez e em cerca de 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave. A síndrome HELLP trata-se de uma forma grave de pré-eclâmpsia, caracterizada por _____, _____ e _____.

- a) hemoptise (H) | elevação das enzimas cardíacas (EL) | baixa de potássio (LP)
- b) hemólise (H) | elevação das enzimas hepáticas (EL) | baixa de plaquetas (LP)
- c) hematêmese (H) | elevação das enzimas musculares (EL) | baixa de plaquetas (LP)
- d) hemólise (H) | elevação das enzimas cardíacas (EL) | baixa de proteínas urinárias (LP)

21) De acordo com as diretrizes da *American Heart Association* (2020) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP), avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a RCP. O acesso intraósseo (IO) é aceitável se o acesso IV não estiver disponível.
- () No algoritmo de atendimento a adultos, RCP de alta qualidade significa comprimir com força (pelo menos 5cm) e rapidamente (100 a 120 compressões/minuto), aguardando o retorno total do tórax.
- () No algoritmo de atendimento a adultos, RCP de alta qualidade significa realizar interrupções nas compressões devido ao risco de fratura e alternar os responsáveis pelas compressões a cada 20 minutos, ou antes, se houver cansaço.
- () Se o ritmo for chocável, nos casos de assistolia/AESP, recomenda-se a dose inicial de 120 a 200J.

- a) E - E - C - E.
- b) C - E - E - C.
- c) C - C - E - E.
- d) E - C - C - C.

22) Em Nota Técnica acerca de esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, quanto às diretrizes de funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas do Tipo IV, é CORRETO afirmar que:

- a) O CAPS AD IV deve ser um serviço aberto que funciona segundo a lógica do território e que fornece atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas aos consumos de álcool, crack e outras drogas, durante as 24 horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.
- b) O CAPS AD IV deve produzir, individualmente com o usuário, um Projeto Terapêutico Singular que acompanhe o usuário nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades de vida e mediando suas relações sociais.
- c) O CAPS AD IV deve bloquear e territorializar a oferta dos serviços às necessidades dos usuários, recorrendo às tecnologias de alta exigência, como acomodação dos horários, acolhimento de usuários mesmo sob o efeito de substâncias, dispensação de insumos de proteção à saúde e à vida.
- d) O CAPS AD IV não deve responsabilizar-se, dentro de suas dependências ou em parceria com outros pontos de atenção da Rede de Saúde, pelo manejo e pelo cuidado de situações envolvendo comorbidade psiquiátrica ou clínica.

23) Conforme a Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União.
 - II. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser orientado por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre, hospitalar.
 - III. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser amparado pela União que dispõe de protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas a afirmativa II está correta.
 - c) Apenas a afirmativa III está correta.
 - d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

24) Conforme Montenegro & Rezende (2017), o quadro clínico do descolamento prematuro de placenta (DPP) é variável, podendo haver desde casos assintomáticos até aqueles nos quais há morte fetal e grave morbidade materna. O DPP pode ser classificado em quatro graus. Com isso, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Grau 0.
- (2) Grau 1.
- (3) Grau 2.
- (4) Grau 3.

- () Há sangramento vaginal, mas a paciente não relata dor ou age com discrição; mãe e feto estáveis.
- () Associado ao óbito fetal. Esse tipo pode ser subdividido em grau 3A, sem coagulopatia, e grau 3B, com coagulopatia.
- () O diagnóstico é retrospectivo, pelo exame da placenta que mostra o hematoma retroplacentário.
- () Caracterizado por sangramento vaginal, dor abdominal intensa, hipertonia uterina; feto em sofrimento, mas vivo.

- a) 1 - 3 - 4 - 2.
- b) 2 - 4 - 1 - 3.
- c) 3 - 2 - 1 - 4.
- d) 4 - 1 - 2 - 3.

25) Segundo Brunner & Suddarth (2020), o choque progride em um *continuum* e pode ser identificado como inicial ou tardio, dependendo dos sinais e dos sintomas e da gravidade geral da disfunção dos órgãos. O choque é dividido em estágios separados: compensatório (estágio 1), progressivo (estágio 2) e irreversível (estágio 3). Quanto mais cedo as intervenções forem instituídas ao longo desse *continuum*, maior a chance de sobrevivência do paciente. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. No estágio compensatório a pressão sistólica está abaixo de 100 mmHg e PAM abaixo de 65 mmHg, exige reposição volêmica para dar suporte a pressão arterial.
- II. No estágio irreversível há icterícia, anúria com necessidade de diálise e demanda suporte mecânico para manter a pressão arterial.
- III. No estágio progressivo as incursões respiratórias são superficiais e rápidas e há presença de mosqueamento e petéquias.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa III está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

26) Sobre o diagnóstico de enfermagem, considerado um julgamento clínico sobre uma resposta humana, segundo Herdman, Kamitsuru & Lopes (2021), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Um diagnóstico com foco no problema é um julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo de vida em indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade.
- II. Um diagnóstico de risco é um julgamento clínico a respeito da suscetibilidade de um indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade ao desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a condições de saúde/processos de vida.
- III. Um diagnóstico de promoção da saúde é um julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial humano de saúde.
- IV. Um diagnóstico de síndrome é um julgamento clínico relativo a um determinado agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

27) Paciente feminina, 57 anos, chega à unidade para realizar hemodiálise. Refere que tem acordado no meio da noite com sensação de sufocamento, precisando sentar-se na cama rapidamente. Pesando-se pela manhã, constatou que estava cinco quilos acima do peso, que fora verificado na última sessão de hemodiálise, há dois dias. Seu familiar sinalizou que a sua veia do pescoço do lado direito estava inchada, mesmo quando ela estava sentada. Na ausculta pulmonar, presença de sons respiratórios adventícios. Considerando este contexto, qual é o diagnóstico de enfermagem mais acurado, a ser estabelecido pelo enfermeiro, para o início da sessão de hemodiálise?

- a) Eliminação urinária prejudicada.
- b) Retenção urinária.
- c) Volume de líquidos excessivo.
- d) Risco de volume de líquidos deficiente.

28) Sobre as características da Resolução nº 736/2024 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () O Processo de Enfermagem é organizado em cinco etapas inter-relacionadas e interdependentes.
- () A execução do Processo de Enfermagem deve ser baseada em suporte teórico, como modelos de cuidado, teorias, sistemas de linguagens padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados e protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos.
- () O diagnóstico e a prescrição de enfermagem são privativos dos enfermeiros no Processo de Enfermagem.
- () A Resolução divide a implementação de enfermagem em dois padrões: cuidados autônomos do enfermeiro e cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde.

- a) C - E - C - C.
- b) C - C - C - E.
- c) E - C - C - C.
- d) C - C - E - E.

29) Algumas características do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, segundo a Resolução COFEN nº 564/2017, devem ser consideradas pelo enfermeiro, EXCETO:

- a) O respeito aos princípios éticos é essencial para fortalecer a confiança da sociedade na enfermagem.
- b) O código estabelece normas para a conduta dos profissionais em situações complexas, como conflitos éticos, dilemas morais e questões legais.
- c) O novo código permite que trabalhadores das categorias de enfermagem deleguem atribuições para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente.
- d) O profissional de enfermagem deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos.

30) Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

O enfermeiro líder precisa ter e/ou desenvolver algumas habilidades para apoiar e facilitar o desenvolvimento do processo de trabalho, atender situações peculiares e, conforme o contexto, optar pelas estratégias mais adequadas com comunicação assertiva e _____, _____ e competência _____ para o alcance de metas organizacionais e assistenciais com mais assertividade.

- a) participativa | relações interpessoais saudáveis | técnica
- b) participativa | relações hierárquicas | técnica
- c) unidirecional | crescimento individual | técnica específica
- d) unidirecional | relações interpessoais saudáveis | técnica

31) O aumento dos níveis pressóricos como evento agudo é uma das demandas mais comuns no atendimento à demanda espontânea no dia a dia das equipes da Atenção Primária à Saúde e merece especial atenção, uma vez que está relacionado a piores desfechos cardiovasculares. Sobre o manejo da crise hipertensiva de acordo com cada avaliação, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Emergência hipertensiva.
- (2) Urgência hipertensiva (UH).
- (3) Pseudocrise hipertensiva.
- (4) Elevação eventual da pressão arterial (PA).

- () Encaminhar para consulta médica pela necessidade de restabelecer controle pressórico em 24-48h e atentar-se para a administração do captopril por via oral, se necessário (conforme prescrição médica).
- () Encaminhar para atendimento médico imediato e atentar-se para a administração do captopril por via oral, se necessário (conforme prescrição médica).
- () Avaliar a intensidade dos sintomas e a necessidade de consulta médica no dia e realizar escuta acolhedora, avaliando sinais e sintomas de sofrimento psíquico.
- () Identificar e abordar condições que possam ter desencadeado o aumento da PA, como dificuldades de adesão/autocuidado, e conduzir consulta de enfermagem de rastreamento ou de acompanhamento se diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica.

- a) 2 - 1 - 3 - 4.
- b) 1 - 2 - 3 - 4.
- c) 2 - 1 - 4 - 3.
- d) 3 - 2 - 1 - 4.

32) O enfermeiro deve realizar o treinamento inicial para o uso da insulina a partir da prescrição médica e manter-se vigilante nas consultas de enfermagem subsequentes para os erros na utilização, dificuldades de adesão e eventos adversos. Com relação aos cuidados de enfermagem sobre a insulinoterapia, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Homogeneizar a insulina a partir da movimentação do frasco e da seringa com insulina previamente preparada, de dez a vinte vezes, em movimentos suaves (interpalmar, circular ou pêndulo) para prevenção do aparecimento de bolhas de ar.
- () Na preparação de duas insulinas concomitantes: aspirar primeiro a dose de insulina NPH e, após, aspirar a dose de insulina regular.
- () Se utilizar canetas, após a homogeneização da insulina, selecionar a dose necessária, realizar a assepsia da pele com álcool 70% esperando secar, realizar a prega cutânea e aplicar a dose pressionando o botão injetor da caneta de insulina.
- () Evitar a aplicação da insulina em um mesmo ponto por pelo menos 14 dias, tempo necessário de cicatrização do tecido, e reforçar a importância do rodízio de locais a partir do aparecimento da lipodistrofia.
- () Na impossibilidade de uso único, orientar os usuários a reutilizar agulhas para aplicação de insulina subcutânea, entre 4 a 8 utilizações.

- a) C - E - C - C - C.
- b) C - C - C - E - C.
- c) E - C - E - E - E.
- d) C - C - C - E - E.

33) Desbridamento é um componente importante no gerenciamento da ferida pelo enfermeiro. Considerando os métodos de desbridamento e as suas ações no auxílio ao processo de cicatrização, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Desbridamento autolítico.
- (2) Desbridamento químico ou enzimático.
- (3) Desbridamento mecânico.

- () Remove o tecido desvitalizado com força de fricção, úmido/seco ou irrigação.
- () Remove o tecido aplicando agente enzimático exógeno que degrada o tecido desvitalizado.
- () Remove o tecido aplicando agente que promove meio úmido para que as enzimas presentes no leito da ferida e os macrófagos realizem a lise e a fagocitose do tecido necrótico.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 1 - 2.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 3 - 2 - 1.

34) O protocolo de sepse é aplicado a pacientes com suspeita de sepse ou choque séptico, quando há disfunção orgânica e suspeita de infecção grave. São intervenções de enfermagem na abordagem inicial da sepse, EXCETO:

- a) Administrar, na primeira hora após o diagnóstico, o antimicrobiano intravenoso de largo espectro.
- b) Reavaliar os sinais e sintomas de disfunção orgânica periodicamente nas 12 horas.
- c) Providenciar e garantir a monitorização do débito urinário.
- d) Puncionar acesso venoso calibroso para assegurar a reposição volêmica agressiva.

35) Sobre os sinais e os sintomas de desequilíbrio hidroeletrólítico, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Fadiga, anorexia, náusea e vômito, distensão abdominal, fraqueza muscular, hipersensibilidade e câimbras estão associados à hipopotassemia.
- () Parestesia, fraqueza muscular, dor torácica, confusão, insuficiência respiratória e hipóxia tecidual estão associados à hipofosfatemia.
- () Rubor, hipotensão, sonolência, reflexos hipoativos e depressão respiratória estão associados à hipermagnesemia.
- () Fraqueza muscular, anorexia, náuseas e vômitos, dor em flanco, poliúria e polidipsia, desidratação e letargia estão associados à hipercalemia.

- a) C - C - C - C.
- b) C - E - E - C.
- c) E - C - C - E.
- d) C - E - C - C.

36) No que se refere a crianças com infecção respiratória, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Lactentes e crianças pequenas, especialmente entre 6 meses e 3 anos de idade, reagem mais severamente a infecções agudas do trato respiratório do que crianças com mais idade.
- II. Entre os sinais e os sintomas associados a infecções das vias aéreas em lactentes e crianças pequenas, estão febre, meningismo e dor abdominal.
- III. As infecções do trato respiratório são sempre muito leves e não causam sintomas em lactentes.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

37) Sobre a avaliação e os cuidados de enfermagem em criança com infecção das vias aéreas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Se a criança estiver com temperatura corporal significativamente elevada, controlar a febre é somente responsabilidade da família da criança.
- b) Os sinais de deterioração clínica que incluem aumento do desconforto respiratório, redução da frequência respiratória e cardíaca, melhora da hipoxia, boa perfusão e letargia moderada devem ser avaliados somente pelo médico assistente da criança.
- c) A avaliação deve incluir frequência, profundidade e ritmo respiratórios, frequência cardíaca, oxigenação, estado de hidratação, temperatura corporal, nível de consciência, nível de atividade e nível de conforto.
- d) Crianças de menos idade com infecções do trato respiratório ficam irritadas e animadas, podendo ser difícil de oferecer cuidados prescritos. Assim, a família não deve acompanhá-las na hospitalização.

38) Sobre o equilíbrio hídrico em lactentes, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Devido a características próprias, o organismo de recém-nascidos e lactentes tem maior necessidade de água e é mais vulnerável a alterações no equilíbrio hidroeletrolítico.
- II. Em comparação a crianças de mais idade e adultos, os lactentes apresentam maior ingesta e produção de líquidos em relação ao tamanho corporal.
- III. Os distúrbios hidroeletrolíticos ocorrem com maior frequência e rapidez em lactentes, e as crianças têm poder menor de adaptação a essas alterações.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

39) Em crianças com histórico de perda de líquidos e desidratação potencial ou real, é fundamental a avaliação clínica. Sobre os tipos de desidratação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A desidratação isotônica (isosmótica ou isonatrêmica) ocorre em condições nas quais os déficits de eletrólitos e água estão presentes em proporções aproximadamente iguais. Essa é a principal forma de desidratação em pacientes pediátricos.
- II. A desidratação hipotônica (hiposmótica ou hiponatrêmica) ocorre quando o déficit eletrolítico excede o déficit hídrico.
- III. A desidratação hipertônica (hiperosmótica ou hipernatrêmica) resulta de uma perda de água que excede a perda de eletrólitos e geralmente é causada por uma perda proporcionalmente maior de água ou uma ingesta maior de eletrólitos.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

40) Sobre terapia antineoplásica, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os agentes antineoplásicos são classificados de acordo com sua estrutura química, função em nível celular e especificidade de ação no ciclo de divisão celular.
- b) Existem apenas dois tipos de agentes alquilantes na quimioterapia de doenças neoplásicas e não neoplásicas.
- c) Os agentes antimetabólicos não afetam as células e não inibem a síntese de DNA, podendo ser utilizados diariamente.
- d) Derivados vegetais são produtos utilizados que não causam danos à saúde, podendo ser aplicados em qualquer fase do tratamento oncológico.