



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



FundMed
Pesquisa Ensino Inovação

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2025

CATEGORIA PROFISSIONAL:

FONOAUDIOLOGIA

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA), assine no local indicado.
- Este caderno contém **40 questões de múltipla escolha**, com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais somente uma será a correta.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para a correção da prova objetiva, sendo de responsabilidade do candidato sua guarda durante a prova, seu preenchimento e sua entrega ao fiscal de sala.
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS com bastante atenção, à caneta esferográfica (ponta grossa, tinta azul ou preta), marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. Sob nenhuma circunstância, o cartão de respostas será substituído devido a erro, desatenção ou falha no preenchimento por parte do candidato.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de **até 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
- Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo **tempo mínimo de 60 minutos**.
- Ao terminar a prova, o candidato devolverá ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- O candidato somente poderá levar o caderno de provas **quando estiver faltando 60 minutos para o término do tempo total de duração da prova**. Por razões de segurança, o candidato que sair antes desse horário não poderá copiar as suas respostas.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar o lacre do material, quando então poderão retirar-se do local após concluído o procedimento.

1) Segundo Backes et al. (2009), em relação aos conceitos e às ideias de saúde e doença desenvolvidos ao longo da história e na contemporaneidade, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Na Antiguidade, acreditava-se que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais. Nesse período, a compreensão das doenças era por meio da filosofia religiosa. A doença é resultante do desequilíbrio do organismo humano.
- () A multicausalidade das doenças aparece na Renascença, em que os fatores causadores das doenças eram relacionados ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao meio ambiente. Acreditavam que as causas agiam entre si, acarretando maior gravidade das doenças.
- () Na contemporaneidade, a atenção à saúde volta-se para a promoção da saúde. Consideram-se importantes as vulnerabilidades e o empoderamento dos indivíduos, assim como a subjetividade e a singularidade do que acontece nas esferas individual e coletiva.
- () O conhecimento científico contribui para a caracterização da saúde e das doenças. Suas verdades são estanques e devem desconsiderar as práticas de cuidado e autocuidado de cada indivíduo e cultura.

- a) C - E - C - C.
- b) C - E - C - E.
- c) C - C - E - C.
- d) C - C - E - E.

2) Para Albuquerque (2014), em relação à produção social do humano e à determinação da saúde e da doença, é CORRETO afirmar que:

- a) A humanidade modifica a natureza, controlando seus processos de forma a adequá-la às suas necessidades.
- b) O ser humano, a partir de uma ideia, realiza processos para manutenção de bens e produtos que sejam obsoletos para sua sobrevivência.
- c) A sobrevivência humana se dá por meio de uma relação instintiva de subordinação à natureza.
- d) A humanidade reduz a mortalidade precoce, diminuindo a longevidade.

3) Em relação ao processo de saúde e doença e seus determinantes sociais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Segundo Albuquerque (2014), com a utilização dos meios de vida que o ser humano elabora e intencionalmente modifica, ele consegue garantir sua sobrevivência e ter maiores possibilidades de realização, o que pode reduzir a mortalidade precoce, aumentar a longevidade e desenvolvimento de seus saberes.
- II. Albuquerque (2014) nos diz que compreender a determinação social da saúde não consiste em compreender apenas que a saúde depende do acesso aos objetos humanos, mas à possibilidade de realização, de satisfação das necessidades da vida e ao acesso aos produtos necessários para tal fim.
- III. Segundo Albuquerque (2014), a saúde, entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo, apresenta-se de modo semelhante nas diferentes sociedades, classes e estratos de classes sociais, apesar das diferenças biológicas entre os corpos dos seres humanos que as compõem.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.

4) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Incidente.
- (2) Evento adverso.
- (3) Gestão de risco.
- (4) Cultura de segurança.

- () Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- () Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, oportunizando aprender com as falhas e melhorando a atenção à saúde.
- () Incidente que resulta em dano à saúde.
- () Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.

- a) 3 - 2 - 4 - 1.
- b) 2 - 3 - 1 - 4.
- c) 3 - 1 - 4 - 2.
- d) 1 - 4 - 2 - 3.

5) Considerando-se a Resolução-RDC nº 36/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Resolução se aplica a todos os serviços de saúde, excetuando-se os privados.
- II. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar como princípio e diretriz a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
- III. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 60 dias a partir do ocorrido para análise aprofundada do evento.
- IV. Compete aos NSP estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

6) Em um ensaio clínico randomizado, pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais, para avaliar seu impacto na prevenção de quedas. Como resultado primário, o risco relativo (RR) estimado para quedas foi de 1,11 (IC 95%, 0,94 a 1,31), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nesses dados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O risco de quedas foi 1,11% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) O risco de quedas foi 11% maior no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para quedas seja de 11% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

7) Em um ensaio clínico randomizado, no qual pacientes idosos em uso por pelo menos 3 meses consecutivos de medicamentos com ação no sistema nervoso central (opioides, sedativos-hipnóticos, relaxantes musculares, antidepressivos tricíclicos ou anti-histamínicos de primeira geração) foram recrutados, juntamente ao seu médico prescritor, para serem aleatoriamente alocados para intervenção de educação do paciente e apoio à decisão do médico, ou para grupo controle de cuidados habituais. O risco relativo (RR) estimado para alcançar a descontinuação do uso dessas medicações foi de 1,79 (IC 95%, 1,29-2,50), na comparação do grupo intervenção vs. controle. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Descontinuação da medicação foi 1,79% menor no grupo intervenção, comparado ao controle.
- b) Descontinuação da medicação foi 79% mais frequentemente alcançada no grupo intervenção comparado ao controle, sendo esse resultado estatisticamente significativo.
- c) Estima-se que a redução relativa do risco para descontinuação da medicação seja de 79% no grupo intervenção, comparado ao controle.
- d) Não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos intervenção e controle.

8) O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, entre outros. Sobre essas ações e serviços, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Atenção psicossocial.
- II. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- III. Vigilância em saúde.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

9) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Entende-se por vigilância _____ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde _____, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de _____ das doenças ou agravos.

- a) epidemiológica | individual ou coletiva | prevenção e controle
- b) sanitária | coletiva | controle
- c) epidemiológica | individual | fiscalização e reabilitação
- d) sanitária | individual ou coletiva | prevenção e controle

10) Sobre as atribuições diferenciadas da União, dos Estados e dos Municípios no âmbito da Vigilância em Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Compete exclusivamente à União a elaboração de normas pertinentes à vigilância em saúde.
- b) A União é a única responsável pela execução de ações de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras, sem possibilidade de compartilhamento com Estados e Municípios.
- c) Os Municípios são responsáveis por participar da pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de vigilância em saúde.
- d) Os Estados, diferentemente da União, não têm atribuições relacionadas ao financiamento das ações de vigilância em saúde.

11) Sobre as redes de atenção à saúde (RAS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece as diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS.
- II. Propor novas formas de financiamento para a Atenção Primária à Saúde dos municípios, desde que cumpram os seguintes atributos: primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária, que é uma estratégia para implantação da RAS.
- III. As RAS são definidas como os serviços e as ações que intervêm em processos de saúde doença, pautados em diferentes densidades tecnológicas, logísticas e de gestão para assegurar a integralidade do cuidado, melhorar o acesso, a equidade, bem como a eficácia proposta no SUS.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12) O terceiro componente das redes de atenção, os sistemas de apoio, são os lugares institucionais em que se realizam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Quais são estes sistemas de apoio?

- a) Sistema de diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica e sistemas de informação à saúde.
- b) Sistemas de governança, sistema de identificação da área geográfica e sua população.
- c) Sistemas logísticos e sistema de saúde mental.
- d) Sistema da rede hospitalar no nível federal.

13) A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas Comissões Intergestores. Sobre estas comissões, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Comissões Intergestores Tripartite.
- (2) Comissões Intergestores Bipartite.
- (3) Comissões Intergestores Regionais.

- () Âmbito das regiões de saúde.
- () Âmbito federal.
- () Âmbito estadual.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 2.

14) Sobre o tema da bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As condições necessárias para que a interdisciplinaridade ocorra são a existência de uma linguagem comum; objetivos comuns; reconhecimento da necessidade de considerar diferenças existentes; domínio dos conteúdos específicos de cada um dos participantes; e elaboração de uma síntese complementar.
- b) Bioética é uma reflexão compartilhada, complexa e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver.
- c) Na bioética, a humildade é uma característica que não é levada em consideração, pois o resultado das reflexões são sempre definitivos e imutáveis.
- d) Conhecimentos e discussões gerados pela bioética e pela ecologia contribuíram para ampliar a noção de responsabilidade.

15) Considerando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Como política pública, baseia-se na aprendizagem pelo método tradicional de ensino.
- b) A residência multiprofissional em saúde (RMS) é considerada um espaço para o desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde (EPS), o qual pode se constituir como um dispositivo potencial para promover as mudanças pretendidas pelos profissionais de saúde, a fim de consolidar os princípios do SUS.
- c) Para a operacionalização da PNEPS, torna-se imperativa a premissa de que as práticas dos profissionais de saúde respondam prioritariamente às demandas das redes ambulatoriais e hospitalares privadas.
- d) O fazer profissional na área da saúde, incluindo a RMS e a EPS, é um fim em si mesmo e tem como ação principal a oferta de cursos na modalidade a distância.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 25 QUESTÕES

16) Em se tratando das variações do bolo alimentar, alguns aspectos indicam modificações sistemáticas e esperadas na fisiologia da deglutição. Assim, infere-se que o aumento da viscosidade do bolo pode desencadear:

- a) Diminuição do tempo do trânsito faríngeo.
- b) Maior abertura do esfíncter esofágico superior.
- c) Diminuição da duração das ondas peristálticas da faringe.
- d) Necessidade de menor pressão da língua para propulsão.

17) Em idosos, os músculos orofaciais, por diminuição da força e do tônus, apresentam diminuição da pressão intraoral durante a deglutição em comparação com adultos jovens. Assim, seria INCORRETO afirmar que, no processo de envelhecimento:

- a) Há um incremento no número de golpes mastigatórios se com dentição completa.
- b) O comportamento da pressão da língua é considerado controverso.
- c) A frequência da deglutição diária é menor nos menos ativos.
- d) Há redução da amplitude e da velocidade dos movimentos verticais laríngeos.

18) Considerando os resultados dos exames de imagem que podem ser necessários para o diagnóstico da disfagia em casos de aspirações silenciosas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Uma das principais causas de aspirações silentes é a dessensibilização, e não a denervação.
- II. A presença de secreção espessa sensibiliza os receptores faríngeos.
- III. O músculo cricotireóideo é o principal responsável pela tensão das pregas vocais.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

19) A doença de Parkinson é causada, principalmente, pela depleção de dopamina na substância negra localizada no mesencéfalo. Considerando a clínica dessa doença, é CORRETO afirmar que:

- a) Inicia de forma insidiosa, com tremores ao movimento dos lábios ou na extremidade de um dos membros.
- b) A deterioração cognitiva com sintomas semelhantes à doença de Alzheimer ocorre em aproximadamente 75% dos casos.
- c) A prevalência de distúrbios na deglutição varia entre 11 a 81% com alterações nas fases oral e faríngea.
- d) A xerostomia é uma queixa frequente que se associa à evolução da doença e à piora na deglutição.

20) O distúrbio da deglutição em pacientes com câncer de cabeça e pescoço é denominado disfagia mecânica. Considerando as intervenções realizadas, é CORRETO afirmar que:

- a) O tratamento cirúrgico desencadeará efeitos precoces ou tardios independentemente de sítio primário, estadiamento clínico ou extensão da ressecção.
- b) Ocorre disfagia após a laringectomia total por falta de pressão intraoral, redução da peristalse faríngea e na retração da base da língua.
- c) Após a intervenção cirúrgica na cavidade oral, pode ocorrer penetração e aspiração após a deglutição por falta de controle oral.
- d) Em casos de tireoidectomia, pode ocorrer disfagia caracterizada por aspiração de resíduos após a deglutição, mesmo em pacientes com mobilidade laríngea preservada.

21) A intubação orotraqueal e a ventilação mecânica podem ser necessárias ao longo de uma internação. Com relação às suas implicações na deglutição, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Caso o período de intubação seja maior do que uma semana, haverá aumento do risco de lesão laríngea com disfagia após a extubação da ventilação mecânica.
- b) O atraso no disparo da deglutição pode ser observado após dois dias subsequentes à extubação.
- c) A disfagia faríngea pode evoluir bem em torno de 24 horas após a extubação, e o paciente pode retornar à dieta por via oral.
- d) O distúrbio da deglutição após a extubação pode estar associado tanto a alterações cognitivas quanto a alterações mecânicas.

22) O uso de traqueostomia causa alterações neurofisiológicas e mecânicas na deglutição, aumentando o risco de aspiração. A partir destas alterações, é CORRETO afirmar que:

- a) Na presença da cânula de traqueostomia, principalmente com balonete insuflado, ocorre aumento da pressão infraglótica.
- b) A cânula de traqueostomia não interfere no processo de deglutição se a técnica cirúrgica envolver fixação à pele.
- c) Há alteração da sensibilidade laríngea em razão da diminuição do reflexo de deglutição ao nível dos neurônios motores medulares.
- d) O traqueostomizado pode apresentar aumento do tempo de deglutição e estase faríngea prolongada.

23) A polineuropatia do doente crítico está associada à fraqueza muscular adquirida em pacientes que permanecem em unidade de terapia intensiva (UTI). Considerando essa doença e suas implicações, é INCORRETO afirmar que:

- a) Está correlacionada com maior mortalidade.
- b) Está envolvida com maior incidência de pneumonias.
- c) É uma doença potencialmente incurável.
- d) Não há estudos que correlacionem a fraqueza muscular com a disfagia.

24) A videoendoscopia da deglutição ou FEES® é um exame que pode ser escolhido para a aplicação em caso da impossibilidade de realizar o videodeglutograma. A partir disso, sobre o FEES®, é CORRETO afirmar que:

- a) É um exame com ingestão de bário, pouco invasivo, simples e barato.
- b) Deve ser indicado caso sintomas inconsistentes no exame clínico sejam identificados.
- c) É eficaz para identificar a sensibilidade durante a fase esofágica.
- d) Não pode ser realizado caso o paciente apresente alterações posturais.

25) A videofluoroscopia da deglutição é indicada quando a avaliação clínica não esclarece o diagnóstico da disfagia. Considerando os resultados encontrados nas fases da deglutição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A aspiração antes da deglutição é causada por alteração da sensibilidade oral.
- II. A aspiração após a deglutição ocorre por redução do fechamento laríngeo.
- III. A aspiração silente ocorre por redução da elevação laríngea.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

26) A avaliação da linguagem deve incluir a investigação de fluência de fala, repetição, compreensão oral, nomeação oral, aspectos gramaticais, leitura e escrita, pragmática, prosódia, assim como de manifestações linguísticas. Sobre o assunto, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () A afasia de condução apresenta a fluência e a expressão preservadas, mas a repetição prejudicada.
- () A afasia de Wernicke apresenta a repetição e a compreensão prejudicadas, mas fluência preservada.
- () A afasia transcortical motora apresenta a fluência prejudicada, mas a repetição e a compreensão preservadas.

- a) E - E - C.
- b) E - C - C.
- c) C - C - E.
- d) C - E - E.

27) O Código de Ética da Fonoaudiologia regulamenta os direitos e os deveres dos fonoaudiólogos inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Com base nele, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Como uma das disposições preliminares, cabe aos fonoaudiólogos inscritos e aos demais interessados comunicar aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia fatos que caracterizem a inobservância do Código de Ética e das normas que regulamentam o exercício da Fonoaudiologia.
- II. Incluído nos deveres gerais do fonoaudiólogo está apontar falhas em regulamentos e normas de instituições, quando as julgar incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo dirigir-se, nesses casos, ao Conselho Regional de fonoaudiologia.
- III. Entre os direitos gerais do fonoaudiólogo, nos limites de sua competência e suas atribuições, constituem-se: avaliar, solicitar e realizar exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa, além de emitir declaração, parecer, atestado, laudo e relatório.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

28) De acordo com as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal (TAN), a TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância: triagem, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. A respeito da TAN, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Todos os recém-nascidos devem realizar a TAN, e não apenas aqueles com indicador de risco para deficiência auditiva.
- b) A TAN deve ser realizada, preferencialmente, logo após o nascimento, antes das primeiras 24h de vida.
- c) No caso de nascimentos que ocorram em domicílio, fora do ambiente hospitalar, ou em maternidades sem triagem auditiva, a realização do teste deverá ocorrer no primeiro mês de vida.
- d) Os procedimentos da TAN devem ser realizados como triagem, mesmo que os equipamentos utilizados tenham a possibilidade de realização de exames de diagnóstico.

29) A sucção não nutritiva (SNN) indiretamente proporciona benefícios para o desempenho da alimentação oral. A oferta de SNN por dedo enluvado durante a alimentação por gavagem propicia muitos benefícios. Considerando esses benefícios, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Melhor tolerância alimentar.
- b) Acelera a transição da alimentação por sonda para via oral.
- c) Aumento do ganho de peso.
- d) Melhora no equilíbrio da temperatura corporal.

30) Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Na atuação em disfagia pediátrica, além da avaliação clínica fonoaudiológica, a qual é considerada _____, muitas vezes é necessária a realização de exames instrumentais complementares para uma melhor avaliação, como a _____, sendo uma grande aliada na avaliação de bebês e crianças com alterações na deglutição, sejam elas advindas de doenças neurológicas ou não, observando-se uma alta incidência de aspiração _____ em estudos radiográficos envolvendo crianças com múltiplas deficiências.

- a) soberana | videofluoroscopia da deglutição | maciça
- b) inconclusiva | radiografia de tórax | silenciosa
- c) soberana | videofluoroscopia da deglutição | silenciosa
- d) soberana | radiografia de tórax | maciça

31) Na declaração de 2019, o *Joint Committee on Infant Hearing* (JCIH) sugere que, para alguns bebês na UTIN (por exemplo, bebês em ventiladores), pode não ser viável ou prático realizar uma triagem auditiva antes de um mês de vida devido a alguns fatores. Com isso, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Alta probabilidade de presença de líquido na orelha média.
- II. Interferência de ruído.
- III. Interferência elétrica no equipamento.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

32) Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

De um modo geral, vários fatores podem causar alterações na sucção do bebê na mamada, como: intercorrências clínicas, baixo peso ao nascer (em especial prematuridade), distúrbios metabólicos, alterações neurológicas, síndromes e anomalias congênitas. Algumas das alterações recorrentes na amamentação são: _____, que dificulta a pega, e a pega inadequada, que pode dificultar a _____, acarretando uma _____, podendo levar a um inadequado ganho de peso.

- a) posicionamento inadequado | extração de leite | redução na produção láctea
- b) estalos durante a mamada | extração de leite | desorganização oral
- c) posicionamento inadequado | respiração | redução na produção láctea
- d) micrognatia | respiração | redução na produção láctea

33) O padrão de alimentação oral em lactentes prematuros é caracterizado por:

- a) Imaturidade na coordenação entre sucção, deglutição e respiração.
- b) Mordida tônica.
- c) Desorganização oromotora com escape posterior.
- d) Hiperextensão cervical.

34) Sobre a intervenção do fonoaudiólogo no distúrbio alimentar pediátrico (DAP), considerando as intervenções mais adequadas para melhorar a relação da criança com os alimentos e com o ambiente das refeições, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Utilizar recursos lúdicos com fins terapêuticos para diminuir o estresse da criança.
- II. Compreender que o ato de comer é aprendido, bem como saber identificar os pontos que estão dificultando a apreciação da criança pelos alimentos e pelo ambiente das refeições.
- III. Iniciar a intervenção expondo o paciente a contato direto com os alimentos de menor aceitação, direcionando o alimento à cavidade oral, para que se acostume e tolere.
- IV. Adequar o cardápio do ponto de vista sensorial, para melhor conforto e relacionamento da criança com o alimento.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

35) Vários distúrbios gastrointestinais e condições médicas podem exigir o uso de nutrição parenteral total (NPT) ou sondas orogástricas ou nasogástricas, ou gastrostomias, como meio de fornecer ingestão e nutrientes calóricos adequados à população pediátrica. Sobre os critérios para desmame de via alternativa, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Problema médico estabilizado.
- () Bom estado nutricional.
- () Deglutição segura e eficiente.
- () Cuidadores preparados.
- () Habilidades alimentares apropriadas.

- a) C - E - C - E - E.
- b) E - C - E - C - C.
- c) C - E - C - C - E.
- d) C - C - C - C - C.

36) As práticas alimentares parentais se constituem nos comportamentos adotados pelos pais na intenção de influenciar o consumo e os hábitos alimentares da criança. Os estilos parentais refletem o clima emocional durante as refeições. Sobre o estilo parental e a prática alimentar saudável, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Responsivo.
- (2) Controlador.
- (3) Permissivo ou indulgente.
- (4) Não envolvido ou passivo.

- () Tenta controlar a alimentação da criança. Restringe alimentos da criança. Pressiona a criança para comer. Suborna a criança com recompensas. Ignora os sinais de fome da criança.
- () Orienta a alimentação da criança. Estabelece limites. Come como modelo e conversa sobre comida de forma positiva. Responde aos sinais de fome da criança.
- () Não estabelece limites. Alimenta a criança com o quê, onde e quando ela quer. Prepara comidas especiais para a criança. Ignora os sinais de fome da criança.
- () Desiste das responsabilidades alimentares. Não estabelece limites. Ignora os sinais de fome ou as necessidades físicas e psicológicas da criança.

- a) 2 - 1 - 3 - 4.
- b) 1 - 3 - 4 - 2.
- c) 4 - 1 - 2 - 3.
- d) 2 - 3 - 4 - 1.

37) Pode ser entendido como ingestão oral prejudicada por mais de duas semanas, que não é apropriada para a idade, e está associado à disfunção médica, nutricional, habilidade alimentar e/ou psicossocial. Devido à interação entre esses domínios, o comprometimento de um pode levar à disfunção de qualquer um dos outros, resultando nesse diagnóstico:

- a) Dificuldade alimentar.
- b) Distúrbio alimentar pediátrico.
- c) Disfunção oral.
- d) Disfagia.

38) A primeira etapa do Método Canguru inicia-se:

- a) No pré-natal, com a identificação de situação de risco que indique a necessidade de cuidados especializados para a gestante, continuando na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e/ou Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) durante a internação do RN.
- b) Na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa), onde a mãe, apoiada e orientada pela equipe de saúde, assume a maior parte dos cuidados com seu filho.
- c) No domicílio, com o suporte ambulatorial da maternidade de origem.
- d) Na Unidade Básica de Saúde, com a primeira consulta após alta, em até 48 horas após a alta.

39) De acordo com as diretrizes do cuidado do Método Canguru, sobre as medidas de adequações sensoriais tátil e auditiva no ambiente neonatal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Manusear as incubadoras com cuidado, não provocar barulho e nem colocar objetos sobre elas. Fechar e abrir as portinholas de forma suave. Tomar cuidado durante o manuseio dos equipamentos, evitando esbarrões.
- II. Utilizar rolinhos que sirvam de apoio e aconchego ao RN de forma a facilitar posição fetal em flexão e favorecer a organização neurocomportamental, inclusive com a aproximação das mãos na boca.
- III. Preparar o “ninho” utilizando rolinhos com os lençóis do RN, fornecendo limites e suporte para o seu corpo.
- IV. Realizar toque intermitente e leve (tipo cócegas), pois o recém-nascido geralmente reage positivamente a ele.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa III está correta.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

40) Abaixo, há as etapas de um procedimento. Assinale a alternativa que se refere a esse procedimento.

- I. Auxiliar a mãe a se posicionar de forma adequada, observando sempre se ela está confortável, com apoio nas costas e nos pés.
- II. Fixar a seringa, sem o êmbolo, com fita adesiva na roupa da mãe e na altura do peito.
- III. Acoplar a sonda na seringa.
- IV. Fixar previamente a sonda no peito, deixando sua ponta exatamente no mamilo, sem ultrapassar.
- V. Verificar se o RN abocanhou corretamente o mamilo e a aréola.
- VI. Colocar o leite materno, previamente extraído na seringa, sem o êmbolo. O RN, ao sugar, retirará leite do peito ao mesmo tempo em que recebe o leite que flui da seringa.

- a) Técnica sonda-dedo.
- b) Técnica da mama vazia.
- c) Sucção nutritiva no peito.
- d) Translactação.