



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA: RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE/2024 RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE/2024

ENFERMAGEM

Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde	Questões de 01 a 15
Conhecimentos Específicos	Questões de 16 a 40

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (FOLHA DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Após conferir seus dados na FOLHA DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA), assine no local indicado.
- Verifique se este caderno contém 40 questões com quatro alternativas de resposta (A, B, C e D).
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTAS, único documento válido para correção, com atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros e a utilização de livros, impressos ou qualquer outro material de consulta. É expressamente proibido o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos nas dependências do local de prova.
- A prova objetiva terá duração de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
- Ao final dos trabalhos, devolva ao fiscal da sala a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada, podendo levar consigo seu caderno de questões de acordo com o previsto no edital do processo seletivo.
- AGUARDE A ORDEM DO FISCAL DA SALA PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. A bioética, na sua origem e complexidade, pode ser utilizada como um amplo referencial teórico para dar suporte às discussões sobre saúde e intervenções científicas. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo.
- I. A bioética se tornou um campo de encontro para numerosas disciplinas, discursos e organizações envolvidas com questões éticas, legais e sociais trazidas pelos avanços da medicina, ciência e biotecnologia.
 - II. Os conhecimentos e discussões gerados pela bioética e pela ecologia contribuíram para ampliar a noção de responsabilidade, durante muito tempo, associada aos deveres existentes entre seres humanos contemporâneos e geograficamente próximos.
 - III. A bioética baseia-se na perspectiva usual da relação dos seres humanos com a natureza, no sentido de domínio sobre a mesma, o ambiente natural visto como um recurso para ser desfrutado e as discussões políticas centradas no âmbito nacional.
 - IV. Bioética significa o reconhecimento de obrigações éticas, não apenas com relação ao ser humano, mas para com todos os seres vivos.
 - V. Durante muito tempo, a relação profissional paciente, por exemplo, foi considerada como sendo um sistema fechado, onde apenas esses dois elementos contavam. Com a crescente participação da família, das empresas de seguro e de outros profissionais prestadores de serviço, o sistema teve que ser aberto para ser adequadamente entendido.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I, II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.

2. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde propõe uma configuração para que os profissionais de saúde produzam conhecimento, pensem na educação e no trabalho. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) Como política pública, baseia-se na aprendizagem verticalizada, pautando-se nas práticas em ação na rede de serviços e, por conseguinte, no conhecimento da realidade.
 - (B) A Residência Multiprofissional em Saúde tem como objetivo formar profissionais para atuação no SUS, uma vez que pressupõe construção interdisciplinar dos profissionais em saúde e trabalho em equipe.
 - (C) A Residência Multiprofissional em Saúde como estratégia para a disseminação da Educação Permanente em Saúde entre os profissionais propõe a imutabilidade no campo da saúde.
 - (D) O projeto pedagógico da Residência Multiprofissional em Saúde espera do residente comprometimento com os princípios do SUS, especialmente com estratégias de medicalização da saúde.

3. Sobre a Resolução RDC n.º 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Cultura da segurança é o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- () Dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- () Evento adverso é o incidente que não chegou a ocorrer, mas com grande probabilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

4. Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (2008), tais determinantes estariam vinculados aos comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho, bem como à macroestrutura _____, _____ e _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) econômica / social / cultural
- (B) renda / crença / trabalho
- (C) crença / habitação / social
- (D) econômica / produção / crença

5. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- () A definição utilizada para emergência em saúde pública é: situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
- () A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e poder privado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / V / F
- (C) F / V / V
- (D) V / F / V

6. Sobre os conceitos de saúde e doença ao longo da história, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Antiguidade.	A.	Tende à redução, à objetividade e à fragmentação do conhecimento, traduzindo os acontecimentos por meio de formas abstratas, demonstráveis e calculáveis.
2.	Idade Moderna.	B.	Aspectos econômicos, políticos, socioculturais, socioepidemiológicos e históricos influenciam o processo de viver e a saúde humana e os modos de vida, de trabalho e de produção são fundamentais para se compreender os processos de saúde, adoecimento e morte da população.
3.	O Olhar Epidemiológico.	C.	Acreditava-se que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais ou sobrenaturais.
4.	O Olhar Antropológico.	D.	Baseadas em questionamentos que envolvem valores e significados relacionados a determinados hábitos e comportamentos considerados como de risco e de agravos à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2D / 3A / 4B
- (B) 1C / 2A / 3D / 4B
- (C) 1D / 2A / 3B / 4C
- (D) 1B / 2C / 3D / 4A

7. São considerados atributos essenciais da rede de atenção à saúde:

- (A) população; estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.
- (B) carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
- (C) reativa e episódica, acionada pela demanda das pessoas usuárias.
- (D) população e territórios definidos; extensa gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes serviços; Atenção Primária à Saúde como primeiro nível de atenção; Serviços especializados; mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de forma continuada; atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e nas comunidades, levando em consideração as particularidades de cada um.

8. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Diretrizes.	A.	A inserção da vigilância em saúde na Rede de Atenção à Saúde (RAS) A gestão do trabalho, o desenvolvimento e a educação permanente; Processos de trabalho integrados com a atenção à saúde.
2.	Princípios.	B.	apoiar tecnicamente e atuar de forma integrada com as Secretarias Municipais de Saúde na implementação das ações de vigilância em saúde.
3.	Estratégias de organização.	C.	Conhecimento do território; Integralidade; Equidade; universalidade e Cooperação e articulação intra e intersectorial.
4.	Responsabilidade do Estado/SES.	D.	Processos de trabalho integrados com a atenção à saúde; promover a cooperação e o intercâmbio técnico científico no âmbito nacional e internacional; avaliar o impacto de novas tecnologias e serviços relacionados à saúde de forma a prevenir riscos e eventos adversos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1D / 2B / 3A / 4C
- (B) 1C / 2A / 3B / 4D
- (C) 1D / 2C / 3A / 4B
- (D) 1B / 2C / 3D / 4A

9. A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- I. atenção primária.
- II. urgência e emergência.
- III. atenção psicossocial.
- IV. atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- V. vigilância em saúde.

É correto o que se afirma em

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, IV e V, apenas.
- (C) I, II, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.

10. O texto da Portaria n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010, apresenta os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Economia de escala ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, sendo o longo prazo, um período de tempo suficiente para que todos os insumos sejam variáveis.
- (B) Integração Vertical consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade. É utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganhos de escala (redução dos custos médios totais em relação ao volume produzido) e escopo (aumento do rol de ações da unidade).
- (C) As Diretrizes Clínicas e as Linhas de Cuidado devem ser utilizadas apenas no âmbito hospitalar.
- (D) Os níveis de atenção referem-se aos limites geográficos e sua população e no estabelecimento do rol de ações e serviços que serão ofertados nesta região de saúde. As competências e responsabilidades dos pontos de atenção no cuidado integral estão correlacionadas com abrangência de base populacional, acessibilidade e escala para conformação de serviços.

11. Sobre as principais ferramentas de microgestão dos serviços, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A Rede de Atenção à Saúde organiza-se a partir de um processo de gestão da clínica associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de recursos.
- () A gestão de caso é a mudança de um modelo de atenção à saúde focada no indivíduo, por meio de procedimentos curativos e reabilitadores, para uma abordagem baseada numa população adscrita, que identifica pessoas em risco de adoecer ou adoecidas, com foco na promoção da saúde e/ou ação preventiva, ou a atenção adequada, com intervenção precoce, com vistas a alcançar melhores resultados e menores custos.
- () A gestão dos riscos coletivos e ambientais passa pela vigilância, prevenção e controle das doenças, agravos e fatores de risco, onde o foco é a identificação oportuna de problemas de saúde na população, a identificação das causas e fatores desencadeantes, a descrição do comportamento, a proposição de medidas para o controle ou eliminação e o desencadeamento das ações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) V / V / F
- (C) F / V / V
- (D) V / F / V

12. As ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem obedecer aos seguintes princípios:

- I. integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- IV. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

13. Sobre as competências no Sistema Único de Saúde (SUS), correlacione as colunas abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Direção nacional do SUS.	A.	Executar serviços: de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; de saúde do trabalhador; e de saúde bucal.
2.	Direção estadual do SUS.	B.	Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
3.	Direção municipal do SUS.	C.	Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2A / 3B
- (B) 1B / 2C / 3A
- (C) 1A / 2B / 3C
- (D) 1A / 2C / 3B

14. Um estudo incluiu 10.318 participantes para investigar a associação de atividades de lazer com risco de demência entre idosos. O envolvimento mais frequente em atividades relacionadas às habilidades de ler e escrever (por exemplo, escrever cartas ou escrever um diário, usar um computador e ter aulas/cursos) e em atividades mentais ativas (por exemplo, jogos, cartas ou xadrez e fazer palavras cruzadas ou quebra-cabeças) estiveram associados a uma estimativa de risco relativo para demência de 0,89 (IC 95%: 0,85-0,93) e 0,91 (IC 95%: 0,87-0,95), respectivamente.

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Idosos que realizam atividades envolvendo habilidades de ler e escrever apresentam um risco de demência 11% menor, bem como aqueles que realizam atividades mentais ativas um risco 9% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (B) Atividades envolvendo habilidades de ler e escrever estão associadas a um risco de demência 89% menor, bem como atividades mentais ativas a um risco 91% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (C) A probabilidade de demência é de 0,89% naqueles que realizam atividades envolvendo habilidades de ler e escrever e de 0,91% naqueles que realizam atividades mentais ativas.
- (D) Não foi encontrada significância estatística na associação entre realizar atividades envolvendo habilidades de ler e escrever, nem realizar atividades mentais ativas, com demência.

15. No estudo que investigou a associação de atividades de lazer com risco de demência entre idosos, foi verificado que o envolvimento em atividades artísticas criativas (artesanato, marcenaria ou metalurgia e pintura ou desenho) apresentou risco relativo estimado para demência de 0,93 (IC 95%, 0,88-0,99) e em passeios externos um risco relativo de 1,00 (IC95%: 0,95 a 1,05).

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Idosos que realizam atividades artísticas criativas apresentam um risco de demência 7% menor, enquanto aqueles que realizam passeios externos um risco 100% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (B) Atividades artísticas criativas estão associadas a um risco de demência 93% menor, enquanto passeios externos a um risco 1% menor, quando comparados aos que não realizam tais atividades.
- (C) Estima-se que a redução relativa do risco para demência seja de 7% naqueles que realizam atividades artísticas criativas, comparados aos que não realizam, não sendo encontrada significância estatística na associação entre realizar passeios externos e demência.
- (D) A probabilidade de demência foi de 0,93% naqueles que realizam atividades artísticas criativas e de 0% naqueles que realizam passeios externos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A história natural da insuficiência cardíaca caracteriza-se pela piora progressiva da função cardíaca e dos sintomas associados. Apesar dos avanços no tratamento, pacientes com insuficiência cardíaca podem progredir para uma condição clínica denominada insuficiência cardíaca avançada, definida por

- I. sintomas de insuficiência cardíaca persistentes e graves.
- II. disfunção ventricular grave, definida por fração de ejeção ventricular maior que 30%.
- III. episódios de congestão pulmonar ou sistêmica que requerem altas doses de diurético endovenoso.
- IV. capacidade para o exercício levemente diminuída.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

17. O sedentarismo tem alta prevalência tanto no Brasil quanto no mundo, e está fortemente relacionado à mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares. Tanto em estratégia individual, quanto populacional de prevenção de doenças cardiovasculares, é de fundamental importância priorizar um forte combate ao sedentarismo, estimulando a adoção de um estilo de vida mais ativo. Sobre os efeitos agudos do exercício físico, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Aumento do débito cardíaco.
- () Diminuição do fluxo sanguíneo coronariano.
- () Aumento da glicemia.
- () Diminuição dos hormônios grelina e pipar Y (reguladores de apetite).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V / V
- (B) V / F / F / F
- (C) F / V / F / V
- (D) V / F / F / V

18. A insulina está entre os principais medicamentos definidos pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente perigosos, pois falhas na sua utilização podem resultar em danos significativos, incluindo a morte. O enfermeiro deve realizar capacitação inicial para paciente/família com indicação de uso de insulina e manter-se vigilante nas consultas de enfermagem subsequentes, orientando

- (A) o rodízio na aplicação da insulina é recomendado somente em casos de lipodistrofias.
- (B) para gestantes a partir do último trimestre de gravidez, aconselhar aplicações na região abdominal.
- (C) recomendar seringas com agulhas fixas, com graduação adequada ao número de unidades de insulina diária.
- (D) sempre que possível a insulina deve ser acondicionada em sua embalagem original, na porta do refrigerador.

19. O câncer de colo uterino está em quarto lugar dentre os tipos de câncer que acometem a população feminina no Brasil. Os enfermeiros têm importante papel na ampliação do rastreamento e monitoramento da população adscrita, realizando busca ativa das mulheres, de modo a impactar positivamente na redução da morbimortalidade por câncer de colo uterino. Com relação à periodicidade para realização do exame citopatológico de colo do útero, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Mulheres de 25 a 64 anos de idade que já tiveram ou têm atividade sexual.	A.	Realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, não realizar exames adicionais.
2.	Mulheres após os 64 anos de idade sem histórico de rastreio.	B.	Não é necessário rastreamento.
3.	Mulheres após os 64 anos de idade com dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.	C.	Anualmente, e após dois resultados normais consecutivos, o intervalo entre coletas passa a ser a cada três anos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2B / 3A
- (B) 1C / 2A / 3B
- (C) 1A / 2C / 3B
- (D) 1B / 2A / 3C

20. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é um direito do profissional de enfermagem

- (A) negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe que não ofereça risco à integridade física do profissional.
- (B) delegar atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente.
- (C) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (D) registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

21. De acordo com Hockenberry, Wilson e Rodgers (2023), a bronquiolite é uma infecção viral aguda com efeito máximo no nível bronquilar. Sobre esta infecção, é correto afirmar que

- (A) é mais comum em crianças de 2 a 4 anos de idade.
- (B) o adenovírus é o patógeno mais comum.
- (C) tem início como uma insuficiência respiratória aguda com sintomas de rinorreia e febre de baixo grau.
- (D) independente se os sintomas forem leves ou graves, toda criança necessita de hospitalização para observação dos sintomas.

22. De acordo com Barros et al (2022), o processo de enfermagem é detalhado e definido operacionalmente em cada uma de suas cinco etapas, que devem ser inter-relacionadas, _____ e recorrentes, a saber: coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem); _____; planejamento de enfermagem; _____ e avaliação de enfermagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) independentes / intervenções de enfermagem / cuidados de enfermagem
- (B) sequenciais / prescrição de enfermagem / intervenções
- (C) interdependentes / diagnóstico de enfermagem / implementação
- (D) ininterruptas / cuidados de enfermagem / discussão de caso

23. De acordo com Morsch et al (2022), a sepse é definida como a “presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária a resposta desregulada do hospedeiro à infecção”. As manifestações clínicas da sepse estão associadas ao foco infeccioso e aos sinais decorrentes dos órgãos em disfunção. Os sintomas da sepse em pacientes adultos incluem, geralmente,

- I. alterações no estado de consciência (agitação, sonolência, torpor, confusão).
- II. bradipneia.
- III. leucocitose/leucopenia.
- IV. bradicardia.

É correto o que se afirma, apenas, em

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.

24. Sobre a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) para pacientes adultos em Parada Cardiopulmonar (PCR), de acordo com as últimas diretrizes da American Heart Association (2020), assinale a alternativa correta.

- (A) As compressões torácicas devem ser realizadas com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120/min) e deve-se aguardar o retorno total do tórax.
- (B) O profissional responsável pelas compressões torácicas deve ser alternado a cada três minutos.
- (C) É aconselhável para os profissionais tentarem, primeiro, estabelecer o acesso intraósseo para administração de medicamentos em parada cardiopulmonar.
- (D) Recomenda-se que leigos não iniciem a ressuscitação cardiopulmonar para uma suposta parada cardiopulmonar, pois o risco de dano ao paciente é alto se o paciente não estiver em parada cardiopulmonar.

25. Segundo a Nota Técnica n.º 11/2019, o Ministério da Saúde irá incentivar e habilitar unidades especializadas em saúde mental/psiquiatria em hospitais gerais, com mínimo de 8 e máximo de 30 leitos por enfermaria. Sobre essas unidades, é correto afirmar que

- (A) o número de leitos não deverá exceder o percentual de 20% do número total de leitos do Hospital Geral.
- (B) o repasse integral do incentivo de custeio é feito pelo Ministério da Saúde independente da ocupação da unidade
- (C) para o cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de dois técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; um enfermeiro por turno e um médico psiquiatra por turno.
- (D) os leitos antigos, que não se encontram em enfermarias psiquiátricas de Hospitais Gerais, deverão passar por processo de inativação imediatamente.

26. A embolia pulmonar é um distúrbio comum, que frequentemente está associada a situações como traumatismo ou cirurgia de grande porte. O enfermeiro deve monitorar e instituir medidas de prevenção de embolia pulmonar em todos os pacientes, mas particularmente naqueles com condições que predisponham a uma redução da velocidade do retorno venoso. Sobre as orientações para prevenção de embolia pulmonar, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Evitar permanecer sentado por períodos prolongados.
- () Manter as pernas cruzadas.
- () Evitar a deambulação precoce.
- () Manter cateteres nos acessos venosos pelo menor tempo possível.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V / F
- (B) V / F / F / V
- (C) F / F / F / V
- (D) V / V / F / V

27. Sobre o pneumotórax em pacientes adultos, é correto afirmar que

- (A) no pneumotórax simples, a traqueia é deslocada para longe do lado afetado.
- (B) em uma situação de emergência, o pneumotórax hipertensivo pode ser descomprimido pela inserção de uma agulha de pequeno calibre (calibre 24).
- (C) o dreno torácico é inserido e conectado à aspiração, removendo o ar e o líquido remanescentes, restabelecendo a pressão positiva e reexpandindo o pulmão.
- (D) os pacientes com possível pneumotórax hipertensivo devem receber, imediatamente, oxigênio suplementar em alta concentração para tratamento da hipóxia, e deve-se utilizar a oximetria de pulso para monitorar a saturação de oxigênio

28. De acordo com a Nota Técnica n.º 11/2019, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Serviço Residencial Terapêutico.	A.	Se destinam a proporcionar atenção integral e continuada às pessoas com quadro de dependência de substâncias psicoativas. Devem funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados. Visam o atendimento de adultos ou crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente.
2.	Unidades Ambulatoriais Especializadas – Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental.	B.	Moradias inseridas na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção.
3.	Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas do Tipo IV.	C.	Equipe composta por médico psiquiatra, psicólogo e assistente social, que devem prestar atendimento integrado e multiprofissional, por meio da realização de consultas e psicoterapia. Deverá ser lotada em ambulatórios gerais e especializados, policlínicas e ambulatórios de hospitais gerais e hospitais psiquiátricos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1C / 2B / 3A
- (B) 1B / 2A / 3C
- (C) 1A / 2C / 3B
- (D) 1B / 2C / 3A

29. Infecções relacionadas à assistência à saúde são infecções que se manifestam após 48 a 72 horas de internação, ou mesmo após a alta hospitalar e estão relacionadas a internação ou procedimentos realizados durante a internação. As medidas de controle de infecção incluem

- (A) em casos de precaução para gotículas, profissional e familiares devem utilizar máscara N95.
- (B) implementar medidas de precaução padrão para todos os pacientes: higienização das mãos, uso da caixa de perfurocortantes e uso de luvas, avental, óculos e máscara quando em risco de contato com secreções.
- (C) a higienização das mãos é a medida mais importante na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde e deve ser realizada conforme os quatro momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde: 1) antes do tocar o paciente, 2) antes de realizar procedimento limpo/asséptico, 3) após o risco de exposição a fluidos corporais e 4) após tocar o paciente.
- (D) a higiene das mãos com água e sabão é mais eficaz quando comparada ao uso de solução contendo álcool.

30. A violência contra a mulher assume classificações distintas segundo a sua tipologia (autoinfligida, interpessoal e coletiva) e a natureza dos atos perpetrados (violência, física, sexual e psicológica). De acordo com a classificação adotada pela Lei Maria da Penha, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Violência física.	A.	Qualquer conduta que constranja a mulher, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.
2.	Violência Sexual.	B.	Violência que ocorre no ambiente de trabalho, a partir de relações de poder entre chefia-trabalhadora ou trabalhadora-trabalhadora.
3.	Violência Psicológica.	C.	Qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
4.	Violência Moral.	D.	É toda ação que coloque em risco ou cause danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da mulher.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1B / 2A / 3D / 4C
- (B) 1C / 2A / 3B / 4D
- (C) 1C / 2A / 3D / 4B
- (D) 1C / 2D / 3A / 4B

31. Segundo Montenegro e Rezende (2017), sobre os fatores de risco para o câncer de mama, é correto afirmar que o(a)

- (A) uso de contraceptivos orais por tempo prolongado, reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de cinco anos, constitui risco muito elevado para câncer de mama.
- (B) menarca antes de 12 anos, menopausa após os 55 anos, nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos e não ter amamentado, constitui risco médio para câncer de mama.
- (C) obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica e exposição frequente a radiações ionizantes constitui risco alto para câncer de mama.
- (D) história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos constitui risco muito elevado para câncer de mama.

32. O abortamento é a expulsão de feto pesando menos de 500 g ou com menos de 20 semanas de gestação, podendo ser espontâneo ou provocado. O abortamento retido ocorre quando

- (A) alguma parte do produto da concepção foi eliminada, mas não a sua totalidade; podem estar retidos feto, placenta ou membranas.
- (B) o abortamento (geralmente incompleto) é complicado por infecção intrauterina.
- (C) já existe a morte fetal (em geral por semanas) sem a sua expulsão.
- (D) há dois ou mais abortamentos consecutivos.

33. Sobre as condutas e manobras de reanimação cardiorrespiratória em gestantes e recém-nascidos,

- I. a aspiração das vias respiratórias dos recém-nascidos pelos obstetras, logo após a saída dos ombros, não é mais recomendada: não diminui a aspiração de mecônio.
- II. as condutas preconizadas em gestantes com parada cardíaca seguem a mesma doutrina recomendada às não grávidas, sendo que as alterações fisiológicas da gravidez não interferem no processo de reanimação cardiorrespiratória.
- III. após o diagnóstico da grávida com parada cardiorrespiratória, recomenda-se o deslocamento manual do útero para a esquerda, a fim de prover melhor retorno sanguíneo ao coração direito.
- IV. o esvaziamento do útero na parada cardíaca materna pode resultar em rápida melhora, com retorno da circulação espontânea. Haverá também uma chance maior para a sobrevida neonatal.

É correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

34. A Portaria n.º 3588/2017 dispõe sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A respeito dessa Portaria, assinale a alternativa correta.

- (A) A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes que objetivam organizar o tratamento e assistência aos pacientes e seus familiares na área de Saúde Mental. Abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais, não incluindo aquelas com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas (álcool, maconha, cocaína, crack e outras drogas).
- (B) Todos os Serviços, que compõem a RAPS, são igualmente importantes e devem ser incentivados, ampliados e fortalecidos. O Ministério da Saúde não considera mais Serviços como sendo substitutos de outros, não fomentando mais fechamento de unidades de qualquer natureza.
- (C) A abordagem das pessoas com uso nocivo de drogas e com dependência de substâncias psicoativas, será através da modalidade RAPS levando o poder público às áreas de maior vulnerabilidade social.
- (D) Os CAPS (IV AD) está sendo organizado para funcionar 24 horas nas regiões de cracolândias, com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de plantão. Tal modalidade de Serviço está programada para atender pacientes em situações de emergência psiquiátrica, encaminhá-los para abordagens terapêuticas, mas não há acompanhamento no CAPS-AD, pois é um serviço de primeiro atendimento a situações de risco e vulnerabilidade.

35. A Lei n.º 13.840/2019, que altera a Lei n.º 11.343/2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e tratar do financiamento das políticas sobre drogas e dá outras providências. Sobre esta Lei, o

- I. Sisnad é o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas.
- II. tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento hospitalar, incluindo, priorizando formas de internação em hospitais especializados.
- III. PIA (Plano Individual de Atendimento) deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

36. De acordo com Hoffbrand e Moss (2018), sobre a Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e o Linfoma de Hodgkin, analise as proposições abaixo.

- I. Na leucemia linfoblástica aguda, a infiltração de órgãos causa dor óssea, linfonodopatia, esplenomegalia moderada e cefaleia. A maioria dos pacientes apresenta febre.
- II. No Linfoma de Hodgkin, a maioria dos pacientes apresenta aumento assimétrico de linfonodos superficiais, firmes, separados e dolorosos à palpação.
- III. O hemograma da leucemia linfoblástica aguda mostra anemia e contagem de leucócitos sempre aumentada devido ao grande número de blastos presentes na corrente sanguínea.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

37. De acordo com Bonassa e Gato (2023), com relação à toxicidade hematológica dos antineoplásicos, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Há necessidade de recuperação completa ou parcial da leucopenia antes de nova aplicação de antineoplásicos.
- () O período de nadir na maioria dos antineoplásicos varia de 7 a 14 dias.
- () Sinais clássicos de infecção podem não ocorrer em função do limitado número de células fagocitárias.
- () Os citostáticos em doses convencionais com frequência causam anemias severas a ponto de exigir transfusões sanguíneas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / F / F
- (B) F / F / V / V
- (C) V / V / V / F
- (D) F / V / F / V

38. Com relação ao controle da disseminação de microrganismos multirresistentes, é correto afirmar que

- (A) os produtos usados para higienização das mãos não podem ser considerados fontes de bactérias multirresistentes.
- (B) um microrganismo é considerado multirresistente quando apresenta resistência a duas ou mais classes de antimicrobianos.
- (C) a principal ponte de transmissão de microrganismos multirresistentes entre pacientes colonizados e não colonizados é a falta de leitos de isolamento nas unidades para adequar melhor os pacientes.
- (D) bactérias gram positivas e gram negativas são disseminadas principalmente através do contato direto entre o paciente colonizado e o não colonizado.

39. De acordo com Oliveira (2018), a dengue é uma infecção causada por um Arbovírus. Em relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) Na dengue clássica, a febre é baixa, de início gradativo, seguida de cefaleia e dor retrocular.
- (B) A dengue hemorrágica começa com febre baixa que evolui gradativamente para febre alta, petéquias, equimoses, hemorragias em gengivas e epistaxe.
- (C) A prova do laço não necessariamente precisa ser realizada em todos os casos para constatar uma tendência hemorrágica, marcador das formas mais graves da doença.
- (D) A base do controle da doença é a eliminação do mosquito, não há tratamento específico e as medicações são apenas sintomáticas.

40. Considerando-se CAMPANHA (2020), sobre liderança na enfermagem, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A liderança transformacional mostrou dificultar a cultura de organização da unidade e empoderamento estrutural.
- () Liderar pensando na transformação individual e dos outros é fator determinante para se conquistar os objetivos almejados.
- () Líderes devem centrar-se em questões operacionais da organização, ou seja, traduzir as estratégias transmitidas em ações assertivas.
- () Para avançar nos modelos de liderança em enfermagem, é necessário ser flexível, inovador, fornecer autonomia, orientar de forma clara e o objetivo, administrar conflitos com bom senso, coerência, compreensão, ter senso democrático e humanidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) F / V / F / V
- (B) F / V / V / V
- (C) V / F / V / F
- (D) V / V / F / V