



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



FundMed
Pesquisa Ensino Inovação

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SUPLEMENTAR PARA
RESIDÊNCIAS MÉDICAS/2024

ÁREAS DE ATUAÇÃO
**EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA,
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA E
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA**

Nome: _____

Nº de Inscrição: _____

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNOS DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME e Nº de INSCRIÇÃO), assine no local indicado.
- Este caderno contém **10 questões** com quatro alternativas (**A, B, C e D**).
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS, único documento de correção, com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. É vedada a substituição do cartão decorrente de erro cometido na marcação.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de até **1 hora e 30 minutos**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Ao finalizar a prova, o candidato poderá levar consigo seu caderno de questões.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, depois de concluído o procedimento.

01. Criança que nasceu com 37 semanas e 5 dias de idade gestacional, de parto cesáreo (bolsa rota no ato) devido à doença hipertensiva específica da gestação, em boas condições, não requereu manobras de reanimação na Sala de Parto. Apresentou índice de Apgar 8 e 9 no primeiro e quinto minutos respectivamente e peso ao nascimento de 3.350 g. À avaliação com 12 horas de vida, foram constatadas tiragem subcostal leve e frequência respiratória de 88 mpm, com necessidade de 30% de oxigênio. Considerando a principal suspeita diagnóstica, assinale a assertiva correta.

- (A) O mecanismo fisiopatológico está relacionado a retardo da reabsorção do líquido pulmonar.
- (B) O quadro radiológico mostra áreas de atelectasia com aspecto granular grosseiro alternando com áreas de hiperinsuflação pulmonar.
- (C) O corticosteroide antenatal estaria indicado para reduzir a incidência e a gravidade do desconforto respiratório.
- (D) O tratamento consiste em suporte ventilatório não invasivo (CPAP nasal) e terapia de reposição do surfactante por se tratar de caso grave.

02. O sopro cardíaco inocente

- (A) raramente é diastólico.
- (B) é holossistólico.
- (C) tem baixa intensidade (4+ ou menos).
- (D) irradia para o dorso.

03. Criança de 3 meses e 1 semana de idade foi trazida pelos pais à consulta na UBS para revisar e atualizar o calendário vacinal. Após análise da Caderneta de Vacinação, constatou-se ausência de registro da vacina contra *Rotavirus*. Assinale a assertiva correta sobre a vacina contra *Rotavirus* para o paciente, segundo as recomendações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

- (A) Por ser uma vacina de administração intramuscular, antes de indicá-la deve-se avaliar o tônus muscular das extremidades para apontar a região mais adequada para aplicação.
- (B) A vacina não deve ser indicada porque a criança tem idade superior ao limite recomendado (3 meses de idade).
- (C) A vacina pode ser indicada, considerando que a criança está dentro da faixa etária recomendada.
- (D) Caso a vacina seja indicada, deve-se orientar os pais sobre o fato de que a dose deverá ser repetida se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar logo após a aplicação.

04. Paciente de 3 anos foi admitido na Emergência por pneumonia, tendo sido instituída oxigenoterapia e iniciada administração de antibiótico intravenoso. Recebeu, também, solução cristaloide balanceada, na dose de 60 ml/kg, durante 1 hora. Clinicamente, apresentou piora, com sonolência e pouca resposta aos comandos verbais. A saturação de hemoglobina era de 88%; a frequência cardíaca, de 174 bpm; e a pressão arterial, de 80/50 mmHg. Não havia urinado nas últimas 24 horas; tinha pulsos finos e velocidade de enchimento capilar periférico de 4 segundos. Considerando o quadro, assinale a assertiva correta sobre o emprego de vasoativos.

- (A) Não há indicação.
- (B) Dopamina deve ser indicada preferencialmente por se tratar de choque séptico pouco responsivo à hidratação intravenosa.
- (C) Noradrenalina deveria ser indicada, mas não pode ser administrada em canal venoso periférico.
- (D) Epinefrina deve ser o medicamento de escolha, podendo ser administrada em veia periférica para não retardar o tratamento.

05. Adolescente masculino, de 13 anos, com diagnóstico de asma desde a infância, foi trazido à consulta pela mãe que buscava orientação sobre a melhor opção de tratamento da doença. Ela informou que o paciente vinha apresentando crises leves, mas frequentes, de falta de ar e chiado no peito, especialmente quando participava das aulas de futebol (3 vezes/semana). Que conduta, dentre as abaixo, é a mais adequada de acordo com a GINA (*Global Initiative for Asthma*, 2023)?

- (A) Usar salbutamol inalado antes das aulas de futebol.
- (B) Usar uma combinação de fenoterol e budesonida inalado de modo continuado.
- (C) Usar budesonida inalado de modo continuado.
- (D) Recomendar a suspensão da participação nas aulas de futebol até que seja obtido melhor controle da doença.

06. Assinale a assertiva **incorreta** sobre nutrientes presentes no leite humano e sua relação com a dieta materna.

- (A) As concentrações das vitaminas do complexo B são influenciadas diretamente pela dieta materna.
- (B) Cálcio, ferro, zinco e cobre são altamente biodisponíveis, e suas concentrações são afetadas pela alimentação da mãe.
- (C) A composição dos ácidos graxos do leite materno é influenciada diretamente pela dieta materna.
- (D) Vitaminas lipossolúveis são influenciadas diretamente pela dieta materna.

07. Associe os achados laboratoriais de função tireoidiana (coluna da esquerda) às doenças do eixo tireoidiano (coluna da direita).

- | | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| 1 - TSH elevado com T4 livre normal | () | Doença de Graves |
| 2 - TSH baixo com T4 livre elevado | () | Hipopituitarismo |
| 3 - TSH elevado com T4 livre baixo | () | Tireoidite de Hashimoto com hipotireoidismo |
| 4 - TSH baixo com T4 livre baixo | | |
| 5 - TSH elevado com T4 livre elevado | | |

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é

- (A) 1 – 4 – 3
(B) 2 – 3 – 4
(C) 2 – 4 – 3
(D) 4 – 2 – 1

08. As taxas ou coeficientes utilizados como indicadores de saúde são fundamentais para elaboração de políticas públicas. Associe as taxas (coluna da esquerda) às respectivas fórmulas para seu cálculo (coluna da direita).

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| 1 - Natalidade | () | $\frac{\text{Número total de nascidos vivos residentes}}{\text{População total residente}} \times 1.000$ |
| 2 - Mortalidade neonatal precoce | () | |
| 3 - Mortalidade neonatal tardia | () | $\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 28 a 364 dias de idade}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes}} \times 1.000$ |
| 4 - Mortalidade pós-neonatal | () | |
| 5 - Mortalidade infantil | () | $\frac{\text{Número de óbitos de residentes de zero a 6 dias de idade}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes}} \times 1.000$ |

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é

- (A) 5 – 3 – 4
(B) 5 – 3 – 2
(C) 1 – 4 – 3
(D) 1 – 4 – 2

09. Considerando a saúde auditiva e a triagem auditiva neonatal, associe as condutas (coluna da esquerda) aos casos clínicos (coluna da direita), segundo as *Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal*, do Ministério da Saúde.

- | | | |
|---|-----|---|
| 1 - ACOMPANHAMENTO: consultas mensais na Atenção Primária | () | Recém-nascido apresentou intercorrências perinatais, ficando internado por 10 dias na UTI Neonatal, sem necessidade de uso de antibióticos ou ventilação assistida. A triagem auditiva neonatal com potencial elétrico auditivo de tronco encefálico automático (PEATE-A) foi normal em ambas as orelhas na alta da UTI Neonatal. |
| 2 - MONITORAMENTO: avaliação audiológica entre 7 e 12 meses de vida na Atenção Especializada | () | Recém-nascido a termo, sem intercorrências pré ou perinatais, sem fatores de risco para perda auditiva, falhou no teste e no reteste da triagem auditiva neonatal. |
| 3 - DIAGNÓSTICO: encaminhamento e acesso ao diagnóstico funcional nos Centros Especializados de Reabilitação (CER) com o Serviço de Reabilitação Auditiva ou nos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade, habilitados pelo Ministério da Saúde. | () | Bebê prematuro, com 32 semanas de idade gestacional, que ficou internado na UTI Neonatal por 40 dias, sem intercorrências, realizou triagem auditiva com PEATE-A antes da alta hospitalar com resposta ausente em ambas as orelhas. |
| | () | Recém-nascido a termo, apresentando malformação de orelha externa (microtia) unilateral, passou na triagem auditiva na orelha normal. |

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1
(B) 1 – 3 – 3 – 2
(C) 2 – 3 – 3 – 3
(D) 3 – 2 – 3 – 1

10. Criança de 5 meses foi trazida à Emergência pelo pai com diversas lesões compatíveis com maus-tratos, embora ele relatasse histórias de queda do berço. A paciente faleceu em poucas horas, e o médico plantonista forneceu atestado de óbito, dando como causa da morte trauma craniano. Com base no quadro, o médico agiu

- (A) corretamente em função das evidências de trauma.
- (B) corretamente porque não havia comprovação de maus-tratos.
- (C) de forma inadequada porque havia indícios de morte violenta.
- (D) de forma inadequada porque não havia confirmação da causa do óbito.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SUPLEMENTAR PARA
RESIDÊNCIAS MÉDICAS/2024

ÁREA DE ATUAÇÃO

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA – PNEUMOLOGIA

Nome: _____

Nº de Inscrição: _____

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNOS DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME e Nº de INSCRIÇÃO), assine no local indicado.
- Este caderno contém **10 questões** com quatro alternativas (**A, B, C e D**).
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS, único documento de correção, com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. É vedada a substituição do cartão decorrente de erro cometido na marcação.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de até **1 hora e 30 minutos**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Ao finalizar a prova, o candidato poderá levar consigo seu caderno de questões.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, depois de concluído o procedimento.