

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SUPLEMENTAR PARA
RESIDÊNCIAS MÉDICAS/2024

ANO ADICIONAL
PSIQUIATRIA (ADIÇÃO)

Nome: _____

Nº de Inscrição: _____

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNOS DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME e Nº de INSCRIÇÃO), assine no local indicado.
- Este caderno contém **10 questões** com quatro alternativas (**A, B, C e D**).
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS, único documento de correção, com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. É vedada a substituição do cartão decorrente de erro cometido na marcação.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de até **1 hora e 30 minutos**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Ao finalizar a prova, o candidato poderá levar consigo seu caderno de questões.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, depois de concluído o procedimento.

01. Que alternativa contempla a classe de fármacos considerada a primeira escolha no tratamento farmacológico dos transtornos de ansiedade no geral?

- (A) Tricíclicos
- (B) Benzodiazepínicos
- (C) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina
- (D) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina

02. Assinale a alternativa que contém o tratamento farmacológico de primeira escolha para o transtorno de ansiedade social.

- (A) Inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina (IRSN) ou fluoxetina
- (B) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) ou venlafaxina
- (C) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) ou duloxetina
- (D) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) ou antipsicóticos atípicos

03. Assinale a assertiva correta sobre o tratamento farmacológico da esquizofrenia.

- (A) Os antipsicóticos de segunda geração são mais efetivos do que os antipsicóticos de primeira geração.
- (B) Os antipsicóticos de primeira geração são mais efetivos do que os antipsicóticos de segunda geração.
- (C) Nos idosos, antipsicóticos de baixa potência são os mais indicados por seu perfil de efeitos colaterais.
- (D) Em comparação aos antipsicóticos orais, os antipsicóticos de depósito estão associados a redução de risco de recaída e reinternação.

04. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do parágrafo abaixo sobre os transtornos relacionados a substâncias.

A definição de requer que um dano real tenha sido causado à saúde física e mental do usuário.

- (A) uso recreacional
- (B) uso nocivo
- (C) uso experimental
- (D) dependência

05. Assinale a alternativa que contém os fármacos indicados para o tratamento da dependência de álcool.

- (A) Diazepam, dissulfiram e naltrexona
- (B) Diazepam, naltrexona e acamprosato
- (C) Dissulfiram, naltrexona e acamprosato
- (D) Dissulfiram, diazepam e clorpromazina

06. Em crianças com transtorno do espectro autista, o tratamento farmacológico da agressividade e da irritabilidade a partir dos 6 anos pode ser realizado, considerando as evidências consistentes de sua eficácia, com seguintes fármacos:

- (A) aripiprazol e risperidona.
- (B) fluoxetina e risperidona.
- (C) fluoxetina e haloperidol.
- (D) clorpromazina e risperidona.

07. Assinale a assertiva correta sobre transtornos do neurodesenvolvimento.

- (A) "Atraso global do desenvolvimento" é uma categoria aplicável a crianças com menos de 5 anos.
- (B) O diagnóstico de deficiência intelectual exige a aplicação de um teste que informe o Quociente Intelectual (QI).
- (C) A classificação da deficiência intelectual em seus graus depende da aplicação de um teste que informe o Quociente Intelectual (QI).
- (D) A expressão dos desejos e emoções de forma predominantemente não verbal é característica da deficiência intelectual moderada.

08. Assinale a assertiva correta sobre suicídio e automutilações na adolescência.

- (A) Automutilações na adolescência são consideradas como gestos suicidas ou tentativas de suicídio.
- (B) A depressão é um fator de risco específico para automutilações.
- (C) A coocorrência de automutilações e tentativas de suicídio indicam uma condição mais grave.
- (D) Sofrer *bullying* e ser do gênero masculino são fatores de risco associados a automutilações.

09. Considere as assertivas abaixo sobre transtornos mentais na população idosa.

- I - Em função das mudanças fisiológicas relacionadas à idade, idosos costumam tolerar apenas doses baixas de fármacos.
- II - Quanto maior a faixa etária, maior a prevalência de demência.
- III - Transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns na população idosa, com exceção da demência.

Quais são corretas?

- (A) Apenas III
- (B) Apenas I e II
- (C) Apenas II e III
- (D) I, II e III

10. Em Saúde Mental, o matriciamento

- (A) visa discriminar os casos que devem permanecer na Atenção Primária daqueles que devem ser encaminhados a serviços especializados em Saúde Mental.
- (B) é um modo de produzir saúde baseado na corrente filosófica do Positivismo.
- (C) baseia-se na diferenciação hierárquica entre a equipe que encaminha casos e a equipe especializada em Saúde Mental.
- (D) trata-se de um suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações.