



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS - ESTADO DA BAHIA

EDITAL N.º 01/2026

FONOAUDIÓLOGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Duração: 4h (quatro horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, contendo **50 (cinquenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, e a **prova de redação**, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	PROVA DE REDAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	RACIOCÍNIO LÓGICO- MATEMÁTICO		
1 a 10	11 a 17	18 a 25	26 a 50	

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas, com a folha da **prova de redação** no verso.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas**, classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes do previsto, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões, a partir de **1 (uma) hora** para o horário de término da prova.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas e transcrever sua redação. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

Excesso de proteína pode trazer riscos à saúde, alertam especialistas

Sophie Egan

Se você andou pelos corredores de alimentos embalados de um supermercado recentemente, ou deu uma olhada nas atuais diretrizes alimentares dos Estados Unidos, pode ter ficado com a impressão de que, quando se trata de proteína, quanto mais, melhor.

Cereais embalados, pipoca, mistura para panqueca e bebidas de café estão sendo enriquecidos com o nutriente. E a nova pirâmide alimentar invertida, que o governo Trump divulgou em janeiro, destaca a proteína de forma proeminente, com bife, frango e queijo no topo.

Pesquisas sugerem que a maioria dos adultos americanos está consumindo muito mais proteína do que o necessário para uma boa saúde. Uma pesquisa de 2025 com 3.000 adultos americanos mostrou que 71% estavam tentando comer mais proteína. O percentual era de 59% em 2022.

A proteína é um nutriente essencial. Mas [...] não é necessariamente melhor, diz Bettina Mittendorfer, professora de nutrição e fisiologia do exercício na Faculdade de Medicina da Universidade de Missouri. E em alguns casos, comer muito mais do que os especialistas em nutrição recomendam pode trazer alguns riscos.

Não existe uma regra rígida sobre quanta proteína é demais, dizem os especialistas, e muitas pessoas podem exceder as quantidades recomendadas sem problemas. Mas problemas potenciais podem surgir quando as pessoas consomem muito mais do que cerca de 1,2 g de proteína por quilograma de peso corporal por dia, diz Mittendorfer.

Doenças cardíacas e diabetes tipo 2

A maioria da proteína que os americanos consomem vem de carne e outros produtos de origem animal. Em um estudo publicado em 2021, pesquisadores do Departamento de Agricultura descobriram que alimentos de origem animal (incluindo carne bovina, frango e carnes curadas) representavam quase 70% do consumo de proteína das pessoas.

Pesquisas sugerem que aqueles que consomem maiores quantidades de carne vermelha e processada tendem a ter riscos mais elevados de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, diz Donald Hensrud, professor associado de nutrição e medicina preventiva na Faculdade de Medicina da Mayo Clinic.

Em uma grande análise publicada em 2023, por exemplo, pesquisadores descobriram que comer 100g extras de carne vermelha (equivalente a cerca de uma costeleta de porco fina e desossada) por dia aumentava o risco de doenças cardíacas em 11% — e cada 50g adicionais de carne vermelha processada (equivalente a cerca de uma salsicha padrão) por dia aumentava em 26%.

Outro estudo, também publicado em 2023, descobriu que entre os quase 217 mil participantes (majoritariamente mulheres), aqueles que consumiam mais carne vermelha tinham um risco 40% maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que aqueles que consumiam menos, e que aqueles que consumiam mais carne vermelha processada tinham um risco 51% maior.

Carnes vermelhas e processadas tendem a conter altos níveis de gorduras saturadas, que podem elevar os níveis sanguíneos de colesterol LDL (ou "ruim") e aumentar o risco de infarto e AVC. Esses alimentos também podem aumentar a inflamação e a resistência à insulina, diz Hensrud, o que também poderia elevar os riscos de doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/eqilibrioesaude/2026/06/excesso-de-proteina-pode-trazer-riscos-a-saude-alertam-especialistas.shtml>. Adaptado. Acesso em 03/06/2026

1. De acordo com o texto, um determinado fenômeno reflete a crescente valorização da proteína no mercado alimentício americano. Esse fenômeno é o(a):

- A) inclusão desse nutriente em alimentos, como pipoca e cereais
- B) recomendação de reduzir o consumo de carne vermelha nas diretrizes oficiais
- C) aumento do número de estudos científicos sobre os riscos do excesso proteico
- D) substituição progressiva de alimentos de origem animal por fontes vegetais de proteína nos supermercados

2. No 8º parágrafo do texto, há o relato de um estudo de 2023 apontando que o consumo de 50g extras de carne vermelha processada por dia eleva em 26% o risco de doenças cardíacas. Esse dado exemplifica, no contexto do texto, o argumento central de que:

- A) qualquer fonte de proteína animal é igualmente prejudicial à saúde
- B) a quantidade de proteína consumida não importa, mas sim sua qualidade
- C) o consumo de proteína vegetal é isento de riscos cardiovasculares
- D) o excesso proteico proveniente de carnes, especialmente processadas, está associado a maiores riscos cardiovasculares

3. A tese central defendida no texto é a de que:

- A) o consumo de proteína deve ser eliminado da dieta de pessoas com risco cardiovascular
- B) a proteína é um nutriente essencial, mas seu consumo excessivo, especialmente de fontes animais, pode representar riscos à saúde
- C) as políticas alimentares do governo estadunidense contradizem frontalmente todas as pesquisas científicas sobre proteína disponíveis atualmente
- D) pesquisas recentes comprovam que qualquer quantidade de proteína acima da recomendação diária causa doenças cardíacas e diabetes tipo 2

4. O texto combina diferentes modos discursivos ao longo de sua estrutura. Essa combinação organiza-se da seguinte maneira:

- A) o modo descritivo predomina no texto inteiro, uma vez que o autor está focado em caracterizar os hábitos alimentares da população americana sem emitir juízo de valor
- B) o modo injuntivo organiza a abertura do texto, prescrevendo comportamentos alimentares; o expositivo desenvolve os dados científicos; o narrativo conclui com recomendações dos especialistas
- C) o modo expositivo apresenta dados e pesquisas; o argumentativo estrutura a tese de que o excesso proteico pode ser prejudicial; o descritivo aparece pontualmente ao caracterizar alimentos e fontes de proteína
- D) o modo narrativo é dominante, pois o texto relata cronologicamente a evolução do consumo de proteína nos Estados Unidos desde 2022, organizando os fatos em sequência temporal linear, sem sobressaltos ou interrupções

5. “Pesquisas sugerem que aqueles que consomem maiores quantidades de carne vermelha e processada tendem a ter riscos mais elevados de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, diz Donald Hensrud, professor associado de nutrição e medicina preventiva na Faculdade de Medicina da Mayo Clinic” (7º parágrafo). Nesse trecho, as expressões em destaque produzem um efeito de sentido veiculado por um determinado mecanismo, que é o de:

- A) coesão referencial, ao retomar anaforicamente o termo “pesquisas” citado no parágrafo anterior, garantindo progressão temática sem repetição
- B) ruptura de coerência, pois o uso de verbos modalizadores contradiz os dados numéricos precisos apresentados logo a seguir, criando inconsistência argumentativa
- C) reforço da ideia de risco, que já havia sido apresentada, com atenuação da força assertiva da afirmação, visando a expressar uma certa margem de incerteza científica
- D) coesão sequencial por conexão adversativa, que opõe os dados das pesquisas às recomendações do governo, sinalizando discordância entre ciência e política pública

6. No trecho “A proteína é um nutriente essencial. **Mas** [...] não é necessariamente melhor” (4º parágrafo), o conectivo em destaque estabelece uma relação adversativa. Nesse contexto de uso, a substituição de “mas” por “portanto” geraria um(a):

- A) sentido preservado, pois “portanto” também pode introduzir uma ideia que se opõe à afirmação anterior em contextos informais
- B) texto mais formal, mas o argumento central permaneceria intacto, pois a ideia de limitação do consumo proteico independe do conectivo utilizado
- C) mudança aceitável apenas se acompanhada da inversão da ordem das orações, já que “portanto” exige que a conclusão venha antes da premissa
- D) relação de conclusão, transformando o alerta dos especialistas em consequência lógica e necessária do fato de a proteína ser essencial, o que distorceria completamente o argumento apresentado

7. No trecho “[...] problemas potenciais podem surgir quando as pessoas consomem muito mais do que cerca de 1,2 g” (5º parágrafo), as formas verbais em destaque expressam, respectivamente:

- A) certeza e dúvida
- B) condição hipotética e possibilidade
- C) possibilidade e valor genérico-habitual
- D) recomendação indireta e possibilidade

8. “Em um estudo publicado em 2021, pesquisadores do Departamento de Agricultura descobriram que alimentos de origem animal (incluindo carne bovina, frango e carnes curadas) representavam quase 70% do consumo de proteína das pessoas” (6º parágrafo). Nesse trecho, a palavra em destaque classifica-se como:

- A) adjetivo
- B) advérbio
- C) preposição
- D) pronome indefinido

9. O texto mobiliza predominantemente a função:

- A) referencial, pois as vozes especializadas reforçam o efeito de objetividade e ancoragem em dados verificáveis
- B) poética, pois a alternância entre vozes diferentes cria um efeito rítmico que torna o texto mais atraente ao leitor leigo
- C) fática, pois as citações de especialistas servem para manter o canal de comunicação aberto entre o jornalista e o público-alvo
- D) conativa, pois as falas dos especialistas têm como objetivo primário persuadir o leitor a mudar seus hábitos alimentares de forma imediata

10. “Pesquisas sugerem que aqueles que consomem maiores quantidades de carne vermelha e processada tendem a ter riscos mais elevados de doenças cardíacas e diabetes tipo 2 [...]” (7º parágrafo). Nesse trecho, os dois conectivos destacados cumprem função de introduzir, respectivamente, uma oração:


- A) adjetiva e uma oração adverbial
- B) adjetiva e uma oração substantiva
- C) substantiva e uma oração adjetiva
- D) substantiva e uma oração adverbial

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Um usuário do *MS Word 2010*, em português, precisa formatar um documento para centralizar uma parte do texto, utilizando teclas de atalho. Para isso, ele precisa utilizar as teclas:

- A) CTRL + E
- B) CTRL + R
- C) SHIFT + E
- D) SHIFT + R

12. Uma “Barra de Ferramentas de Acesso Rápido” do *MS Word 2010*, em português, foi personalizada com inserção de ícones relacionados a documentos. Um dos ícones inseridos foi o de criar um novo documento. Esse ícone é o:



13. Um usuário do *MS Excel 2010 BR* precisa inserir, em uma célula, uma função para tratamento de texto. Nesse caso, uma função que pode ser utilizada é a:

- A) MOD
- B) LINHA
- C) EXATO
- D) AVEDEV

14. Utilizando um sistema de correio eletrônico, quando se coloca um destinatário como Cco (ou Bcc), quer dizer que se deseja que esse destinatário:

- A) leia a mensagem que em breve será retirada do servidor, de modo que não poderá mais ser acessada
- B) receba a mensagem, mas sem que os outros destinatários saibam que ele a recebeu
- C) sinalize automaticamente para o remetente que a mensagem enviada foi lida
- D) não possa mais receber as mensagens deste remetente

15. Um usuário de computador precisa acessar um programa de *software* que fornece acesso à internet, exibindo *sites* na tela e permitindo a interação com eles, como inserir textos e clicar em *links* para acessar outros *sites*. Um programa que serve para cumprir essas tarefas é o:

- A) *STM32Cube*
- B) *Google Chrome*
- C) *Adobe Photoshop*
- D) *Oracle Virtual Box*

16. Um usuário do *MS PowerPoint BR* deseja configurar a transição dos *slides* de sua apresentação para que ela seja do tipo "Panorâmica". O ícone associado a esse tipo de transição é:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 

17. Um usuário do *MS Windows*, em português, precisa acessar o "Menu Iniciar" por meio de teclas de atalho. As teclas de atalho para essa situação são:

- A) ALT + F4
- B) ALT + TAB
- C) CTRL + ESC
- D) CTRL + TAB

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

18. Um gestor de projetos de uma empresa de tecnologia organiza três equipes de desenvolvimento. A equipe **A** realiza entregas a cada 6 dias corridos; a equipe **B**, a cada 8 dias corridos; e a equipe **C**, a cada 12 dias corridos. Se, hoje, todas as equipes realizaram entregas simultaneamente, o número mínimo de dias para que esse evento ocorra novamente é:

- A) 12 dias
- B) 24 dias
- C) 48 dias
- D) 72 dias

19. No encerramento de um *workshop* corporativo, a comissão organizadora aplicou uma pesquisa de satisfação em que os participantes atribuíam notas de 1 a 5 para o evento. O relatório final apontou que 20 pessoas atribuíram nota 5, 20 pessoas atribuíram nota 4 e 10 pessoas atribuíram nota 3. A nota média ponderada de satisfação obtida por esse evento foi:

- A) 3,8
- B) 4,0
- C) 4,2
- D) 4,4

20. O setor de almoxarifado de uma repartição pública constatou que 4 impressoras idênticas, trabalhando no mesmo ritmo, gastam um total de 12 dias para imprimir um lote de processos acumulados. Para agilizar o serviço, a chefia decidiu instalar mais 2 impressoras de igual modelo e desempenho. O tempo total necessário para imprimir esse mesmo lote de processos, com as 6 impressoras funcionando juntas, é de:

- A) 6 dias
- B) 8 dias
- C) 9 dias
- D) 18 dias

21. Para o julgamento de um recurso administrativo, o conselho deliberativo de uma autarquia deve sortear um comitê especial composto por 3 conselheiros. Sabendo que o conselho completo possui 10 membros e que o presidente da autarquia obrigatoriamente deve fazer parte desse comitê especial, o número de maneiras diferentes de estruturar os demais membros desse comitê é:

- A) 120
- B) 84
- C) 58
- D) 36

22. O gerente de projetos de uma empresa de tecnologia da informação afirmou para a sua equipe a seguinte regra de conformidade: "Todo processo de desenvolvimento que foi auditado neste semestre apresentou total conformidade com as normas internacionais." A negação lógica da afirmação do gerente de projetos é expressa por:

- A) todos os processos de desenvolvimento que não foram auditados neste semestre apresentaram inconformidades
- B) nenhum processo de desenvolvimento que foi auditado neste semestre apresentou total conformidade com as normas internacionais
- C) se um processo de desenvolvimento não foi auditado neste semestre, então ele não apresentou total conformidade com as normas internacionais
- D) pelo menos um processo de desenvolvimento que foi auditado neste semestre não apresentou total conformidade com as normas internacionais

23. O setor de recursos humanos de uma autarquia constatou que, após uma reestruturação interna, o salário bruto de um cargo técnico sofreu um reajuste de 15%. No entanto, devido à mudança de faixa na tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e do plano de saúde, o total de descontos sobre o salário bruto desse servidor passou de 20% para 24%. Considerando o cenário descrito, o salário líquido (salário bruto menos os descontos) desse servidor sofreu uma variação real de:

- A) um aumento de 9,25%
- B) um aumento de 11,00%
- C) uma redução de 4,00%
- D) uma redução de 1,20%

24. Uma *startup* de tecnologia gastou dois quintos do seu capital inicial com infraestrutura de servidores e um terço do capital restante com campanhas de marketing digital. Sabendo que, após esses investimentos, a empresa ainda possui R\$ 150.000,00 em caixa, o valor do capital inicial total aportado nessa *startup* foi de:

- A) R\$ 312.500,00
- B) R\$ 375.000,00
- C) R\$ 450.000,00
- D) R\$ 500.000,00

25. Durante uma auditoria fiscal em uma multinacional, dois auditores da Receita Federal analisam, de maneira independente, livros contábeis de filiais diferentes. A probabilidade de o Auditor 1 encontrar uma desconformidade fiscal grave em seu lote de documentos é de 0,60, enquanto a probabilidade de o Auditor 2 identificar uma desconformidade análoga no seu lote é de 0,75. A probabilidade de que ambos os auditores encontrem desconformidades graves em suas respectivas análises independentes é de:

- A) 0,25
- B) 0,35
- C) 0,45
- D) 0,55

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Um paciente apresenta neuropatia do nervo laríngeo recorrente, com redução importante da abdução das pregas vocais observada à videolaringoscopia. Considerando a anatomia e fisiologia da laringe, o músculo comprometido, nesse caso, é o:

- A) cricotireóideo
- B) tiroaritenóideo
- C) cricoaritenóideo lateral
- D) cricoaritenóideo posterior

27. Uma criança de 18 meses é levada à consulta fonoaudiológica pela mãe, que relata que a filha utiliza cerca de doze palavras com sentido, compreende ordens simples como "pega" e "dá", aponta para objetos de seu interesse e usa jargão com variação de entoação. Não há histórico de alterações auditivas ou neurológicas. Com base nos marcos do desenvolvimento típico da linguagem para essa faixa etária, o perfil descrito é compatível com:

- A) atraso global da linguagem expressiva e da linguagem receptiva para a idade
- B) atraso na linguagem receptiva, com linguagem expressiva preservada
- C) atraso na linguagem expressiva, com linguagem receptiva preservada
- D) desenvolvimento típico da linguagem expressiva e da linguagem receptiva para a idade

28. O Brasil vem passando por um processo de transição demográfica e epidemiológica, caracterizado pelo aumento da expectativa de vida, pela redução das taxas de fecundidade e pelo envelhecimento populacional. À luz das implicações desse cenário para a prática fonoaudiológica, pode-se afirmar que o(a):

- A) aumento da expectativa de vida tem contribuído para a redução da prevalência de alterações de comunicação e de deglutição em idosos, devido ao maior acesso aos serviços de saúde e aos avanços terapêuticos
- B) transição epidemiológica caracteriza-se, principalmente, pela substituição das doenças crônicas pelas doenças infectocontagiosas, o que justifica o aumento da demanda fonoaudiológica relacionada aos agravos agudos na população idosa
- C) envelhecimento populacional tem ampliado a demanda por atendimento fonoaudiológico voltado às alterações de comunicação, de cognição e de deglutição associadas a doenças crônicas e neurodegenerativas, cada vez mais prevalentes na população idosa
- D) aumento da expectativa de vida e da população idosa tem ampliado a demanda por cuidados fonoaudiológicos; contudo, esse fenômeno está relacionado, principalmente, ao crescimento absoluto do número de idosos, e não às mudanças no perfil epidemiológico da população

29. Um recém-nascido pré-termo internado em unidade neonatal encontra-se clinicamente estável e é incluído no Método Canguru. Considerando os efeitos dessa estratégia, o desenvolvimento infantil e a atuação fonoaudiológica, o Método Canguru:

- A) contribui para o desenvolvimento do recém-nascido principalmente por reduzir a exposição aos estímulos ambientais da unidade neonatal, sendo seus efeitos sobre o aleitamento materno considerados secundários
- B) favorece o contato pele a pele e a participação familiar no cuidado, contribuindo para a estabilidade clínica do recém-nascido e para experiências precoces que podem favorecer o desenvolvimento das funções relacionadas à alimentação
- C) promove benefícios para o vínculo entre o bebê e seus cuidadores e pode favorecer o estabelecimento da alimentação oral; entretanto, não há evidências consistentes de sua influência sobre a manutenção do aleitamento materno após a alta hospitalar
- D) contribui para a organização comportamental e para a interação entre o bebê e a família, e seus efeitos sobre o desenvolvimento das funções orais são considerados semelhantes aos observados em recém-nascidos submetidos exclusivamente aos cuidados convencionais

30. Um recém-nascido prematuro de 32 semanas de idade gestacional permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por 12 dias e recebeu medicação ototóxica durante a internação. Aos 25 dias de vida, foi submetido à Triagem Auditiva Neonatal, por meio do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (PEATE-A), apresentando resultado satisfatório bilateralmente. À luz das Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde, a conduta mais adequada, nessa situação, consiste em:

- A) orientar os responsáveis quanto ao desenvolvimento auditivo e de linguagem e manter monitoramento audiológico periódico
- B) dispensar o acompanhamento audiológico periódico, desde que a criança apresente desenvolvimento auditivo e de linguagem compatível com a idade
- C) considerar o resultado compatível e orientar acompanhamento do desenvolvimento auditivo e de linguagem apenas se surgirem sinais clínicos sugestivos de alteração auditiva
- D) encaminhar imediatamente para avaliação audiológica diagnóstica completa, uma vez que a presença de indicadores de risco torna inconclusivo o resultado obtido unicamente pelo PEATE-A

31. Um professor de 26 anos procura atendimento fonoaudiológico relatando desconforto na garganta, sensação frequente de corpo estranho e necessidade constante de pigarrear há aproximadamente quatro meses. Refere rouquidão leve e intermitente, sem prejuízo significativo da intensidade vocal. Durante a anamnese, relata episódios frequentes de refluxo gastroesofágico. À videolaringoscopia, observa-se uma lesão exofítica unilateral localizada sobre o processo vocal da cartilagem aritenóide direita. Com base nos dados clínicos e nos achados laringológicos descritos, esse quadro é compatível com:

- A) cisto epidermóide de prega vocal, lesão subepitelial que pode causar rouquidão persistente e alterações vibratórias da mucosa
- B) granuloma laríngeo, frequentemente associado ao refluxo laringofaríngeo, trauma local ou comportamentos vocais hiperfuncionais
- C) nódulo vocal, lesão geralmente bilateral e associada ao fonotrauma crônico, localizada na junção entre os terços anterior e médio das pregas vocais
- D) pólipos vocais, lesão benigna frequentemente unilateral, associada a trauma fonatório e localizada predominantemente na porção membranosa das pregas vocais

32. A respeito das habilidades envolvidas no processo de aquisição da leitura e da escrita, trata-se de um perfil frequentemente observado em indivíduos com transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura quando identificam-se dificuldades:

- A) na fluência leitora e na ortografia, sem repercussões sobre a precisão da leitura ou sobre os processos de decodificação
- B) predominantes na compreensão de textos, com precisão e velocidade de leitura preservadas, associadas a alterações ortográficas
- C) na correspondência entre grafemas e fonemas, lentidão na leitura de palavras isoladas, redução da fluência leitora e alterações ortográficas
- D) na leitura de palavras e pseudopalavras, com desempenho preservado em tarefas de consciência fonológica e de nomeação automatizada rápida

33. Durante a avaliação perceptivo-auditiva da voz, diferentes atributos sonoros podem ser analisados pelo examinador. Sobre os aspectos perceptuais da voz, pode-se afirmar que o(a):

- A) timbre corresponde à percepção subjetiva da intensidade vocal, permitindo classificar a voz como forte ou fraca
- B) loudness está relacionado principalmente à frequência fundamental da voz, sendo responsável pela percepção da altura vocal
- C) duração corresponde à característica que permite diferenciar vozes que apresentam a mesma frequência fundamental e intensidade
- D) pitch corresponde à percepção subjetiva da frequência vocal, estando relacionado à sensação de voz mais grave ou mais aguda

34. As habilidades auditivas desenvolvem-se progressivamente nos primeiros anos de vida e constituem a base para a aquisição da linguagem oral. Em uma criança com desenvolvimento típico aos 2 anos de idade, é possível evidenciar a habilidade de compreensão auditiva quando a criança:

- A) executa sequências de instruções compostas por três ou mais comandos não relacionados entre si
- B) responde a solicitações simples do cotidiano, mesmo sem apoio gestual, quando inseridas em contextos familiares
- C) reconhece diferenças sutis entre fonemas acusticamente semelhantes em tarefas formais de discriminação auditiva verbal
- D) compreende narrativas curtas envolvendo eventos passados e futuros, identificando relações temporais e causais entre os acontecimentos

35. Acerca dos processos envolvidos na aquisição e no desenvolvimento da leitura, pode-se afirmar que o(a):

- A) aumento da fluência leitora está associado, entre outros fatores, à maior automatização do reconhecimento de palavras familiares, reduzindo a dependência exclusiva da conversão grafema-fonema durante a leitura
- B) consolidação da leitura de palavras familiares está relacionada ao fortalecimento das representações ortográficas, processo que depende predominantemente da maturação das habilidades linguísticas da criança
- C) desenvolvimento da fluência leitora depende principalmente da ampliação do vocabulário oral, sendo a precisão na decodificação um aspecto secundário após os primeiros anos de escolarização
- D) rota lexical, à medida que a leitura se desenvolve, tende a substituir progressivamente a rota fonológica, tornando-a pouco relevante para a leitura de palavras novas ou desconhecidas

36. Um homem de 67 anos sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico há quatro meses. Na avaliação fonoaudiológica, ele apresenta fala fluente e abundante, com frequentes parafasias semânticas e fonêmicas, compreensão significativamente comprometida para comandos verbais e conversação, além de reduzida consciência dos próprios erros linguísticos. A repetição, a leitura e a escrita também se mostram prejudicadas. Diante desse quadro, a abordagem terapêutica mais adequada para priorização inicial corresponde a:

- A) treino de construção sintática e de expansão de enunciados, priorizando a elaboração de frases e de narrativas
- B) exercícios de evocação lexical por confrontação visual, ampliação de categorias semânticas e treino intensivo de nomeação
- C) atividades de repetição de palavras e de frases em complexidade crescente, associadas ao treino de leitura em voz alta e à automatização de sequências verbais para fortalecimento das habilidades de repetição
- D) treino de compreensão auditiva por meio da associação palavra/imagem, execução de comandos em complexidade crescente, discriminação semântica e estratégias para monitoramento dos próprios erros linguísticos

37. Durante a avaliação miofuncional orofacial, observa-se que determinado músculo participa da elevação do assoalho da boca e do osso hióide durante a deglutição, podendo também auxiliar na depressão mandibular quando o osso hióide encontra-se estabilizado. O músculo descrito é o:

- A) digástrico
- B) milo-hióideo
- C) gênio-hióideo
- D) estilo-hióideo

38. Uma criança de 7 anos, com histórico de fissura labiopalatina reparada, apresenta fala com inteligibilidade reduzida. Durante a avaliação fonoaudiológica, observa-se substituição sistemática dos fonemas plosivos orais por produções realizadas na região laríngea, sem utilização adequada da pressão aérea intraoral necessária para a produção dos sons-alvo. Esse padrão é característico de:

- A) golpe de glote, considerado uma articulação compensatória
- B) hipernasalidade, resultante do direcionamento excessivo da energia acústica para a cavidade nasal durante a fala
- C) enfraquecimento consonantal, decorrente da redução da pressão intraoral causada pela insuficiência velofaríngea
- D) distorção articulatória compensatória, caracterizada pela produção correta do ponto articulatório associada à alteração da ressonância

39. Durante a avaliação videofluoroscópica da deglutição de um paciente após acidente vascular encefálico, observa-se atraso no disparo da fase faríngea, redução da elevação laríngea e presença de resíduos em valéculas e em seios piriformes após a deglutição. Acerca das possíveis repercussões fisiológicas desses achados, é correto afirmar que o(a):

- A) atraso no disparo da fase faríngea tende a aumentar a eficiência do fechamento das vias aéreas inferiores, reduzindo o risco de penetração e de aspiração
- B) redução da elevação laríngea pode comprometer a abertura do esfíncter esofágico superior e favorecer a permanência de resíduos faríngeos após a deglutição
- C) presença de resíduos em valéculas e em seios piriformes indica preservação da propulsão faríngea, sendo um achado frequentemente observado em indivíduos sem disfagia
- D) redução da elevação laríngea está associada principalmente ao aumento da velocidade do trânsito faríngeo, favorecendo o clareamento espontâneo dos resíduos alimentares

40. Uma criança de 5 anos é encaminhada para avaliação fonoaudiológica devido a dificuldades de linguagem observadas desde os primeiros anos de vida. Durante a avaliação, observa-se que ela apresenta vocabulário reduzido para a idade, dificuldades morfosintáticas e limitação na elaboração de narrativas. Por outro lado, demonstra iniciativa comunicativa frequente, utiliza gestos de forma integrada à fala, estabelece atenção compartilhada, mantém contato visual funcional e busca espontaneamente interagir com adultos e com crianças em diferentes contextos. À vista disso, pode-se afirmar que o perfil descrito é mais compatível com:

- A) transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão das alterações linguísticas observadas, que constituem um dos principais marcadores diagnósticos do transtorno
- B) apraxia de Fala na Infância (AFI), devido às dificuldades na organização linguística e na elaboração de narrativas, compatíveis com um transtorno de planejamento motor da fala
- C) transtorno dos Sons da Fala (TSF), caracterizado principalmente por alterações fonológicas que costumam repercutir diretamente no vocabulário e na estrutura morfosintática
- D) transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL), caracterizado por prejuízos persistentes na aquisição e no uso da linguagem, sem comprometimento primário das habilidades sociocomunicativas

41. No contexto da prevenção e promoção da saúde em Fonoaudiologia, a associação correta entre a ação desenvolvida e o seu respectivo nível de atuação em saúde consiste em:

- A) realização da Triagem Auditiva Neonatal, para identificação precoce de alterações auditivas - Prevenção primária
- B) terapia fonoaudiológica de um paciente com afasia após acidente vascular encefálico - Prevenção secundária
- C) grupo educativo com pais sobre estratégias de estimulação da linguagem e interação comunicativa nos primeiros anos de vida - Promoção da saúde
- D) avaliação fonoaudiológica de escolares com queixa de dificuldades de aprendizagem para identificação de alterações de linguagem - Prevenção terciária

42. No contexto da disfagia orofaríngea neurogênica, determinados sinais observados durante a avaliação clínica podem sugerir comprometimento da segurança e da eficiência da deglutição. Em relação a alguns desses sinais, pode-se afirmar que o(a):

- A) atraso no disparo da deglutição está relacionado, predominantemente, à fase esofágica da deglutição, com impacto limitado sobre a proteção das vias aéreas
- B) presença de atraso no disparo da deglutição, a alteração da qualidade vocal após a alimentação e a necessidade de múltiplas deglutições para um mesmo bolo alimentar podem estar associadas ao comprometimento da fase faríngea da deglutição
- C) alteração da qualidade vocal após a deglutição deve ser interpretada em conjunto com outros sinais clínicos, podendo estar relacionada à presença de resíduos em estruturas supraglóticas, sem necessariamente indicar aspiração traqueal
- D) ocorrência de múltiplas deglutições para um mesmo bolo alimentar pode representar uma estratégia compensatória adotada pelo indivíduo, sendo observada tanto em situações de resíduos faríngeos quanto em quadros com redução da sensibilidade laríngea

43. As disfunções temporomandibulares (DTM) podem repercutir sobre diferentes funções do sistema estomatognático. Acerca dessas repercussões, verifica-se que:

- A) a ocorrência de ruídos articulares constitui um dos fatores mais associados a modificações funcionais da fala e da deglutição, especialmente quando presente por longos períodos
- B) as alterações observadas na mastigação de indivíduos com DTM estão mais frequentemente relacionadas ao padrão oclusal, enquanto os sintomas musculares e articulares tendem a exercer menor influência sobre o desempenho funcional
- C) a presença de dor e de alterações nos movimentos mandibulares pode favorecer adaptações funcionais durante a mastigação, com possíveis repercussões sobre a eficiência mastigatória e a dinâmica de outras funções orofaciais
- D) as adaptações funcionais observadas em indivíduos com DTM tendem a estar relacionadas principalmente à redução da amplitude mandibular, apresentando menor associação com fatores como dor, fadiga muscular ou estratégias compensatórias

44. Durante a avaliação vocal, observam-se padrão vocal hiperfuncional, esforço fonatório aumentado, ataque vocal brusco e compressão supraglótica à emissão. A avaliação laríngea evidencia mobilidade preservada e pregas vocais sem alterações morfológicas significativas. Com base nesses achados, o quadro é compatível com o diagnóstico de:

- A) disfonia funcional, caracterizada por ajustes inadequados do comportamento vocal, que repercutem na produção da voz
- B) disfonia orgânica, considerando o predomínio de alterações relacionadas à dinâmica laríngea observada durante a fonação
- C) comprometimento vocal multifatorial, no qual alterações musculares e estruturais tendem a contribuir de forma semelhante para o desvio vocal
- D) disfonia organofuncional, uma vez que padrões hiperfuncionais de emissão costumam estar associados ao desenvolvimento de adaptações teciduais laríngeas

45. No processo de reabilitação vocal, diferentes técnicas podem ser utilizadas de acordo com os objetivos terapêuticos e os ajustes fisiológicos pretendidos. A respeito dessas técnicas, afirma-se que os(as):

- A) exercícios de voz ressonante buscam redistribuir a energia sonora ao longo do trato vocal, estando seu efeito terapêutico relacionado predominantemente ao aumento da intensidade vocal
- B) exercícios de trato vocal semiocluído favorecem ajustes na interação entre fonte sonora e trato vocal, podendo contribuir para maior economia vocal e melhor eficiência da vibração das pregas vocais
- C) técnicas que utilizam sons hiperagudos podem favorecer modificações nos padrões vibratórios das pregas vocais e são empregadas principalmente com o objetivo de aumentar a massa vibratória durante a fonação
- D) técnicas de esforço vocal podem ser utilizadas para favorecer maior fechamento glótico em determinados quadros, sendo indicadas principalmente quando o objetivo terapêutico é reduzir a atividade muscular laríngea durante a fonação

46. O processamento cortical da informação auditiva envolve diferentes áreas encefálicas com funções específicas. Com base nisso, pode-se afirmar que:

- A) as regiões pré-frontais participam da recepção primária dos estímulos auditivos, sendo responsáveis pela decodificação inicial das propriedades espectrais da fala
- B) o corpo caloso atua como principal centro cortical de processamento auditivo, integrando informações relacionadas à localização e à discriminação dos sons
- C) o giro angular desempenha papel central na análise inicial dos parâmetros acústicos do som, sendo considerado a principal área cortical de recepção auditiva
- D) a área auditiva primária está localizada no giro temporal superior e participa das etapas iniciais de processamento das características acústicas do estímulo sonoro, como frequência e intensidade

47. Durante o acompanhamento de um lactente com suspeita de deficiência auditiva permanente, a equipe multiprofissional busca garantir que as etapas de triagem, de diagnóstico e de intervenção ocorram dentro dos períodos recomendados para favorecer o desenvolvimento da linguagem. Nesse contexto, a sequência temporal mais compatível com as diretrizes de identificação e intervenção precoces da deficiência auditiva na infância corresponde à triagem auditiva:

- A) até 1 mês de vida, à confirmação diagnóstica preferencialmente até 3 meses e ao início da intervenção até 6 meses
- B) até 1 mês de vida, à confirmação diagnóstica até 6 meses e ao início da intervenção após definição do perfil audiológico da criança
- C) até 3 meses de vida, à confirmação diagnóstica até 6 meses e ao início da intervenção logo após a estabilização dos limiares auditivos
- D) preferencialmente no período neonatal, à confirmação diagnóstica até 2 meses de vida e ao início da intervenção após avaliação periódica da evolução auditiva da criança

48. O desenvolvimento das funções orais no período neonatal depende da maturação progressiva do sistema nervoso e das estruturas do sistema estomatognático. Sobre esse processo, é correto afirmar que a:

- A) estabilidade clínica e a idade gestacional contribuem para a avaliação da prontidão alimentar, embora a eficiência da alimentação oral esteja mais relacionada à força de sucção observada durante a avaliação
- B) maturação das funções de alimentação ocorre paralelamente ao desenvolvimento global do recém-nascido, sendo o ganho ponderal um parâmetro frequentemente considerado na decisão de iniciar a alimentação oral
- C) presença de reflexos orais primitivos, associada à organização dos estados comportamentais, é frequentemente utilizada na avaliação da prontidão alimentar, podendo indicar desempenho satisfatório da alimentação oral
- D) coordenação entre sucção, deglutição e respiração torna-se progressivamente mais eficiente ao longo da maturação neurológica, constituindo um dos fatores considerados na prontidão para alimentação oral do recém-nascido

49. A compreensão atual da gagueira do desenvolvimento tem se baseado em modelos multifatoriais que buscam explicar a interação entre diferentes aspectos envolvidos na fluência da fala. Tal compreensão defende que:

- A) a presença de alterações emocionais persistentes é apontada como um dos mecanismos centrais para o desenvolvimento da gagueira
- B) fatores respiratórios e posturais são considerados componentes centrais para o desenvolvimento da gagueira, influenciando diretamente a estabilidade temporal da fala
- C) a gagueira do desenvolvimento tem sido associada à interação entre predisposição genética, diferenças no processamento e no controle da fala e fatores relacionados às demandas comunicativas do indivíduo
- D) os episódios de disfluência característicos da gagueira decorrem predominantemente de dificuldades na organização do pensamento verbal, podendo ocorrer mesmo na ausência de alterações dos mecanismos motores da fala

50. A interpretação conjunta dos limiares obtidos por via aérea e por via óssea constitui uma etapa fundamental da avaliação audiológica. Em relação aos achados compatíveis com perda auditiva mista, é correto afirmar que:

- A) tanto os limiares por via aérea quanto os obtidos por via óssea apresentam-se rebaixados em magnitude semelhante, sem diferença clinicamente significativa entre as duas vias
- B) observa-se rebaixamento dos limiares por via aérea e por via óssea, coexistindo componente coclear e alteração na transmissão sonora, evidenciada pela presença de gap aéreo-ósseo
- C) os limiares por via aérea encontram-se rebaixados, enquanto os limiares por via óssea permanecem dentro dos padrões de normalidade, podendo haver diferença entre as duas vias em algumas frequências
- D) o rebaixamento dos limiares ocorre predominantemente por via aérea, enquanto a via óssea tende a apresentar valores melhores que a via aérea em razão dos mecanismos compensatórios do sistema auditivo

PROVA DE REDAÇÃO

Leia o texto a seguir.

Saúde mental

A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Saúde Mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade.

O bem-estar de uma pessoa não depende apenas do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais, como saúde física, apoio social, condições de vida. Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos.

A saúde mental não é algo isolado, é também influenciada pelo ambiente ao nosso redor. Isso significa que se deve considerar que a saúde mental resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pode-se afirmar que a saúde mental tem características biopsicossociais.

Entender a saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos ajuda a ver que todos têm um papel importante em cuidar do bem-estar de todos, cuidando de nós mesmos e apoiando uns aos outros.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental>. Acesso em 03/06/2026. Texto adaptado

Com base no texto motivador e em seu repertório sociocultural, elabore um texto dissertativo-argumentativo que apresente propostas para responder à seguinte questão:

Como conciliar as exigências da vida contemporânea com a manutenção da saúde mental?

Orientações:

1. A redação deverá ter, no mínimo, **20 (vinte)** linhas e, no máximo, **30 (trinta)** linhas.
2. A redação não poderá conter cópia dos textos motivadores.
3. Redija o texto com caneta esferográfica azul ou preta.
4. Utilize a norma-padrão da língua portuguesa.
5. A escrita deve ser legível. A redação ilegível receberá nota ZERO.
6. NÃO pule linhas e não dê espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos.
7. Transcreva o seu texto, à caneta, para a FOLHA DE REDAÇÃO, pois o rascunho NÃO será considerado para a correção.
8. Qualquer fragmento de texto fora do local indicado para a folha de redação será desconsiderado.
9. NÃO assine nem rubrique a FOLHA DE REDAÇÃO.

Qualquer escrita, sinal, desenho, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato é passível de nota ZERO.

Pontuação máxima: **35 pontos**.

RASCUNHO DA PROVA DE REDAÇÃO
MÍNIMO DE 20 E MÁXIMO DE 30 LINHAS

1	
5	
10	
15	
20	
25	
30	