

[illegible]

Língua Portuguesa

1 . Assinale a alternativa que não está de acordo com as normas de crase em Língua Portuguesa.

- a) Esteja no consultório à uma hora em ponto.
- b) O diretor referiu-se à Vossa Excelência com o devido respeito durante a sessão.
- c) O candidato ficou à distância de dois metros do portão.
- d) O técnico retorna à casa do paciente para nova avaliação

2. Há um vocábulo destacado que se forma corretamente com o auxílio de hifenização em:

- a) O servidor possui uma excelente autoestima.
- b) O acordo foi preestabelecido pelas organizações hospitalares.
- c) Ele foi nomeado para o cargo de subsecretário de saúde.
- d) A prefeitura adquiriu um novo microônibus para a saúde.

3) Na frase, “Ele se apropriou de recursos alheios (Roubou).” Estamos utilizando uma figura de linguagem chamada de:

- a) Elipse
- b) Eufemismo
- c) Metáfora
- d) Hipérbole

4. De acordo com a norma-padrão da Língua-Portuguesa e a concordância entre verbo e sujeito, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases a seguir:

- 1. _____ muitos servidores aguardando a reunião na Secretaria.
- 2. _____ duas semanas de atraso na entrega dos medicamentos.
- 3 _____ haver soluções melhores para o fluxo do SUS

- a) Haviam/Houve/Devem
- b) Havia/Houveram/Devem
- c) Havia/Houve/Deve
- d) Haviam/Houveram/Deve

5. De acordo com as regras de acentuação vigentes, assinale a opção em que a palavra perdeu o acento ao ser pluralizada:

- a) Hífen
- b) Armazém
- c) Troféu
- d) Refém

Matemática e Raciocínio Lógico

6. José é vendedor de produtos esportivos pela internet e necessita despachar uma bola de voleibol de diâmetro 12 cm. Considerando $\pi=3$, o volume desta bola é de:

- a) 824 cm³
- b) 846 cm³
- c) 856 cm³
- d) 864 cm³

7. A soma das idades dos irmãos Sílvio e João é 63 anos. A idade de Sílvio é $\frac{3}{4}$ da idade de João. Quantos anos tem João:

- a) 25
- b) 27
- c) 36
- d) 38

8. Em uma unidade de saúde, 120 pacientes foram entrevistados sobre dois hábitos. Sabe-se que 70 praticam atividade física, 50 seguem dieta balanceada e 30 praticam atividade física e seguem dieta. Quantos pacientes não praticam atividade física nem seguem dieta?

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50

9. Em uma UTI, 12 médicos intensivistas conseguem acompanhar adequadamente 48 leitos em regime de 12 horas diárias durante um plantão, mantendo um padrão de qualidade assistencial constante.

Devido a uma epidemia, a ocupação aumenta para 72 leitos. Ao mesmo tempo, a jornada de cada médico é reduzida para 8 horas diárias por questões legais, sem alteração da produtividade por hora.

Quantos médicos serão necessários para manter o mesmo padrão de qualidade?

- a) 18
- b) 24
- c) 27
- d) 30

Noções de informática

10. Os atalhos do Windows aumentam a produtividade usando combinações de teclas para comandos rápidos. Quais as teclas pressionadas simultaneamente servem para bloquear instantaneamente o computador .

- a) Alt + L
- b) Windows + B
- c) Ctrl + L
- d) Windows + L

11. Um antivírus é um software de segurança projetado para detectar, prevenir e remover programas maliciosos. Qual alternativa abaixo não é um software antivírus.

- a) Panda
- b) Avira
- c) Norton
- d) Opera

12. No Microsoft Word 2016 (em sua configuração padrão e versão em português), o usuário acaba de redigir um parágrafo importante e deseja garantir que as alterações sejam gravadas no arquivo atual. Qual atalho de teclado deve ser utilizado para realizar a função ‘salvar’?

- a) Ctrl + B
- b) Ctrl + Shift + S
- b) Ctrl + S
- c) Alt+ Ctrl + V

Conhecimento Específico

13. No que se refere à organização, direção e gestão do SUS, a direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso I do Art. 198 da Constituição Federal. No âmbito da União, essa direção é exercida por qual órgão?

- a) Ministério da Saúde
- b) Conselho Nacional de Saúde
- c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
- d) Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

14. A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Qual equipamento da RAPS é considerado o ponto de atenção estratégico para o território?

- a) Hospital Psiquiátrico de Custódia
- b) Centro de Atenção Psicossocial
- c) Comunidade Terapêutica
- d) Unidade de Pronto Atendimento

15. São princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica e utilizados na Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 exceto:

- a) universalidade
- b) equidade
- c) integralidade.
- d) resolutividade

16. Ao avaliar a saúde cardiovascular e o risco de resistência insulínica de um indivíduo, o profissional de saúde busca biomarcadores e medidas antropométricas que compõem o quadro de instabilidade metabólica. Aquela que não integra o conjunto de critérios obrigatórios para o fechamento desse diagnóstico?

- a) A concentração plasmática de lipoproteína de alta densidade (HDL-c).
- b) O volume de triglicerídeos presente na amostra sanguínea em jejum.
- c) A aferição da massa corporal total (kg) obtida na balança.
- d) A análise da homeostase glicêmica em estado basal.

17. Um paciente apresenta cálculos renais recorrentes compostos por oxalato de cálcio. Além do aumento da ingestão hídrica, qual orientação dietética é fundamental para reduzir a saturação urinária desses cristais?

- a) Aumento do consumo de vitamina C suplementar.
- b) Dieta rica em proteínas de origem animal.
- c) Consumo adequado de cálcio e restrição de sódio.
- d) Restrição severa de cálcio dietético.

18. Gestante de 28 anos, G2P1, com 10 semanas de gestação, compareceu para o início do pré-natal. IMC pré-gestacional de 41 kg/m². Nega comorbidades prévias. História obstétrica sem intercorrências. Exame físico sem alterações e exames iniciais normais.

De acordo com o Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional de Santa Catarina (2025), a classificação de risco e a conduta adequada são.

- a) Risco intermediário (10 pontos), seguimento na APS com teleconsultoria se necessário.
- b) Alto risco (≥ 10 pontos), pré natal compartilhado com encaminhamento ao AAE/PNAR).
- c) Risco habitual, com reforço de medidas não farmacológicas apenas.
- d) Risco intermediário, pois obesidade isolada não define alto risco.

19. Homem, 52 anos, IMC 33 kg/m², comparece à consulta para avaliação de exames de rotina. Antecedentes: Infarto agudo do miocárdio há 2 anos. Hipertensão Arterial em uso de losartana. Exames: HbA1c: 7,8%, Glicemia de jejum: 156 mg/dL. Assintomático do ponto de vista glicêmico.

De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2025), qual a melhor conduta inicial?

- a) Iniciar metformina em monoterapia.
- b) Iniciar metformina associada a sulfonilureia
- c) Iniciar insulina basal associada à metformina.
- d) Iniciar agonista de GLP - 1 associado a inibidor de SGLT2

20. Mulher, 29 anos, previamente hígida, procura atendimento com história de Tosse seca há 8 dias, febre baixa intermitente (máx. 37,7°C), cefaleia e mal-estar. Refere que “não melhorou” desde um quadro gripal inicial. Exame físico: FR: 18 irpm, SatO₂:97% em ar ambiente. Ausculta:poucos estertores dispersos, sem foco claro.

Exames:Leucócitos: 7.800/mm³, PCR discretamente elevado, Radiografia de tórax: infiltrado intersticial difuso, sem consolidação lobar. Paciente estável, sem critérios de gravidade.

Qual alternativa abaixo apresenta a melhor conduta inicial?

- a) Tratamento sintomático sem antibiótico
- b) Amoxicilina + clavulanato
- c) Azitromicina
- d) Levofloxacino

