



## FISIOTERAPEUTA (ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR) (HOSPITAL)



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

DOMINGO  
TARDE

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DO MUNICÍPIO  
DE UNIÃO (PI)

EDITAL Nº 007/2026

### ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

#### 1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

#### 2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

#### 3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

#### 4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC ([www.igeduc.org.br](http://www.igeduc.org.br)), conforme o Edital.

#### 5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

#### 6. Permanência em sala e saída do local de prova:

- ✓ Observe o tempo mínimo de permanência em sala previsto no Edital.
- ✓ Não se retire do local de prova sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir a prova, entregue todos os materiais de aplicação exigidos e siga as orientações da equipe de fiscalização.
- ✓ Certifique-se de assinar os documentos de controle, quando solicitado.



## GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

Em uma área urbana, a vigilância municipal identifica aumento inesperado de casos de determinado agravo. Os registros mostram concentração de ocorrências em alguns bairros, com maior frequência entre determinados grupos populacionais. A equipe decide cruzar notificações com dados demográficos, informações sobre condições ambientais, histórico temporal dos casos e características dos indivíduos afetados. Paralelamente, surgem pressões para que sejam adotadas medidas imediatas com base apenas no número de notificações registradas.

Considerando a atuação da vigilância em saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A distribuição espacial dos casos constitui importante instrumento de vigilância, enquanto a investigação dos fatores ambientais deve ocorrer posteriormente, quando houver confirmação de que eles apresentam relação causal com o agravo.
- (B) A investigação epidemiológica deve integrar informações sobre pessoa, tempo e lugar e analisar possíveis fatores relacionados ao evento, produzindo evidências que orientem oportunamente medidas de prevenção e controle.
- (C) Os dados de notificação permitem dimensionar a magnitude do evento, sendo a demanda apresentada pelos serviços assistenciais uma referência suficiente para estabelecer as principais medidas de controle.
- (D) A caracterização epidemiológica do evento deve orientar a resposta sanitária, mas a definição das medidas de intervenção deve depender prioritariamente dos recursos disponíveis no território.
- (E) A análise das características dos casos contribui para compreender o agravo, enquanto a adoção de medidas preventivas pode ser organizada independentemente das informações produzidas pela investigação epidemiológica.

### Questão 02

Uma secretaria estadual de saúde pretende reorganizar a distribuição de serviços especializados entre diferentes regiões. Para subsidiar a decisão, foram analisados dados epidemiológicos, perfil demográfico, fluxos assistenciais, capacidade instalada e barreiras de acesso. Considerando o planejamento regional dos serviços de saúde, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A análise dos fluxos assistenciais favorece a organização da rede, podendo a oferta especializada ser concentrada conforme os padrões atuais de utilização.
- (B) A capacidade instalada constitui referência relevante para distribuir serviços, enquanto os fluxos assistenciais podem ser ajustados posteriormente conforme a utilização observada.

- (C) O diagnóstico territorial orienta a programação dos serviços, enquanto barreiras de acesso podem ser tratadas por medidas administrativas específicas.
- (D) Os indicadores epidemiológicos permitem identificar prioridades, enquanto a distribuição dos serviços pode acompanhar a estrutura física disponível nas regiões.
- (E) A organização da oferta deve relacionar necessidades de saúde, características territoriais, capacidade instalada e fluxos assistenciais, buscando maior adequação entre demanda e acesso.

### Questão 03

Uma secretaria municipal de saúde pretende elaborar uma política para reduzir fatores associados ao aumento de doenças crônicas em territórios socialmente vulneráveis. A proposta prevê participação comunitária, articulação com outras secretarias e reorganização de ações de saúde. Considerando os fundamentos da promoção da saúde, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A promoção da saúde envolve atuação sobre determinantes e condições de vida, articulando participação social, políticas intersetoriais e práticas de cuidado.
- (B) A redução dos fatores de risco pode orientar políticas de promoção, enquanto a atuação sobre as condições sociais pode complementar as ações desenvolvidas pela saúde.
- (C) A participação comunitária favorece a definição das estratégias, enquanto as ações intersetoriais podem ser direcionadas conforme os recursos disponíveis em cada setor.
- (D) A promoção da saúde pode priorizar ações educativas e preventivas nos serviços, enquanto intervenções sobre determinantes sociais dependem de políticas específicas.
- (E) A reorganização dos serviços fortalece a promoção da saúde, enquanto iniciativas externas ao setor saúde podem apoiar as estratégias definidas pela gestão.

### Questão 04

Em determinado território, a vigilância identificou aumento de casos de uma doença transmissível e observou associação temporal com alterações nas condições ambientais locais. A equipe pretende definir uma resposta integrada, envolvendo investigação dos casos, análise dos fatores de risco e medidas de controle. Assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A vigilância epidemiológica permite caracterizar a ocorrência do agravo, enquanto a vigilância ambiental pode atuar sobre os fatores identificados no território.

- (B) A investigação epidemiológica deve priorizar a identificação dos casos, enquanto os fatores ambientais podem orientar intervenções específicas posteriormente.
- (C) A resposta deve integrar informações epidemiológicas e ambientais, orientando intervenções proporcionais aos riscos identificados e às características do território.
- (D) A análise ambiental contribui para reconhecer fatores de risco, enquanto as medidas de controle podem ser definidas pelos serviços assistenciais envolvidos no atendimento.
- (E) A integração das informações fortalece a vigilância, podendo cada componente definir medidas próprias conforme sua área técnica de atuação.

### Questão 05

Após a divulgação de novos indicadores, uma secretaria municipal de saúde constata que dois territórios apresentam taxas semelhantes de utilização dos serviços, mas condições sanitárias bastante distintas. Em um deles, há elevada prevalência de doenças crônicas e dificuldade de acesso da população aos serviços especializados; no outro, observa-se maior concentração de atendimentos por condições agudas e menor cobertura de determinadas ações de atenção primária. Diante desse cenário, a gestão decide revisar a programação da rede, considerando dados epidemiológicos, características demográficas, demandas assistenciais, capacidade instalada, recursos financeiros e resultados alcançados.

Com base nos princípios do planejamento em saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O planejamento territorial permite identificar desigualdades entre os serviços, sendo a utilização da demanda observada nos estabelecimentos de saúde suficiente para estabelecer a programação operacional da rede.
- (B) A capacidade instalada constitui a principal referência para reorganizar a rede, enquanto os indicadores epidemiológicos devem ser utilizados para corrigir eventuais desequilíbrios identificados após a programação dos serviços.
- (C) A demanda efetivamente registrada nos serviços representa a expressão mais objetiva das necessidades da população, podendo orientar prioritariamente a distribuição dos recursos e a definição das metas assistenciais.
- (D) A análise da situação de saúde deve preceder e orientar a definição de prioridades e a programação das ações, articulando necessidades do território, recursos disponíveis, responsabilidades e resultados a serem monitorados.
- (E) A definição das prioridades deve considerar os indicadores epidemiológicos, mas a alocação dos recursos deve preservar, preferencialmente, a estrutura assistencial existente para evitar descontinuidade na oferta.

### Questão 06

Um município apresenta aumento progressivo da incidência de doenças crônicas. Inicialmente, a secretaria de saúde propõe ampliar consultas médicas e campanhas educativas. Durante o processo de planejamento, entretanto, o diagnóstico revela que a população mais afetada também enfrenta dificuldades de mobilidade urbana, baixa disponibilidade de espaços públicos para atividade física, insegurança alimentar e condições socioeconômicas desfavoráveis. Diante disso, o município propõe uma estratégia que envolve saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e participação da comunidade.

Considerando os fundamentos da promoção da saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) As ações educativas e de incentivo à mudança de comportamentos constituem estratégias centrais de promoção da saúde, enquanto intervenções sobre infraestrutura e condições sociais devem ser desenvolvidas pelos setores responsáveis.
- (B) A promoção da saúde amplia as ações preventivas e permite a articulação entre diferentes setores, desde que exista disponibilidade institucional para estabelecer mecanismos de cooperação entre eles.
- (C) A participação da comunidade contribui para a identificação das prioridades, enquanto as ações sobre os determinantes sociais devem ser incorporadas separadamente às políticas públicas de cada setor.
- (D) A reorganização dos serviços de saúde fortalece a prevenção e a promoção, enquanto intervenções sobre as condições ambientais e sociais podem complementar as estratégias definidas pela gestão sanitária.
- (E) A promoção da saúde pressupõe atuação sobre os determinantes e condicionantes da saúde, articulando políticas intersetoriais, participação social e reorganização das práticas de cuidado para enfrentar problemas que ultrapassam a dimensão exclusivamente assistencial.

### Questão 07

Ao avaliar a execução de um programa municipal de saúde, a equipe técnica identifica uma situação aparentemente contraditória: parte significativa dos recursos previstos ainda não foi executada, enquanto algumas metas físicas apresentam resultados próximos do esperado. Em outras ações, porém, observa-se elevada execução financeira acompanhada de resultados inferiores às metas estabelecidas. Diante disso, o gestor determina uma análise conjunta da programação orçamentária, execução financeira, metas físicas, indicadores de desempenho e resultados sanitários.

Considerando os princípios da gestão pública dos recursos destinados à saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A baixa execução financeira demonstra inadequação da programação e justifica a revisão das metas, podendo a disponibilidade efetiva de recursos determinar a redefinição dos objetivos inicialmente estabelecidos.
- (B) A comparação entre recursos executados e metas alcançadas permite identificar divergências, que poderão ser corrigidas prioritariamente mediante ajustes na programação do exercício seguinte.
- (C) A execução orçamentária permite verificar a utilização dos recursos, enquanto a análise dos resultados assistenciais deve constituir etapa posterior e independente, realizada pelos setores responsáveis pela avaliação.
- (D) O acompanhamento das metas físicas constitui o principal mecanismo de avaliação do programa, cabendo à gestão financeira verificar posteriormente se os recursos foram suficientes para sustentá-las.
- (E) A execução financeira deve ser analisada em conjunto com a execução física e os objetivos estabelecidos no planejamento, permitindo verificar a coerência entre recursos empregados, ações realizadas e resultados alcançados.

### Questão 08

Um município está elaborando seu planejamento para o próximo ciclo de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). A equipe técnica pretende utilizar as necessidades identificadas no território, os instrumentos de planejamento e os dados de execução orçamentária para aprimorar a alocação dos recursos e acompanhar a implementação das ações previstas. Considerando a relação entre planejamento, orçamento, execução e monitoramento dos recursos públicos em saúde, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) O planejamento ascendente considera as necessidades de saúde identificadas nos territórios e deve orientar a programação das ações e a alocação de recursos, articulando-se aos instrumentos de planejamento e ao acompanhamento da execução.
- (B) O monitoramento da aplicação dos recursos concentra-se na verificação da execução financeira, utilizando os valores empenhados e pagos como referência suficiente para avaliar a implementação das ações de saúde planejadas.
- (C) O planejamento ascendente parte das diretrizes definidas nacionalmente e direciona sua execução aos territórios, cabendo aos instrumentos municipais ajustar as ações após a definição das dotações orçamentárias correspondentes.
- (D) A execução orçamentária constitui etapa posterior ao planejamento das ações de saúde, podendo a programação inicialmente estabelecida ser ajustada conforme a disponibilidade financeira, sem necessidade de correspondência com as prioridades definidas.

- (E) A programação das ações de saúde deve acompanhar as dotações orçamentárias disponíveis, de modo que as prioridades identificadas no planejamento possam ser redefinidas conforme os limites estabelecidos para a execução financeira.

### Questão 09

Em determinada região de saúde, os municípios apresentam diferentes capacidades de oferta. A atenção primária está distribuída de maneira relativamente homogênea, enquanto exames de maior complexidade, cirurgias e determinados atendimentos especializados encontram-se concentrados em poucos municípios. Diante da necessidade de reduzir deslocamentos desnecessários e garantir continuidade do cuidado, os gestores discutem a construção de fluxos assistenciais compartilhados e mecanismos de referência e contrarreferência.

Considerando os princípios e diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A integralidade garante a continuidade do cuidado, enquanto a hierarquização permite que cada gestor local defina livremente a ordem de acesso aos diferentes níveis de atenção conforme a capacidade disponível.
- (B) A regionalização favorece a organização territorial dos serviços, enquanto a descentralização possibilita que os municípios estabeleçam isoladamente os mecanismos de referência entre os diferentes pontos da rede.
- (C) A descentralização distribui responsabilidades entre os gestores e permite que cada município estabeleça autonomamente os fluxos de acesso aos serviços especializados existentes dentro ou fora de seu território.
- (D) A regionalização organiza a oferta e os fluxos de atenção considerando o território e as relações entre os municípios, enquanto a hierarquização estrutura os serviços segundo diferentes níveis de complexidade.
- (E) A hierarquização organiza os serviços de acordo com sua complexidade, enquanto a regionalização tem como finalidade principal distribuir recursos financeiros de maneira proporcional entre os municípios integrantes da região.

### Questão 10

Um município identificou aumento da demanda por atendimentos especializados e constatou que parte dos usuários procura diretamente serviços de maior complexidade, mesmo quando existem possibilidades de acompanhamento na atenção primária. A gestão pretende reorganizar os fluxos assistenciais e fortalecer a coordenação do cuidado. Considerando a organização do SUS, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A ampliação do acesso aos serviços especializados pode reduzir a necessidade de coordenação pela atenção primária quando houver capacidade suficiente na rede.
- (B) A organização hierarquizada dos serviços permite direcionar usuários aos diferentes níveis, enquanto a atenção primária concentra atividades de menor complexidade assistencial.
- (C) A descentralização favorece a autonomia municipal, permitindo organizar os fluxos assistenciais conforme as características locais e a disponibilidade de serviços.
- (D) A integralidade amplia a oferta de serviços à população, enquanto a coordenação do cuidado pode ser compartilhada entre os diferentes pontos da rede.
- (E) A atenção primária pode exercer função de coordenação do cuidado, articulando o acesso aos demais pontos da rede conforme as necessidades de saúde identificadas.

## LEI DO SUS

### Questão 11

O Conselho Nacional de Saúde analisa a necessidade de integrar políticas públicas relacionadas à saúde com ações cuja execução envolva áreas que não estão compreendidas no âmbito direto do SUS. Considerando a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) As comissões intersetoriais vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde coordenam políticas externas ao SUS, podendo assumir a execução administrativa das ações articuladas.
- (B) As comissões intersetoriais apoiam a formulação de políticas de saúde, enquanto a execução de programas externos ao SUS pode ser atribuída aos órgãos integrantes das comissões.
- (C) As comissões intersetoriais articulam programas relacionados à saúde, enquanto sua atuação pode abranger áreas externas ao SUS conforme as prioridades definidas pelo Conselho Nacional.
- (D) As comissões intersetoriais promovem integração entre políticas públicas, enquanto a execução das ações articuladas pode ser centralizada no Conselho Nacional de Saúde.
- (E) As comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde articulam políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas externas ao âmbito do SUS.

### Questão 12

Um trabalhador sofre acidente relacionado às condições existentes em seu processo de trabalho e busca atendimento na rede pública. Paralelamente, a vigilância pretende investigar os fatores de risco presentes no ambiente laboral e propor medidas preventivas. À luz da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A atuação do SUS na saúde do trabalhador envolve assistência e vigilância, enquanto a avaliação das condições laborais pode depender de solicitação do empregador responsável.
- (B) O SUS participa da atenção ao trabalhador acidentado, enquanto estudos sobre riscos ocupacionais podem ser desenvolvidos pelos serviços especializados da empresa.
- (C) A saúde do trabalhador compreende assistência aos trabalhadores acidentados, enquanto a investigação dos riscos ocupacionais pode ser conduzida pelos serviços responsáveis pela segurança empresarial.
- (D) A saúde do trabalhador envolve ações de prevenção e assistência, enquanto a fiscalização das condições de trabalho pode ser realizada conforme a competência administrativa de cada órgão.
- (E) A saúde do trabalhador compreende assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho e ações de vigilância, avaliação e controle dos riscos presentes no processo de trabalho.

### Questão 13

Uma equipe municipal está avaliando a atuação do SUS diante de problemas relacionados à qualidade da água destinada ao consumo humano, à fiscalização de alimentos e à inspeção de estabelecimentos que prestam serviços de interesse sanitário. Considerando a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) O SUS participa da fiscalização de alimentos e bebidas, enquanto o controle da qualidade da água destinada ao consumo humano pode ser atribuído a outros setores administrativos.
- (B) O SUS controla produtos e serviços de interesse sanitário, enquanto a fiscalização de alimentos e bebidas pode integrar ações ambientais desenvolvidas pelos municípios.
- (C) O SUS participa do controle sanitário de produtos e serviços, enquanto a fiscalização de alimentos pode ser realizada conforme programas definidos pela gestão local.
- (D) O SUS participa da fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano, além de controlar serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (E) O SUS atua na inspeção de estabelecimentos de saúde, enquanto o controle de alimentos e água pode ser organizado mediante ações de vigilância epidemiológica.

### Questão 14

Um gestor municipal pretende reorganizar a rede de serviços de saúde para reduzir sobreposições entre unidades que realizam atividades semelhantes. Durante o planejamento, a equipe técnica propõe concentrar determinados recursos e redefinir os fluxos assistenciais. Considerando os princípios e diretrizes previstos na Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A regionalização permite organizar os serviços territorialmente, enquanto a existência de estruturas semelhantes pode favorecer a capacidade de resposta da rede.
- (B) A organização dos serviços públicos deve priorizar a ampliação da oferta, ainda que unidades distintas mantenham estruturas destinadas a finalidades semelhantes.
- (C) A organização dos serviços públicos deve buscar evitar duplicidade de meios para fins idênticos, favorecendo o uso racional dos recursos disponíveis.
- (D) A distribuição dos recursos deve considerar as necessidades assistenciais, enquanto estruturas semelhantes podem permanecer conforme decisões dos gestores responsáveis.
- (E) A reorganização da rede pode considerar a capacidade instalada, enquanto a duplicidade de meios pode ser mantida para ampliar a autonomia dos serviços locais.

### Questão 15

Um município pretende constituir um consórcio com outros municípios para desenvolver conjuntamente determinadas ações e serviços de saúde. Durante a elaboração do instrumento constitutivo, surgem dúvidas sobre a forma de organização da direção do sistema no âmbito do consórcio. Considerando a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A formação de consórcios permite integrar recursos e serviços, enquanto a direção pode ser exercida por representantes indicados pelos municípios envolvidos.
- (B) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver serviços de saúde, podendo sua direção ser compartilhada entre os gestores conforme o instrumento constitutivo.
- (C) Os municípios podem organizar serviços mediante consórcios, enquanto a direção das atividades consorciadas pode ser distribuída entre os gestores participantes.
- (D) Os consórcios intermunicipais podem integrar ações de saúde, enquanto a definição de sua direção pode acompanhar a estrutura administrativa de cada município participante.
- (E) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver conjuntamente ações e serviços de saúde, aplicando-se a esses consórcios o princípio da direção única.

## BIOSSEGURANÇA

### Questão 16

Em um laboratório de pesquisa biomédica, determinado agente biológico apresenta risco ocupacional conhecido, e parte dos procedimentos envolve manipulação de culturas com potencial de formação de aerossóis. O responsável técnico deverá estabelecer as condições de contenção antes da execução das atividades.

Considerando a avaliação de risco em biossegurança, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A escolha do nível de biossegurança pode acompanhar o agente envolvido, utilizando as práticas operacionais como parâmetro complementar de proteção.
- (B) A classificação de risco do agente constitui referência suficiente para estabelecer a contenção, cabendo ao procedimento determinar ajustes complementares durante sua execução.
- (C) A formação de aerossóis recomenda adoção de contenção ampliada, ainda que as características do agente e da atividade indiquem baixo potencial de exposição.
- (D) A infraestrutura física disponível orienta a definição da contenção, enquanto as características do procedimento podem ser consideradas na seleção dos EPI.
- (E) A definição das medidas de contenção deve considerar o agente, a atividade realizada, as vias de exposição e as condições operacionais do procedimento.

### Questão 17

Um laboratório de análises clínicas identificou aumento de resultados incompatíveis com os controles internos. A investigação apontou falhas na organização das bancadas, na identificação de materiais e na sequência de determinadas etapas operacionais. Considerando as boas práticas laboratoriais, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A padronização dos procedimentos reduz diferenças operacionais, embora a identificação dos materiais possa ser flexibilizada em atividades de rotina.
- (B) A experiência dos profissionais pode compensar variações na execução dos procedimentos quando os equipamentos empregados apresentam desempenho adequado.
- (C) A organização das bancadas favorece o fluxo de trabalho, enquanto a confiabilidade dos resultados depende predominantemente dos equipamentos utilizados.
- (D) A utilização de EPI apropriados contribui para a segurança, podendo reduzir a relevância de falhas relacionadas à organização das etapas laboratoriais.
- (E) A prevenção de falhas requer procedimentos padronizados, organização adequada, identificação dos materiais e controle das etapas críticas do processo.

### Questão 18

Em uma unidade hospitalar, são gerados resíduos infectantes, resíduos perfurocortantes e resíduos que não apresentam características de risco biológico. Durante inspeção, verificou-se que os trabalhadores realizavam a separação de parte desses materiais durante o armazenamento temporário. À luz dos

princípios de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A classificação durante o armazenamento pode integrar o gerenciamento, desde que os fluxos posteriores sejam definidos conforme os grupos identificados.
- (B) A segregação durante o armazenamento temporário pode ser utilizada quando os resíduos permanecem identificados desde o momento da coleta interna.
- (C) A segregação deve ocorrer na fonte geradora, possibilitando acondicionamento e manejo compatíveis com as características e os riscos de cada resíduo.
- (D) A separação após a geração pode ser admitida quando os trabalhadores responsáveis pelo manejo utilizam recipientes específicos para cada categoria.
- (E) O agrupamento inicial pode facilitar a logística interna, desde que os resíduos sejam classificados antes do tratamento ou da disposição final.

### Questão 19

Durante a realização de um procedimento assistencial, um profissional de saúde sofre uma exposição percutânea decorrente de acidente com agulha que havia sido utilizada em paciente-fonte. Considerando as medidas de prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes e a conduta imediata recomendada pelo Ministério da Saúde/ANVISA após exposição ocupacional a material biológico potencialmente contaminado, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) Após a exposição percutânea, o profissional deve realizar limpeza vigorosa do local, seguida da aplicação de solução antisséptica, e aguardar a avaliação clínica caso o paciente-fonte não apresente diagnóstico conhecido de infecção transmissível.
- (B) Após a exposição percutânea, o profissional deve estimular o sangramento do local e aplicar produto químico desinfetante, comunicando o acidente posteriormente para avaliação da necessidade de acompanhamento ocupacional.
- (C) Após a exposição percutânea, o profissional deve limpar o local com solução antisséptica, evitar manipulação adicional da área e iniciar acompanhamento após a obtenção dos resultados sorológicos do paciente-fonte.
- (D) Após a exposição percutânea, o profissional deve lavar o local com água e sabão, comunicar o acidente e buscar avaliação para determinar o risco da exposição e a necessidade de medidas específicas de profilaxia e acompanhamento.
- (E) Após a exposição percutânea, o profissional deve higienizar o local com água e sabão, aguardar a identificação laboratorial do agente infeccioso antes de iniciar qualquer medida profilática ou de higienização do local.

### Questão 20

Em um laboratório clínico, determinado procedimento apresenta risco de respingos e possibilidade de geração de aerossóis. Foi selecionada uma cabine de segurança biológica compatível com a atividade, e os trabalhadores receberam EPI definidos conforme a avaliação dos riscos. Sobre a utilização integrada dessas medidas, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A seleção dos EPI pode tomar a classificação do agente como referência predominante, deixando as características da atividade para avaliação operacional posterior.
- (B) A cabine de segurança biológica e os EPI apresentam funções semelhantes de proteção, embora atuem sobre diferentes regiões do ambiente laboratorial.
- (C) A contenção coletiva, os EPI e as práticas de trabalho devem atuar de forma complementar, considerando as diferentes possibilidades de exposição existentes.
- (D) A utilização da cabine de segurança biológica reduz suficientemente a exposição ocupacional, podendo os EPI ser definidos com menor rigor para esse procedimento.
- (E) A existência de contenção coletiva permite adaptar determinadas práticas de trabalho quando os trabalhadores utilizam adequadamente os equipamentos individuais.

## CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

### Questão 21

Na condução do desmame, a decisão de suspender o suporte ventilatório invasivo apoia-se em preditores obtidos à beira do leito, entre os quais um índice que combina dois parâmetros do padrão ventilatório assumido pelo paciente quando a assistência do ventilador é retirada. Sobre esse preditor, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Corresponde à razão entre a frequência respiratória e o volume corrente aferidos sem assistência do ventilador, e resultados abaixo de 105 ciclos por minuto por litro sinalizam maior chance de sucesso.
- (B) Deriva da razão entre a frequência respiratória e a capacidade vital forçada do paciente, e sua elevação progressiva ao longo do teste acompanha a recuperação da musculatura inspiratória.
- (C) Resulta da divisão da pressão inspiratória máxima pelo volume corrente do paciente e identifica a fadiga diafragmática instalada ao longo do período de suporte ventilatório.
- (D) Expressa a razão entre o volume corrente e a frequência respiratória aferidos sem assistência do ventilador, e cifras acima de 105 ciclos por minuto por litro anunciam boa reserva ventilatória do paciente.

(E) É aferido com pressão de suporte de 15 cmH<sub>2</sub>O ajustada para compensar a resistência do tubo, ajuste que conserva o valor do índice e o torna comparável ao obtido sem assistência.

### Questão 22

A fraqueza muscular que se instala no curso da doença crítica compromete o desfecho funcional e prolonga a permanência hospitalar, e seu reconhecimento integra a rotina de avaliação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. A respeito dessa condição, analise as afirmativas a seguir:

I. A graduação da força pela escala do Medical Research Council soma seis grupos musculares em cada hemicorpo, pontuados de 0 a 5, o que resulta em um total situado entre 0 e 60 pontos.

II. A confirmação do quadro depende de eletroneuromiografia associada a biópsia muscular, exames que distinguem o comprometimento nervoso do muscular e fecham o diagnóstico à beira do leito.

III. O acometimento é difuso e simétrico, com predomínio da musculatura proximal sobre a distal, e a função dos nervos cranianos e o controle autonômico costumam ser poupados.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I apenas.
- (E) I e III apenas.

### Questão 23

Durante a mobilização e o exercício supervisionados na fase hospitalar, o fisioterapeuta acompanha o comportamento da frequência cardíaca e da pressão arterial para ajustar a carga e reconhecer respostas inadequadas ao esforço. Sobre esse acompanhamento, assinale a alternativa que o descreve CORRETAMENTE.

- (A) A queda da frequência cardíaca no primeiro minuto após o término do esforço traduz a retirada gradual do estímulo simpático sobre o nó sinusal, com pouca participação do tônus vagal.
- (B) O produto entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica estima de modo indireto o consumo de oxigênio pelo miocárdio e eleva-se conforme aumenta a intensidade do esforço.
- (C) A pressão arterial diastólica acompanha a sistólica e sobe de forma proporcional à carga imposta, o que confere ao seu incremento o papel de marcador de tolerância ao esforço.
- (D) O produto entre a frequência cardíaca e a pressão arterial diastólica expressa a reserva cronotrópica utilizada e orienta a progressão da carga ao longo da internação hospitalar.

(E) A prescrição da intensidade na fase hospitalar apoia-se na frequência cardíaca de reserva calculada a partir de teste ergométrico máximo realizado antes do início do programa.

### Questão 24

A progressão da mobilização do paciente internado é acompanhada por escalas ordinais que registram o maior nível de atividade alcançado a cada dia. Considere as atividades listadas abaixo, apresentadas fora da ordem de progressão:

- (1) Marcha estacionária junto ao leito, com elevação alternada dos pés.
- (2) Transferência para a poltrona por elevador mecânico ou prancha, sem apoio de peso nos membros inferiores.
- (3) Transferência ativa do leito para a poltrona, com apoio de peso e deslocamento de passos.
- (4) Permanência sentado à beira do leito, com controle ativo do tronco.

Com base nessa progressão, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente CORRETA dessas atividades:

- (A) 2, 4, 3, 1.
- (B) 3, 1, 4, 2.
- (C) 1, 3, 2, 4.
- (D) 4, 2, 1, 3.
- (E) 4, 3, 1, 2.

### Questão 25

A aferição da força da musculatura inspiratória à beira do leito apoia-se, em regra, em manobras voluntárias máximas, o que restringe seu emprego em pacientes sedados ou com nível de consciência rebaixado. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Em pacientes pouco cooperativos, a pressão inspiratória máxima é obtida por dispositivo acoplado à via aérea que bloqueia a entrada de ar e libera a saída, mantido por um período de oclusão previamente definido.

PORQUE

II. A oclusão sucessiva das inspirações reduz de modo progressivo o volume pulmonar em direção ao volume residual, faixa em que a relação comprimento-tensão dos músculos inspiratórios favorece a geração da maior pressão negativa.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

- (E) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

### Questão 26

As infecções relacionadas à assistência à saúde são enfrentadas por conjuntos de medidas aplicadas de forma articulada, próprios de cada topografia e do dispositivo envolvido. Associe cada agravo da Coluna I ao conjunto de medidas descrito na Coluna II:

Coluna I

1. Pneumonia associada à ventilação mecânica.
2. Infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter venoso central.
3. Infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora.
4. Infecção de sítio cirúrgico.

Coluna II

( ) Manutenção do sistema de drenagem fechado, com a bolsa coletora fixada abaixo do nível da bexiga e mantida sem contato com o chão ou com a parede.

( ) Aspiração de secreção subglótica de forma contínua ou intermitente e busca diária da redução do nível de sedação nos casos de suporte invasivo prolongado.

( ) Uso de gorro, máscara, avental estéril de manga longa e luvas estéreis na punção, com preparo prévio da pele por solução alcoólica de clorexidina.

( ) Banho com antisséptico antes do procedimento, remoção de pelos com tricotomizador elétrico imediatamente antes dele e glicemia mantida abaixo de 180 mg/dL.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 4, 2, 3, 1.  
(B) 1, 3, 4, 2.  
(C) 2, 4, 1, 3.  
(D) 1, 4, 3, 2.  
(E) 3, 1, 2, 4.

### Questão 27

As técnicas de desobstrução brônquica e de expansão pulmonar diferenciam-se pelo volume pulmonar em que atuam, pelo mecanismo que empregam e pelo tipo de retorno oferecido ao paciente. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A expiração lenta total com a glote aberta é executada em decúbito lateral, com o pulmão a ser tratado em posição infralateral, e conduz o volume pulmonar da capacidade residual funcional até o volume residual.

( ) A drenagem autógena é conduzida em volumes pulmonares elevados desde a primeira série, com

expirações forçadas e rápidas que deslocam as secreções retidas nas vias aéreas periféricas.

( ) A pressão positiva expiratória aplicada por máscara eleva a capacidade residual funcional e favorece a chegada de ar por trás das secreções através dos poros de Kohn e dos canais de Lambert.

( ) O incentivador orientado a volume oferece como sinal de retorno a sustentação de uma esfera elevada pelo fluxo aspirado, exigindo do paciente a manutenção de um fluxo inspiratório constante.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.  
(B) F, V, V, F.  
(C) F, F, V, V.  
(D) V, V, F, F.  
(E) V, F, V, F.

### Questão 28

O prontuário reúne, em documento compartilhado pela equipe, os elementos que descrevem a condição do paciente internado e o curso da assistência prestada ao longo da internação. Sobre esse registro, analise as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico e o prognóstico cinético-funcionais constituem itens próprios do registro, apartados da descrição do exame físico e do resultado dos exames complementares.

II. A evolução descreve, a cada atendimento, o estado funcional do paciente, o tratamento realizado e as eventuais intercorrências, ainda que o plano terapêutico permaneça inalterado.

III. O plano terapêutico é lançado ao término do acompanhamento, como síntese retrospectiva dos procedimentos aplicados e dos objetivos que foram alcançados.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I apenas.  
(B) I e III apenas.  
(C) I, II e III.  
(D) II apenas.  
(E) I e II apenas.

### Questão 29

Na presença de via aérea artificial, o condicionamento do ar inspirado deixa de contar com as vias aéreas superiores e passa a depender do dispositivo acoplado ao circuito. O trocador de calor e umidade, interposto entre a peça em Y do circuito e a via aérea do paciente, opera por mecanismo \_\_\_\_\_ e acrescenta ao circuito um espaço morto \_\_\_\_\_ ao seu volume interno. Comparado ao umidificador aquecido, e mantidos os demais ajustes do ventilador, o trocador tende a \_\_\_\_\_ a frequência respiratória e a \_\_\_\_\_ o volume

corrente. Diante dessa comparação, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) passivo - igual - elevar - reduzir
- (B) ativo - inferior - elevar - reduzir
- (C) passivo - inferior - reduzir - elevar
- (D) ativo - igual - reduzir - elevar
- (E) passivo - igual - reduzir - elevar

### Questão 30

A leitura da saturação periférica de oxigênio traduz a proporção de hemoglobina ligada ao oxigênio e sofre influência tanto de fatores fisiológicos quanto das condições técnicas de aferição. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ Na intoxicação por monóxido de carbono a leitura tende a permanecer normal ou elevada, porque o aparelho não separa a carboxi-hemoglobina da oxi-hemoglobina.

☐ Uma saturação periférica de 90% corresponde, na curva de dissociação da oxi-hemoglobina, a uma pressão parcial de oxigênio arterial situada em torno de 90 mmHg.

☐ A acidose, a hipercapnia e a elevação da temperatura corporal deslocam a curva de dissociação para a esquerda e aumentam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.

☐ Estados de hipotensão arterial, vasoconstrição intensa e baixa perfusão periférica reduzem a acurácia da leitura obtida no leito ungueal e pedem confirmação por gasometria.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR