

CONCURSO PÚBLICO

021. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica de Marcos Rey para responder às questões de números **01** a **10**.

Salas de espera

Mesmo com decoração agradável, ar-refrigerado, sorrisos de uma atendente sexy, ficar plantado numa sala de espera é mais chato do que campeonato de boliche. Seus personagens não são muito variados: crianças que não param de se mexer; enxeridos loucos pela intimidade das pessoas; leitores compulsivos de revistas...

Mas houve uma sala de espera terrível na minha vida. Precisava de emprego. Desesperadamente. Não fora o primeiro a chegar, sempre há os que chegam antes. Fiquei horas com os olhos fixos na porta da esperança. O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão. O segundo, que levava à mão um currículo enorme, deixou a entrevista picando-o com ódio em mil pedacinhos.

Minha vez. Entrei trêmulo, pálido, derrotado. O empresário abriu os braços, sorrindo. Conhecia-me. Conhecia-o. Rodolfo! Não o sabia também dono daquilo! Meu dia de sorte!

– É você? Aqui está seu maior fã! Li dois livros seus. Minha mulher disse que sairá outro. Serei o primeiro a comprar.

Abraçados, senti que o mundo afinal acolhia este aquariano.

– Estava na sala de espera desde as 2, Rodolfo.

– Por que não mandou me avisar? Eu o receberia imediatamente. Não calcula como o admiro.

– Agora estou precisando de um emprego, amigo. A vida está dura.

– Dura? Está duríssima! Insuportável – confirmou, com uma pequena ressalva – mas não para os artistas. Vocês não sofrem nossos problemas. Devem rir da gente, reles homens de negócio. Como gostaria de ter talento para escrever! Viveria com pouco dinheiro, porém feliz. Eu aqui sou um mártir dos números.

– O que poderia me arranjar, Rodolfo? Estou encalcrado. Qualquer coisa serve – revelei humilde.

Ele lançou-me um olhar mais sábio do que compadecido:

– Eu não o desviaria de sua vocação com um empregui-nho. Conserve-se fora da maldita engrenagem.

E confessou:

– Hoje ganhei o dia, vendo-o. Vou acompanhá-lo ao elevador.

– Mas Rodolfo...

– Faço questão.

(Coleção melhores crônicas – Marcos Rey.
Seleção Anna Maria Martins. Global, 2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa correta a respeito das ideias do texto.

- (A) A necessidade de conseguir um emprego era urgente, porém o autor foi arrogante com o empresário que o recebeu.
- (B) As salas de espera tornam-se mais agradáveis para o autor apenas quando há atendentes jovens e bonitas.
- (C) O autor chega sempre atrasado às entrevistas de emprego porque é incapaz de cumprir compromissos.
- (D) O empresário frustrou as expectativas do autor, pois, embora tenha feito elogios, não lhe deu o emprego.
- (E) As pessoas que frequentam salas de espera costumam surpreender pelos mais diversos comportamentos que apresentam.

02. No segundo parágrafo, em “O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão.”, observa-se que as duas atitudes do candidato são

- (A) repetitivas.
- (B) opostas.
- (C) incoerentes.
- (D) simultâneas.
- (E) imparciais.

03. No décimo segundo parágrafo, ao dizer “Conserve-se fora da maldita engrenagem”, Rodolfo aconselha o autor a

- (A) aceitar exclusivamente cargos empresariais que tenham altíssima remuneração.
- (B) mudar o conteúdo e o gênero de suas obras para vender mais livros.
- (C) valorizar seu talento e manter-se fiel à atividade artística que vem executando.
- (D) adquirir outras habilidades profissionais e ter mais chances no mercado de trabalho.
- (E) demonstrar mais autoestima na hora de pedir emprego a conhecidos.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo termo entre parênteses, sem alteração do sentido do texto.

- (A) leitores **compulsivos** de revistas (obsessivos)
- (B) Entrei trêmulo, **pálido**, derrotado (febril)
- (C) senti que o mundo afinal **acolhia** este aquariano (rechaçava)
- (D) Devem rir da gente, **reles** homens de negócio (experientes)
- (E) Ele lançou-me um olhar mais sábio do que **compadecido** (envaidecido)

05. Considere os trechos do texto.

- ... ficar plantado numa sala de espera é **mais** chato do que campeonato de boliche. (1º parágrafo)
- Precisava de emprego. **Desesperadamente**. (2º parágrafo)

Os termos destacados apresentam, respectivamente, as ideias de intensidade e de modo.

Assinale a alternativa em que os termos destacados também expressam, respectivamente, as mesmas ideias.

- (A) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / deixou a entrevista picando-o **com ódio** em mil pedacinhos (2º parágrafo).
- (B) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / Estava na sala de espera **desde as 2**, Rodolfo (6º parágrafo).
- (C) **sempre** há os que chegam antes (2º parágrafo) / **Agora** estou precisando de um emprego, amigo (8º parágrafo).
- (D) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Eu o receberia **imediatamente** (7º parágrafo).
- (E) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Viveria **com pouco dinheiro**, porém feliz (9º parágrafo).

06. De acordo com as ideias do texto e com a regência nominal estabelecida pela norma-padrão, o trecho “enxeridos loucos pela intimidade das pessoas” (1º parágrafo) pode ser substituído por:

- (A) enxeridos desejosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (B) enxeridos curiosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (C) enxeridos avessos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (D) enxeridos receosos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (E) enxeridos ávidos por conhecer a intimidade das pessoas.

07. Assinale a alternativa em que as duas frases do segundo parágrafo estão reescritas sem alteração do sentido do texto.

- (A) Não fora o primeiro a chegar, ainda que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços, no entanto sorria.
- (B) Não fora o primeiro a chegar, contanto que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços à medida que sorria.
- (C) Não fora o primeiro a chegar, por isso sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços embora sorrisse.
- (D) Não fora o primeiro a chegar, pois sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços enquanto sorria.
- (E) Não fora o primeiro a chegar, tanto que sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços apesar de sorrir.

08. No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro a ser lançado por este.

Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma-padrão, o empresário também poderia ter dito:

- (A) Serei o primeiro a comprá-lo para mim ler suas novas crônicas.
- (B) Serei o primeiro a comprá-lo para eu ler suas novas crônicas.
- (C) Serei o primeiro a comprá-los para eu ler suas novas crônicas.
- (D) Serei o primeiro a comprar ele para mim ler suas novas crônicas.
- (E) Serei o primeiro a comprar eles para eu ler suas novas crônicas.

09. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase corretamente empregado em:

- (A) Mas Rodolfo, e quanto à uma colocação em sua empresa?
- (B) Mas Rodolfo, você não vai dar à mim uma oportunidade?
- (C) Mas Rodolfo, estou à espera de um emprego há tempos!
- (D) Mas Rodolfo, graças à seu apoio eu poderia trabalhar...
- (E) Mas Rodolfo, eu me dedicarei à trabalhar muito por sua empresa!

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal determinada pela norma-padrão.

- (A) Aguardar horas em salas de espera não são tarefa prazerosas.
- (B) Faltaram alguns candidatos à entrevista de emprego na renomada empresa.
- (C) Habitualmente existe revistas variadas à disposição nas salas de espera.
- (D) Toda a esperança do autor estava depositado na aquisição de um novo emprego.
- (E) Rodolfo se entusiasmou ao rever o colega, pois se conhecia de longa data.

11. Sabe-se que o preço unitário do produto A é igual ao dobro do preço unitário do produto B, e que o valor total da compra de 20 unidades de A e 5 unidades de B é R\$ 450,00. Nessas condições, a compra de 5 unidades de A e 20 unidades de B terá um valor total de
- (A) R\$ 250,00.
(B) R\$ 275,00.
(C) R\$ 300,00.
(D) R\$ 325,00.
(E) R\$ 350,00.
12. O tanque de combustível de certo veículo, cuja capacidade total é n litros e que já continha 5 litros de etanol, foi totalmente preenchido com a adição de certa quantidade de gasolina, igual a $\frac{3}{10}$ de n , e certa quantidade de etanol, igual a $\frac{3}{5}$ de n . O número de litros de etanol contidos no tanque, após esse reabastecimento, é igual a
- (A) 30.
(B) 35.
(C) 40.
(D) 42.
(E) 45.
13. Um lote que deveria conter 960 unidades de certo parafuso seria totalmente distribuído em saquinhos, de modo que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos. Entretanto, constatou-se que nesse lote havia 1 120 unidades desse parafuso e, para que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos que teria inicialmente, foi necessário acrescentar mais 4 saquinhos à quantidade inicialmente prevista. Desse modo, o número total de saquinhos utilizados foi igual a
- (A) 18.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 28.
(E) 30.

14. Um rolo de certo fio foi totalmente dividido em oito pedaços. Os seis primeiros pedaços cortados têm comprimentos iguais, e cada um dos outros dois pedaços têm 1,6 m a menos que o comprimento de cada pedaço inicial. Se a média aritmética dos comprimentos dos pedaços cortados é igual a 4,6 m, então cada um dos dois pedaços menores mede

- (A) 3 m.
- (B) 3,2 m.
- (C) 3,4 m.
- (D) 3,6 m.
- (E) 4 m.

15. O volume de água contido inicialmente em um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, de 3 m de comprimento e 2 m de largura, era igual a $\frac{1}{3}$ de

seu volume total. Foram, então, colocados mais 6 m³ de água nesse reservatório, que ficou completamente cheio, sem transbordar. A medida da altura desse reservatório é

- (A) 1,5 m.
- (B) 1,8 m.
- (C) 2 m.
- (D) 2,5 m.
- (E) 3 m.

R A S C U N H O

16. A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) suspeita fortemente de violência doméstica contra uma menina de 12 anos de idade que mora com os pais. No mesmo quintal, em outra casa, moram os avós maternos e dois tios, irmãos da mãe. Assinale a alternativa correta referente ao encaminhamento adequado para investigar essa situação.

- (A) A equipe de saúde deve conversar cuidadosamente com a menina tentando obter mais informações sobre o caso e localizar pontos de apoio na família ou no círculo social próximo.
- (B) A equipe de saúde deve solicitar a presença dos pais da menina para explicar a suspeita, obter informações e um encaminhamento mais seguro.
- (C) Havendo fortes evidências de violência doméstica, a equipe de saúde deve notificar a polícia por precaução.
- (D) Como se trata de uma questão delicada, a equipe de saúde deve seguir o encaminhamento dado por um psicólogo.
- (E) A menina deve ser encaminhada para um psicólogo o mais rápido possível, e os pais devem ser chamados para que fiquem atentos para o comportamento dos avós e tios.

17. As primeiras vacinas a serem administradas em uma criança são:

- (A) contra a poliomielite e contra o rotavírus humano, ao nascer.
- (B) contra a hepatite B e contra a poliomielite, no primeiro mês de vida.
- (C) a BCG e contra a hepatite B, ao nascer.
- (D) a meningocócica C e contra a hepatite B, ao nascer.
- (E) a BCG e a meningocócica C, ao nascer.

18. Uma instrumentadora de cirurgia, ao manusear um bisturi usado pelo cirurgião, tem a luva danificada e sofre um pequeno ferimento corto-contuso. Em relação à notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Como não é caso incapacitante, não se trata de acidente de trabalho.
- (B) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho com exposição a material biológico no prazo de uma semana.
- (C) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho se houver evidências de algum adoecimento decorrente do evento.
- (D) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho imediatamente, devido à gravidade do ocorrido.
- (E) Caso haja alguma complicação ou desdobramento clínico, o caso deve ser notificado como acidente de trabalho em qualquer momento.

19. Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil em uma dada comunidade em um determinado ano, é suficiente ter dados sobre óbitos de crianças

- (A) até 28 dias de idade e número de nascidos vivos.
- (B) até 12 meses de idade e população total da comunidade.
- (C) até 12 meses de idade e número de nascidos vivos.
- (D) de 0 a 6 dias de vida e número de nascidos vivos.
- (E) entre 7 e 27 dias de vida e número de nascidos vivos.

20. Assinale a principal via de transmissão do SARS-CoV-2.

- (A) Sexual.
- (B) Endovenosa.
- (C) Secreções corpóreas de pessoas infectadas em situação de rua.
- (D) Superfícies de bancos de praças públicas.
- (E) Perdigotos e aerossóis de pessoas infectadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do artigo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que dispõe sobre “recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade”, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se da convenção coletiva de trabalho, especificada nesse item que declara ações específicas para profissionais de nível técnico.
- (B) Consta entre os artigos sobre proibições das relações com as organizações empregadoras.
- (C) Acompanha o artigo que trata sobre os direitos, incluindo o acesso às informações necessárias ao exercício profissional.
- (D) Está contido onde se faz menção ao dever de disponibilizar os serviços profissionais em casos de catástrofes, desde que haja o pleito de vantagens pessoais.
- (E) Denominada imperícia, esse artigo orienta a cassação do direito ao exercício profissional, uma vez que não há possibilidade de recusa à execução de atividades.

22. Segundo Laccort e Oliveira, o “trabalho em equipe é uma ferramenta do processo de trabalho em saúde e requer de todos os membros a composição de um conjunto de instrumentos para construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, estimulando os vínculos. A enfermagem é um trabalho humano que tem finalidade de cuidar. O trabalho em equipe na área de enfermagem é fundamental, sem equipe não há trabalho”.

A respeito da equipe de trabalho, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- (A) A discussão de caso clínico deve ocorrer entre profissionais da mesma categoria e profissão, para manter separadas as condutas, por exemplo, de fisioterapeutas e equipe de enfermagem.
- (B) O trabalho em equipe tem indicação de aplicação como método em serviços onde já há acreditação e certificação, uma vez que demanda treinamentos de habilidades de comunicação e aceitação desse modelo pelos pacientes.
- (C) A complexidade do objeto de intervenção em saúde no trabalho em enfermagem inviabiliza o trabalho em equipe, já que não podem ocorrer divergências de opiniões para além da sobrecarga de trabalho.
- (D) A atuação articulada de equipe multiprofissional vem sendo adotada há alguns anos, favorecendo a aplicação da integralidade, construindo saberes e práticas que podem ir além do modelo biomédico.
- (E) Trabalho interprofissional para ser exercido demanda formação específica e certificada, estrutura arquitetônica e organizacional para tal.

23. Em uma enfermaria neurológica, é comum – no preenchimento da admissão – a verificação de uma escala que avalia o estado de consciência, pontuando padrões de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Trata-se da escala de
- (A) Phillip.
 - (B) Heimlich.
 - (C) Allen.
 - (D) Cincinnati.
 - (E) Glasgow.
24. Assinale a alternativa que representa estratégia(s) protetiva(s) para melhor manejo de situações de crise em saúde mental.
- (A) Genética e uso de medicamentos.
 - (B) Estigma e vulnerabilidade social.
 - (C) Internação compulsória e plano privado de saúde.
 - (D) Privacidade e ausência de contratualidade.
 - (E) Projeto terapêutico singular articulado com rede de atenção psicossocial.
25. Entre as ações relacionadas à promoção da amamentação, está a mediação de grupos de orientação às famílias. Você está compondo o grupo que auxilia pessoas com dúvidas e é abordado por uma senhora, que pergunta sobre a possibilidade de o leite materno de sua nora estar fraco, por apresentar aspecto ralo e de coloração amarelada. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.
- (A) No período pós-parto, hormônios estimulam a secreção do colostro, de aspecto tal como o descrito pela senhora e de grande importância para a imunidade.
 - (B) O leite materno com o aspecto descrito é denominado maduro, por conter já menor quantidade de lactoferrina e imunoglobulina A.
 - (C) A secreção desse tipo de leite ocorre quando há *déficit* nutricional no organismo materno, devendo a mãe buscar atendimento, e o bebê, receber complemento lácteo.
 - (D) Trata-se de um fenômeno chamado galactopoiese, sugestivo de problemas imunológicos no bebê.
 - (E) Denomina-se colostro, o leite que varia em sua composição, tem propriedades constipantes e é secretado até os seis meses de vida do bebê.
26. Sobre a vacina contra o rotavírus humano, é correto afirmar que
- (A) se compõe de dose única, com vírus inativado e administração subcutânea.
 - (B) é dividida em três doses e um reforço, com intervalos mínimos de seis meses.
 - (C) tem aplicação via intradérmica e está contida na vacina tríplice viral.
 - (D) a idade máxima para iniciar a vacinação com a primeira dose é 3 meses e 15 dias.
 - (E) tem aplicação via intramuscular e duas doses, sendo o esquema iniciado aos 4 meses.
27. Dos antissépticos disponíveis, qual deve ser o recomendado para o preparo do procedimento de sondagem vesical de demora?
- (A) Óxido de etileno.
 - (B) Clorexidina aquosa.
 - (C) Quaternário de amônio.
 - (D) Álcool 70%.
 - (E) Lidocaína.
28. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o documento técnico que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para produtos para saúde, a RDC nº 15 de 2012. Sobre essas práticas e os cuidados com equipamentos que entram contato com mucosa íntegras potencialmente colonizadas, assinale a alternativa correta.
- (A) São artigos não críticos de conformação complexa.
 - (B) Devem ser submetidos ao processo de limpeza em lavadora ultrassônica.
 - (C) São denominados artigos críticos, exigindo dupla assepsia.
 - (D) A esterilização das mãos constitui essencial cumprimento para processar artigos.
 - (E) Exigem desinfecção de alto nível, no mínimo.

29. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir:

A Política Nacional de Atenção _____ se propõe a abranger um conjunto de ações em saúde, abrangendo prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, diagnóstico, reabilitação, desenvolvendo impacto nos determinantes e _____ de saúde. Um exemplo comum é a atuação de grupos de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, respiratórias, neoplasias e _____.

- (A) Básica ... condicionantes ... diabetes
- (B) Primária ... intervenções ... hepáticas
- (C) Básica ... auditorias ... arboviroses
- (D) Total ... tecnologias ... cerebrais
- (E) Básica ... auditorias ... covid-19

30. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) Fica vedado ao usuário de plano ou convênio privado, a utilização do ambulatório de especialidades e da unidade básica de saúde do território.
- (B) A participação da comunidade só é permitida mediante regulamentação de grupos inscritos nas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde.
- (C) A universalidade de acesso e a integralidade da assistência devem ser garantidas em todos os níveis de complexidade.
- (D) A centralização político-administrativa prevista na Constituição evita diferenças entre o acesso a equipamentos de saúde nos diferentes municípios brasileiros.
- (E) Meio ambiente e saneamento básico devem ser tratados por seus respectivos ministérios, uma vez que o SUS já abarca muitos recursos.

31. A ventilação mecânica invasiva na UTI pediátrica é um procedimento comum e que pode ser realizada por meio de uma cânula orotraqueal, cânula nasotraqueal ou traqueostomia. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o manejo da ventilação mecânica constitui prática avançada de Enfermagem estando o técnico de enfermagem apto a realizar

- (A) a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva em pacientes pediátricos.
- (B) a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da ventilação mecânica invasiva.
- (C) a coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória.
- (D) a aspiração das vias aéreas de acordo com as técnicas corretas de controle de infecção e higiene oral conforme prescrição de enfermagem.
- (E) a realização e/ou prescrição de higiene bucal, incluindo o uso do gluconato de clorexidina 0,12% ou outras soluções antissépticas cientificamente recomendadas.

32. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) tem crescido, com mais de 20 mil hospitais credenciados em mais de 156 países nos últimos 15 anos. Ações visando estimular os hospitais e as maternidades no país a se tornarem “Amigos da Criança” são coordenadas no Brasil pela Área de Saúde da Criança do Ministério da Saúde. Os estabelecimentos de saúde, para se tornarem HAC, precisam ser submetidos à avaliação com base no cumprimento dos critérios globais. Quais critérios a seguir fazem parte dos “Dez passos para o sucesso do aleitamento materno”?

- (A) Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno, ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto, praticar o alojamento conjunto.
- (B) Encorajar o aleitamento sob livre demanda, dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas no peito, ter uma norma escrita sobre aleitamento materno que deverá ser rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde.
- (C) Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, encorajar o aleitamento sob livre demanda, dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas no peito.
- (D) Encorajar a formação de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas logo após a alta do hospital ou ambulatório, encorajar o aleitamento sob livre demanda, dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas no peito.
- (E) Não dar aos recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que seja prescrito pelo médico, evitar o aleitamento sob livre demanda, ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.

- 33.** Na fase em que a morte se torna inevitável, prevalece os cuidados paliativos e a prioridade se torna o alívio do sofrimento, a não a maleficência. No caso de crianças, o princípio da autonomia deve ser exercido pela família ou seu responsável legal, buscando a defesa dos seus melhores interesses. Segundo os aspectos relacionados aos cuidados paliativos, é correto afirmar:
- (A) deve-se realizar uma abordagem simples e específica de apenas um profissional.
 - (B) consiste no cuidado ativo e abrangente com o corpo, mente e espírito da criança, proporcionando apoio à família.
 - (C) começa apenas no final da doença, independentemente de a criança receber ou não tratamento para controlar a doença subjacente.
 - (D) deve-se evitar adaptações conforme nível de desenvolvimento da criança e conforme os valores familiares.
 - (E) é de responsabilidade de instituições específicas a prática desses cuidados.
- 34.** Paciente com 5 anos de idade, masculino, foi admitido na UTI Pediátrica por bronquiolite, mantendo máscara de oxigênio não reinalante a 10 L/min e monitorização cardíaca com sinais vitais estáveis. Após 4 horas da sua admissão, ele apresenta parada cardiorrespiratória. Segundo as diretrizes internacionais da *American Heart Association* (AHA 2015 – 2020), quais as medidas para essa situação?
- (A) Comprimir forte (no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax) e rápido (no mínimo 100 compressões/min) e permitir o retorno torácico, manter ventilação excessiva (rápida e forte), acionar o serviço de psicologia para os pais.
 - (B) Minimizar as interrupções nas compressões (menos que 10s), administrar epinefrina a cada ciclo de compressões, se o paciente não estiver com via aérea avançada, fazer a relação de 30 compressões para cada 2 ventilações com um único socorrista e 15 compressões para cada 2 ventilações quando houver dois socorristas.
 - (C) Comprimir forte (no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax) e rápido (100 a 120 compressões/min) e permitir o retorno torácico, evitar ventilação excessiva, administrar epinefrina e repetir a cada 3 a 5 minutos conforme solicitação médica.
 - (D) Se o paciente não estiver com via aérea avançada, fazer a relação compressões x ventilações de 30:2 com um único socorrista e 15:2 com pelo menos dois socorristas, evitar ventilação excessiva, administrar epinefrina a cada ciclo de compressões.
 - (E) Manter ventilação excessiva (rápida e forte), acionar o serviço de psicologia para os pais, comprimir forte (no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax) e rápido (100 a 120 compressões/min) e permitir o retorno torácico.
- 35.** A equipe da UTI pediátrica atendeu a uma parada cardiorrespiratória de um paciente de 1 ano e 8 meses e, após realizar as manobras, a criança recuperou os sinais vitais. Após 3 dias, ela foi diagnosticada com encefalopatia hipóxico-isquêmica e foi submetida à investigação de morte encefálica. Segundo o protocolo de morte encefálica no Brasil, são necessários dois exames clínicos. Qual o intervalo de tempo entre esses exames para esse paciente?
- (A) Intervalo de 48 horas entre os exames clínicos.
 - (B) Intervalo de 24 horas entre os exames clínicos.
 - (C) Intervalo de 12 horas entre os exames clínicos.
 - (D) Intervalo de 6 horas entre os exames clínicos.
 - (E) Intervalo de 2 horas entre os exames clínicos.
- 36.** Paciente de 10 anos, internado na UTI Pediátrica há 20 dias, passa a apresentar sinais de Insuficiência renal e é indicado hemodiálise. Quais os cuidados do técnico de enfermagem ao paciente pediátrico em hemodiálise?
- (A) Observar sinais de infecção na inserção do cateter de Shilley, realizar curativo quando necessário com técnica limpa, realizar balanço hídrico rigoroso.
 - (B) Realizar balanço hídrico rigoroso, pesar o paciente diariamente quando não houver restrições e realizar o controle rigoroso dos sinais vitais.
 - (C) Pesar o paciente diariamente quando não houver restrições, realizar curativo quando necessário com técnica limpa e proporcionar medidas de conforto.
 - (D) Realizar balanço hídrico durante a hemodiálise, pesar o paciente diariamente quando não houver restrições e analisar os resultados dos exames laboratoriais.
 - (E) Realizar curativo quando necessário com técnica limpa, observar sinais de infecção na inserção do cateter de Shilley e realizar balanço hídrico rigoroso.
- 37.** Em um ambiente de Terapia Intensiva, o uso de drogas vasoativas é muito comum e essencial no tratamento de diversas complicações de inúmeras patologias. Quais os cuidados de enfermagem com o paciente que está recebendo droga vasoativa contínua?
- (A) Controle rigoroso dos sinais vitais, infusão com equipo microgotas com controle rigoroso do gotejamento e atentar-se aos sinais de hipotensão.
 - (B) Controle rigoroso dos sinais vitais, preparo da solução exclusivamente em soro glicosado 5% para evitar hipoglicemia e atentar-se a sinais de hipotensão.
 - (C) Administração por via intravenosa preferencialmente via central, controle rigoroso dos sinais vitais e administração por bomba de infusão.
 - (D) Controle rigoroso do débito urinário, realizar sinais vitais de 4h em 4h e infusão com equipo microgotas com controle do gotejamento.
 - (E) Controle do débito cardíaco, administração por bomba de infusão com controle rigoroso e controle dos sinais vitais a cada 6 horas.

38. A sistematização da assistência de enfermagem é uma obrigação da equipe de enfermagem na prestação de suas atividades. Segundo o COFEN, é de responsabilidade do técnico de enfermagem realizar

- (A) prescrição de enfermagem para planejamento dos cuidados do paciente, devidamente assinada e carimbada.
- (B) diagnóstico de enfermagem para identificação dos riscos do paciente durante a internação hospitalar, devidamente assinado e carimbado.
- (C) evolução de enfermagem que deverá ser realizada no mínimo a cada 24 horas informando a evolução do paciente, assim como os cuidados prestados, devidamente assinada e carimbada.
- (D) exame físico para identificação de anormalidades fisiológicas e verificação dos riscos de infecções associados aos dispositivos, devidamente assinado e carimbado.
- (E) anotação de enfermagem contendo as informações dos cuidados prestados aos pacientes, utilizando termos técnicos e reconhecidos, devidamente assinada e carimbada.

39. A escala de Braden-Q é um instrumento utilizado para avaliar o risco do desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes pediátricos. Quais os cuidados de enfermagem para o paciente com alto risco de desenvolver lesão por pressão?

- (A) Manter a pele livre do excesso de umidade, eliminar pressão secundária por dispositivos tecnológicos, utilizar o lençol para mover a criança, evitando movê-la pelo braço.
- (B) Manter o corpo da criança em posição de alinhamento neutro, manter a pele úmida para devida hidratação, eliminar pressão secundária por dispositivos tecnológicos.
- (C) Massagear proeminências ósseas quando hiperemiadas, utilizar o momento do banho para avaliar a pele, mover sempre a criança pelos braços para evitar cisalhamento.
- (D) Manter a pele úmida para devida hidratação, massagear proeminências ósseas quando hiperemiadas, realizar mudança de decúbito de 2h em 2h.
- (E) Manter a cabeceira da cama elevada no mínimo 30°, realizar mudança de decúbito de 2h em 2h, mover a criança sempre pelos braços para evitar cisalhamento.

40. A administração intravenosa de hemocomponentes é indicada para pacientes que sofreram perda sanguínea significativa ou alterações hematológicas decorrentes de doenças ou procedimentos. De acordo com a Resolução do COFEN vigente, em relação à transfusão de hemocomponentes, o técnico de enfermagem deve

- (A) registrar o procedimento realizado e retornar para verificar os sinais do paciente após 15 minutos do início da infusão.
- (B) registrar o procedimento no prontuário do paciente e verificar a temperatura corpórea a cada 30 minutos durante a infusão do hemocomponente.
- (C) verificar a temperatura corpórea a cada 30 minutos e se houver alteração interromper a infusão do hemocomponente.
- (D) permanecer junto ao paciente nos primeiros 10 minutos após a instalação para identificar possíveis sinais de reações adversas.
- (E) permanecer junto ao paciente e verificar os sinais vitais, se houver queixa de dor no local da infusão.

